



153
372

56

C. 27

C. 6





EDOARDI VVOTTO-
NI OXONIENSIS DE
DIFFERENTIIS ANI-
MALIVM LIBRI
DECEM.

AD SERENISS. ANGLIAE REGEM
EDOARDVM VI.

Cum amplissimis indicibus, in quibus primùm authorum nomina,
unde quæque desumpta sunt, singulis capitibus sunt notata & deli-
gnata: deinde omnium animalium nomenclaturæ, itémque singu-
larum earum partes recensentur, tam græcè, quàm latinè.

LVTETIAE PARISIORVM
APVD VASCOSANVM.

M. D. LII.

Cum priuilegio Regis.



IN LIBRVM DE ANIMALIVM DIFFERENT.

riis, Edoardi Vvottoni Oxoniensis præfatio, Ad serenissimum
Angliæ Regem Edoardum, eius nominis sextum.



QVONIAM uel temeritate quadâ indoctus, uel ingenij confidentia ad hoc inflammatus uideri possum, Edoarde Rex illustrissime, ut de animalium differentiis scriberem: hæc præfatione apud tuam Maiestatem, qua studiorum meorum conatus aduersus illius culpe iniuriam defenderem, ac tueri, utendum esse iudicavi. Quod equidem eò libentius faciendum putavi, quòd alius nemo occurreret, cui iustius otij mei rationem redderem: quem & natura mihi principem, utriusque rectorem, & uoluntas meorum actionum moderatorem constituerunt. Simulque etiam expectabat animus hoc modo literarum studiosis hominibus cognitam & perspectam esse, primum quæ fuerit huius laboris initio conatus mentis: deinde, quæ causæ me huius ingenij tenuitatis non inditum ad hoc opus suscipiendum impulerint: denique quidnam id sit, quod in hac re præstare, & perficere uoluerim. Id uniuersum quicquid sit, si minus, quàm pro dignitate tantæ rei effectum esse uidebitur: spero bonos uiros, non uoluntatem mihi, sed uires defuisse cognituros. Quo nomine maiorem in illis iudiciorum & equitatem mihi promitto, si quid forte in illis uel erratum, uel non satis accurate tractatum inuenerint, rei in qua operam studiūque posuimus difficultate perspecta, & uoluntate communia studia iuuandi considerata.

Equidem cum ante multos annos, quoscunque nancisci licuit auctores, quæ rum legendi & studendi maiora uigilantia tenebam, antiquissimos optimosque euoluissim: quicunque eam doctrinæ partem scriptis illustrassent, quæ ad rem medicam pertinerent, præclare quidem omnia & plerisque descripta & excolta animaduerti: eius tamen generis esse uidebantur, quæ locorem requirerent attentum, literarum meditationi uehementer deditum, in omni scriptorum uarietate uersatum, præstanti quadam memorie ui, naturæque bonitate singulari præditi: si cuncta illa parata ac præsentia habere uellet, quæ uis forent: præsertim quæ illa non uno loco, aut intra unius scriptoris operam sepe, sed passim & uelut in medio posita, maxime uero in latissimis illis philosophorum & historicorum campis inuenerentur. Hæc res usque adeo animum meum commouit, ut commentarios quosdam subiecissim operis mihi ediscendos proponere in quorum ueluti iudicio ad auctores ipsos, si usus postularet, in re dubia consilij capiendi gratia facile deduci possem. Quæ in re quum diu multumque laborassim, & nonnihil affectus mihi uide-

P R A E F A T I O.

ret, posteaquàm doctissimorum uirorum commentaria locis primùm Ruellij, deinde Georgij Agricolæ amari quòdam & familiaris uoci scrip-
ta & in lucem edita uissem: maxima tandem me laboris parte leua-
tum sanè intelligebam. Nam hic de iis omnibus, quæ intra terræ visce-
ra nasci, animisque cætere natura uoluit, cuiusmodi sunt metallici ter-
rarum lapides, atque id genus alia. Ille de iis quæ super terram aluntur,
quales sunt stirpes omnes, deque earum rerû natura uniuersa, (quæ om-
nem ferè medicam materiam in se complectantur) ueterum in hoc ge-
nere scriptis adiun, tanta eruditione, iudicio, copia, & orationis luce
scripserunt, ut frustra in us postea operam studiûmque ponendum exi-
stimaui. Illam itaque Venerem tam feliciter exortam, & egregiè
perfectam probandam & suspiciendam, non aliqua noua audacia atting-
endam esse censeui. Vnum tamen hoc restare uidebatur, quòd nimirum
intellexim, quæ de natura eorû, quæ in aëre, aut sub aquis uitam agû,
hoc est de animalium generibus uariè & fuscè à ueteribus scripta fuere,
qui collegerit adhuc extitisse neminem. Quamobrem in huius ope-
ris meditationem, si quando per negotia licebat, & quidpiam subsociû
temporis incidebat, omni cura & conatu incumbendum esse duxi. Res
uero tandem eò perducta est, ut cum ipso mihi satisfecissem, & hanc stu-
diorum meorum partem cum quem animo finem constitueram assen-
sum uissem: uelè meuter à me contenderint ex amicis doctissimi qui-
dam uiri, quibus labores meos communicaueram, ut quod mihi in hac
re studiorum ueluti compendium parafsem, id studiis omnibus publi-
carem. Huc hæsisse me fateor, nihilque ipse iam omni consilio destru-
tus uidebar. Nam neque amicorum flagitationi, ne ingratis: neque pu-
blico commodò, ne ingratussum existimarer, deesse potui. Cum uero
meum cogitarem, quàm ab eo alienum esset uice mea institutum, &
omnis studiorum ratio, ut editis aliquando libris iudicium orbis habere
uellem, quàm nihil temporis scriptioni, nihil humanioribus literis, qui-
bus styli uirum dignitasque aliqua parari posset, dedissem: contrà quàm
omne tempus in eorum scriptis, qui philosophiam, aut medicinam inge-
niorum monumentis græcis aut latinis uocant consumpsissem, nec
alium laboris mei finem mihi proposuissem, quàm ut ea solùm intelli-
gerem: inclinatum ferè uoluntatem reuocari, nec illi animi mei indo-
ctum locum dare uolui, sene in eam artem ut descendere m. Verum
enimvero magnæ ista causæ non erant, erant tamen, sed ad amicorum
studia non erant magnæ sanis. Itaque quid illuc inquam? Si isthunc a-
nimam induxissis uelutrum esse utile: nolo reip. ullum còmodum in me
claudere. Ergo ne amicorum uoluntates contemnere tam ardentes, ne-
ue publicum commodum morari uideremur, publicè hæc nostra re-
cepturus, non tamen quoquo modo, sed quæ inter nos conuenerunt, &
si seruarentur. Sunt autem illa huiusce modi, Ioannes est Masonus, ami-
cus meus singularis & patronus, uir præter fortunæ splendorem, quo

P R A E F A T I O.

uirtus illum excolit, omnibus cum natura, tum industria adiumentis animò ornatus. Is tuo iussu ac uoluntate in Galliam proficiscens, ut apud Flentium regem legatione fungeretur, accepto à me libro, uel extorto potius, pactus est curatum se, si facta legendi copia excellenti illic doctrina ac iudicio præditus hominibus probaretur, & eum allaturus fructum uideretur, qui hac à plerisque sperabatur, eum ut typographo daret, sin aliter eueniret, mihi meum redderet, ipse ne hoc amplius exposceret. Quibus rebus ad exitum humi cõsiliij non omnino temerarij, aut arrogantis adductus sum, habes illustrissime Rex. Quid uerò in hoc genere effecerim, atque utinam aliquid effecissem: sed quid efficere uoluissim, nunc accipies. Cùm in animo mihi esset animalium rationem quo potissimum modo dignosci posset, excutere atque explicare: cùm alios nonnullos, tum uel maxime Aristotelem proponendum putauis, quem in ea re imitater, scripserem certe in omni doctrinarum genere excellentem, & propè singulatam, quo uel Cicerone teste, nihil acutus, nihil politius. Hoc igitur cum itineris doce usus, (explicita tamen prius & declarata ratione qua animalium differentia inueniri possint) incipium paulò altius ab ipso Animali repetere institui, & ita repetere, ut si quæ non illius propria, sed superiorum generum communia occurrerint, ea ipsa suo, hoc est primo loco, plana taceam. Multa enim in pluribus etiam genere diuersis eadem reperiuntur. In sequentibus deinde, si quæ species sub se non nullum inter se differetes, sed in eodem genere politas complectebantur: ea ita tractaui, ut communis ipsorum natura postulabar. Post hæc species ipsas ad sua quasque genera reduxi, quæque propria ipsarum essent, easque ab aliis rebus omnibus separarent, ea ita iam adiunxi. Sic etenim probaturum me omnibus hanc docendi uiam arbitrabar, si ea quæ generis natura ad species pertinebât, in speciebus nõ reperirentur, sed ita orationem formarem, ut neque rebus obscura fieret, neque uerbis superuacaneis redundaret. Iam ^{ad} ad marginem & in fine capitum apposui, eorum rerum, quas, quòd scitu dignæ erât, impeditas relinquere consuevit non fuit: neque tamen contextui ea inferere uolui, quòd uerebatur ne nudum lectoti, non uoluptatem essent allatura. Quid, quòd multa ex his ne inseri quidem possent? nisi forte quibus de rebus uariæ sunt authorum sententiæ, uariæ codicũ lectiones, eas res à propoliti serie non putes sciungendas. Quid, quòd sæpe sola ceterorũ animalium nomina inueniuntur, sæpe, licet præter nomina uim eorum propriam descriptam uideris, ignorabis tamen, quo pertineant, aut scilicet. Omitto graecæ linguae phrasas, quæ subinde tales sunt, ut latina eas linguae non assequatur. Omitto uersiones hominum doctissimorum, in quibus uel primas tenebat Theodorus Gaza, quæ si quando à graecorum authorum mente aberrabant, in uiam ut redirent curauis. Neque uerò unquam cuiusquam errores dissimulandos, sed semper & sine conuictij suspitione prodendos, & sine ostentatione ingenij corrigendos esse audi-

P R A E F A T I O.

caus . Cum igitur latina graecae lectionis ope facta, recta praestarentur, si graeca ipsa utio afficerentur, nec occurreret ulla ratio corrigendi, coniectura apta & idonea utendum censui. quod à nobis factum est, cum in aliis quibusdam, nam etiam in Athenæo & Oribasio, quòd horum authorum exemplaria munus multa suppetebant. Atque ut nostrae consuetudine intra sententiarum contextum locum habere non debebant sic si quae breuiter à nobis idèoque obscure tractata fuere, (quoniam ut breuitatis studiosi fuimus, ita & obscuritatem quantum leuui, uitauimus) eadem fusiis & maiore luce ab aliis explicata cognouimus, id iudicauimus in uoluminum marginibus magna diligentia adnotandum. Postremo si quid forte occurrebat, quod uel propter rei obscuritatem intelligi non posset, uel propter meam inscitiam à me intellectum non erat, id à me non est dissimulatum: sed in marginum quoque spatium ascriptum, quod alij cum in ea loca incidere, facilius per otium quid sit, uniuersum poterunt inuestigare. Atque hæc quidem hæctenus. Illud ab omnibus uehementer peto, cum plerisque non minor, bonis certe maior etià existimationis, quam uix cura sit: si quae sint in hoc opere, cuiusmodi multa esse scio, non ea circumscriptione còclusa, qua debet: si sermo minus elegans, & politus, si dicendi genus scabrum & inaequabile cuiquam uideatur: ut hæc à me instantam fuisse commentandi rationem perpendatur: quae in singulis authoribus reperiri, ea uerbis non incia, sed ipsorum reddidit, si quidem latine fuissent scripta. Nam è graecis, quae fuerunt translata, in iis interpretum uerba assumere uolui, ea quae à graecis non differebat animaduerti. Neque hic serè quicquid inuenies, quod è meo capite natum statuatur. Veterum scriptorum sententias in unum quasi cumulum coaceruauim, de meo nihil addidi. Atque illis ipsis uetibus, ne in furti crimen fortè uocarer, singulis sua reddidi, descriptis nò solum ad finem huius praefationis authorum nominibus, unde quaeque desumpta sunt, uerum etiam cuique capiti praefixis. Iam ne uniuersa tibi euoluere necesse sit, in aliis studiis occupatissimo, cum pauca fortassis de siderentur, indices quosdam rerum omnium, qui non modo quid in quoque libro, sed etiam quid in singulis eiusque libri capitibus tractetur, admovent, conficiendos, & uniuerso operi praeposendos: petui. Quo fiet ut & temporis rationi in his legendis consula tur, & ad id quod quæsieris aliquis, ueluti manu quadam ductus in eo solo legendi labore ponatur. Qua in re si unius labor, multorum otio consulatur, non est hoc committendum, ut multorum otium unus laboris consuium faciat.

Tux itaque Maiestati, princeps optime, hoc quicquid est laboris dicere ideo exequissimum petui: quandoquidem si qui fructus ex his percipi possit uideantur, eorum primatias tibi offerèdas iure existimaui, cui uni me meaque dedo, prout omnia debeo. Christus seruet tuam serenitatem diuissime incolamem.

Londini. X X I I. Octobris M. D. L I.

THEY WERE NOT REPEATED

உள்ளுயிரிடைக்கல், அதன் காலம் தாமதமாகிவிட்டால், உயிர் காப்பதில் இயலாது.

[illegible]

PRIVILEGII SENTENTIA.

CAVTV M est auctoritate regia, ne quis alius præter Vasconum, hos decem libros Edoardi Vvottoni philosophi & medici clarissimi, De differentiis animalium, ante sexennium in hoc Francorum regno imprimat, nèue vendat. Qui locus fecerit, libris & poena in sanctione æstimata, mulctabitur. Dæum Lutetiæ Parisiorum IIII Nonas Januarij M. D. LII.

Guyot.

SYMMATIM HÆC INSUNT LIBRIS
SINGVLIS, ATQVE EX IIS AV-
THORIBVS EXCERPTA.

In primo libro generatim explicatur, quibus modis constituun-
tur animalium Differentiæ: & præterea ani-
malium partes recensentur.

NIMAL. quod sit, & quo differat
ab his que non sunt animalia. Ex
authoribus. Platonē in Timæo.
Aristotele in historia animalium.

De partibus animalium. De generatione ani-
malium. De Anima. De sensu & sens. De lo-
quaci. & sensu. De somno & vigili. De Re-
spiracione. Ex Plinio. Cap. 1. fol. 1

Quibus modis constituta debeant animalia Dif-
ferant. Ex Aristotele in historia animalium. De
partib. animalium. De sensu & sensu. in. fol. 1.b
Animalium genera amplissima. Ex Aristotele
in historia animalium. cap. 1. fol. 1.b

De partibus animalium. Auctores. Aristoteles
in historia animalium. De partib. animalium.
Galenus in li. De placitu Hippocratis & Pla-
tonis. In Methodo medendi. De iniqua in-
temperie. De faciliorebus naturalibus. De
usu partium. cap. 1. fol. 1

De partibus exterioribus dissimilibus. Au-
thor Aristoteles in historia animalium. De
partibus animalium. cap. 1. fol. 1

De capite & eius partibus. Ex authoribus Ar-
istotele in historia animalium. De partibus ani-
malium. Cicerone De natura Deorum. Cornel.
Celsus. Plinio. Galeno De ossibus. De Alimen-
torum facultatibus. De compositione medi-
camentorum per loca. In Consiliis in Apho-
rismis. Ex libro qui Introductorius inscri-
bitur. Ex Iulio Polluce. cap. 1. fol. 1.b

De Collo & eius partibus. Ex Aristotele in ani-
malium historia. De partibus animalium. Ex
Galeno De Sanitate tuenda. In Anatomia.
De usu partium. De locis affectus. De ve-
terum sectione. Ex Cornel. Celfo. Plinio. &
Iulio Polluce. cap. 1. fol. 1

De Thorace & eius partibus. Auctores. Aristo-
teles in animalium historia. De partibus ani-
malium. De Generatione animalium. Gale-
nus in li. Anatomia. De usu partium. In
Methodo medendi. De Motu musculorum.

De ossibus. In Commentariis de fractura. Ex
his qui inscribuntur ser' 1. 1. Hippocrates in
Aphorismis. Ex Galenus in eundem librum.
cap. 1. fol. 1.b

De Brachijs & eorum partibus. Ex authoribus.
Aristotele in historia animalium. De parti-
bus animalium. Galeno de motu multabo-
rum. De ossibus. De usu partium. In Com-
mentariis ser' 1. 1. Ex lib. qui Introductorius
inscribitur. Cornel. Celfo. Plinio. Festo
Papien. Iulio Polluce. cap. 1. fol. 1.b

De Cruribus & eorum partibus. Auctores. A-
ristoteles in historia animalium. De partibus
animalium. Galenus De usu partium. De ossi-
bus. In Commentariis ser' 1. 1. Lib. qui In-
troductorius inscribitur. Cornel. Celsus. Iu-
lius Pollux. Festus Pompeius. cap. 1. fol. 1

De Sinu partium uicis. Auctores. Aristoteles
in historia animalium. De partibus animalium.
De Animalium uicis. De Celo & medio.
Plinio in Timæo. Corn. Celsus. cap. 1. fol. 1.b
De Capitis partibus interioribus. De Cerebro
& eius partibus. Auctores. Aristoteles in ani-
malium historia. De partibus animalium. De
Somno & Vigili. Galenus in Anatomia. De
serpente dissectione. De ossibus inscribitur
to. Lib. Introductorius. Iul. Pollux. ca. 1. fol. 1

De Oculi partibus interioribus. Auctores. Ga-
lenus De uicibus dissectione. De usu partium.
De Placitis Hippocratis & Platonis. In
Methodo medendi. Auctor libelli qui De An-
atomia oculorum inscribitur. Galeno ad-
scrip. Iul. Pollux. cap. 1. fol. 1.b

De Colli & Pectoris partibus interioribus. Ex
Auctoribus. Aristotele in historia animalium.
De partibus animalium. Galeno De usu par-
tium. Iulio Polluce. cap. 1. fol. 1.b

De uisceribus & Septo transuerso. Ex autho-
ribus Aristotele in historia animalium. De
partibus animalium. Galenus in Anatomia.
De usu partium. De Temperantia. De pla-

CAPITA X LIBRORVM

cius Hippocratis & Platonis . De uenarū se-
ctione. Iul. Pollux. Plinius . cap. xv. fol. 10
De uentris partibus interioribus . Authores. A-
ristoteles in animalium historia. De partibus
animalium. Cornel. Celsus. Galenus in Ana-
tomicis . De uenarum sectione. De usu par-
tium. De ossibus . In Commentariis in libris A-
phorism. Iul. Pollux. Plinius . cap. xvi. fol. 11
De partibus similibus . Ex Aristotele in hi-
storia animalium . De partibus animalium.
cap. xvii. fol. 11 b
De Sanguine. Venis. & Arterius & quæ huius
proportionē respōdēt. Ex Authoribus. Aristote-
le in historia animalium . De partibus ani-
malium. Galenus in libris quibus est incipit.
Quid animi mores et temperaturam conspiciat
sequuntur . An sanguis natura concitatur
in uenis . De placitis Hippocratis & Plato-
nis . De uenarum sectione . De foveæ forma-
tione. De usu partium. De Atra bile. cap. xviii. fol. 12
De Nervis. Ligamentis. & Tendinibus. Autho-
res. Aristoteles in historia animalium. Gale-
nus. In Methodo medendi. De usu partium.
De placitis Hippocratis & Platonis. De Ner-
uorum sectione . De Motu musculorum.
In Anatomicis. De ossibus. Plinius. cap. xix. fol. 12 b
De Fibris. Ex authoribus. Aristotele in historia
animalium . Galeno De temperamento.
cap. xx. fol. 13
De Ossibus . Authores. Aristoteles in animalium
historia. De Generatione animalium. De Par-
tibus animalium. Galenus De Temperamē-
tis. De ossibus. De usu partium. In Anatomi-
cis. De uenarum sectione . De motu muscu-
lorum. Lib. Introductorum. Cornel. Celsus.
Plinius. Iul. Pollux. cap. xxi. ibid.
De Glandulis. Ex authoribus Aristotele in
historia animalium . De partibus animalium.
Galenus De Temperamento. Iulio Polluce.
cap. xxii. fol. 13
De Vagibus. Vagulis. Chelis. Gorgibus. & Ro-
stris. Authores. Aristoteles in histor. anima-
lium. De partibus animalium. Plinius.
cap. xxiii. fol. 13 b
De Pile. & cute . & quæ huius proportionē res-
pondēt. S. Gorgice. Squama. Testis. Graffa. Ex
authoribus . Aristotele in historia animalium.
De partibus animalium . Galenus in Anato-
micis. De usu partium. De Temperamento.
In Methodo medendi . In Commentariis in
Aphorism. Hippocratis . cap. xxiiii. ibidem
De Membris. Ex authoribus. Aristotele in hi-
storia animalium. De partibus animalium.
Galenus in Anatomicis . De usu partium. De

Motu musculorum . De diffusionē uulnē.
De Semine . In Commentariis in Aphorism.
Hippocratis. Ex lib. Introductor. Corn. Cel-
so. Plinio. Actio. Iul. Polluce. cap. xxv. fol. 14
De Carne. Authores. Aristoteles in historia ani-
malium. Galenus De Temperamento. De Alimen-
torum facultatibus. In Anatomicis. Iul.
Pollux. cap. xxvi. fol. 14
De Glandulis. Authores. Galenus in Anatomicis.
De usu partium. De Semine . De Alimen-
torum facultatibus . In Commentariis in A-
phorism. Hippocratis . De Diffusionibus.
Plinius . cap. xxvii. fol. 14 b
De Adipe & Sebo . Authores. Aristoteles in hi-
storia animalium . De partibus animalium.
Galenus De Alimētorum uiribus. De Tem-
peramento. De usu partium. De simplicium
medicamentorum facultatibus. cap. xxviii. ibid.
De Medulla. Ex authoribus Aristotele in histo-
ria animalium. De partibus animalium. Ga-
lenus De Motu musculorum. De Alimen-
tis. Plinius . cap. xxix. fol. 14 b
De Lacte & Coagulo . Authores. Aristoteles in
animalium historia . De partibus animalium.
De generatione animalium. Galenus De A-
limentis . De simplicium medicamentorum
facultatibus. De locis affectis. Orbasius. Plinius.
cap. xxx. fol. 15 b
De Semine . Ex Aristotele in animalium histo-
ria . cap. xxxi. fol. 15
De Excrementis. Authores. Aristoteles De par-
tibus animalium. De Generatione animalium.
Galenus De Semine. Testis. De Naturalibus
facultatibus. De locis affectis. De Amala.
De simplicibus medicamentis. Iul. Pollux.
cap. xxxii. ibid.

Laber secundus ex speciatim docet
à quibus colligi debent ani-
malium differentie.

PER quæ inueniri consuevit possint a-
nimalium differentie. Authores. Aristote-
les in historia animalium. De partibus ani-
malium. De sensu & sensibus. Galenus De usu
partium . cap. xxxiii. fol. 15 b
De Differentiis animalium quæ à partium di-
stiramine oriuntur . Authores . Aristoteles
in historia animalium. De partibus ani-
malium . De animalium motu. Plinius .
cap. xxxiiii. fol. 15
De Differentiis quæ ab animalium affectionibus
oriuntur. ut Loci mutatione . laceratione. arg.

DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

- Id genus alius. Author Aristoteles in animalium historia. cap. xxxv. fol. 21. b
- Ab animalium incessu que constituantur differentie. Ex Aristotele in animalium historia. & lib. De animalium incessu. ca. xxxvi. fol. 22.
- A Generatione que oriuntur differentie. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De Generatione animalium. Plinio. cap. xxxvii. fol. 22. b
- A locis in quibus gignuntur animalia, & in quibus degunt, colliguntur differentie. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De longitudine & brevitate vite. Porphyrio. Corn. Celfo. Plinio. cap. xxxviii. fol. 23. b
- De Differentiis sexuum, masculini scilicet & feminini. Ex Aristotele in histor. animalium. De Generatione animalium. & Oppiano De venatione. cap. xxxix. fol. 27.
- A Visus ratione ductis, oriuntur animalium discrimina. Ex Aristotele in animalium historia. cap. xl. fol. 25. b
- De Differentiis que à sensibus in animalibus colliguntur. Author Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. Alexander Aphrodisius in problemis. Plinius. Cicerro De Natura Deorum. & in Quæstionibus Academicis. cap. xli. fol. 26. b
- A Respiratione & uoce animalium differentie. Ex Aristotele in histor. animalium. De Generatione animalium. cap. xlii. fol. 27.
- Quæ à Somno & uigilia oriuntur animalium discrimina, aut ab quædam, uicinia scilicet & Senectute aut uice proteritate & breuitate. Ex Aristotele in animalium historia. De sensu & sensu. De longitudine & brevitate vite. cap. xlii. ibidem.
- Differentie que à moribus constituantur. Author Aristoteles in historia animalium. Plinio. cap. xliii. fol. 27. b
- Ab Affectionibus quorundam uenatione que oriuntur animalium discrimina. Ex Aristotele in historia animalium. cap. xlii. fol. 28. b
- A Valitudine prospera aut aduersa differentie. Author Aristoteles in historia animalium. cap. xlii. fol. 29.
- Animalium discrimina eò quòd commodè magis uicinis aut incommodè nobis sint. Ex authoribus. L. Columella. M. Varone. Plinio. Galeno De Alimentis. De simplic. medicamentis. facit. cap. xlii. ibidem.
- Ab alimentis que ex animalibus nobis suppeditantur, differentie quibus modis constituantur. Author Galenus De Alimentis. De cibo. bo. malique succo. De uenis uisura

tionis. In Methodo medendi. Orbasius. Corn. Celsus. cap. xlii. fol. 29. b

Alia quedam ab alimentis que nobis præstant animalium discrimina. Ex uisdem authoribus. Et præterea Ex Aristotele in Lib. Meteorolog. Actio. Athenæo. & Plinio. cap. xlii. fol. 30.

A medicamentis que nobis præstant animalia, quibus modis constituantur animalium differentie. Author Galenus De simplic. medicamentis. Dioscorides. Plinius. Orbasius. Actio. & Aristoteles in historia animalium. cap. xlii. fol. 31. b

Liber tertius continet animalium sanguine prædiorum differentias.

PArtis exteriorum differentie in animalibus sanguine præditis. Author Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. Cicerro in Metamorph. Salustius. Et ex Theophrasto Scholasticè notualla. cap. li. fol. 32.

Interiorum partium discrimina in animalibus que sanguine prædita sunt. Author Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. De uicinis & Senect. De Respiratione. Galenus in Anapnoe. De formatione fetus. De uulue diffinitione. Solinus. cap. lii. fol. 33. b

Similium partium differentie in animalibus sanguine. Ex authoribus Aristoteles in animalium historia. De Generatione animalium. Galeno De Temperamentis. Plinio. cap. lii. fol. 34. b

Eorum que ad generationem pertinent discrimina inas que sanguine prædita sunt animalibus. Ex Authoribus Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Galeno de uenarum & arteriarum diffinitione. De uulue diffinitione. cap. liii. fol. 35.

Morum affectionumque & affectionum quorundam aliarum differentie. Author Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Theophrastus De causis fructuum. Lactetui. cap. lii. fol. 37.

Eorum que in uariis generis animalibus alimentis aut medicamentis rationem obtinent discrimina. Ex authoribus Galeno. De Ab-

CAPITA X LIBRORVM

mentis. De cib. bo. malique succi. In Metodo
medendi. De simplic. medicament. facultat.
Orbafio. cap. lvi. ibid.

Ex animalium sanguineorum paribus, ali-
mentorum medicamentumque uires diuerſe. An-
thoer. Galenus De Alimentis. De cib. bo.
malique succi. De tenu. acrius ratione. De
ſimplic. medic. facultatib. Dioſcorides. Plin-
ius. Orbafius. Aetius. Paulus Aegineta.
cap. lvi. fol. 39. b

De Excreſcentiarum, quæ in animalibus ſangu-
inis reperiuntur differentis. Anthoer. Ga-
lenus De ſimplic. medic. facultatib. De locis
afflictis. Dioſcorides. Plinius. Orbafius. Ae-
tius. cap. lviii. fol. 40. b

De Lacte & eius quæ ex lacte ſunt. In Caſeo. Bu-
tyro. & aliis. Ex authoribus. Galeno De Ali-
mentorum facultat. De cib. bo. malique ſucci.
De Sanitate tuenda. In Metodo medendi.
De ſimplic. medic. Dioſcorides. Plinius. Ori-
baſius. Aetius. Paulo Aegineta. Aſthengo. Con-
ſtantino Ceſare. Columella. Hippocrates.
cap. lxx. fol. 41

Libet quartus continet Homi- nis differentias.

DE Homine. Anthoer. Ariſtoteles in hi-
ſtoria animalium. De partibus animalium.
De Generatione animalium. De Iuue-
tute & Senect. De Memoria & Reminſcen-
tia. De Reſpiratione. De animalium inſectis.
De Anima. De Senſu & Senſ. Plinio. Solinus.
Iul. Pollux. Cicero. De natura Deorum. De
Academis Quæſtionibus. cap. lx. fol. 36. b

De partibus Hominis exterioribus. Anthoer.
Ariſtoteles in hiſtoria animalium. De parti-
bus animalium. De Generatione animalium.
De animalium inſectis. De Somno & Vigilia.
Galenus De Sanitate tuenda. In arte parua.
In Conſtitutionis in ſextum librum. De mor-
bis aulparibus lib. qui Introductio moris inferi-
bitur. Ex De Deſinitionibus. Plinius. Solinus.
Aetius. Iul. Pollux. cap. lxx. ibidem

De partibus Hominis interioribus, & ſimilan-
tis. Ex anthoeribus Ariſtotele in hiſtoria ani-
malium. De partibus animalium. De Gene-
ratione animalium. Galeno De Tempera-
mentis. In Anatomicis. De uſu partium. De
officiis. De Alimento. facultatib. De ſanitate
tuenda. Plinio. Theophr. cap. lxx. fol. 46

De uoce Hominis & Somno. Anthoer. Ariſto-
teles in hiſtoria animalium. Plin. ca. lxxv. fo. 47

De Hominis Generatione & Partu. atque de uſ
quæ ad hæc pertinent. Anthoer. Ariſtote-
les in hiſtoria animalium. In problematis. Ga-
leno De Homine. Plin. Solino. ca. lxxv. fo. 47. b

De Hominis Vita, Accacibus, & Statura. Antho-
er. Ariſtoteles De Generatione animalium.
In problematibus. Mar. Varro. Plinius. Soli-
nus. cap. lxx. fol. 48. b

Multiformes Homines effigies, & mira que-
dam de Homnibus alia. Ex authoribus. He-
rodoto. Plinio. Solino. Paſſiana. Aetiano.
cap. lxxv. ibid.

Homini quæ ex Homine ſue eius partibus o-
mnes commodæ. Anthoer. Dioſcorides.
Plinius. Galenus De ſimplic. medic. facultat.
Aetius. Solinus. cap. lxxv. fol. 49. b

Libet quintus continet anima- lium quadrupedum uinipe- rarum differentias.

DE Quadrupedum uiniperarum partibus
exterioribus. Anthoer. Ariſtoteles in hi-
ſtoria animalium. De partibus animalium.
De Generatione animalium. Galenus in A-
natomicis. Plinius. cap. lxxviii. fol. 52

Inuicem quarundam partium diſcriminas
quadrupedum uiniperis. Ex Ariſtotele in hi-
ſtoria animalium. De partibus animalium. &
Galenus in Anatomicis. cap. lxxv. fol. 51. b

Polorum colorumque diſcriminas & uocum
Quadrupedibus uiniperis. Ex authoribus.
Ariſtoteles in hiſtoria animalium. De parti-
bus animalium. Plinio. cap. lxx. fo. 54. b

De Coitu Partuque & aliis quæ ad generatio-
ne pertinet in quadrupedibus uiniperis. An-
thoer. Ariſtoteles in hiſtoria animalium. De
Generatione animalium. Plin. ca. lxxi. ibid.

De Quadrupedum uſu & genere. Anthoer. A-
riſtoteles in hiſtoria animalium. Plinius. L.
Columella. cap. lxxvi. fo. 57

De Quadrupedum tuitione, Læſione &
aliis quibuslibet affectionibus affictis. Ex
Animalium hiſtoria Ariſtotele. & Plinio.
cap. lxxvi. fo. 58

Alimenta ex quadrupedibus & eorum partibus
uaria. Anthoer. Ariſtoteles in hiſtoria ani-
malium. Galenus De Alimentis. De cib. bo-
minumque ſucci. Orbafius. Plin. ca. lxxviii. ibid.

M V L T I F I D A.

De Quadrupedibus Multiformis. Ex primo De E-
lephanto. Ex authoribus. Ariſtotele in hiſto-

DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

ria animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Galeno De usu partium. In Anatome. Plinio. Solino. Dioscoride. Strabone. Pausania. Philostrato. Oppiano De Venatione. Aelianus. cap. lxxv. fo. 96. b

De Simiarum generibus. Ex Aristotele in historia animalium. Plinio. Solino. Galeno in Anatomia. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Scribano. Aelianus. Artianus in rubi maritima generatione. Dioscoro. Siculo. cap. lxxvi. fo. 97. b

De Canibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Partibus animalium. De Generatione animalium. Galenus in Anatomia. De simplic. medic. facultatibus. Dioscorides. Aleazar. Aphrodisius in problemat. Plinius. Oppianus de pisc. & De venatione. Isid. Pollux. M. Varro. L. Columella. Gensius poeta. M. Aurelius Olympius. Vergilius in Georg. cap. lxxvii. fo. 98. b

De Lupis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Solinus. Oppianus De venatione. Galenus De compositione medic. per loca. Aetius. Gratius. Vergilius in Georg. Isid. Pollux. Aelianus. cap. lxxviii. fo. 99. b

De Hyena & Crocuta. Ex authoribus. Aristoteles in historia animalium. Oppiano De Venatione. Plinio. Solino. Galeno De simplic. medic. facultat. Aetio. cap. lxxix. fo. 99. b

De Leonibus. Ex authoribus. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Scribano. Herodoto. Solino. Galeno De usu partium. De simplicibus medic. cap. lxxx. fo. 99. b

De Tigride. Authores. Plinius. Solinus. Oppianus De Venatione. Strabo. Artianus. cap. lxxxi. fo. 99. b

De Panthera. Pardo. & Cepo. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Pausanias. Solinus. Oppianus De Venatione. cap. lxxxii. ibid.

De Vesio. Ex authoribus. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Plinio. Solino. Galeno De simplic. medic. facultat. Dioscoride. cap. lxxxiii. fo. 99. b

De Hydris. Ennacris. & Scyris. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Plinius. Solinus. Pluracibus in libello cui titulus est. Solenturine sint animalia aquatilia an terrestria. Oppianus De Venatione. Galenus De simplic. medic.

facultat. Dioscorides. cap. lxxxiiii. fo. 99. b

De Vulpe & Leporibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. Oppianus De Venatione. Galenus De simplicibus medicamentis. De Alimentorum facultatibus. De tenui usibus ratione. Aetius. Paulus Aegineta. Dioscorides. Athenarum. M. Varro. Herodotus. Xenophon De Venatu. Strabo. Moyses in Leuitico. cap. lxxxv. fo. 99. b

De Viveris. Mustelarum generibus. & De Felle. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. M. Varro. Strabo. Galenus De simplicibus medicamentorum facultat. Dioscorides. Aetius. Oppianus De Venatione. Aelianus. Ouidius in Metamorph. M. Aurelius Marcellus. cap. lxxxvi. fo. 99. b

De Muris & Musum generibus. Ex authoribus Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinio. Dioscoride. Galeno De Aliment. De simplic. medic. Ouidio in Metamorph. Herodoto. Oppiano De Venatione. M. Varro. L. Columella. Aetio. Nicandro. Aelianus. D. Hieron. cap. lxxxvii. fo. 99. b

De Quadrupedibus squamis. Vt De Fibra. Lutra & quilibet alius. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Solinus. Strabo. Dioscorides. Galenus De simplic. medic. Nicander in Therac. Aelianus. M. Aurelius. cap. lxxxviii. fo. 99. b

De Virulo marino. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Dioscorides. Oppianus De pisc. Galenus de simplic. medic. cap. lxxxix. fo. 99. b

De Talpa & Vespertione. Ex authoribus. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De animalium in cunctis. Plinio. Strabone. Isid. Pollux. Herodoto. Ouidio in Metamorph. cap. xc. fo. 99. b

De Monstris quibetdam aliis animalibus in Indis aut Anthopia prognata. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Solinus. Strabo. Aelianus. cap. xcii. fo. 99. b

BISVLCA.

De Quadrupedibus Bistices. & primo De Boae. & Boum generibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. M. Varro. L. Columella. Palladius. Scribo. Plinius. Solinus. Oppianus De Venatione. Celsus in Commentariis. Pausanias. Herodotus. Athenarum. Galenus De Aliment. De sanitate tuenda. De cib. bo. aliisque succi.

CAPITA X LIBRORVM

De simplic. medic. facultat. Dioscorides. Pau-
lus Aeginetes. cap. xxi. fol. 7a.
De Ombus. Authores. Aristoteles in histor. ani-
malium. De partib. animalium. Plinius. M.
Varro. Columella. Palladius. Galenus de Ali-
mentor. facultat. De constitutione artu. De
cib. bo. malique succi. De sanitate tuenda. De
simplic. medic. Dioscorides. Orribasius. Aeti-
us. Paulus Aeginetes. Michael Seinius. Op-
pianus De uenar. Herodotus. Achenus. A-
chamus. cap. xxi. fol. 75.
De Capris. Ex authoribus. Aristoteles in historia
animalium. M. Varro. Plinius. Columella.
Dioscorides. Palladius. Galenus De alimēt. De
tem. uisus ratione. De cib. bo. malig. succi.
De Sanitate tuenda. De simplic. medic. Ori-
basius. Aetio. Oppiano De uenatione. Hero-
doro. Achiano. Ex Lib. Regū. ca. xxi. fol. 77. b
De Cernis. Authores. Aristoteles in historia ani-
malium. De partib. animalium. Plinius. Soli-
mus. Quadrius in Metamorph. Jul. Pollux. Ga-
lenus De alimēt. De tem. uisus ratione. De
Sanitate tuenda. De simplic. medic. Diosco-
rides. Herodotus. Nicander. Paulinus. Sera-
bō. Gesenius. Achamus. cap. xxi. fol. 79. b
De Trigelapho. Tarand. Ophio. Leucocrota.
& Colo. Ex authoribus. Solino. Plinio. Stra-
bone. cap. xxi. fol. 81.
De Hippelapho. Hippardio. Hippogro. Hippo-
pocamo. & Ete. Authores. Aristoteles in hi-
storia animalū. Plinius. Solinus. Oppianus
De uenatione. Herodotus. Paulinus. Dio-
scorides. cap. xxi. fol. 81. b
De Camelo & Camelopardali. Ex authoribus.
Aristoteles in histor. animalium. De partib. a-
nimalium. De Generatione animalium. Plinius.
Herodotus. Heliodoro. Strabone. Mose
in Leuico. cap. xxi. ibidem
De Suis. Authores. Aristoteles in historia ani-
malium. Plinius. Ouidius in Metamorph.
Galenus in Anatom. De uen. dissē. De
cib. bo. malique succi. De tem. uisus ratio-
ne. De Sanitate tuenda. M. Varro. Columella.
Palladius. Orribasius. Dioscorides. Achamus.
cap. xxi. fol. 81. b

SOLIPEDES.

De Solipedibus. Plinio authore. cap. c. fo. 84. b
De Equo. Authores. Aristoteles in historia ani-
malium. De Generatione animalū. Plinius.
Solinus. M. Varro. L. Columella. Palladius.
Galenus De usu partū. Abdyrus. Vergilius
in Georg. Oppianus De uenatione. Jul. Pol-
lux. Vegetius De re ueterinaria. Herodotus.

Strabo. Achamus. Celsus in Commentariis.
cap. ci. fol. 84.
De Asino. Authores. Aristoteles in histor. anima-
liū. De partib. animalū. De Generat. anima-
liū. M. Varro. Columella. Palladius. Plinius.
Galenus De alimēt. facultat. De cib. bo. ma-
lige succi. In Methodo medica. De simplic.
medic. Dioscorides. Abdyrus. Achamus. Op-
pianus De uenar. cap. ci. fol. 87.
De Mulo. Authores. Aristoteles in histor. anima-
liū. De Generatione animalū. M. Varro. Co-
lumbella. Palladius. Plinius. cap. ci. fo. 88. b

Liber sextus continet ea quæ cortice in-
teguntur ~~quædam~~ à Græcis dicta, Qua-
drupedestilicet ouiparas, & serpētes.

DE Quadrupedibus ouiparis. Author Ari-
stoteles in histor. animalū. De partibus a-
nimalium. De animalū incesu. De Gene-
ratione animalū. De Respiratione. c. ci. fol. 89. b
De Crocodili & Scinco. Authores. Aristoteles
in histor. animalū. De partibus animalū. De
animalium incesu. Herodotus. Dioscorides.
Plinius. Paulinus. Achamus. cap. cv. fol. 90.
De Testudinū generibus. Ex authoribus. Aristo-
tele in histor. animalū. De partibus animalū.
De animalū incesu. De Inuēt. & Senectū. Plin-
io. Solino. Strabone. Oppiano De pē. Pau-
lo Aegineta. Arthuro. Martiale. c. cxi. fo. 91.
De Ranarū generibus. Ex authoribus. Aristote-
le in histor. animalū. De partib. animalū. Plin-
io. Dioscorides. Nicandro. Galeno De simpli.
medicam. Paulo Aegineta. Aetio. Achano.
cap. cxi. fol. 91. b
De Lacertis. Authores. Aristoteles in histor. ani-
malū. De partib. animalū. Plinius. Dioscori-
des. Strabone. Galeno De simplic. medic. fa-
cult. cap. cxi. fo. 93. b
De Salamandris & Sepe quadrupede. Ex autho-
ribus. Aristoteles in histor. animalū. Diosco-
rides. Plinio. Galeno De Tēperamēt. De simpli.
medic. Aetio. Nicandro. Luciano. c. cxi. fo. 94
De Stellione. Authores. Aristoteles in histor. a-
nimalium. Plinius. Nicander. Aetius. Paulus
Aegineta. Ouidius in Metamorph. Galenus
De simplic. medic. facultat. cap. cx. fol. 94. b
De Chameleone. Authores. Aristoteles in histor.
animalium. De partibus animalium. Plinius.
Solinus. Dioscorides. cap. cx. fol. 95.

SERPENTES.

De Serpētib. Authores. Aristoteles in histor.
animalium. De partib. animalium. De ani-
malium

DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

- malum accessu. De Generatione animalis. De longitudine & uita breuitate. Cornel. Celsus. Plinius. Galenus De Theriaca ad Pisonem. De Aliment. D. Basilus magnus. Oppianus De pisc. Dioscorides. Paulinus. ca. cxi. f. 97. b.
- De Hydros. & aliis quibusdam serpentibus aquaticis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Nicander. Actius. Solinus. Vergilius in Georgis. Dioscorides. Pausanias. Arrianus. Galenus de Theriaca ad Pisonem. Paulus Aegineta. cap. cxi. fol. 97. b.
- De Serpantibus terrestribus. Et primo de Aspidogeneis. Authores Aristoteles in histor. animalium. Solinus. Actius. Nicander. Lucanus. Plinius. Strabo. Dioscorides. Galenus De Theriaca ad Pisonem. Paulus Aegineta. cap. cxiii. fol. 98. b.
- De Vipera, Diplode, Ceraste, & Hamanodyte. Authores. Aristoteles in historis animalis. De panti-animalium. De Generatione animalium. Nicander. Actius. Strabo. Plinius. Solinus. Lucanus. Aelianus. Dioscorides. Galenus de Alumenis. De simplic. medicamentis. De Theriaca ad Pisonem. In Antidosis. Paulus Aegineta. Suidas. cap. cxv. fol. 99.
- De Hamorrhoe. Sepedone. Seps. Cichra. & Cichra. Authores. Nicander. Actius. Galenus De Theriaca ad Pisonem. Dioscorides. Paulus Aegineta. Aelianus. Paulinus. Lucanus. cap. cxxa. fol. 100. b.
- De Basilisco. & aliis quibusdam serpentibus, quorum uenenum remedio caret. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Solinus. Galenus De Theriaca ad Pisonem. Nicander. Dioscorides. Dioscorides Siculus. Aelianus. cap. cxxvi. fol. 101.
- De Dracone. Amphibena. & aliis quibusdam serpentibus, quorum morsus minus affert periculum. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Solinus. Nicander. Pausanias. Strabo. Actius. Lucanus. Herodotus. Philostratus iuxta Apollonem Tyrannem. Aelianus. cap. cxxvii. fol. 102. b.

Libri septimus continet animi differentias.

- D**E Partibus Animi exterioribus. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. De sensibus animalis. Plinius. cap. cxi. fol. 103.
- De Partibus Animi interioribus. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. De

- Respiratione. Galenus De uita positum. cap. cxx. fol. 104.
- De Cerebri Animi, & aliis quae ad eorum generationem pertinent. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. De Generatione animalis. Plinius. ca. cxi. f. 103.
- De uita Animi. & de mutatione. Authores. Aristoteles in histor. animalium. & Plinius. cap. cxiii. fol. 106. b.
- De uocis differentibus & coloris in Auiibus. Ex Aristotele in histor. animalium. Et de partibus animalium. cap. cxxii. fol. 107. b.
- Ex ingressu animi & uoluntate differentis. Aque ex ualitudine moribusque. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. Plinius. cap. cxxviii. ibidem.
- Eorum quae in auiibus alimentis medicamentisue rationem obtinent, differentia. Ex auiibus Galenus De aliment. De tenui uisus ratione. De cibis. malisque succis. De Sanitate tuenda. De simplic. medic. De ratione uisus in morbis acutis. In methodo medendi. Dioscorides. Plinius. Paulus Aegineta. c. cxxv. f. 108.

FIDIPEDES.

- De animi generibus quae fidos habent pedes. Et primo de Gallinaceo genere. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. De generatione animalis. Plinius. Columella. M. Varro. Palladius. Dioscorides. Galenus De aliment. De cibis. malisque succis. De simplic. medic. facultat. Orithasius. Actius. cap. cxxvi. fol. 109. b.
- De Gallis Rusticis. Africanis. Melagris, & Pavone. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De animalium uicella. M. Varro. Columella. Plinius. Aelianus. Palladius. Oppianus de Venatione. Galenus De alimentis facultat. Aelianus. cap. cxxvii. fol. 111.
- De Columbaceo genere. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalis. De generatione animalis. L. Columella. M. Varro. Palladius. Plinius. Aelianus. Dioscorides. Galenus De tenui uisus ratione. De cibis. malisque succis. De simplic. medic. De aere bibo. cap. cxxviii. fol. 112.
- De Palumbis. Oenadis. Pelidae. & Turtur. Ex auiibus Aristoteles in histor. animalium. De generatione animalis. Alexandro Myndio. Aelianus. Dioscorides. Plinius. Galenus. De aliment. De tenui uisus ratione. Orithasius. Aelianus. Martialis. cap. cxxix. fol. 114.
- De Phasianis. Toracis. Erythrotoracis. Otide. & Oco. Authores. Aristoteles in histor. animalium.

CAPITA X LIBRORVM

lum. Plinius. Athenęus. Strabo. Galenus
De alimentis. & De tenui uisus ratione.
cap. cxxx.
De Cormuris. Perdices. Galeus, & alii id ge-
nus quibuscumque venenis grauioribus. Ex
Auctoribus. Aristoteles in hystor. animalium.
Plinio. Athenęus. M. Varro. Ouidio in Me-
tamorph. Solino. Scribonio. Dioscoride. Ga-
leno. De aliment. De cib. bo. malig. sicca. De
tenui uisus ratione. De simplic. medic. Or-
basio. Aeno Jul. Pollux. Adiano. Vespasiano
in Georgic. Suda. cap. cxxxv. fol. 115.
De Tardorum Menstruorumque generibus, & a-
liis quibuscumque cum eis similitudine qua-
dam angustant. Auctores. Aristoteles in hi-
stori. animalium. M. Varro. Columella. Plinius.
Athenęus. Dioscorides. Galenus. De alimen-
tis. De tenui uisus ratione. De simplic. medic. Paula-
nus. Adianus. cap. cxxxvi. fol. 117. b

AVES CARNIVORAE.

De Aquilaram generibus. Auctores. Aristote-
les in hystor. animalium. De Generatione a-
nimantium. Plinius. Athenęus. Galenus. De u-
sibus partium. De simplic. medic. faculas. Pau-
linus. cap. cxxxviii. fol. 118. b
De Accipitrum generibus. Ex Auctoribus. Ar-
istoteles in hystor. animalium. De Partibus ani-
malium. De Generatione animalium. Ouidio
in Metamorph. Plinio. Scribonio. Galeno. De
usu partium. De simplic. medic. Oppiano. De
venenosis. Columella. cap. cxxxix. fol. 120.
De Cuculo. Auctores. Aristoteles in hystor.
animalium. De Generatione animalium. Pla-
nius. cap. cxxxix. fol. 121.
De Nocturnis Auiibus, quę unęquęque sunt. Au-
ctores. Aristoteles in hystor. animalium. Pla-
nius. Aristophanes. Ouidius in Metamorph.
Athenęus. Adianus. cap. cxxvi. fol. 122.
De Hirundinum generibus. Ex Auctoribus. Ar-
istoteles in hystor. animalium. De Generatione
animalium. Plinio. Ouidio in Metamorph.
Columella. Vergilio in Georgic. Adiano. Ga-
leno. De simplic. medic. De compositione me-
dicamentorum per loca. Paulo. Argenteo. Ar-
tio. cap. cxxxviii. fol. 123.
De Coruinis generis. I. Coruus. Coruice. & Mo-
nedula. Auctores. Aristoteles in hystor. ani-
malium. De partibus animalium. De Genera-
tione animalium. De adinsum audiri. Pla-
nius. Apuleius. Athenęus. Lucretius. Ouidius
in Fastis. & in Metamorph. Oppianus. De
Venenosis. Vergilius in Georgic. Cicero de
Diuinatione. & Heliachim. Suda. ca. cxxxviii.

fol. 124.
De Pico Martio. Pinnaco. Pica & quibuscumque id
genus aliis. Auctores. Aristoteles in hystor.
animalium. De partibus animalium. Plinius.
Solinus. Adianus. Ouidius in Metamorph.
cap. cxxxix. fol. 125.
De aliis quibuscumque auiibus, quę uisus causa ar-
bores & lignaserunt confunduntur. Ex Ar-
istoteles in hystor. animalium. Adiano & Pla-
nio. cap. cxi. fol. 126.
De Aquila, id est quę spem uictorie. Ex Aristote-
le in hystor. animalium. Plinio. & Adiano.
cap. cxi. fol. 126. b
De his auiibus quę maxima ex parte uermiculis
aliquęque id genus animalculis uiuunt. Ma-
trophila duntor. Ex Auctoribus. Aristoteles
in hystor. animalium. De longitudine & bre-
uitate usque. Plinio. Actio. Aristotelo. cap. cxi. b.

AQUATICAE VOLACES.

De Auiibus quę circa aquam uisunt. Primo De
uolacibus. Auctores. Aristoteles in hystor.
animalium. Plinius. Athenęus. Herodotus.
Actius. Galenus. De simplic. medic. Aristoteli-
phanes. Adianus. cap. cxlii. fol. 128.
De Laro. Charadrius. Fulica. Ardeya & Catas-
cia. Ex Auctoribus. Aristoteles in hystor. ani-
malium. De partibus animalium. Plinio. A-
thenęus. Aristophanes. Heliodoro. Cicero de
Diuinatione. Arato. Vergilio. Nicandro.
Lucretio. Ouidio in Metamorph. Suda.
cap. cxlii. fol. 129. b
De Flano. Cicon. Otorigometra & Glomide. An-
chora. Aristoteles in hystor. animalium. Pla-
nius. Athenęus. Aristophanes. Herodotus.
Suda. cap. cxlv. fol. 130. b
De Ardeiarum generibus. De Porphyrio, &
Hermasopode. Ex Auctoribus. Aristoteles in
hystor. animalium. De animalium insectis. Pla-
nio. Ouidio in Metamorph. Arato. Athe-
nan. Adiano. cap. cxv. ibid.
De Graue. Plata. Oconia, & Ibede. Auctores.
Aristoteles in hystor. animalium. Plinius. Ci-
cero de natura Deorum. Aristophanes. Ga-
lenus. De Aliment. facula. Solinus. Strabo. He-
rodotus. Adianus. cap. cxlv. fol. 131.

Aquaticę aues grauiiores.

De Aquaticis grauioribus, quę omnes palmas
desunt. De Anserum generibus. De Olore
& Onocrotalo. Ex auctoribus. Aristoteles in
hystor. animalium. Plinio. Columella. M. Var-
rone. Galeno. De Aliment. De cib. bo. malig.
facula. De simplic. medic. Dioscoride. Michael-
le. Serbo.

- le Serho . Acliano . Ouidius in Metamorpho.
D . Hieronymo in Sophoniam . Solino .
cap. clviii. fo. 132.
De Anasino genere . & alus que Anasibus simi-
les sunt . Ex authoribus . Aristotele in hystor.
animalium . Plinio . Acliano . Galeno De ali-
ment. M. Varrone & Columel. en. clviii. 133. b
De Corais aquanilibus . Ex Aristotele in hystor.
animalium . & Plinio . c. cl. fol. 134.
De Branchio & Vpuga . Ex authoribus . Aristote-
le in hystor. animalium . Plinio . Ouidio in Me-
tamorph. Pansima . Acliano . cap. cl. ibid.
De Aurbis partium peregrinis . partium insubri-
sis . Authores . Aristoteles in hystor. animaliu.
Plinius . Solinus . Galenus De locis affectis .
Plutarchus . D Ambrosius in Hexahemer .
Ouidius in Fastis . & in Metamorph . Clau-
dianus . Aclianus . Pansimas . Lactantius .
cap. clvi. ibidem.
De Struthiocarnelo . Ex authoribus . Aristotele
in hystor. animalium . De partib. animalium .
De Generatione animalium . Dioscoro Sicu-
lo . Plinio . Strabone . Galeno De aliment. De
cib. bo. malique succi . Aeno . c. clviii. 136.

Liber octauus continet quæ in sangui-
ne præditis sunt aquacilæ : quæ scilicet
in aqua uictum querunt & in a-
qua quoque perunt : uidelicet pisciũ
& Cetorum genera .

- D**E Piscibus & eorum partibus et histori-
bus . Ex authorib. in . Aristotele in hystoria
animalium . De partibus animalium . De
Generatione animalium . De animalium in-
cessu . De Respiratione . Plinio . Galeno De
usu partium . cap. clviii. fo. 136. b
De Piscium interioribus partibus . Ex Aristote-
le in hystor. animalium . De partibus anima-
lium . De Generatione animalium . De Respi-
ratione . Oppiano De pisc. cap. clv. fo. 137. b
De Sexus discrimine in piscibus . Deq. eorum
coru & alus que ad generationem pertinent .
Ex Aristotele in hystor. animalium . De par-
tibus animaliu . De Generatione animaliu .
Plinio . Oppiano De piscib. cap. clvi. fo. 138. b
De Ratione uictus piscium . Author Aristote-
les in hystoria animalium . De partibus ani-
malium . cap. clviii. fo. 140.
Quod loca mutant pisces uarie arguunt .
Ex Aristotele in hystoria animalium . & Plinio .
cap. clviii. fo. 140. b
De Coloris mutatione in piscibus uicique &
somno . Ex Aristotele in hystor. animalium .

- cap. clv. ibidem.
De Valeriodus piscium Differentiis . cum ex le-
gis . cum ex temporibus . Ex authoribus An-
tistotele in hystor. animalium . Columella . &
Plinio . cap. clx. fo. 141.
In Alimentis medicamentisque ratione piscium
discrimina . Authores . Galenus Lib. De ali-
ment. De cib. bo. malique succi . In Methodo
medici . Oribasius Paulus Aegineta . Aclianus .
Aclianus . cap. clxi. fo. 142. b

Chartilagines Pisces . & Plani .

- De Chartagines piscib. Authores . Aristote-
les in hystor. animalium . De partib. anima-
lium . De Generatione animalium . Plinius .
Galenus De alimentis scilicet . De tenui ui-
ctus ratione . De Sanitate uictus . Aclianus .
cap. clxii. fo. 143.
De Plani piscibus Chartagines . Authores .
Aristoteles in hystor. animalium . De partib.
animalium . De Generatione animalium . Plinius .
Athenopis . Galenus De aliment. De tenui
uictus ratione . De simplic. medicament. .
Oppianus De piscib. Dioscorides . Nicander
in Theriac . Paulus Aegineta . Aclianus . O-
uidius in Halionibus . cap. clxiii. fo. 144.
De Chartagines oblongis . ut de Galen. et ut
que poma & ardicantur . Authores . Aristote-
les in hystor. animalium . Plinius . Oppianus
de piscib. Athenopis . Scribo . Galenus . De ali-
ment. facilius . Oribasius . Theophrastus
in plantarum hystoria . Pansimas . Aclianus .
Herodotus . Columel . Apulcius . Ausonius .
cap. clxiiii. fo. 146.
De Piscib. Longis . Ex Aristotele in hystor. ani-
malium . cap. clxv. fo. 147.
De Murena . Anguilla . & alus quibusdam lon-
gis . Authores . Aristoteles in hystor. anima-
lium . De partib. animalium . De animalium
incessu . Plinius . Aclianus . Ouidius in Ha-
licone . Oppianus De piscib. Galenus De Ali-
ment. De cib. bo. malique succi . De tenui ui-
ctus ratione . Columella . Nicander in The-
riac . Macrobius . Oribasius . Aclianus .
cap. clxvi. fo. 147. b
De planis piscib. qui & poma & ardicantur . ad est
qui piscitibus sunt specio . Authores . Aristote-
les in hystor. animalium . De animalium in-
cessu . Plinius . Columella . Aclianus . Gale-
nus De aliment. De tenui uictus ratione . De
cib. bo. malique succi . Oribasius . Oppianus
De piscib. Aclianus . Ouidius in Halionibus .
cap. clxvii. fo. 150.

SAXATILES.

CAPITA X LIBRORVM

De piscibus quibullis in hoc libris tractantur. De Scato. Ex auctoribus Aristotele in hystor. animalu. De piscib. animalu. Plinio. Galeno De aliment. Orbasio. Athenaro. Oppiano De piscib. Columella. cap. cxxv. fo. 191. De Mulla. Coryge. & alus quibullis similibus. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. De Generatione animalu. Oppianus De piscib. Athenarus. Plinius. Dioscorides. Ouidius in Halieutic. Columella. Galenus De aliment. Orbasius. Serabo. Aelianus. cap. cxxv. fo. 191. De Synoches Synagris. Chares. Cleom. & Citharo. Ex auctoribus. Aristotele in hystor. animalu. Plinio. Athenaro. Galeno De potius Naturalib. De aliment. Orbasio. Oppiano De pisc. Aelianus. Ouidius in Halieutic. cap. cxxv. fo. 191. De Anthur genitibus. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Oppianus De piscib. Athenarus. Plinius. Ouidius in Halieutic. Galenus De usa partu. Orbasius. Paulus Aegineta. Columel. Helyche. Aelianus. cap. cxxv. fo. 194. De Lupo & Asella. Ex auctoribus. Aristotele in hystor. animalu. Plinio. Columella. Athenarus. Oppiano De pisc. Ouidius in Halieutic. Plutarchus. Galeno De aliment. De cib. bo. malique succi. De tenui uis. ratione. Orbasio. Aelianus. Apuleius. Apolog. Varro in Delingua Latina. cap. cxxv. fo. 195. De Vimbra. & Glaucio. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Plinius. Athenarus. Galenus De aliment. Orbasius. Oppianus De piscib. Aethores. Ouidius in Halieutic. cap. cxxv. fo. 195. De Sparo & Amara. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Plinius. Orbasius. Athenarus. Oppianus De pisc. Columella. cap. cxxv. fo. 196. De Turdo. Merula. & alus quibullis similibus. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Galenus De aliment. De potius Naturalib. Plinius. Athenarus. Ouidius in Halieutic. Oppianus De piscib. Orbasius. Columella. Aethores. cap. cxxv. fo. 196. De Melanuro. Corosano. & alus quibullis. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Columella. Plinius. Oppianus De pisc. Athenarus. Galenus De aliment. Orbasius. cap. cxxv. fo. 197. De Escoroto & Cordulo. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. De partu animalu. De Respiratione Plinius. Athenarus. Oppianus De piscib. cap. cxxv. fo. 198. De Draco marino. & Scorpione. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Plinius. Oppianus De piscib. Aelianus. Dioscorides. Athenarus. Galenus De aliment. De tenui uis. ratione. Orbasius. Paulus Aegineta.

cap. cxxv. fo. 198. De Mugilum genitibus. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. De partu animalu. De Generatione animalu. De animalu inuicem. Oppianus De piscib. Athenarus. Plinius. Serabo. Orbasius. Galenus De aliment. De cib. bo. malique succi. Paulinus. Aethores. cap. cxxv. fo. 199. De Salsquillo. Salpa. & quibullis alus. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Plinius. Oppianus De piscib. Athenarus. Orbasius. Columella. cap. cxxv. fo. 200. De Gobione. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Oppianus De piscib. Athenarus. Ouidius in Halieutic. Galenus De aliment. De cib. bo. malique succi. Aelianus. Dioscorides. Plinius. cap. cxxv. fo. 201. De Apuaru genitibus. & similibus quibullis alus. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Plinius. Athenarus. Oppianus De pisc. Orbasius. Iul. Pollux. Aelianus. cap. cxxv. fo. 202. De Trichide. Thrissi. & similibus quibullis alus. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. De Generatione animalu. Plinius. Athenarus. Oppianus De pisc. Serabo. Apuleius in Apolog. Columella. Galenus De aliment. Suidas. cap. cxxv. fo. 203. De Halecula. Mena. Smaride. & Boce. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Plinius. Athenarus. Columella. Oppianus De piscib. Dioscorides. Galenus De simplic. medic. Orbasius. cap. cxxv. fo. 204. De aliis quibullis piscibus qui uocales dicuntur. Aethores. Aristoteles in hystor. animalu. Plinius. Paulinus. Athenarus. Serabo. cap. cxxv. fo. 205. De Thyra. Thymede. Pelamide. & huiusmodi genibus alus. Ex auctoribus. Aristoteles in hystor. animalu. Plinio. Athenaro. Orbasio. Oppiano De pisc. Serabone. Ouidius in Halieutic. Galeno De Sanitate tuenda. De aliment. De cib. bo. malique succi. De simplic. medica. Dioscoride. cap. cxxv. fo. 206. De Salsimotos. Ex auctoribus. Plinio. Columella. Dioscoride. Galeno De aliment. De simplic. medic. Athenarus. Orbasius. Aethores. cap. cxxv. fo. 207. De Scombro. Coka. Arna. & aliis quibullis qui sale seruantur. Ex auctoribus. Aristoteles in hystor. animalu. Plinio. Galeno De aliment. Orbasio. Aethores. Athenarus. Oppiano De piscib. Aelianus. Columella. Corneli. Celso. cap. cxxv. fo. 208. De pergrandibus alus quibullis piscibus. quorum

DE DIFFERENT. ANIMALIUM.

si animalia erit a seorsim, id est contactus uo-
dit quid. Ex authorib. Aristotele in hystor. a-
naturali. Strabone. Plinio. Phiarcho. Oppia-
no De pisc. Arbenzo. Orbasio. Aufeno. Dio-
scorde Galeno De simpl. medic. Paulo Aegina-
ra. Herodoto. Aelianus. c. ccc. fol. 187.
De alia quibusdam Romanis & lacustibus pi-
scib. Ex authoribus. Aristotele in hystor. ani-
malib. De partib. animalium. Plinio. Phiar-
cho De summis. Aufeno. Aeliano. Arhe-
naso. Oppiano De piscib. cap. ccc. fol. 189.
De Niloticis piscib. & aliis quibusdam ignotis.
Ex authoribus. Aristotele in hystor. animalib.
Plinio. Strabone. Arbenzo. Oppiano De pi-
scib. Quidio in Halcum. Paulo Aegina-
ra. Iul. Polluce. Aeliano. cap. ccc. fol. 190.
De Piscibus mira. Ex authoribus. Aristotele De
Respiratione. Theophrasto De piscibus. Plinio.
Arbenzo. Columella. Philostrato in vita
Apollonij. Aeliano. cap. ccc. fol. 190. b

CETE.

De Cetis. Ex authoribus. Aristotele in hystor. a-
naturalium. De partib. animalium. De Respi-
ratione. Plinio. Oppiano De piscib. Galeno
De Alimē. De Sanitate uisita. c. cccc. fol. 191.
De Delphino & Phocena. Authoris. Aristote-
le in hystor. animalium. De partibus anima-
lium. De Generatione animalium. Plinio.
Solinus. Oppiano De piscib. Quidius in Me-
tamorph. Aelianus. cap. ccc. fol. 191. b
De Balena. Ceta. & Physiterē. Ex authoribus.
Plinio. Oppiano De Pisc. Strabone. Festo Pō-
peio. Solino. cap. ccc. fol. 191. b
De Aliis quibusdam marinis belat. Ex authorib.
Aristotele in hystor. animalib. Plinio. Oppiano
De pisc. Quidio in Metamorpho. Paulina.
Aeliano. Vergilio in Aeneide. c. ccc. fol. 193.
Liber nonus continet animalium. Exan-
guinum Differētiis: & pēstantim, in-
sectorum.

DE Animalibus Exanguibus. Ex Aristote-
le in hystor. animalium. De partib. anima-
lium. De animalium ingressu. & Colo-
rella. cap. ccc. fol. 193. b
De insectis & eorum partibus ex authoribus. Ex
Aristotele in hystor. animalium. De partib. a-
naturalium. De animalium ingressu. De sen-
su & sensu. Plinio. cap. ccc. fol. 194.
De Partibus Insectorum in sensibus. Ex Aristote-
le in hystor. animalib. De Partibus anima-
lium. De Generatione animalium. & Plinio.
cap. ccc. fol. 194. b
De Insectorum generatione & uirtute. Ex An-

istotele in hystor. animalium. & De Genera-
tione animalium. cap. ccc. fol. 194.
De Visu Insectorum. Voce. Valerianoque. &
aliis quibusdam affectibus. Ex Aristotele in
hystor. animalium. & De partib. animalium.
cap. ccc. fol. 197.
De Insectorum generibus quas suos sibi extru-
unt. ut De Apibus, atque id genus aliis. Au-
thores. Aristoteles in hystor. animalium. De
Generatione animalium. Plinio. M. Varro.
Columella. Vergilio in Georg. c. ccc. fol. 197. b
Ratio operis & uita Apū. Authores. Aristoteles
in hystor. animalib. Plinio. M. Varro. Dio-
scordes Columella. cap. ccc. fol. 199.
De Generatione Apum. Ex Aristotele in hystor.
animalium. De Generatione animalium. &
Plinio. cap. ccc. fol. 180. b
De Morbis Apum & in quibus aliis inimici. sunt
apibus. Ex authoribus. Aristotele in hystor.
animalium. Plinio. Columella. Vergilio in
George. cap. ccc. fol. 180.
De Melle. Ex authoribus. Aristoteles in hystor.
animalium. Plinio. Seneca. in Lib. Epistol.
Dioscoride. Galeno De Naturalib. potiss.
De aliment. De fontib. uirtutib. In Methodo
Medendi. De Annos. M. Varro. L. Colo-
mella. Palladio. cap. ccc. fol. 181.
De Cera & Propoli. Ex authorib. Plinio. Dio-
scorde. & Galeno. De simpl. medic. facult.
cap. ccc. fol. 183.
De Vespe. Crabronibus. & Trembedone. Au-
thores. Aristoteles in hystor. animalium. De
Generatione animalium. Plinio. M. Varro.
cap. ccc. fol. 183.
De Sierē. Bombylio. & Bombytis. Authores
Aristoteles in hystor. animalium. Nicander in
Therac. Plinio. c. ccc. fol. 184.
De Formicis & Scorpionibus. Authores. Ari-
stoteles in hystor. animalium. De partib. a-
naturalium. De Generatione animalium. De
sensu & sensu. Plinio. Solinus. Galenus. De
simpl. medic. Nicander. Quidius in Meta-
morph. Paulinas Strabo. Dioscorides. Sin-
dus. Aelianus. cap. ccc. fol. 184.
De Araneis & Phalangis. Authores. Aristote-
les in hystor. animalium. De Generatione a-
naturalium. Plinio. Quidius in Metamorph.
Aenes. Paulus Aeginetas. Nicander in The-
rac. Dioscorides. cap. ccc. fol. 186.
De Scolopēdra, & aliis quibus multipedes dicunt.
Ex authoribus. Aristoteles in hystor. anima-
lib. De partibus animalib. De Respiratione.
Nicandro in Therac. Plinio. Dioscoride. Op-
piano. De pisc. Paulo Aegina. Galeno De

CAPITA X LIBRORVM

Templa, medic. Aethanas. cap. cccxi. fo. 188
 De iniqua promiscuitate & ueluti aculeum in
 un. genit. Vt de Mofes & Calicibus. Autho-
 res. Antheocles in hiftor. animalium. De par-
 tib. animalium. De Generatione animalium.
 Plinius. Columella. Vergilius in Georg. Seta-
 bo. Theophrastus in plantarum hiftor. Sui-
 das. Antiochianus. Aethanas. cap. cccxi. fo. 189
 De Cicadis. Authores. Antiochianus in hiftor. ani-
 malium. De Respiratione. Plinius. Diofcori-
 des. Galenus. De fimplic. medic. Athenes.
 Aethanas. cap. cccxi. fo. 190
 De Locustis. Ex authoribus. Antiochianus in hiftor.
 na animalium. De partib. animalium. De Ge-
 neratione animalium. Plinius. Aethanas. Dio-
 fcorides. Mofes Leuitic. cap. cccxi. fo. 190
 De Vagantibus, quæ græci uoluerunt uo-
 cam. Ex Antiochianus in hiftor. animalium. De
 partib. animalium. De Generatione anima-
 lium. de animalium ingreffu. De Respiratione.
 Theophrastus. Decimus plantarum. Plinius.
 Diofcorides. Galenus. De fimplic. medicam.
 Nicandro. cap. cccxi. fo. 191
 De Finis, & in quæ exis gignitur, ut papilio-
 nam generibus. Et de penarum quibusdam a-
 liis quæ ex uermibus gignuntur. Ex authori-
 bus. Antiochianus in hiftor. animalium. De par-
 tib. animalium. De Generatione animalium.
 Plinius. Cuius in Metamorphofis. Diofcori-
 des. Nicandro in Theriac. cap. cccxi. fo. 193
 De Betholis quibusdam quæ in liguis aut arbori-
 bus nascuntur. Authores. Antiochianus in
 hiftor. animalium. Theophrastus in Plantarum
 hiftor. De cultis plantarum. Plinius. Placitus
 in Cistaceis. Columella. Scribo. Suetonius
 in Serpis Galba. cap. cccxi. fo. 193
 De nouis quæ in alis ferpibus aut fructibus
 crefcunt. Betholis. Authores. Theophrastus in
 hiftor. plantarum. De Causis plantarum. Pi-
 nius. M. Varro. Palladius. Pomponius. Phocius
 Germainicus. cap. cccxi. fo. 194
 De Betholis quibusdam quæ in igne, aut
 terra ipfa gignuntur. Ex authoribus. Antio-
 chianus in hiftor. animalium. De animalium in-
 celfu. De Generatione animalium. Plinius.
 Diofcorides. Galenus. De fimplic. medic. Aeth-
 nas. Aethanas. cap. cccxi. fo. 195
 De Betholis quibusdam quæ intra aut eorum
 partibus generantur. Ex authoribus. Antiochianus
 in hiftor. animalium. Plinius. Galenus in Co-
 mmentariis in Aphorismis. In Methodo medendi.
 Ex lib. qui Inuolutum infirmitatibus.
 Actus. Paulo. Aegina. Columella.
 cap. cccxi. fo. 197

Deus quæ carnis uicij humore absterit. Vt Pe-
 ce. Polliculo. Ruces, & fimilibus. Ex autho-
 ribus. Antiochianus in hiftor. animalium. De par-
 tib. animalium. De Generatione anima-
 lium. Plinius. Q. Sereno. Galenus. De compo-
 sitione medic. per loca. De fimplic. medica.
 Diofcorides. Paulo. Aegina. cap. cccxi. fo. 196
 De Blatis. Authores. Antiochianus in hiftor. ani-
 malium. Plinius. Diofcorides. Galenus. De
 fimplic. medic. cap. cccxi. fo. 197

Libet decimus continet Exanguum A-
 quatilium Differentias, ſcilicet Mol-
 lum, Cruſtaceorum, & Teſtaceorum quæ
 Zoophyta appellantur: quæ & à nō-
 nullis peſces uocantur.

MOLLIA.

DEIUS quæ Mollia dicuntur. Authores. An-
 tiochianus in hiftor. animalium. De partib.
 animalium. De Generatione animalium.
 De Respiratione. Galenus. De Aliment. De
 uis. bo. molliques ſuoc. Onbaſius. Aethanas.
 cap. cccxi. fo. 198
 De Polypo. Ex authoribus. Antiochianus in hiftor.
 animalium. De partib. animalium. De Ge-
 neratione animalium. Plinius. Oppiano. De gi-
 ſib. & de Venarum. Aethanas. Iul. Pollux.
 & Onbaſius. cap. cccxi. fo. 199
 De Sepia. Ex Antiochianus in hiftor. animalium.
 De partibus animalium. De Generatione ani-
 malium. Plinius. Aethanas. Diofcorides. Gale-
 nus. De fimplic. medic. ſecundum Paul. Aegina-
 ra. cap. cccxi. fo. 201
 De Loliginæ & Lolio. Authores. Antiochianus
 in hiftor. animalium. De partib. animalium.
 Plinius. Oppianus. De peſc. Aethanas.
 cap. cccxi. fo. 202
 De Lepore marino. Ex authoribus. Diofcorides.
 Galenus. De fimplic. medic. ſecundum. Actus.
 Plinius. Nicandro in Alexipharmac. Apuleio
 in Apolog. Aethenas. Aethanas. cap. cccxi. fo. 203

CRVSTATA.

DE CRUSTACEIS. Ex authoribus. Antiochianus in hiftor.
 na animalium. De partib. animalium. De Ge-
 neratione animalium. De Respiratione. Gale-
 nus. De Aliment. Plinius. Aethanas. Onbaſius.
 Actus. cap. cccxi. fo. 203
 De Locustis. Authores. Antiochianus in hiftor. a-
 nimalium. De partib. animalium. De anima-
 lium incelfu. De Generatione animalium.
 Aethenas

DE DIFFERENT. ANIMALVM.

Athenicus. Plinius. Oppianus De pisci.
cap. cccxxi. fol. 104
De Asaco sine Cammaro. Ex Aristotele in histo-
ria animalium. De parib. animalium.
cap. cccxxii. fol. 105
De Cancro generibus. Authores. Aristote-
les in historia animalium. De parib. anima-
lium. De animalium ingressu. Plinius. Op-
pianus de piscib. Athenicus. Dioscorides. Ga-
lenus De cib. bo. malique succi. De simplic.
medic. Paulus Aegineta. Aetius. Aelianus.
cap. cccxxiii. fol. 105.b
De Squallurum generibus. Et Cimarum. Leone.
Et Arcto. Ex authoribus. Aristoteles in histo-
ria animalium. De paribus animalium. Plinio.
Athenico. Aeliano. cap. cccxxiiij. fol. 106.b

TESTATA.

De Testaceis. Authores. Aristoteles in histo-
ria animalium. De parib. animalium. De anima-
lium ingressu. De Generatione animalium.
Galenus De Alimentis. De cib. bo. malique
succo. De tenui viscus renone. De siliis
tuerda. Orbasius. Plinius. Athenicus.
cap. cccxxv. fol. 107.b
De Turbinatis. Author. Aristoteles in histo-
ria animalium. De parib. animalium. cccxxv. fol. 107
De Cochleis. Ex authoribus. Aristoteles in histo-
ria animalium. De paribus animalium. De
Generatione animalium. Plinio. Dioscori-
de. Orbasio. Athenico. M. Varrone. Galeno
De cib. bo. malique succo. De Alimentis. De sim-
plic. medic. De compositione medic. per lo-
ca. Aetius. Paulo Aegineta. Cornelio. Celso.
Cicerone De Distributione Strabone.
ca. cccxxvi. fol. 110.
De Maricorum generibus. in Purpura. Buccino.
Scaliquis. Authores. Aristoteles in historia
animalium. De Generatione animalium. Pli-
nius. Athenicus. Dioscorides. Strabo. Gale-
nus De Alimentis. De cib. bo. malique succo.
De simplic. medic. Orbasius. Paulus Aegineta.
Cicerone. Metamorph. ca. cccxxvii. fol. 111
De Strabulo. Et Natus. Ex authoribus. Aristote-
les in historia animalium. De parib. animalium. Plinio.
Aeliano. Et Athenico. ca. cccxxviii. fol. 112
De Echuris. Ex authoribus. Aristoteles in histo-
ria animalium. De parib. animalium. De Gene-
ratione animalium. Plinio. Dioscorides. Gale-
no De Alimentis. De simplic. medicamentis.
cap. cccxxix. fol. 113
De Balano. Authores. Aristoteles in histo-
ria animalium. Plinius. Athenicus. Galenus De Al-
mentis. Orbasius. cap. ccc. fol. 114.

De Vmculibus. Et De Lepade. Et Aure mari-
na. Ex authoribus. Aristoteles in histo-
ria animalium. De parib. animalium. Athenico.
Orbasio. cap. cccxli. fol. 114
De Brachibus. Et primo De Offibus. Authores.
Aristoteles in histo-
ria animalium. De Genera-
tione animalium. Plinius. Athenicus. Orba-
sius. Coen. Celsus. Galenus De Alimentis. De
cib. bo. malique succo. De simplic. medic. Pau-
lus Aegineta. cap. cccxlii. fol. 114.b
De Chamus seu Conchas. Ex authoribus. Aristote-
les in historia animalium. Dioscorides. Pla-
nio. Orbasio. Athenico. Pomponio. Mela.
cap. cccxlii. fol. 115
De Musculis sine Musculis. Et Testibus. Ex autho-
ribus. Aristoteles in histo-
ria animalium. De Ge-
neratione animalium. Coen. Celso. Plinio.
Plinio. Dioscorides. Athenico. Orbasio. Gale-
no De simplic. Medic. cap. cccxlii. fol. 115.b
De Pinna. Ex authoribus. Aristoteles in histo-
ria animalium. Plinio. Cicerone De natura Deo-
rum. Athenico. Orbasio. Theophrasto De
Lapidibus. Solino. cap. cccxlii. fol. 116
De Pectinulo. Authores. Aristoteles in histo-
ria animalium. De Generatione animalium. Pli-
nius. Athenicus. Orbasius. ca. cccxlii. fo. 116.b
De Dactylis siue unguitibus & pernis. Ex autho-
ribus. Aristoteles in histo-
ria animalium. Plinio.
Athenico. Orbasio. cap. cccxlv. fol. 117.

ZOOPHYTA.

De Zoophytis. Et primo De Testibus. Verbulis
ut. Authores. Aristoteles in histo-
ria animalium. De parib. animalium. De Generatione ani-
malium. Athenicus. Orbasius. Plinius.
cap. cccxlv. fol. 117.b
De Holothurio. Scilla. Et Palmone marino. Au-
thores. Aristoteles in histo-
ria animalium. De
parib. animalium. Plinius. Dioscorides. Op-
pianus De pisci. cap. cccxlv. fol. 118
De Vrina. Ex authoribus. Aristoteles in histo-
ria animalium. De parib. animalium. Plinio.
Athenico. Galeno De simplic. medic. Orba-
sius. cap. ccl. fol. 118.
De Spongia. Authores. Aristoteles in histo-
ria animalium. Dioscorides. Plinius. Oppianus
De piscib. Galenus De simplic. medic. scul-
cet. Paulus Aegineta. cap. ccl. fol. 118.b
Epilagus. seu caput vitulum. Ex authoribus.
Aristoteles in histo-
ria animalium. Plinio. A-
lexandro Aphrodisio in problemat. Iul.
Polluce. Galeno De Naturalib. facultat.
cap. cclii. fol. 119.b

FINIS.

CATALOGVS

d. 6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850.

Maiforo 145 a 146 a 147 a 148 a 149 a 150 a
 151 a d
 Maiforo 400 1120 a
 Martians Emvori 31 d
 Metaphors 10 a 11 a 12 d 13 a 14 a
 15 a b
 Monocane 179 b
 Monso (transf.) 167 a
 Monso (transf.) 141 a 161 a
 162 a
 Monso 113 a
 Motam 144 a
 N
 Noora 212
 Noora 213 a 214 a 215 a 216 a 217 a 218 a
 219 a 220 a 221 a 222 a 223 a 224 a
 225 a 226 a 227 a 228 a 229 a 230 a
 231 a 232 a 233 a 234 a 235 a 236 a
 237 a 238 a 239 a 240 a 241 a 242 a
 243 a 244 a 245 a 246 a 247 a 248 a
 249 a 250 a 251 a 252 a 253 a 254 a
 255 a 256 a 257 a 258 a 259 a 260 a
 261 a 262 a 263 a 264 a 265 a 266 a
 267 a 268 a 269 a 270 a 271 a 272 a
 273 a 274 a 275 a 276 a 277 a 278 a
 279 a 280 a 281 a 282 a 283 a 284 a
 285 a 286 a 287 a 288 a 289 a 290 a
 291 a 292 a 293 a 294 a 295 a 296 a
 297 a 298 a 299 a 300 a 301 a 302 a
 303 a 304 a 305 a 306 a 307 a 308 a
 309 a 310 a 311 a 312 a 313 a 314 a
 315 a 316 a 317 a 318 a 319 a 320 a
 321 a 322 a 323 a 324 a 325 a 326 a
 327 a 328 a 329 a 330 a 331 a 332 a
 333 a 334 a 335 a 336 a 337 a 338 a
 339 a 340 a 341 a 342 a 343 a 344 a
 345 a 346 a 347 a 348 a 349 a 350 a
 351 a 352 a 353 a 354 a 355 a 356 a
 357 a 358 a 359 a 360 a 361 a 362 a
 363 a 364 a 365 a 366 a 367 a 368 a
 369 a 370 a 371 a 372 a 373 a 374 a
 375 a 376 a 377 a 378 a 379 a 380 a
 381 a 382 a 383 a 384 a 385 a 386 a
 387 a 388 a 389 a 390 a 391 a 392 a
 393 a 394 a 395 a 396 a 397 a 398 a
 399 a 400 a 401 a 402 a 403 a 404 a
 405 a 406 a 407 a 408 a 409 a 410 a
 411 a 412 a 413 a 414 a 415 a 416 a
 417 a 418 a 419 a 420 a 421 a 422 a
 423 a 424 a 425 a 426 a 427 a 428 a
 429 a 430 a 431 a 432 a 433 a 434 a
 435 a 436 a 437 a 438 a 439 a 440 a
 441 a 442 a 443 a 444 a 445 a 446 a
 447 a 448 a 449 a 450 a 451 a 452 a
 453 a 454 a 455 a 456 a 457 a 458 a
 459 a 460 a 461 a 462 a 463 a 464 a
 465 a 466 a 467 a 468 a 469 a 470 a
 471 a 472 a 473 a 474 a 475 a 476 a
 477 a 478 a 479 a 480 a 481 a 482 a
 483 a 484 a 485 a 486 a 487 a 488 a
 489 a 490 a 491 a 492 a 493 a 494 a
 495 a 496 a 497 a 498 a 499 a 500 a
 501 a 502 a 503 a 504 a 505 a 506 a
 507 a 508 a 509 a 510 a 511 a 512 a
 513 a 514 a 515 a 516 a 517 a 518 a
 519 a 520 a 521 a 522 a 523 a 524 a
 525 a 526 a 527 a 528 a 529 a 530 a
 531 a 532 a 533 a 534 a 535 a 536 a
 537 a 538 a 539 a 540 a 541 a 542 a
 543 a 544 a 545 a 546 a 547 a 548 a
 549 a 550 a 551 a 552 a 553 a 554 a
 555 a 556 a 557 a 558 a 559 a 560 a
 561 a 562 a 563 a 564 a 565 a 566 a
 567 a 568 a 569 a 570 a 571 a 572 a
 573 a 574 a 575 a 576 a 577 a 578 a
 579 a 580 a 581 a 582 a 583 a 584 a
 585 a 586 a 587 a 588 a 589 a 590 a
 591 a 592 a 593 a 594 a 595 a 596 a
 597 a 598 a 599 a 600 a 601 a 602 a
 603 a 604 a 605 a 606 a 607 a 608 a
 609 a 610 a 611 a 612 a 613 a 614 a
 615 a 616 a 617 a 618 a 619 a 620 a
 621 a 622 a 623 a 624 a 625 a 626 a
 627 a 628 a 629 a 630 a 631 a 632 a
 633 a 634 a 635 a 636 a 637 a 638 a
 639 a 640 a 641 a 642 a 643 a 644 a
 645 a 646 a 647 a 648 a 649 a 650 a
 651 a 652 a 653 a 654 a 655 a 656 a
 657 a 658 a 659 a 660 a 661 a 662 a
 663 a 664 a 665 a 666 a 667 a 668 a
 669 a 670 a 671 a 672 a 673 a 674 a
 675 a 676 a 677 a 678 a 679 a 680 a
 681 a 682 a 683 a 684 a 685 a 686 a
 687 a 688 a 689 a 690 a 691 a 692 a
 693 a 694 a 695 a 696 a 697 a 698 a
 699 a 700 a 701 a 702 a 703 a 704 a
 705 a 706 a 707 a 708 a 709 a 710 a
 711 a 712 a 713 a 714 a 715 a 716 a
 717 a 718 a 719 a 720 a 721 a 722 a
 723 a 724 a 725 a 726 a 727 a 728 a
 729 a 730 a 731 a 732 a 733 a 734 a
 735 a 736 a 737 a 738 a 739 a 740 a
 741 a 742 a 743 a 744 a 745 a 746 a
 747 a 748 a 749 a 750 a 751 a 752 a
 753 a 754 a 755 a 756 a 757 a 758 a
 759 a 760 a 761 a 762 a 763 a 764 a
 765 a 766 a 767 a 768 a 769 a 770 a
 771 a 772 a 773 a 774 a 775 a 776 a
 777 a 778 a 779 a 780 a 781 a 782 a
 783 a 784 a 785 a 786 a 787 a 788 a
 789 a 790 a 791 a 792 a 793 a 794 a
 795 a 796 a 797 a 798 a 799 a 800 a
 801 a 802 a 803 a 804 a 805 a 806 a
 807 a 808 a 809 a 810 a 811 a 812 a
 813 a 814 a 815 a 816 a 817 a 818 a
 819 a 820 a 821 a 822 a 823 a 824 a
 825 a 826 a 827 a 828 a 829 a 830 a
 831 a 832 a 833 a 834 a 835 a 836 a
 837 a 838 a 839 a 840 a 841 a 842 a
 843 a 844 a 845 a 846 a 847 a 848 a
 849 a 850 a 851 a 852 a 853 a 854 a
 855 a 856 a 857 a 858 a 859 a 860 a
 861 a 862 a 863 a 864 a 865 a 866 a
 867 a 868 a 869 a 870 a 871 a 872 a
 873 a 874 a 875 a 876 a 877 a 878 a
 879 a 880 a 881 a 882 a 883 a 884 a
 885 a 886 a 887 a 888 a 889 a 890 a
 891 a 892 a 893 a 894 a 895 a 896 a
 897 a 89

[illegible]

Edoardi Vuottoni Oxoniensis

DE DIFFERENTIIS ANIMA

LIVM LIBER I.

Ad serenissimum regem Angliæ Edoardum eius nominis sextum.

Animal quid sit, & quo differat ab his quæ non sunt animalia.

Caput L



Animal undique absolutum atque *diversum*, id est mente præditum esse mundum, cuius circum flexu tegantur cuncta, Plato nobis author esse idemque quatuor in eo animalium genera contineri prodidit. Vnum scilicet deorum celestium, & igneum hoc quidem atque rotundum: alterum *ψυχρὸν καὶ ἀγέραιον*, id est uolucrum & æthereum: tertium, hoc est aquaticum: quatuor *μετὰ τὴν γῆν*, id est ter restre, aut in terra uisitantis. Verum cū sub-

stantie, quæ natura constant, partim ingenite immortalesque seculis omnibus à sapientie professoribus putantur, partim ortus participes atque incertas intelligantur, nos partem illam nobilem ac diuinam minus cōtemplari propterea possumus, quod admodum pauca sentiri poterit, quocirca ope deus, quæ in illis rebus noscē cupimus, facultas nobis cogitandi, indagandique suppeditetur. Reliqua autem illa animantium genera, quæ nos quoque animalia appellamus, quod eas nobis socias familiarsque habemus, noscē uberius possumus. De harum itaque differentiis disseramus, nullam genus pro uicibus omittentes, uel uilius uel nobilius: cum nulla res sit naturæ, quantum uel utilissima appareat, in qua non mirandum aliquid habeatur. In animantium genere uniuerso, primum genus plantarum est: cuiusque alia ab alia differt, eo quod perfectioris uix participes esse uidentur. Vniuersam autem eorum genus, si ad cetera respicias, quæ anima uacant, ipsum quasi animal est: ac respectu animalis, inanime esse uidetur.

Sed enim digressus hunc ad animalia cōtinuus procedit. Natura enim cōtinue ab inanimatis ad animalia transit, per ea quæ uiuunt quidem, sed non sunt animalia: ita ut patrum admodum alterum ab altero differre uideatur, propter suam propinquitatem. Viuunt enim principio, & quæ in ous, & quæ in animalibus gygantur uita plantæ. adhaerendo enim capiunt primum & incrementum & alimentum. Sunt item in mari nonnulla quæ ambages animalis ne sint an planta. Spongiæ enim naturæ simillima plantæ est. Cæterum paruo quodam discrimine subinde alia præ aliis iam adipisci uitam sensamque uidentur. Quin & sentiendi uim in habere nonnulla, ut

DE DIFFERENTIIS

leniter & perobscure sentire uideantur. Quandoquidem itaque animalia ab his quæ uiuant tantum, parte animæ sensuali, sentiendiue facultate omnino se parati consuet, eò præcipue quod sensum habeat, designetur animal. Licet itaque animal corpus animatum, quod sensu præditum est. Non tamen in omnibus animalibus par inest sentiendi uis: sed alius sensus omnes, alius pauciores dedit natura. Sunt enim quinque numerosisus scilicet, auditus, olfactus, gustus, & tactus. Quorum tactus omnibus animalibus adeo necessarius censetur, ut nisi hunc habeat sensum, non poterit animal quæ uiuant, nocentue, hæc quidem uisitare, illa uero amplecti. Est uero & gustus tactus quidam, qui de alimenti causa non minus necessarius habetur. his igitur si priuetur, ut animal seruetur, uisæque, minime erit possibile.

Omnibus itaque quæ animalis nomine censentur, tactus inest & gustus, & maxima etiam ex parte olfactus: nisi quod forte imperfectum animal fuerit. Horum enim quibusdam solum tactus inest: reliqui autem sensus non ex necessitate, sed salutis potius gratia dati sunt. Neque enim omnibus necessario insunt, sed us tantum quæ locum mutare nata sunt, hoc nanque genus non tangendo solum, sed citius etiam sentire oportet, si permanere animal debeat. Quando igitur sentiendi facultate conueniunt omnia, quo pacto unumquodque ab alio discrepet, explicandum iam nobis est.

Quibus modis constitui debeant animalium differentiz. Cap. II.

Non sensus solum, sed & alia nonnulla sunt, quæ partim multis, partim omnibus animalibus insunt communia: uiuendi nimirum ratio, mores animalium, alique affectus actionisque, & præterea partes. Actiones autem & affectus intelligi uolo, ancessum, generationem, incrementum, costam uenerem, uitamque ac mortem, uigiliam & somnum, respirationem, iuuentam & senectam, ualitudinem prosperam aduersamue, sexum masculinum aut feminæ, atque uocem, & quæcunque ad genus alia pos sunt generi animalium tribui. Per hæc potissimum & quæcunque huiusmodi alia, differentias animalium constitui dignum est. Quibus de rebus primum ueluti formula quadam agendum: dein de generatim discussione diligentiore differendum censemus. Profecto differentiz quæ in partium, morum, aliorumque affectuum, & uitium actionumque ratione uersantur, colligi debent: partim quidem, eò quod animalium alii sanguinē habent, ut homo, & equus alia exanguia sunt, ut apes, uespeæ. Item alii pedes natura dedit, alii negauit. Et quæ obtinent pedes aut binos habent, ut homines atque uici, duo hæc tantummodo genera: aut quatuor, ut lacernæ, ut canes aut plures, ut centipedes & apes. Per uictus rationem differunt animalia, eò quod alia carne uiscuntur, alia frugibus: alia omnia attingunt, ut cornices, alia cibo sui generis proprio utuntur, ut apes, melles, & pauci quibusdam aliis aluntur. aranei uenarum muscarum uiuunt. Differunt præterea & moribus animantes: aliosq. affectionibus: alii feræ, alii circutes inueniuntur. Atque harum utriusque, alii perpetuo circutes, ut homo, mulus:

alii

Animal.

implentur.

Animalia.

Ad uictus rationem.
Sanguinis.
Exanguia.
Binos pedes.
Quatuor pedes.
Alia quædam.
Ab affectionibus.
Animalia.

Alia perpetuo ferre, ut panthera, lupus alia cū sine fere, facile manfuefcunt, ut elephas. Item alia mutes funt, animoq; remiffa minimeq; peruitaces repugnantēque, ut boues. alia animofa, peruitaces, & omnino indociles, ut fūs fylueftris alia ingeniofa ac timida, ut ceruus, lepores, cuniculi: alia illiberales, perfida, infidofa q; ut ferpentes: alia liberales, fortes, nobiles, ut leones: alia feroes & infidofa, ut lupa alia afcutes, maliciofa, callida, ut vulpes: alia animofa, amatrix & afcentatrix, ut canes: alia mites, & manfuetudini addicta, ut elephantes: alia uerecūda & cauta, ut afceres alia inuida, & ocnatus, politrataq; ftudiofa, ut pavones. Colore etiam differūt animalia: alia nāque unicolora funt (appello unicolora, quorum genus totum unum habet colorē: quomodo leones fului funt omnes: *A colore.* *Amig.*

g idēque in auiabus & pifcibus & reliquis animalibus intelligi uolos alia uerficolora funt: fed tetracolora (ea autem dico tetracolora, quoniam corpus totum quidem eundem habet colorem, fed non omnium eiusdem generis corpora eundem, ut bos totus albus eſt, aut totus eſt niger) alia uaria funt, idē dupliciter: aut enim genere toto, ut panthera, ut pavo, & pifcū nonnulla, ut quæ thraſſe uocantur: aut non genere toto, fed parte, ut boues, ut capræ: interdum uaria generantur in autum etiam genere, columbae, & alia pleraque. Sunt uero & per actiones animalium differentia, ut alia locum per tempora mutant, alia inuicem in coſuetudine ſua locis comperiunt. *A colore.* *Amig.*

Item animalia alia uolantia funt, ut aues, apes: alia grefſilia, ut quadrupedes: alia natant, ut pifces: alia reptilia funt, ut angues: alia tractilia, ut hircines. His uero modis uaria colliguntur & alia animalium differentia: ut animalium alia aquatilia funt, alia terreftra. Et aquatiliū ordo triplex: alia enim in aqua degunt, uictūque petunt ex humore, quæ etiam per uices recipiunt & reddunt, nec uiuere poſſunt niſi uerſentur in humore, ut pifces. Alia degunt quidem in fluído, uictūque inde emoluntur: fed aerē non humore recipiunt, id eſt ſpirant, & foris parere ſolent. Complura huius generis funt, partim grefſilia, ut lutris, laticæ, crocodilus: partim uolucres, ut mergi & urinatrice: partim etiam quæ nullis pedibus innitantur, ut natrix: nonnulla cum uictū in humore exercet, nec foris uerere queat, nihil uel aeris uel humoris recipiunt, ut urtica, oſtreæ. Aquatiliū item alius nandi uis tributa eſt, ut pifcibus: quidam ambulare poſſunt, ut can-

D erorum genus. Sunt & quæ ſede ſtabili degunt: quæ ſanis affixa omnem uitam traducunt, ut concharum genera nonnulla. Aquatilis item generis, alia marina, alia fluuiatilis, alia lacuſtria, alia paluſtria, ut ranæ. Terreſtriū uero animalium, alia ſpirant, ut homo, & quæcumque terreſtria habent pulmonem: alia quamuis non ſpirant, tamen ſedem in terrâ perpetuo tenent, & uictum inde capiunt, ut uerpes, apes. Terreſtrium etiam alia uolucres funt, ut aues, ut apes: alia peduſtria, quorum alia grefſilia, alia tractilia funt. Animal autem quod uolucere tantum ſit, ut pifcis, natatile ſolummodo eſt, nullum nouimus. Necnon differentias illas uitæ, actionēq; animalium continere. Sunt enim alia gregales, alia ſolitaria, alia uitam anticipem degunt: ut eadem modo ſocietate, modo ſolitudine gaudeant: tū

*Quidam enim
ipsi, velut
sunt.*

voluctes, cum canes, cum etiam pedesires. Item alie ciuiles, alie inciuiles. E
Ciuiles appello amittentes, quae labori communicant id est, quarum opus
communis efficiunt opera, in unumque idem omni est, quod non omnibus gre
galibus competit. Ciuiilis generis est homo, apes, vespa, formica, gus: qui a
tum alie sub duce degunt, ut a pes: alie nulli subditi imperio sunt, ut for
micæ. Sunt item tam ex gregalibus quam ex solitariis alie quæ sedem nun
quam mutant, nec peregrinantur: alie quæ inuente statim tēpore soleant.
Et alie uim habent uenandi, aut ingenio recondendi sibi docere sunt: alie
nec ad uenandum aptæ, nec ad recondendum. Item alie domicilia sibi pa
rant, ut talpa, mus, formica, apes: alie nullas se includere casis patiuntur, ut
plures tamen insecti generis, quam quadrupedis. Quinetiam locus discrimen
aliud existit: quippe cum alie casernas subeant, ut lacerti, serpentes: alie p
per summa telluris degunt, ut canis, ut equus, ac alia foramina sibi exca
uant: alie namque in eo munere sanguuntur. Et alie noctu sibi uictum que
runt, ut noctuæ, æspertillio: alie interdum tantum. Item alie mutæ omnino
sunt: alie strepitum tantum elidunt: alie uocem etiam formant. Quarum
alie loqui possunt: alie uocem solam nullis exprimendam literis reddunt.
atque alie loquaces, alie taciturnæ: alie ofcines, alie non carunt. Alie
præterea cum hominibus degere solent, ut palumbes: alie montis, ut uapores: alie
cum hominibus degere solent, ut columbe. Item alie copia libidinis gra
udent, ut perdicum genus, & gallinæcorum: alie manus nemere ualent, ut
quæ conuinam speciem gerunt: quippe quæ raro soleant coire. Ad hæc alius
data est uis diuicandæ: alie ingenium cauendi & euitandi. Præterea quæ
natant, alia pedibus carent: & hæc aut pinis natant, ut pisces, aut etiam ab
que pinas, sed ut mari utuntur, ut terra serpentes, modoque simili repant
in humore: aut sua ipsa latitudine natant, ut cartilaginei generis, quæ pla
na sunt, & caudam habent, ut rata, pastinaca: alia uero quæ pedes habere
uidentur, ut mollia, cum pedibus ipsis, cum pinis natant. Quæ crassa inte
cta sunt, suis caudis natant, celeriternéque retrorsum, pinnarum caudæ ad
iunctarum beneficio. Cordulus etiam pedibus natat & cauda. Volucrum
autem alie penna uolât, ut aquila, accipiter: alie mēbrana sicca, ut apes, sca
rabei: alie cure, ut uespertilio. Sunt porro quæ uel pennis uel cure uolât, om
nia bipeda aut apoda. Angues enim cura. Ac theophrastus tales uelare narrat.

Animalium genera amplissima.

Cap. III.

H

Amplissima uero animalium genera, in quæ alia digerantur redigantur
que animalia, quæ sibi eam nominibus distincta reperiuntur, hæc sunt,
uis, pisces, cetus qui eadem omnia habent sanguinem. Et terrestres quod
sanguinem habet & pedibus caret, genus serpentium est. Ad hæc genus te
lita insectis est, *γρηγοράζοντες* Graeci uocant, & *γρηγοράζοντες* oscium suæ cōcham.
Et crassa inclusum aliud, *μυρμαγκίδες* uocant: nec aliud nomen habet com
mune, ut locustarum & cancrorū genera. Aliud item *μολύβδινον*, id est molle,
ut lolligines, sepiæ. Adde uis insectorum genus, quæ omnia genera sangui
ne carent. Reliquorum animalium genera nulla præterea ampla nume
rantur

Aranntur: unum enim quod plura genera contineat nullum est: sed aut simplex est, nullis ipsum specificis euarians discrimibus, ut homo aut diu-
de quidem in alia genera potest, sed nullis nominibus distincta. Quæ enim
in genere quadrupede non pennato continentur, sanguinem quidem o-
mnia habent: sed alia animal partiant, alia ouis: dixerim hæc *deinde*, id est
ouipara, illa *feræ*, id est uiuipara. Hæc ita impressurarum formula expo-
suisse quædam prægiustandi grana placuit. Reliquum iam est ut ad alia tra-
scamus.

De partibus animalium.

Cap. IIII.

A Nec omnia partes animalium ex quibus constant, explicandæ sunt.
his enim potissimum, atque in primis, tota quoque ipsa in se deffe-
runt. Sunt porro animalium partes, aut similes, aut organæ siue instrumē-
tales. Similes Græci *ὁμοειδῆς* uocant, quod undique in similes diuidan-
tur particulas, id est quod omnes earum partes tum sibi mutuo, tum toti
similes habeantur: quæ & simplices etiam, & primæ, & incompolite non-
nunquam appellantur: quandoquidem ex illis constitutæ sunt particular,
quæ organæ siue instrumentales, atque etiam officiales uocantur. Simi-
lares autē numerantur hæc, os, cartilago, uena, arteria, nervus, ligamentum,
têdo, membrana, caro, adeps, unguis, cutis: his adduntur humores, ut san-
guis, & qui in oculo sunt, crystallinus & vitreus humor. Instrumentales ue-
ro partes sunt, quæ apte secari in partes, ipsi toti dissimiles sunt: ut manus,
non in manus secatur, aut facies in facies, aut pes in pedes: quapropter &
dissimiles etiam uocantur. Ex hoc partium genere sunt, quæ non modo
partes particulæ uel, græcè *μέρος ἰστέον*, (pars enim cuiuspiam dicitur que-
quid totum complet atque integrat) uerum etiam *μέμα*, id est membra ap-
pellantur: unde hec quæ cum ipsæ totius integritate describantur, habeant
tamen in se partes diuersas, ut caput, ut pes, ut manus, ut totum brachium,
aut pedus: quippe quæ & ipsæ partes sint totæ, & ex partibus consistit di-
uersis dissimilantibusque. Has uero partes totas uoco, & integras: quemad-
modum animal aut totū aliud quodens, unum esse dicitur, & totum quod-
dam integrūmus, eò quod suis conspiciatur finibus circumscriptum, nec
ulla sui parte alij coniunctam ita & ipsius pars, cuiusmodi est oculus, lin-
gua, natus, una esse dicitur: totaque & integra, eò quod appareat suis qui-
busdam finibus contineri: quod si non esset ulla ex parte reliquo corpori
 annexa, sed omnino separata persisteret, tunc sane neque pars, neque mem-
brum diceretur omnino, sed absolute unum & totum integrūque.

De partibus exterioribus dissimilibus.

Cap. V.

UT uero nummos ad id quod sibi quisque certam exploratumque ha-
beat probare solet, ita & in animalium partibus agendum nobis est.
Homo itaq; cum sit omnium maxime animalium nobis familiare, & ex-
teriorum partium eius forma per usum quotidianum sit notissima, reli-
quorum proinde animalium exteriores partes, tam similes, quàm instru-

mentales ita dignoscendæ sunt, eò quòd humanas partem easdem habent, E partium similes, dissimilesque sint, sed proportionè conueniant. At uero interiores contra sunt enim hominum in primis incertæ atque incognitæ. Quamobrem ad cæterorum animalium partem, quarum similes sunt humanæ, referentes eas, contemplari debemus. Hominis autem partes, & si sensu facile percipi possint, describendæ tamen sunt: ut & sensum ratio committetur, atque etiam ut series commentandi seu uetus perspectu, dum ordinem perscrutimur omnium: quò minus lateant ea quæ non eodem modo quo homines, cætera animalia possident. Partes itaque primum enumerabimus officiales, quæ externæ sunt, utpote quæ sunt per usum quotidianu percipue nobis notæ: deinde interiorum ordinem prosequemur: postremo quæ similes sunt, explicare conabimur.

De capite & eius partibus.

Cap. VI.

Maximæ igitur partes, in quas primas diuiditur corpus, hæc sunt, caput, collu, thorax, brachium duplex, crur duplex. Caput in animalibus omnibus superiori obinet situm, corporis situatione. Capitis autem pars quæ capillis instructa est, calua appellatur: cuius pars prior sinciput, posterior occiput est. Quod uero inter sinciput & occiput est, *agras* dicunt, id est coronam. Exterior *agras* capillorum ambitus *agras* uocatur. Caluæ medium illud discrimen & æquamentum capillorum, uerticem uocamus, Græci *σφηρα* dicunt, unde & *σφην*, id est buuertices dicti, quibus discrimine illud geminum est: uerum non ossæ, sed æquamento. Faciem partem eam nominamus: duntaxat in homine, quæ in priore parte caluæ subiacet. Pars faciei frons, quæ sub sincipite posita, inter ipsum & oculos est: hanc quæ pertenditur auris, *σφαιροειδης* dicitur: in qua rugæ, *αλφες* dicunt. Ab utraque frontis parte, tempora sita sunt. Supercilia sub fronte bipartito distincta, inter ea quod medium est, *σφαιροειδης*: at eorum partes quæ naribus proximæ sunt, *σφαιροειδης*, id est superciliorum in capite dicuntur: & *σφαιροειδης*, id est caudæ, quæ ad tempora accedunt. pilos uero ipsos medici nonnulli *σφαιροειδης* uocant. Supercilii oculi subiacent duo, quorum partes superius inferiusque oculos tegentes, palpebre appellantur. Pilos, qui extremo palpebrarum ambitui adherent, cilia nominamus: extremus uero palpebrarum ambitus, unde excrefcit cilia, *σφαιροειδης* uocatur. Humor oculi quo uidemus, pars uidelicet illa quæ in medio est, pupilla, quod eam ambit, nigrum oculi dicitur: quod postremo nigrum circumdat, candidum oculi uocatur. Pars etiam cõmunis superioris inferiorisq; palpebre angulus est, quæ duplici uterq; oculus habet: alterum iuxta narem, alterum iuxta tempora. Auris pars capiens quæ audimus est. huius pars exterior, quæ plana patilique manet, Latinis auricula, Græcis *σφαιροειδης* est, (quasi alam dixeris aut pinnam) quæ solum charulagine & cute consistat. Quæ uero parte sui extrema ab anteriore in posteriorem uertitur, & quasi reflectitur, *σφαιροειδης* dicitur. sub hoc, quod ueluti dimidiu circuli est, ad rotunditatē uertens, & in mucronē exurgens, *σφαιροειδης* appellatur. quod uero huius acamini subest concauum, *σφαιροειδης* rotundum quod in medio est foramen,

memus

- A mectus auditorius vocatur. Suprema autem pars pinna dicitur: inferior fibra. Pars illa interior anfractus cochleæ funilis, delinīs in os quod auriculā plane imitatur. Partem inter utrumlibet oculum, & aurem, & verticem positam, tempora appellamus. Item pars faciei inter oculos sita, nasus est: cuius partes concavæ utrinque, podice, nares decantur, *græce μαστις*, quæ meatum præbent spiritui. his namque aërem reddimus, & accipimus. Olfactus quoque, id est sensus odoris, hac eadem parte summumultatur. Mobiles esse nares natura voluit, nec sicut aures sua compage immobiles. Pars nasi cartilaginea quæ nares distinctiminet, intersepiū vocatur: externas vero narium partes, *σφηνα*. In utraq; nasi parte, loca illa quæ sub oculis caua cernuntur, priuatim etiā *σφηνα*, id est caua dicuntur: quæ ex morbo aut aliis interdū ex cruditate laborantibus facile amollūtur. Quæ vero sub his inter nasum & aures veluti margines leviter eminent, oculolōq; ab inferiore parte nutantur, *malæ* & genæ dicuntur. Sub his laxiores partes, quæ statim, aut spiritu à pulmone revocato cōpressis adhuc labiis inflantur, buccæ sunt, hilaritate risumque indicantes, ut inquit Plinius. Est deinde maxilla duplex: cuius pars prior (quæ scilicet labro subiacet inferiori, atq; in rotundū quoddā acumen tendit) mentum, posterior in idibula est. Labra mox à naso habentur, caro per mobilis. Quod supra labra est, & infra nares, *rimæ* dicitur, & *isthmus*, id est iunctura. Quod autem sub mento est, caruncula, *σφαιρα* vocatur. Quod autem intra labra & maxillas describitur, os est, quo scilicet cibus recipitur: cuius partes, palatum, & fauces siue guttur. Fauces autem & guttur appello partē illam oris universam, quæ gulæ præceditur. Inest & pars sentiens saporem, lingua: cuius pars prior quæ acuta est, *σφηνοειδής* dicitur: caro vero quæ inférieurem attingit maxillam, *σφαλαιδής*. Ea linguae pars quæ ad fauces est, & quæ (ut nonnullis videtur) gustus sensum habet acutiorem, *κλέων* nominatur, & *σφαλαιδής*. utrosque vero linguae carnos sinus, *σφαλαί* vocant. carne rara & fungosa lingua constat: eius pars quedam ligula est, quæ pluribus infra explicabitur. Quod in ore helidum cernitur, tonsillæ: malignum vero, gingivæ appellantur. Carne hæc constant, in utroque dentes osses coherent, utraq; maxilla sexdecim, in homine saltim. primos quaterni lati & acuti, eod quod secant, *μαστι* appellantur: omnes lingualis radicibus innituntur. Hos utrinque sequuntur qui *μαστοί*, id est canini vocantur: quibus lingualis quoque radices insunt, *α* partim acuti sunt, partim latæ quippe qui intra lacumculi, supra archumculi sunt. ultra hos sunt maxillares, qui & molares dicuntur, *σφαλαί* ab utroque latere: nonnullis vero non quinti, sed quaterni sensus oriuntur. Ex his, qui in intimo ore sunt, *σφαλαί* appellantur: quibus utrinque iunguntur qui *σφαλαί*, id est serotini vocantur, post universum denum annum excrecentes: nonnullis etiam senescētib; prodierunt: multis & octogesimo. Molares, qui maxilla superiori insunt, terni sere, qui inferiori binis radicibus adhaerescunt, nonnullis tamen exceptis, qui supra sepe cum quaternis, infra cum ternis radicibus depræbentur: præsertim duo primi interiores, qui & interni. Totus vero dentium ordo *σφαλαί* dicitur, id est dentium acies. Parte autem oris penultima, parti-

cula pendet carnea, columella nomine: quæ si immodice humecta in-
mefcat inflammaturque, uiaz nomine uocatur.

F. Caput, græce κεφαλή dicunt, ὤψις, ἄγρην, ὀφθαλμοὺς, ὠτίονες, ποτὲ καὶ ὤμους uocant,
à parauento capitis hoc nomen derivantes. Calua, quæ & calvaria, κρανίον. Supercilium,
ἐπιφύον, ἐπιφύον. Occiput & occipitium, ὀπίς, ὠπίον pro extremo capillorum ambitu,
etiam ὠπίον dicitur. Vertex capitis, ἀκρότης. Orbitæ ἀμφόρως uocant. G. Fa-
ciem, & ὠτίονες eam partem nominamus, inquit Aristoteles, duntaxat in homine.
Nam pilis autibus ὠτίονες faciæque dicere non solemus, sed ὠτίονες Græci di-
cunt ut in aubus pilæque, & ὀφθαλμοὺς ὠτίονες in homine, à corpore nomen accepisse uide-
tur: quod enim uisus animalium homo cæcis est, solus prospicit ante uertus, uo-
catque ante uertus mitem. Frontis, ὠφίον ἢ ὠφίον. ὠφίον uero dicitur quidam. Tem-
pora, ἀκρότης. Supercilia, ἐπιφύον, ἀμφόρως, ὠτίονες. Oculi, ὀφθαλμοί, ὠφίον. Pal-
pebre, ἀμφόρως. Plinns genus dixit. Cilia ἀμφόρως. Cilia sunt pilæ palpebra-
rum uocantur eodem Plinius palpebras dixit. H. Extremum ambitum genæ super-
ioris, inquit Plinius antiqui cilium uocant, unde & supercilia. τὰ ὠφίον dicitur
& ὠφίον ἀμφόρως τὰ ὠφίον. Papilla, ἀκρότης. Nigrum oculi, ὠφίον ἢ ὠφίον. Candidum
oculi totum, quidam albuginem uocant, ὠφίον ἢ ὠφίον. Angulus oculi uero & ὠφίον. An-
gulus oculi uero. Oculorum pars illa, quæ in medio est, quam pupillam uocant, ἀκρό-
της modo diximus. Ambiens autem hanc circulus, ὠφίον uocatur. Huius uero par-
tes, quæ pupillæ proximæ sunt nigre, ὠφίον. C. Oculi qui candido proximus est,
ἰσός. Quæ ultimæ pars candidi totus est, ὠφίον uocatur. Totus oculus am-
bens, ὠφίον. Angulus oculi radices, ὠφίον ἢ ὠφίον. Quæque nâs proxi-
ma sunt, ὠφίον dicitur & ὠφίον quæ uero tempora spectant, ὠφίον. Concan-
alitudines quibus oculi continentur, quæ palpebras dicuntur, ὠφίον appellantur,
& ὠφίον ἢ ὠφίον. Aures, ὠφίον, ὠφίον. Auriculam, Ciliis eandem aurem uocat,
ὠφίον, ὠφίον. Mearum auditorum, ὠφίον ἢ ὠφίον. Pinna, ὠφίον. Fibra ὠφίον.
Aristoteles atque, inquit Pollux, omnes auriculæ partes præterquam ὠφίον, id est fibra,
uocantur carbunculum medici posita hæc imponere uocabula. Auriculam ὠφί-
on exterior ambiens, ὠφίον, interior uero ὠφίον est. Pars quæ ad tempora uertit,
ὠφίον, interior aut ὠφίον. I. fibra uocatur. & interior ὠφίον, unde & auris foribus
eodem nomen quod concaui est ὠφίον, quod ueluti fundamētum est aut paruum nūm,
ὠφίον. Ipsi aut ὠφίον, quod in ea parte est quæ ad tempora uertit, & ad aures
interiora respicitur, ὠφίον: opposita uero pars ὠφίον dicitur ὠφίον & eius partis,
quæ fibra dicta est, quod prominet, ὠφίον quod ὠφίον proximum est, ὠφίον quod su-
per hanc est acutus in superiore fibra ambitu, ὠφίον. Eius aut partis quæ ὠφίον dicitur
basia, quod tempora spectat ὠφίον dicitur. Cōcaui uero quod uixta ὠφίον est, ὠφίον
quod ad foramen est, ὠφίον quod aut innotest, ὠφίον uocatur. quod deinde ad auriculæ
radicem est fibre fibra dicitur, ὠφίον dicitur. Illius aut auriculæ partis, quæ sub eo quod ὠφί-
on dicta est, habetur, ὠφίον & hunc opposita pars ὠφίον quod ὠφίον sub hac est, ὠφίον
patet. A. Tempora, ὠφίον quæ ad nulli & ὠφίον uocant, & ὠφίον. Nâs, ὠφίον. Nares, ὠφίον.
E. Nasus, ὠφίον. Tonsillæ mitem à medicis quidam ὠφίον uocatur, & ὠφίον ἢ ὠφίον.
Et nâs Sophocles eandem ὠφίον appellat. Et foramina ὠφίον quidam ὠφίον dicitur, & ὠφίον
Interpretum, ὠφίον. Quod uero ὠφίον dicitur. Nâs ea pars quæ superciliis pro-
xime subsidet, ὠφίον, per quem ciliis spiritus transmittitur, media uero ὠφίον est
carulago, uocatur. Partes uero quæ utrinque genas spectant ὠφίον, ὠφίον ἢ ὠφίον, id est
nâs spina. At ea quæ circa dicitur, ὠφίον ἢ ὠφίον, uel ut aliis placeat, quod in-
tus maxillæ spiritus dicitur, ὠφίον ἢ ὠφίον uocant, id est septum nâs. Quæ uero su-
per eam partem est caro ad labia uertens ὠφίον, & totum nâs immittit, ὠφίον.
Quæ autem extrinsecus eorumque spiritus parte sunt, ὠφίον ἢ ὠφίον: auriculæ au-
tem ὠφίον ὠφίον & quod illis tanquam fundamentum subest, ὠφίον ἢ ὠφίον. Maxillæ
& genæ ὠφίον dicitur, & ὠφίον, & ὠφίον, uerum ὠφίον ἢ ὠφίον buccæ potius dicitur.
Mandibula, ὠφίον, ὠφίον. Mandibula, ὠφίον. Labra, ὠφίον.

A. uerres comici *pharynx* uocantur. ad thedendi *angula* dicitur. C. *pharynx* nonnullis etiam *pharynx* dicitur, & *pharynx*. Palati dicitur & *palatum* ens, *pharynx*, *pharynx*, *pharynx*. Fauces Cellis lib. 4. Fauces, & *pharynx* & cibum capitur, *pharynx*, *pharynx*, *pharynx* & quibusdam & *pharynx*, ob loci angustiam. Significat & *pharynx* gula summam partem aque insumit, sicut *pharynx* aperit artus uerum Pharynx partem hanc quam Cellis & Theodorus fauces uocant, gumat appellat fauces uero summam gulæ partem, sicut palatum & stomachum dicit. Lingua *pharynx*, & *pharynx*, & nonnullis *pharynx* uocatur, aut *pharynx*, *pharynx*. & uerum membrum significat & membrum partem, ut dicitur est. Sed quod hic dicitur (Pellicula ambrosia) gula finem aquam illi linguae partem inesse quæ ad fauces est: contra Aristoteles eam, sentiendi istam uim præcipue obesse scribit, partem sui primorem. Nam si interiore tangatur, manus eam sentit exstimator. Ligula, & Pharynx minor lingua uocatur. Græci *pharynx* & *pharynx* uocant. Tonsillæ *pharynx* & *pharynx* dicitur. *Glossitis* *pharynx* inflammationem eorum.

B que prope tonsillas sunt, paritum, & *deinde* penitus tonsillarum ipsarum inflamma-
tionem esse ut. A. Cellis *deinde*, tonsillas, quae post inflammaciones inducere, &
Gratis vocant scribit. Tonsillae sunt numero sex quatuor conspicuntur hinc ad lingu-
radem, singulae utrinque conspicuntur & haec primiores, quae Pollux *adhaec* vocant tra-
dit. Gingivae *adhaec* ut vero Pollux placet, carnes quae dentes continent, quae quidem
externae sunt, *adhaec* quae vero internae, *interhaec* & quae haec dentes ipsos continent,
aequaldicuntur. Dentes, *adhaec*, *interhaec*. Dentes primiores acuti, etiam *adhaec* *interhaec* dicun-
tur, & *interhaec* & *interhaec*. D. Maxillares, *interhaec*. Molares, *adhaec*, *interhaec* veli, *interhaec*,
et, & laquei genarum. Columella, *interhaec*, *interhaec* *interhaec*. Vini *interhaec*.

De collo & eius partibus.

Cap. VII

Collum deinde id appellamus quod inter caput & artus humeris ut
Cinereciacet. Quantum vero collum ipsius cartilagineum, priorem ob-
C tinentis situm, vocem transmittit & halitum, id arteria, & aspera arteria vo-
minatum est. Hæc autem accipienda reddendique tantummodo spiritus
officio fungitur. Nihil, enim aliud nec succum vel humidum, pan ipsa ut-
datur: sed ubi in eam tale quid depercutit, tandem torquetur, dum exur-
tur quod dilapsum est. At vero quantum interius carnes ipsas præiacet,
gula dicitur: quæ cibis atque potus decoratur. Ipsius autem asperæ arteriæ
pars summa, quæ vocis instrumentum est primum ac præcipuum, larynx di-
citur: apparetque in collo tangenti: durum: & uret transglutendum sus-
deq. moveri cernitur. Ultima autè collæ anterioris pars, cum proxime sub-
est iugulum, *manubrium* dicitur. Pars vero posterior collæ, extrema cervice appella-
ta est. Partes thorace tenus dispositæ hæc sunt.

D B. Collum, idem & ceruix, graece *κράνιον, κροτάριον*, (utrumque simul posuit Aristoteles 4. de partibus animalium, *ἐν τῷ κροτάριῳ τὸ κράνιον καὶ τὸ κροτάριον*) dicitur & *κράνιον* hunc ultimam collae memoris pars, *κροτάριον* dicta est. Plinius ceruicem & collo dicitur ut, C. Ceruix, inquit, nulli nobis quibus utraque haec aeterna & gula, ceteris collium, quibus tantum gula. Ceruix flexilis est ad circumspedum. Arteria, & aspera arteria, *ἀρτηρία*, *ἐν κροτάριῳ ἀρτηρία*, & *ἀρτηρία* quoque dicitur, Gula *κροτάριον, κροτάριον, ἀρτηρία*, & *κροτάριον* Homero, stomachum enim vocant Latini, ut Ciceroni. De natura doctum, & Celsus lib. 4. Plinius eam stomacho abominor pro eae acuticula. Galenus utraque significare tradit, gulam scilicet & ea ventriculi, quod *κροτάριον*, id est cor vocem nonnulli solebant. Larynx, *κράνιον*, quandoque etiam *κροτάριον* & *κροτάριον* vocatur. Extrema ceruix, *κροτάριον* dicitur & hanc colli partem *κροτάριον* Galenus est nunculus superiorem humeri partem occupans, & praeterea et dorsum partem quae humeri angulo proxima est.

Thoracem cum partem appellamus, quæ à collo ad pudenda usque trunca pertendit. Finem enim thoracis faciunt partes quæ ostium excrementi tum humidi tum siccæ continent. Thorax ipse parte priore posteriorque constat. In priore huius parte, mox à collo communis colli & pectoris pars, iugulum est, quod ossibus continetur, quæ & iuguli dicuntur, & *κλῆις*. Deinde pectus, priorem thoracis obtinet situm: cuius media pars *πρὸς* uocatur, quasi pectusculum dixitis, & *σῆμα*. Pectus ipsum bipartitum est, in mammam partem sui utraque extuberans. Mammis laxior cōtensus corporis est. Iuncta illis papilla, per quam lac transitissimum elicitur. Qui papillas ambit circulus subinger, *σῆμα* dicitur. Quod sub mammillis est, *σῆμα*, ac si præcordia dicas. Communis pars collæ, brachij, & humeri, ala est, quæ & axilla, & subalis latera. Venter infra pectus est parte corporis priore: totum scilicet quod ab ea parte est, quæ *σῆμα* uocatur, ad podicem usque, una etiam connumeratis illis. Huius pars tota exterior musculosa, quæ interna obsegit, abdomen est: cuius ueluti radix umbilicus est. Huic radici pars subiecta in latus utrunque illa dicitur, quæ autem recte subiungitur, aquiliculus: cuius postremum, pubes est: qua scilicet pili nascuntur. Sed super umbilicum, sub ore ventriculi, hypochondrium est. Causum autem commune hypochondrij, & illud cholago est. Proxima his sunt. Pars femine propria, uterus aut uulua est: maris penis collue, foras postremo thorace propendens, parte sui prima carne propemodum constans, æquali facie turbinatæ nomen à glande pars hæc mutua est, glans dicta. Hæc glandem quæ tegit cutis, *σῆμα* dicitur: & totum quod ex ea cute glandemque constat, præputium est. Reliqua pars cartilaginea est, & augeri amplius potest. Huius membri quod manine dependet, *σῆμα*: foramen uero quæ humor excretnatur, *σῆμα* dicitur: & id quo cuticula cum glande adnectitur, *σῆμα*. Quod in inferiore penis parte, suturæ simile est, per serotum ad podicem usque pertendens, *σῆμα* est. Subiacet membro genitali testes gemini, cute obducti, quod scortum & serotum nominamus. Mulieris autem genitale contra quàm uiri formatum est. Causum enim subditum pubi est, non sicut maris propensum ac prominens: cuius pars interior, loci, & uenas appellatur. Ossium uero & ceruix, matris est: quæ ab utero effertur, accessum proliſco maris semini præbens, & exitum humido excremento. Femoris & uni uentris pars communis est inguen. Pars item interior femoris & naris communis, coles: exterior, subnatale: pars uero excretoria, podex est. Huic quod subditum quasi stragulum est, nates appellant: in quo autem firmur versatur, coxa & acetabulum. Thoracis itæ partes omnes primores diximus. Dorsum item sub ceruice, sed pone pectus est: cuius pars, quæ collo promine subiacer, gibba, *σῆμα*: quæ autem utrinque litz prominens, scapula humerisq; summa uertices *σῆμα* dicuntur. Ab iis in anteriora protendant *σῆμα*, iuguli scilicet ossa, inter quæ iugulum situm est. Quæ uero ab scapulis ad spinam tendunt, *σῆμα*. Græci, nostri scapula uocantur quæ *σῆμα* situm

10

cor pectus & collo, *neger* & *pēdixur*, aque hoc loco, quod cauum est, *apex*, id
est papula, appellatur. Pectus, *sternū*, nique, pectoris media pars est, à summo ad car-
nagum usque illam, cui nomen est *sternū*: significat & *niger* os ipsum pectoris me-
diū, cui adducitur collis Mamma, *pēdixur* dicitur & *niger* & *sternū*. Papula, *St-*
er, *sternū*, dicitur & cauum ilud quod sub pectore est, carnicum mollique ad os
pertinens quidem pars & *apex* quoque & *sternū* vocatur. F. Ala & anila, *pe-*
dixur. Larynx, *sternū*, *sternū*, *sternū*, id est *sternū* est, dicitur, *sternū*, *sternū*.

[illegible][illegible]

vero scapulas vocat, quas *Γραει* dicunt *εναυ* dicit, & Celsus scapula, (scapula aperta legunt nonnulli apud Celsum.) A. Humerus est in hoc significatio pro articulo ipso apud Plinium est alius, tum apertissime lib. 1. c. sed apud Celsum pro ea brachij parte accipitur, quam lacertum vocamus. *Ἰμυ* nem apud Aristotelem fore pro humeri articulo accipitur. Lumbi *ὀσπερ* & *ὀσπερ* & *ὀσπερ* dicuntur lumborum musculi interni, qui & *ὀσπερ* & *ὀσπερ* & *ὀσπερ* dicuntur. Quae requam sunt & qui externos spinas masculos, *Ἰμυ* vocant. Clunae *ὀσπερ* quae & *ὀσπερ* vocantur, ut ante dictum est. Harum partes sunt, nates, quas Graeci *ὀσπερ* vocant & *ὀσπερ* & *ὀσπερ* & *ὀσπερ* & *ὀσπερ*, quae carnes sunt infra nates, ad femora vergentes. Spinae *ὀσπερ*, *ὀσπερ* & *ὀσπερ*. Spinae partem mediam illam quae inter metaphterum & lumbos est, *ὀσπερ* vocant. *ὀσπερ* vocant, ut tradit Pollux, proprie in solis quae ad pedibus est.

De Brachio & eorum partibus.

Cap. IX.

Membri vero superioris bipartitam compactionem à thorace dependentem, brachium sine ulnam vocamus: cuius partes sunt, scapula, humerifus, lacertus (qui & humerus Celfo) gibber, cubitus (Celsus brachium vocat) & manus. Lacertus totius brachij pars maxima est, terminos habens, inferne quidem gibberum, superne autem humeri articulum: gibberum vocamus cui inestitur. est autem ea pars quae totum brachium flectitur. Altera brachij pars non minima, imo secundum lacertum maxima, quam cubitum vocamus, inter gibberum sita est, & articulum, quo est cubito manus iungitur, *ὀσπερ* Graeci vocant, nos brachiale. Cubiti pars superior, *ὀσπερ*, inferior, *ὀσπερ*, dicitur. Manus partes, palma, & digiti quinque. In manu prima palmae pars, quae ex multis manifestis ossibus constat, *ὀσπερ* Graeci dicitur: altera quam *ὀσπερ* vocant, pars manus lata Galeni est, quae ex rectis quinque ossibus constat ad digitos tendentibus, à quibus digiti oriuntur. Digiti quinque numero: quorum qui maximus est, pollex vocatur, à latere metacarpj adiunctus, brevis crassiusque: huic proximus est index: medius deinde, qui longissimus omnium est: illum sequitur qui medicinis dicitur est, *ὀσπερ* dicitur: postremus omnium minimus est. Haec sunt summi digiti ungues. Digiti pars quae inflectitur, nodus sine articulo est: quae rigida constat, internodum dicitur. Pars interior manus, quae carnea est, & scissuris vitæ indicibus distinguuntur, uola est. Exterior vero manus pars nervosa est, *ὀσπερ* à Graecis dicta.

*Altera pars
Galeni vocatur
pro indicibus
in ossibus.*

F. Membrum superius, sicut Aristoteli & Galeno membra significat exteriora (si scilicet) à thorace separata, & quasi dependenna, ut brachia & crura vocantur, ut sicut Pollux, sicut, quod & *ὀσπερ* dicitur, ex femore tantum & crure constat. Brachium *Ἀρχίον* & *Ἀρχίον* hoc membrum Aristoteles *Ἀρχίον*, Galenus *Ἀρχίον* vocat, nonnulli quoniam & *Ἀρχίον*, Celsus brachium, Theodorus brachium sine ulnam. Ita foris ut Plinius, lib. 11. unum humeri ulnae. Scapula, humerifus, *Ἀρχίον*, de quibus supra. Lacertus, hanc partem Aristoteles *Ἀρχίον* vocat, Galenus *Ἀρχίον*, Celsus humerum: alij lacertum, Theodorus, nisi codices sunt mendosi, lacertum agitem, Gibberum, *Ἀρχίον*, articulum hanc eorum ubi cubitus lacerto iungitur, *ὀσπερ* vocant alij hanc quod ab exteriori parte prominet, *Ἀρχίον*. Galenus in ossi, inquit, brachij, quod cubitus appellatur, in extremo tra sine, illo qui cum lacerto iungitur, duo exstant tubercula, alterum maius quod & posternus, & inferius est: alterum minus, quod superius est & in parte anteriore. hoc proccellus sine tuberculo aulgo *ὀσπερ* vocat: sed propter illum, qui minus & posternus est, Arzici *Ἀρχίον* Hippocrates *Ἀρχίον* vocat. huc Galenus

Cubitus

contingimus & calcarum, cuius est. Pars uero ea quæ post eam pedis iuxta digitos est
a trochlear, sive malle, & trochlear dicitur. Sequuntur deinde alia, ad eum digiti pedis
quinque numero. Alij uero superiorem pedis partem totam, quæ ante digitos est, quæ
scilicet ex nervis & ossibus constat, malleum uocant: sive & malleum, cuius proceram par-
tem, quæ digiti proxima est, respondere: postea uero pedis partem inferiorem, ad eum cal-
care: inferiorem partem totam, trochlear, ad eum trochlear, quod scilicet carnosum est & inferius
solum attingit. Galenus uero malleum eam pedis partem uocat, quæ malleoli proxi-
ma est, quæ ex septem ossibus constat, ut infra apertius explicabitur: inter ossa & illi
manus parti respondet, quæ uulgo dicitur: malleus uero, quæ illi proxima est, quæ ex
quinque ossibus constituta est, quibus adiunguntur pedis digiti, & metacarpium in ma-
nu respondet. Itaque constat a Celso plantam uocari, quæ ex utraque hac parte con-
stat, sicut in manu palmam, quæ & eadem constat, & utroque, ut modo dictum est.

De sima partium uario.

Cap. XL

F

Habet sane homo (sicuti & cætera fere animalia) suas partes ita dispo-
sitas, ut & in consuetudine sit & inferior: & prius & posterius: & dextrum
& sinistrum. Et dextrum quidem & sinistrum ex similibus fere constat par-
tibus, nisi quod sinistra omnia imbecilliora. At posteriora prioribus, & su-
periora inferioribus discrepant: præterquam quod inferiora similitudinem
superiorum præferre ea dixerim ratione, quæ uenter imus respondere asso-
let faciei in corpulentia uel gracilitate: & crura cum brachijs communem
inueniunt rationem. Ita quibus lacerti breues, ut etiam formosa magna ex parte
breuia sunt. Et quibus pedes exigui, iis manus quoque parue habentur.

*De sex istis dif-
ferentiis sunt
plura ueluti li-
bri de anima-
lium præter
restructa.*

Partium itaque huius, quemadmodum ad superius & inferius, prius po-
sterius, sinistrum dextrum se habent, pauca explicandus est: sex namque
hæc differentias in ueteri hominem liquido apparet. Superius autem intel-
ligi uolo in animalibus, non ut idem sit quod in orbis uniuersi situ, sed quæ-
dam modum superiorem partem in omnibus eam esse dicimus, non animalibus
tantum, sed quæcumque uita prædita sunt, per quam cibus recipitur un-
guem autem ad quam postremo accedit. Partem quoque priorem eam uo-
co, in qua sensus præcipue comprehenduntur, & unde sensus emanant ex-
ordia opposita uero illi pars posterior est. Dextrum autem, (quemadmodum
& in uniuerso est) unde primus motus orditur. Ergo superiora inferiora-
que hominem omnium maxime animalium habere ad rationem differ-
entiamque locorum naturalium intelligimus: eius etenim partes eam su-
periores quàm inferiores, ad sinum orbis uniuersi superiorem inferiorem-
que dispositæ sunt. Indemque priores posterioremque, atque etiam dextræ
sinistræque habentur cum cæterorum animalium genus, uel respectu hu-
iusmodi careat, uel confusus habeat. Caput itaque cum in cæteris etiam
omnibus animalibus superiorem obtinet sinum, corporis sui rationem ho-
mo potissimum, quoniam solus (ut modo diximus) ad uniuersi orbis habi-
tum institutus est: (solus enim animalium erectus uuit) idcirco partem etiam
altam habet respondentem parti sublimi uniuersi. Caput collum excipit,
tum pectus & dorsum: alterum prius, alterum posterius est. Subiacent iis
uenter & lumbi, genitale & nates: mox femur & tibia: postremo pedes.
Crura uero ante flectunt, eodem scilicet quo & incedunt. Calx è tergo po-
sitæ

G

H

Agius est. Malleoli sicum mutantur aurium: quippe qui latera teneant imi-
crans, quomodo aures iunctæ lateribus capitis habentur. Brachia à latere
corporis dextro sinistroque dependent, atque se intro reflectunt ita ut homi-
ni potissimum crurum & brachiorum dexera, (ὀρεῖ Græci vocant) aduer-
sa inter se sint. Et brachiorum prior ea pars sit, quæ à pectore est: posterior
vero, quæ ab scapulis sicum interior quæ ad latus tendit: exterior quæ ab eo
recedit: quod ad omnes articulos pertinere etiam patet. Sensuum autem
partes sensorias, oculos dico, nares & linguam, eodem scilicet in priorem
partem spectantes habemus. Audimus vero sensoriam partem, id est aures,
à latere, eodem in orbe quo oculos. Ita partes exteriores collocatæ atque
despositæ sunt, non mutanturque præcipua: & cognite per usum situmque
Bevidentiorum habentur.

De partibus interioribus, & primo de capitis partibus. Cap. XII.

Nunc interiorum ordinem persequemur. Primum igitur cerebrū ca-
pitis priorem obtinet partem non modo in homine, verum in cæte-
ris etiam animalibus, quibus ea pars data est: omnibus autem in his est, quæ
sanguinem obtinet, & ob eam rem *σφαγμα*, id est sanguinea appellantur: et
cæteris fere nullum habet, nisi per proportionem, ut ea quæ *σφαγιον*, id est
mollia nomine speciosi nuncupantur ipsam ambiūt membrans duæ quas
μολιδες Græci dicunt: altera crassior & solidior, ossi calvarie adharrens, quam
σκληρὴ, id est duram vocant altera *γυμνὴ* dicta, quæ interior est: & cerebrū
C ipsam attingens, infirmior & rubicundior. Bipartitum omnium anima-
lium cerebrum est, postremūque iungitur, quod cerebellū vocatur, quod
spunxi medullæ continuum est: durusculū, hoc est & colore fuscior. Cere-
brum omnibus priuatum sanguine est, nec unquam intra se ullam conti-
net omniumque corporis partium frigidissimum sensum, vel ad tactum, ait
Aristoteles, Galenus pernegat: cuius tamen frigidius ipsum asserit, quæ co-
mmonem animalis partium, quod ad caloris frigorisque sensum attinet, velum
norma est. Ex cerebro ipso paria nervorum oriuntur septem, quas *εὐρύλας*
vocat, qui in secūdi arte petri sunt. his quæ ad nares feruntur maxime co-
numeratis: neque enim hæc nervorum more produciuntur, nec extra caluā
exeunt.) Et primū quidem paria nervi prodeunt, unus dextra, & alter sini-
D stra, crassitudine notata digna, & fere omnium nervorum mollissima. Hi ve-
lon radices quædam oculorum videntur: uterque enim ex priore cerebri
parte prodeunt, atque in aduersum sibi oculū subsens, in laeum sese explicat:
ipsūque qui in oculo est, vitreum humore in orbem sphaere modo ambit
membranamque (siue tunicam dicere malis) efficit, quæ *αὐτοῦσφαλὴ* dicitur,
id est reformatus. Soli hæc nervi antequam in oculos inferantur, sensibi-
lis quidam mearus inest unde ipsos quidā, non nervos, sed *μύες*, id est mear-
rus appellant, alij nervos opticos, quasi dexteris visus. Alterum post
hoc nervorum par est, in musculos qui oculos movent distributum: pario-
res multo sunt hi, remporalesque: his quos modo intemorauius. His adiacet
tertium par. hos autem nervos molles vocant: molles enim sunt, tum

secunda pars nervus, de quibus modo diximus, tum vero eius quod mox sequetur, quarti, & item aliorum. oritur autem hoc nervorum par, ubi pars cerebri anterior cum posteriore connectitur. Quarti vero pars nervus, huius postea paulo sita sunt, à cerebri basi emergentes. Quinti quoque pars nervi proximi his oriuntur, sed ad capitis latera magis, ad ossa quæ *Λαβή*, id est lapides dicuntur, vergentes. Hi vero cum statim lesidi fiant, in ipso scilicet per ossa transitu, utrinque deinde prodeunt, altera quidem pars (*αὐτομή*, id est auditorium nervum vocat) in priorem magis partem ad auditus metatum; altera in partem magis avertam, in ossis eius quod *Λαβή* dicitur, foramen quoddam, quod *πυλὴ* appellatur: id enim veteres anatomici nomen illi indidit, cum utique penitus anfractum illum perforare non possent, per quem nervus post aures foras emergit. Sextum nervorum par à cerebri basi producitur per foramen quoddam, quod ad inferiorem illius communiatur partem, quam *Λαβή* vocat, à latera similitudine, conspiciuntur. Nec dum etiam nervi isti dari apparent: prædictis tamē omnibus eò duriores sunt, quo iā spumæ medullæ sunt propinquiores. hæc namque eorū qui dari sunt, nervorum principium est. Vbi autem cerebrum definit, illic oritur septimum nervorum par: quod unā cum sexto parī è calvaria se exerit. Habet in se cerebrum, plerisque omnibus, cavum quoddam exiguum veluti lacunam *Μέση* ab Herophilo dictum, id est torcular. habet & ventriculos (*κύνες* vocant) in priore quidem parte, hoc est in cerebro ipso, binos: in posteriore vero, quod cerebellum vocatur, unum. Et præterea à prioribus in posteriore meatus quidam transire cernunt, quem sine quartum totius cerebri ventriculum nonnulli anatomici vocant. A prioribus illis utrinque exoritur processus quidam oblongus & concavus, in narium usque principium protensus, à ventriculorum illorum natura nihil prope mutatus: ostendit instrumentū primum hoc esse medici tradunt. Et cerebri quidem partes, & quæ ex his oriuntur, hoc se habere modo cernuntur: quæ vero in oculis sunt partes, iam explicandæ à nobis sunt.

De oculi partibus interioribus.

Cap. XIII.

Molles illi, quos primi partis nervos, & à priore huius cerebri parte oriri diximus, cum primum è calvaria egressi ad oculos pervenerint, in latum sese (ut modo expostum est) explicantes in orbem ipsi hæc modo, utrumque humorem, quem *καρπὸς* vocant, amplectuntur: efficiuntque membranam illam, sive tunicā, quæ *αὐτοχρυσὸς* dicitur, eò quod *αὐτοχρυσός*, id est reti similis sit. Quæ tamen tunica membranæ neque colore, neque substantia refert penitus: sed si exempli ab oculo eam seponas, atque in unum colligas, apparebat plane eum cerebri portio quardam. Inferitur autē hæc in humore oculi, qui *σφακελὸς* dicitur, id est crystallinus aut glacialis, quod primum visus est instrumentum, elbique affectuam crystallini certus ad cerebrum nuntius. Sunt autem in oculo intus sub tunicis humores orbiculares duo: mollis alter perinde ac vitrum, quod modice solutum ac fufum sit: alter ita durus, ut glaciem mediocriter concretam imiteretur: nec corporis

habui

Quæ quibique
modis à capite
feruntur nervi
in oculi cor-
poris partes, si-
ne ossibus tra-
hentibus. De
differt. nervo-
rum. Cap. 9.
De ipso par-
te. *Αὐτοχρ.*
αὐτοχρ. dicitur

Reperitur de
quibus hanc no-
tam habuit Pol-
dus libro 2.

A habita solum, sed colore etiam tum vitreum tum glaciem referunt: uocanturq; à medicis, hac quidem qui mollior est, *uirtus*, id est intrensille uero durior, *aperta*. Est autè crystallinus, candidus, splendescens, perspicuus, & ut dictum est, durusculus, figura globuli leuiter cōpressi: at vitreus (qui in hoc à natura instans est, ut sit crystallino familiare alimentum) liquidus est instar uitri ab igne liquefacti albi uero coloris tantum habet, quantum si intellexeris exiguum nigrum multo albo pertusum, ut sit albedinis perfectio adulterata. Tunicam *αυτογενή* continet alia *αυτογένη* dicta, (quæ re uera tunica est, & corporibus subiectus operculum) orta à tenuiore cerebri membrana illi cognomine. Vasa hæc plurima, arterias scilicet & uenas in se habere conspicitur, quæ & alimentum *αυτογενή* præstant & uincula illi seu sustentacula fiant. Cerulea hæc multis in partibus est, tam fusca, tam etiam nigra. Circundat hanc, & tætuertur quædam membrana durior, & quæ subiectam sibi tunicam ab ossium duritie tueri possit. A crassiore cerebri membrana hæc producta est, & apud iridis circum lum alteri membranz inferiori conuincta. Porro iridis circulus ita se habet. Crystallinus ille humor (quem primam uidendi instrumentum esse diximus) in uitreum humorem inferitur: & medius in ipso, quasi in aqua uehatur, eodem prope modo quo sphaera globusue, cuius dimidiū extra aquā promineat. Hæc hæc corum conuexio in crystallum medio hemisphærio, in utroque humore circulum unum efficit. Locus hæc terminus est, finisq; *αυτογενή* tunice atque *αυτογένη* efficitq; eodem loco suum utraque circumulum. Ad eundem hunc circulorum locum prope accedunt aliunde membranz præterea due, altera *αυτογενή*, finis est musculorū oculos mouentium, in duriores illam tunicam infertur altera à membrana caluariæ ambiente (*σκληρυν* Græci uocāt) producta est. Hæc colore alba est, & totum oculum cum ossibus contegit: definit autem ad circulum eundem, ubi & reliquæ oculi membranz: & ubi nigro oculi iungitur albus. Locus hic si probe omnia dissecueris, diligenter que omnia perspexeris, circulo uolens der plures (nempe septem) sibi mutuo coherentes, & crassitudine, & colore uarios: ut appositissime à uetensibus harum rerum peritis, iridis nomen datum illi sit. nonnulli autem & *στέφανος*, id est coronam uocarunt. Attunaca illa tertia durior, quam à crassa cerebri membrana oriri diximus, & quæ *αυτογένη* tunicam proxime circumdat, ex iridis circulo producitur membrana alia, quæ & dura est, ut sit crystallino humori operimentum, & ueluti propugnaculum aduersus ea quæ extrinsecus occurrere sine: & præteritus simul atque alba, ne ullo pacto usum impediatur densa adeo ac tenuis, (præsertim in media sui parte) ut non aliter quàm cornu præterenne, & quam accuratissime detrasum, splendore transmutare possit unde & nomen illi impositum est *αυτογενής*, id est cornea. Est uero hæc membrana quæuis aranea tenuior candidiorq; & quouis speculo leuior magisq; pellucida pariter ac dura. Quæ proxima illi subest mollis est, uenosa, nigricia, & in medio pertusa. Oritur hæc una cū cornea ex iridis circulis, à tenuiore illa tunica, quæ *αυτογένη* dicta est: corneamq; sibi uicinam alia, ac eandem ne in crystallinum

humorem concedat, prohibet. Membrana hæc intus qua vitreo humori E proxima est, asperitatem quidam habet: exta uero qua corneam attingit, densior est: in medio autem sui qua pupilla est, perforatur. Atque hoc in loco, abs scilicet foramen est, nulla tunica inter corneam & crystallinum humorem media est: sed uelut pertinac admodum & album cornu, splendor internus cum externo cōmunicat, & commiscetur. Caruleam hanc tunicam in medio perforatam, ab acini uix similitudine quadā (quod scilicet intus aspera non aliter sit, foris leuis) *μεμβράνη* uocantur. Curus substantia, ea parte qua humori crystallino coniungitur, spongie madide similis est. Et cornea tunica qua quidem parte unā cum ea quæ *μεμβράνη* dicitur, ab inde exoritur, humori crystallino propinqua est. membranz enim oculi omnes pānter atque humores, eo in loco coherrent. Exterior uero magis magnisque à crystallino abscedit: adeo ut qua pupillæ locus est, plurimū ab eo distet. Porro hoc ipso intervallo quod est inter humorē crystallinū & *μεμβράνη*, humor quidam prætenuus reperitur & limpidus, ouorum albumini handquaquam dissimilis, quo unā cum spiritu quodam aëreo splendido prohibetur cornea, ne eo in loco crystallinum humorem comprimat aut contingat. Si enim pertundatur pungaturque cornea, confestim & humor ille per uulnus effluere cernitur: oculisq; rugosus efficitur, contractus atque laxus. Inter hunc humorem & crystallinum, membrana quædam, in modū cepe corticis aut aranæ prætenuus est, quo crystallinus humor ab chagride membrana separatur. Quod autem reliquum in oculo est, pupillam ambiens, (exceptis qui oculum mouent musculis) non in homine solum, sed omnibus animalibus quibus oculi duri non sunt, sibi naturam imitatur. Et oculi quidem partes, non numerantur: quanquam crystallinus humor primum usus instrumentum est, ut sæpius iam dictū est: reliquæ uero eius causæ factæ sunt.

E. Nulla tunica, nullam forsitan tunicam conspicuam intellexit Galenus. Nam *ἀρρετή* membrana quonammodo prætenditur crystallino humori, statim expli- cabitur ex eodem Galeno. F. Humor prætenuus, humorem aquenū uocant hūc Alcibiades: hic in diffusionibus coagulatur. Membranula, hanc membranulam tenent adeo ut egre conspici possit, ex *ἀρρετή* uel nati, non desinunt Pollux (ut arbi- tor) ab illa, sed quasi eandem membranam duplici nomine insignitæ, ut aëreæ no- tamus, scilicet *ἀρρετή* & *ἀρρετή*.

H

De colli & pectoris partibus interioribus,

Cap. XIIII.

Collum capiti subiacet proximū, ut ante dictū est. Intra collū gula est, cui comes aspera arteria iungitur, priorē obtinēs suam in omnibus iis quæ cum habent habent autē omnia quibus pulmo est. Huius summa pars larinæ dicitur, ut ante diximus: in cuius meatu particula quædam lingue quæ in fistulis est, non absimilis cernitur, cui in uoce formanda primæ partes tribuuntur, nomant *γλῶττις* (quasi lingulam dicas) & *ὑπογλῶττις*, id est lingua larinæ. Iungitur postremæ lingue parti minor lingua, quæ *ἐπιγλῶττις*, & ligula nominata est, posita inter principia gulæ & larinæ, carti- laginea

*Asperam ar-
teriā Collū en-
im, pectoris
membrana, quæ
fistula fistula
est.
Larinæ, huius
est.*

A. laginea, p. tennuiss, forma hedere folio persimile: cuius pars latior ad ipsam linguam micro: uero ad interiores oris partes uergit, uidelicet apta quæ per uices arteriarum foramen quod ad os spectat, operiat. respirantibus enim erecta est, at deglutientibus prona. Arteria ipsa multis cartilaginibus constat: & altero sui extremo cum lingua una coniungitur: altero ad pulmonem descendit: cum in utriusque finditur pulmonis partem. esse nanque bipartitus pulmo omnium cõsuevit. Hinc arteriarum partes illæ binæ in multos ueluti ramos sparguntur, *alperæ* uocant. Gula ab ore & ipsa dependet, continua tam spinæ tum alperæ arteriarum, nexu fibrarum, & per septum transversum descendens, in os uentriculi siuit, neruo carneq; cõstans: & pariter descendendi in longum larumq; habilis. Quæ intra pectus continentur omnia, *ab* *uisceribus* dicuntur. Spatium uero ipsum pectoris totum, *uisceribus* dicitur.

De uisceribus & septo transverso.

Cap. XV.

S Equitur ut de uisceribus doceamus. Naturâ habent omnia uiscera, carneam quidem, sed sibi consimilem, cæteris dissimile. Sunt enim carnosissimi generis species plures: primo quidem quæ proprie caro appellatur, deinde cuiusque uiscerum propria substantia est. Eam Erasistratus *parêchyma* uocauit: quandoquidem posita sit ad meatus uenarum, & intercapedines prouide quasi sex æque profuscentis, ita sanguinis per uenas fluentis, uiscera illa, ueluti *æçççççççççç*, id est profusiones consistunt. Sunt autem uiscerum, quædam supra septam transversam, quedam infra. Cor situm in pectore est operum inuolucro pingui & corpulento, quod uenæ maiori annectitur, & arteriæ quæ aorta nominatur. & cæteris quidem animalibus in medio pectore situm est, homini tantum paulo uergit ad leuam. Extremum eius *æçççççççççç* Græci uocant: turbatur in mucronem curuosum & firmissimum, & omnino parti corporis priori commissum est: at parti sui ampliore superiore corporis spectat, præterquam in piscibus, solis enim his cordis mucro ad caput spectat. Cordis pars illa amplior qua membranz connectitur, *æçççççççççç* uocatur. Nerviulos quosdam suis in cauis continet: sed cor sine osse est omnium quæ nos nouerimus, præterquam maximorû quorundam animalium: ossi tamen quoddâ simile omnibus inest: cuius substantia nõ in omnibus æque dura est. in minutis enim animalibus, ad cartilaginis duritiem prope accedit. quod enim in eis nascitur, non omnino cartilagineus, sed corporis ex neruo & cartilagine conflati naturam habet. In maiusculis perfecta cartilago est: in uis uero quæ grandiora sunt, cartilago osses est: at in maximis animalibus, os cartilagineum potius dicendum est. Quo nãque uastiore corpore fuerit animalis genus, eo propius ad ossis duritiem accedit cartilago illa. In corde, uentriculi siue finis fere bini inueniuntur, unus in latere cordis dextro, in sinistro alter. Non tamen idem in omnibus est uentriculorum numerus, quibus enim pulmo decit, hæc neq; dextrum cordis uentriculum habent. Inter utrumque cordis uentriculum, medium quoddam est quasi septum. Auriculas necnon habet cor binas, uentriculis adhaerentes, quæ concavæ sunt, & substantia conlante carnea, au-

riculas eas dixere ueteres, ob similitudinem quandam earum quæ in capite E
sunt utrinque enim cordi, sicut aures capiti adherent. Sed de corde hæc
nostre lingua etiam insectum iam consideranda sunt. Pulmo spirandi offi-
cina est, attrahens ac reddens animam ad circo spongiosus ac fistulis mani-
bus cauius. Bisidus consuevit esse omnium pulmo, quanquam paruum dis-
tinctio in omnibus nõ æque cernitur. Est enim hominis pulmo simplicior,
atque à singulari arteria partes in utrumque latus duæ dependit: uenæ quo-
que maiori, atque arteriæ, quæ aorta ab Aristotele uocatur, pulmo con-
nectitur. Sub pulmone septum pectoris est, quæ præcordia & septum trans-
uersum appellantur determinat enim hoc à reliquis pulm onem & cor. Co-
stis hoc & hypochondriis & spinæ, parte sui carnosiore, ualidiorque an-
nexus est: parte uero media tenuior est, membranæque exulante contextus. F

Iecur sub septo positum, à dextro latere est: Lien à sinistro in omnibus, quæ
membra ista disposita habent per naturam non prodigiose. Lien enim le-
gitimum illum locum in nonnullis quadrupedum, lienem cum iecinore
permutasse uisum est. Iecinoris pars, quæ ad septum transuersum & peri-
tonæum est, conuexa uel gibba quæ autem inferne uentriculum tangit, ca-
ua uocatur. In iis animalibus quæ lienem habere necesse est, lien ipse quasi
iecur adulteratum esse uidetur adeo ut Plaro lienem iecinoris *ἱπαρίσιον*, id
est effigiem dixerit. Quæ autem lienem non habere necesse est, sed exiguis
admodum lien ueluti notæ grana habetur, ut secur bipartitum aperte est
& pars altera ad dextram, aliter (quæ minor est) ad sinistram situm habere
solet. Et in nonnullis adeo diuisum patet, ut locis quibusdam leporis bina G
iecinora habere uideantur: quemadmodum in genere piscium, tum alijs, cū
cartilaginei iecur duplicatum habere uidentur. Fibras habet iecur, *ἀσπὴν*,
ἰσπὴν græce uocantur. est enim secur, alius multitudine, alius simplicius.

Iecur magna ex parte maximèq; animalium numero, felle caret: uerum
in nonnullis id habere in uelica sibi adnexum cernitur. Quæ enim sangui-
nem habent animalium, maior pars fel habet, aut iecori aut intestinis an-
nexum: ut piscium plurima, necnon serpentum maxima pars. Renes post
hæc iuxta spinam ipsam adherent in illis: ex uisceribus is maxime pingue-
scunt: & quantum uolunt fuerint pingues, medijs tamen fere aliquid
deest. Dexter in omnibus quibus sunt renes animalibus, superiorem obti-
net locum, (nonnunquam iecoris fibræ aliquā attingens) munusque pin- H
guis obducitur, & squallidior est, quod uel in omnibus æque liquido mam-
festatur. Porro à spinæ uasis, arteria scilicet & uena magna, inferuntur in
eos haud exigua magnitudinis uasâ: alijs utrinque singula, alijs quibusdā
bina. Figura us summa fere est, qua parte arteria & uena ipsi inferuntur, &
qua se mutuo respiciunt opposita uero parte, gibba. In omnium fere re-
nibus sinus inest concavus, (quibusdā amplior, ut in maioribus animan-
tibus, quibusdā uero arctior, ut minoribus) corpore quodam membra-
neo circumdatus. Ex hoc utrinque sinu haud procul à locis quibus inferun-
tur, quæ diximus uasâ, meatus duo insignes concavi atque prelongi, ad ue-
sicam feruntur singuli ex singulis renibus, *ὑποσπῆρας* à Græcis dicti. Et de u-
sceribus

ἰσπὴν, ἢ ἰσπὴν
ἰσπὴν.

ὑποσπῆρας, ἢ ὑποσπῆρας
ὑποσπῆρας.

A foetibus quidem, hoc est de pulmone, corde, iecore, hene & renibus, dictum iam est.

B. Viscera, *πρωτάκια*. Intercapedines, *μεταστάσεις*. Aristoteles interpretes uacuitates dixit. C. *Χορδαία*. D. Ventriculi sunt sinus, *σύνδεσμοι*, & idem, et res in manibus animalium corde esse uentriculos sentit Aristoteles: uerum uerum illam caeteram partem esse dextra uentriculi affert Galemus. *Αυτίκω, ἰσχυρὰ*. E. Pulmo, *πνεύμων, ὁ πνεύμων*. Septima pectoris, *πρὸς τὴν ἑξῆς φρένα*, praecordia appellantur, quia cordi preterduntur: alia praecordia uocamus uno nomine, extra in homine. F. Iecur, *ἰσχρὸν*. Lura, *ὁ πνεύμων*. Conuexa, *σφῆρα*. Cava, *καὶ*. G. Fel, *χολή*: nomen hoc commune est, & humoni ipsi, & uesculae humorem continenti. *Βενεὶ, σφῆρα*.

De uentris partibus iniectionibus.

Cap. XVI.

Ventriculum appellamus eam partem, in quam cibus deuoratur: uentriculus os sub media pectoris cartilagine, quae *σφῆρα* dicitur: reliqua pars infra subsepto transuerso sita est. secundum habet uentriculus amphio-rem, & in homine certe ad dextram potius inclinatum: pars uero superior, quae ad gulam tendit, atctior est. In aliis fere animalibus, in anteriora ad hypochondrium tendit uentriculus. huius ostium inferius, quo cibo exitus patet, in intestinum, ad dextram prope iecur situm est. *ὀστέον* hanc partem Graeci uocant, quoniam portae modo in inferiores partes ea quae excretum sunt, exeunt. Pylorum intestina excipiunt, flexuosis orbibus conuoluta: quorum natura, quatenus intestina sunt, eadem in omnibus animalibus est: magnitudine autem, & anfractuam (quasi *ὄμβρος* dicunt) numero, discrimen habetur. In his ab egressu ipso ex pyloro, est quod *ισχυρὰ* dicitur ab Hierophilo (quod duodecim digitorum longitudine habeat) dictum est. Hoc principium est intestini, prius quam in anfractus orbisq; conuoluitur. Quod autem sequitur flexuosis orbibus conuolutum, non ita tamen implicitum, ieiunum intestinum uocatur: cui tale uesibulum est, quia nunquam quod accipit, continet, sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenuius intestinum est, in sinus uehementer implicatum: orbis uero eius in dexteriores partem conuersi, & à regione dexterioris coae figurati, superiores tamen partes magis complent. Deinde ad intestinum cum crassiore altero transuerso cōiungitur, quod à dextra parte incipiens, in sinistrae peritiam est, in dexteriores non est: idēq; caecum nominatur, dum idum quoddam exiēs. Ad id quod peritiam est, *σῆμα* appellatum, late fusum atque sinuatum, ab utraque parte hac atque illuc uolutum, magis tamen sinistiores inferioresq; partes tenens, coniungitur reur, atque uentriculum: deinde cum quibusdam membranulis à sinistro rene uenientibus iungitur atque hinc dextra recuruatam, ad exitum usque excrementi reductum perducit: idēq; id ita rectam intestinum nominatur: breue id, corpus lentumq; huius finis est musculus, *σφῆρα* Graeci dicunt: quo cohibetur alui excrementa, ne inuitis nobis effluant. Contigit uero uersa haec omētum, quod non nisi membrana praepunguis est, Graeci *σῆμα* dicunt. ostium id de medio uentre, situmq; à septo transuerso dependet. Quod autem latē uocant, membrana & ipsum est duplex pertendēs continua de intes-

A ac solidas intelligi uoluerunt, cutem, membranam, uenam, pilum, os: item & quod uice fungitur ossi ut spinam, *ἄσπερ* Graeci dicunt, & cartilaginem, unguem, cornu item quae us proportionem respondent.

De sanguine, uenis atque arteriis: & quae us proportionem respondent. Cap. XVIII.

E Similariam numero humorem quoddam genus unumquodq; animalium continet, quo si aut per utrum, aut per naturam ipsam prouetur, in perniciem agatur necesse est: habet etiam diuersum quoddā, id scilicet in quo humor ille contineatur. Sunt haec in aliis sanguis & uena: alius quod us proportionem respondeat, ut fibra & sanies. Hinc sane animalia alia *ἀσπερ* dicantur, id est sanguine praedita & sanguinea, alia *ἀσπερ*, id est exanguia. Et sanguineis quidem omnibus, similariam sanguis potissimum communis est: nec minus communis ea pars est, quae sanguis continetur, quae uena dicitur: exanguibus autem, proportionem illis respondet, sanies & fibra. Quae itaque natura sanguinea uenarumq; corporis principium esse uideatur, primum de us differendum est. Sedenim natura uenarum ita se habet. Duae itera thoracem uenas continentur: uenarum enim nomine etiam uasa illa pulsantia, quas modo arterias uocamus, à uenarum, tum medicis, tum philosophis appellari uideo: altera earum maior, quam uenam etiam ob insignem eius cauitatem uocant Hippocrates *ἡσπείδα*, id est rectoram dicit. Altera minor quam aortam uocant nonnulli, arteriam medici posteriores: eodem etiam nomine uasa singula, quae pulsam habeant nuncupantes. Sunt etenim arteriae spirituum scimitrae, quarum certe pulsus in eadem membris euidens est. Vtraque ueluti caudex est, seu truncus omnium quae per totum corpus sparguntur uasorum: uenarum altera, quam scilicet cauiam uocari diximus: altera uero, quae & arteria dicta est, arteriarum. Neque uenae fere deest arteria: & quacunque corporis parte arteriam uidens, eandem & uenam conspicitur, paucis quibusdam exceptis uenis. Quoniam qui ab arteria oriuntur rami, minores multo sunt, quam qui à uena maiori proficiuntur. Sed qui diligētius nosse uelit, quemadmodum uenae arteriaeque inter se habeant, spectare id tum per dissectionem, tum etiam per commentationem, hoc est historiā animalium debet. In us uasis qui continentur humor, qualiscunque is sit, una sanguinis appellatione censetur. Sanguis si integer sit, rubet & dulcis saporis est: salsum namque sanguinem, sicuti & salsum pituitam, morbosos humores esse perspicuum est. Verum qui in arteriis reperitur, tenuior simul & calidior, magisque flauus est, quam qui in uenis atque purior: qui spiritui animali nutrimentum praestet. Et qui in sinistro cordis uentriculo reperitur, fere tenuior est, atque magis flauus, quam qui in dextro: quanquam nonnunquam etiam crassior atque artior, uerum semper calidior. Qui uero in dextro sinu est, eandem speciem habet cum eo, qui in iecore, & in omnibus uenis corporis uenis reperitur. Solus omnium humorum sparsus per totum corpus animalium sanguis est: effluitq; sanguis quacunque partem incidit carnis uix atque incorrupte. Venaeq;

DE DIFFERENTIIS

ipse in pectus postremo fibras subter totam cutē disperſe, adeo in an-
guſtam ſubtilitatem tenuantur, ut penetrare ſanguis nō poſſit, aliōdie quā
exilis humor ab illo, qui cacuminibus innumerus ſudor appellatur. Sanguis
in primis neceſſarius communisq; omnibus animalibus ſanguineis eſt, eſt
enim his ultimum alimentum. Atque deſicit ſanguis quoties eibus nō in-
geritur: quoties uero ingeſtitur, augetur: et ſi alimenta bona aſſumantur,
ſanguis integer eſt, ſi praua uiuoſus. Liquidus & calidus ſemper eſt, quan-
diu in animalis corpore continetur: at ubi effluſerit, cōcreſcit ſere omniū
ſanguis, niſi fibre, quibus reſertus eſt, eximantur: ſi uero fibras detraheris,
ſanguis non coegetur. Sanguis incoctus ſanies eſt: incoctus autem, aut quia
coctus nondū eſt, aut quia in ſerum degenerauerit. Fit enim per conco-
ctionem ex ſanie ſanguis. F

A. Sanguis, *αἷμα*, ueni, *αἷμα*: fibre, *ἰνὴ*, ſanies, *ῥῆμα*. B. Hippocrates in libro *de
diſſectis* 2. mē. Cum naſceretur infans cui uena quæ in cubito eſt, puſſa uenit, ſanctus ille &
lucidus euadere: cui ſanctum mox facit, *ἰνὴ*. Plato etiā in *Taietico*: cor uero ſimul &
uenarum ſocium, & eius ſanguinis, q̄ uel per omne corpus eſt impetu ſeruo, &c. Celiſus
quoque in proœmio. Neque quid uenas moueat, inquit, ſed quid quæque genera mor-
tas ſignificent, &c. Plinius lib. 11. Nullo uino æque uenæ excitantur. & alia nem ple-
riſque locis. Virgilius lib. 6. cithmos uenarū appellat. C. Arteria. Quemadmodū
à maximis hæc caudicibus exeunt, radices atque rama, id eſt uenæ arteriæq; inno-
ret paſſi per uniuerſum ſparguntur corpus, accuſare docuit Galeſius, cum in alijs, cum
uero breuiſſime ſimul ac aperitiſſime in eo libro, quem de Diſſectione uenarū & arte-
narum inſcripſit. D. Sanguis, *αἷμα*. E. Suſtor, *ὑπόστασις*. Santes, *ὑγιής*, ſignificat etiā id
quod in exanguibz uicem ſanguinis præſtat ſicut & in quibuſdā illud eſt uenū. G

De nervis, ligamentis, & tendinibus.

Cap. XIX.

*Alia eſt
quæſiſtenda.*

NERUORUM mox ordinē perſequemur. His ceu canalibus quibuſdā trāſ-
mittitur ſenſus, & motus à cerebro in uniuerſas animalis partes. Aut
enim à cerebro manifeſte oriuntur, aut per mediā doſi medullam tranſ-
mutantur: ex qua prodeunt circiter ſexaginta. Nullus à cerebro aut ſpinali
medulla producitur neruus, *ἁπλῶς*, id eſt non coniugatus, ſed ſemper alter
ad dextram, ad ſiniſtram aliteneadē proſius utrinque magnitudine, ſuum
obtinēt. Nervi omnes ſua ſubſtātia cerebro ſunt durioreſ: uerum qui ſen-
ſum oculis præſtant, denſioreſ omnino conſpiciuntur, haud magnopere ta-
men durioreſ: atque hi omnium ſoli ſenſibiles meatus in ſe habere cœmunt. H
Nur. Sunt nervi alij molleſ, alij durioreſ: molleſ nervi, ſenſus ſunt inſtru-
menta, quemadmodum duri, motionis. Ex parte cerebri poſtérieure molleſ
neruiſque penitus nullus producitur: ex anteriore autem duros quōſdam ner-
uos orti fuit neceſſe: in quibus, opinor, ſunt ij quibus oculi mouentur.
Quæcumque uero neruorum mollioreſ ſunt, ij nihil à medulla ſpinali deſ-
ſerre uidebuntur, quod ſcilicet ad mollietatem attinet. Nervi non ſoluantur
incaſum: ſed inq; uulneratis ſummas dolor, præſectis nullus. E neruorum
genere cenſentur ligamenta. & tendines: ligamentum proprie & non eom-
muniter appellatum corpus eſt neruoſum, album, exanguē, ſolidum, ſine
ſenſu, ſimuliterque neruo concuſſatus expert: ex oſſe quidem omnino or-
tū.

A tum habens: insertam autem in os aut musculum aut scilicet os ossi, aut musculum ossi coniungat, & tanquam vinculum contineat. Musculorum *apophyses* tendines nominantur, in quos scilicet musculi desinunt: massa autem eorū natura est, & media inter ligamentū & neruum. Horū quidam adco-
efficuntur tenues, ut membranę potius videantur. Facile autē dignoscuntur: nā si hos clara luce penitus inspicias, fibras quaslibet intercurrentes ostendēr.

G Neruus, *neruus*. horum sectionem in universa corporis membra ostendit accuratissime Galenus lib. de usu partium, & de nervorum dissectione. Notat Aristoteles ē cerebro exoriri meatus duos seruosos malos, qui per ipsas oculorum sedes, per tendentes in superiores *peritrochæ* sinuuntur, aboque scētiat nervorū originem a corde, non à cerebro duci. **H** Ligamentum, *malloquas*. hac vel nervorum nomine vocat Aristoteles & Plinius. Sunt & alij ligamentorum usus, ut videtur est apud Galenum libro Anatomicæ primo. **A** Tendines, *seruosos*, ē *apophyses*, tendentes.

De fibris.

Cap. XX.

Fibrę inter neruum & uenam suam habent naturam: & nonnullę hu-
morem, sinicem appellatum continent. tendunt à nervis ad uenas, ac
unde ad nervos. In corde item fibrę sunt, quales in musculis cernimus, quibus
caso circumhæret: cæterum non est idem fibrarum genus, sed quę in
musculis habentur, nervorum ac ligamentorū sunt particular. Cordis pro-
pria quidam est fibrarum species, æque scilicet ac uenarum tunice: atque
arteriarum, utemque intestinorum, utriculi, uteri, & uelice utriusque li-
cet enim in his membris, propriam quandam uidere carnem suis ipsorum
C fibris circumnascētem. Aliud item genus fibrarum est, quod consistere in
sanguine solet, quanquam non cuiusque animalis: spissari autem sanguis
non potest, si id genus fibrarum detrahatur, ut dictum est: spissatur uero si
non detrahatur. Genus id ergo fibrarum, tamen cœui, procœi & bubali, & aliorum quorun-
dam sanguini docet: quocirca eorum sanguis nō similiter atque cæterorum
concreuit, sed cœuorum perinde ut leporū solet spissari: idelicet non co-
itu firmiore, ut cæterorū, sed fluído, quale lac est quod insecto coagulo co-
iunt. Sanguis, uena, arteria, neruus, ligamentū, tēdo & fibra, ita se habēt.

De ossibus.

Cap. XXI.

Ossa omnium animalis parui sunt durissima, maximeq. terrestria. *Ossa, iuxta.*
Hęc tanquam fundamentum quoddam ad uniuersū corporis molem
sustentandam subiiciuntur: eis namque membra omnia firmantur: magni-
tudinis quoque animalium meta atque terminus us describitur. Ossium
quidam grandia & ampliter concava sunt ac medullosa: quidam mino-
ra, solida, ac sine medulla. In iis quę imbecilliora sunt animalibus, ossa sunt
laniata ac caua: magis fortioribus uero densiora ac conserta: magis ac pro-
inde canis, lupus, panthera, reliquisque omnia, quę musculis ac neruis sunt
robustioribus, densiorem multo ac duratiorem habēt ossium compaginem,
quàm oues, caprę, & id genus alia: quin & leo qui omnium est ferocissi-
mus, ossa in cæteris quidem membris omnia habet medullę expertia: in
firmioribus uero & si quis alius id genus artus, admodum exiguum ac te-
C

noctem. hominis uero ossa, quæ in ipso uel maxima sunt, cava & laxa inue-
niuntur: ut qui leone mulculos habeat longe imbecilliores. Atque hæc
quidem in omni animalium genere adeo seruat natura, ut nō modo gres-
sile nullum, sed ne uoluerē quidem aut aquaticū aliter habeat. quando qui-
dem aquilæ dēfissimā ac durissimā sunt ossa: deinceps & accipitrum fero-
cioribus, circo, palumbario & similibus: gallinæ uero, ananibus atque
anseribus, laxa simul ac cava, leuiorq; ossium est substantia. Ossa uero tanquā
principio sunt connexa, & omnia inter se aptata, utinam continuāt seriem,
modo uenarum nec est ullum os, (quod essetū dignū sit) quod seorsum
ipsum per se maneat. Intitū uero omnibus spina est: quæ compacta ex uer-
tebris, à capite ad coxas porngitur. Extat huius continuum capitis os rariū
& totidū, summis superimpositum uertebri: quod calua dicitur & cal-
uaria, ex anteriore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque leuis: cuius
pars prior sinciput est, tenuissimū, infirmissimūq; omnium capitis os-
sium, nouissimēq; consilire solitū. Omnium enim ossium corporis, ul-
timum id concretit & indutatur, in homine denaxæ: cum tamen in cæ-
teris animalibus discrimen ossium nullum sit, sed omnia perfecta iam in-
de à natuitate proueniant. Caluaria ipsa nō simili modo in quoquo gene-
re animalium habetur: aliis enim osse continuo calua perficitur, *ut in canibus*

*Septem uero
rarior in libel-
lo, quæ à mē-
tis infirmitatē
testatur, quæ
in pueris calua-
riæ parte.*

contingit, ut canis: aliis compacto, ut homini. Sex enim numerantur caluariæ of-
sa, excepto etiam illo quod à cunei similitudine *apertū* dicitur. Sunt autē
hæc ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se conne-
duntur, molliora. Caluariæ pars serrata, suturæ nomine significatur. Inue-
niuntur autem suturæ in plerisque quinque: prima ad sinciput, *ut in canibus*
dacta: altera per uerticem, *ut in canibus* tertia per occipitū, *ut in canibus* quæ ma-
gna ex parte coniunguntur. Duæ quas *apertæ* nomināt, in utroque tem-
porum lingule: hæc super aures, tempora à superiore capitis parte discer-
nunt, quæ *apertæ* dicitur, ad inferiorem per uerticem tendens, occipitum
à summo capite diducit. *ut in canibus* uero ab eodem uertice per medium ca-
put ad frontem procedit: eaque modo sub imo capillo desinit, modo fron-
tem ipsam leuans, inter supercilia finitur. Os deinde est, cum posterior
pars cum caluariæ osse, quod iuxta autem habetur, anterior cum parte su-
percilij extrema ad paruum oculi angulum coniungitur: iugale appellari
potest, Græci *zygoma* dicunt. Inter caluariam, & ea quæ superiorē maxillam
constituunt, os est quod à cunei similitudine *apertū* uocatur, & ucluri ca-
neus inferitur. hoc si inter superioris maxillæ ossa numerabimus, quinde-
cim numero erunt: uel ut alii placet, octo: inter quæ cēsentur, & genarum
& narum ossa. Duodecim faciei ossa numerant alij. Maxillæ inferioris nō
est os simplex in summo nanque menti acumine, si coquitur, laxatur. Ma-
xillæ dentium genus inhaeret, os partim cauum, partim solidū & adeo fir-
mum, ut solum inter ossa ferri aciem respiciat: neque eandem penitus nan-
nam quam cætera ossa habet. Cætera nanq; in prima corporis consuetudo-
ne omnia gignuntur, neque est quod post oriatur: at dentes post enascun-
tur, quo sit, ut cum deciduerint, denovo possint oriri: soliq; dentes inter ossa,

A tota uita crescent. Dentes omnes in suorum ossium concavis insiguntur. Et ossa ipsa quibus continentur dentes, *σύνενα*: quæ subeunt foramina, *δόντια* dicuntur. & expatis ossa ita se habent. Spina longitudine & rectitudinem continet animalium: hæc ex uertebis quatuor & uiginti constat (excepto osse sacro) in homine scilicet in reliquis, ex pluribus compacta est. Harum tota compago in ceruicis uertebas, & dorsi, & lumborum, & os sacrum (quod & os latum uocatur à nonnullis) diuiditur. Dorsi etiam partem intelligimus, cui cum pedore est æqualis lógitudo: quod subest reliquum, lumba appellantur: quorum pars ultima sacro osse finitur, in homine inquam. homo enim cauda uacat. In collo septem uertebre sunt duodecim ad costas, ad lumbos quinque. Earum quæ in collo sunt, supremæ uertebre in utroque eius

*Spina, σύνενα
δόντια. Vertebra
σύνενα, δ
δόντια.*

Σύνενα, σύνενα.

B latere sinus inest, in quos ingredi conspiciuntur processus ossis caluæ sub infenore cerebelli parte egressi, quæ *σύνενα* dicuntur. Ex secunda colli uertebra sursum uersus, in primæ uertebre sinus quosdam (quos ab oculorum sinus similitudine *σύνενα* appellant) prioribus minores, processus duo inseruntur, qui à figura tubinata *σύνενα* dicuntur: Hippocrates à figuræ similitudine *σύνενα* uocauit: & totam quoque uertebra *σύνενα*, id est dentem inde nominauit. Vltima uero colli uertebra *σύνενα* uocatur. Sub atlante proxima, & primæ dorsi uertebra *σύνενα* dicitur: & quæ illi subest, *σύνενα*: quæ deinde sequuntur, *σύνενα*. Duodecima uero dorsi uertebra, *σύνενα*. E lumborum uertebis, prima *σύνενα* dicitur: postrema *σύνενα*. Os sacrum ex tribus particulis tanquam ex propriis quibusdam uertebis

*Prima dorsi
uertebra, σύν
ενα, σύνενα
Os sacrum,
σύνενα, σύνενα
σύνενα, σύνενα
σύνενα, σύνενα
σύνενα.*

C compactum est: quarum extrema os aliud quartum quod coccyx nominatur, additum est: cuius pars quæ podici proxima insedetur, *σύνενα* uocatur. Vertebre omnes breues teretesq; sunt: processus tamen quosdam exiunt, *σύνενα* Greci uocant. Ex mediis enim omnium (preter primam) partibus postremis, exeunt ossei quidam processus: qui tanquam uallū spinam ab ea parte descendunt, *σύνενα* Græcis nomen est. Sunt & ab utroque uertebrianam latere processus: & à superiore etiam parte atq; inferiore omnibus, exceptis tribus summis. Omnium spinæ ossium, infimum (quod os sacrum dicitur) maximum est, quod uelut fundamentum quoddam omnes sustinet uertebas. Secundum uero loci in magnitudine occupat, quæ illi proxima uertebra est quæ inter eius quæ in lumbis sunt, quinta numeratur. Reliquæ uero, quod longius ab infima recedunt, eò etiā fere magnitudine deficiunt. Primæ itaque ceruicis uertebre, minime sunt omnium, & ob foraminis amplitudine tenuiores: uertebre namq; omnes foramine medio sibi iunguntur, quod *σύνενα* dicitur, quo spinæ medulla à cerebro descendit. Rursus à ceruice duo lata ossa utrinque ad scapulas rēdunt nostri scoptula, *σύνενα* Greci nominant: a summis uerticibus, qui ad scapulas sunt, signata, ab his triangula, paulatimq; lutescentia ad spinam tendunt. Hæc parte sui potestior cartilaginosa sunt, sed in imo maxime: ibiq; ualidis musculis necuisq; constructa sunt, nullisq; nisi in summo, ossi coherescunt. Inæqualia undiq; sunt hæc ossa, atq; omni ex parte dissimilia: gibba quædam exteriore ex parte, ueritiuscus summa: & summa in parte crassa, in imo uero tenuis sunt.

*Σύνενα, σύνενα
σύνενα, σύνενα
σύνενα.*

paulatimque pleniora euadunt, donec ad eam partem perueniant, quam E
 scoptuli ceruicem nominant. Is in extremo in acetabulum definit (ut mo-
 do diximus) eius ossis caput in se excipit, qui humerus dicitur, efficitque
 humeri articulum. In utriusque scoptulorum parte gibba, *ῥαχίς*, ad est spa-
 tia hinc parti propria addita à natura est: quæ paulatim superiore sui parte,
 qua scoptulorum ceruicæ attingit, altius sese attollens, ossi alligatur, quod in-
 gulû dicitur adq; efficit hic ossium nexus, quod *κράγιον* à Græcis uocatur:
 quod simul efficit & humeri articulo operimentû, ac propugnaculû: & pro-
 haberet, ne humeri ossis caput sursum uersus articulo excederet. Est & in
 scoptulo utroq; in inferiore capitis eius parte exiguus acutûq; processus:
 qui cum anchoræ auriculi rostri similitudine refertur, *ἀγκύλη* dicitur à nômali-
 bus, ab aliis *egressæ* nuncupatur, quandoquidem extrema eius pars uer-
 uinum rostrum extenditur. Hæc ossa in hominibus quidem longius distat
 à pectoris ossibus, & hinc parti quasi innatant. Quin & humerorum arti-
 culi à reliquis pectoris ossibus altius prominent: at in quadrupedibus, sco-
 ptula reliquis pectoris ossibus fere conuincta sunt: ac proinde hominû soli
 sunt humeri, cæteris armî. Lato hinc scapularum ossi, quæ dicitur parsilla,
 quam *ῥαχίς*, ad est spina uocauimus, adnectitur iugulum, non inter duris-
 sima ossa numerandam: (tubulosum enim est) altero eius capite in eo quod
 posui, altero in exiguo sinu ossis pectoralis (quod *σῆμα* dicitur) insidet. Pars
 eius inferior qua pectoris ossi alligatur, crassior cæteris rotundiorque est:
 quæ hinc succedit, longe gracilior procedens uero, quo propius lato scapu-
 larum ossi sit, eo plenius latiusq; de in exteriora curuatum est. Costæ ab
 utroque latere sunt duodecim: rarissime nanque decimatercia costæ in ho-
 mine uisitur, atque hoc rarius undecim tantum. Hæ primis partibus rotun-
 dæ & leniter quasi capitulatæ, uertebrae transversis processibus, ubi quo-
 que paulum infinuans inhaerent. Inde patescunt, & in exteriorem partem
 recurrente, paulatim in cartilagineum degenerant: & quæ parte rarius in in-
 teriora leniter flexæ, committuntur: septem quidem cû ossi pectoris, quod
σῆμα dicitur, octaua uero cum cartilaginis radice, quæ *σπῆλαι* uocatur, re-
 liquæ autem quatuor in pectoris latera ad septem transversum definitæ,
 quæ cæteris etiam breuiores sunt. Quinque istæ postremæ nostræ appel-
 lantur, sunt quæ cartilagineæ omnes atque adco ipsarum sinus, exquisita car-
 tilago est. Costis non una est, simplexque figura. nam in prioribus illis H
 quicquid cum pectoris ossi committitur: non os est, sed in cartilaginé de-
 generat: & suprema costæ, ea parte conspicitur maxima, qua spinæ adnecti-
 tur: reliquæ in medio, & ubi ad pectoris latus accesserint, latiores sunt, quæ
 earum partes *σῆμα* dicuntur angustiores autem, qua spinæ coniunguntur,
 & *σπῆλαι* uocantur. Pectoris os, *σῆμα* à Græcis nominatum, à iugulo statim
 incipit, & per medium pectoris protensum ad præcordia ipsa mollis carti-
 lagine terminatur: (quæ quidem cartilago triangula est, & à nômali-
 bus *σῆμα* appellatur.) non unum os hoc est, sed ex pluribus ossibus constat: sunt
 autem numero septem, sicuti costæ utrinque septem, quæ cum ipsis alli-
 gantur. Braschy ossa sunt, primum humerushic extremis utrinque capi-
 tibus

Humeralis
 & caput
 scapulae

Aribus nimis molles, sine medulla, cartilagineos: medius, tetes, duras, medullosus, & in priorem, & posteriorem partem leniter gibbus. maximū omnium hoc os est, scilicet excepto. Summa eius pars grandae sculam habet caput, & in eo tuberculum quoddam adnatum rotundum, quod scapularum ossi inseritur: pars autem inferior in tubercula duo desinit inaequalia, inter quae sinus est: circa hunc cubitus mouetur. constat hic ex ossibus duobus. Radius quē *ῥαδις* appellant, superior minorque, rotundo & leniter curuo capite, exiguum humeri tuberculum recipit. Cubitus alterum os dicitur, eodem scilicet quo totum nomine, inferior maiorque. In huius fine extremo, ubi scilicet cum humeri ossē coniungitur, duo inveniuntur tubercula: alterum manus, & in parte cubiti posteriore inferiorēque alterū

g manus, & in parte anteriore superiorēque: & communī quidem nomine *ῥαδις* uocant, & *ῥαδις* proprie uero maiorem illum & posteriorem Attici *ῥαδις* dicunt. Hippocrates *ῥαδις*. Radius supra infraque ualidis ligamentis cubito alligatur: media inter se omnino dehiscent. Radius superiore parte tenuior est, cubitus plenior: uerum cū rursus ad manū eorum, modo crassitudinis mutato, ubi radius plenior, cubitus admodū tenuis est. Vtrunque adnatum tuberculum iuxta carpi partes habet, ex interiore parte cauum, extra uero gibbum. In sinum eiusmodi se infinuat *ῥαδις*, quā primam palmarum partem diximus, eique adnectitur. Inest autem cubito & processus quidam, quem à columnae similitudine *ῥαδις* appellant: & hac quoque carpo annectitur. Cubitus minimo digito, radius pollicis è directo

respondet. In manu prima palmarum pars, quae graece *ῥαδις* dicitur, ex multis minorisque ossibus constat: quorum numerus incertus est: quidam tamen octo numerant. dura omnia, nec medullosa multipliciq; figure sunt: nam partim gibba, partim lina, partim recta, partim orbiculata: sed oblonga omnia & triangula. Recta deinde quatuor ossa ad digitos tendentia palmarum replent. Ab his digiti ipsi, praeter pollicem, omnes oriuntur: qui ex ossibus ternis constant, quae *ῥαδις* dicuntur, id est internodia & *ῥαδις*. Aut omniumque eadem ratio est: pollicis tantum primum internodii, ex transuerso illi palmarum parti, quam metacarpium diximus, anterius est. Compactus ita & pollex ex triplici ossē est: primumque eius internodium cum posteriore palmarum parte minime connumerandam censet Galenus. Ac superiorum quidem partium ossa sic ordinata sunt. Ad unā uero spātam ab

Prima manus ossa numero sunt octiduo, siue, ut aliter est, Clearchus.

utroque sacri ossis latere, coxarum os, & quod *ῥαδις* dicunt, utrinque adnectum est: quod transuersum longeque ualentissimum, uulsiam, uelicam, rectum intissimum tuerat. Atque his quidem ossibus quae ex utroque ossis sacri latere certantur, integris nullum est nomen unum inditum: nam partes eorum late superiores, alium ossa nuncupantur inferiores exterioresque, coxae & coxarum ossa. In quorum utroque sinus praegrandis est, qui recipit rotundum seeminis caput, acetabuli uocant. Graeci *ῥαδις*. Ab his quae in anteriora protenduntur, tenuisque, & forata, atque inter se coniunctae sunt, os constituant, quod pedem dicunt: quod in uris rectius est, recuruatum magis in exteriora in seeminis, ne partum prohibeat. E coxarum os-

ῥαδις, id est, Clearchus.

libus femina oriuntur, quæ magnitudine cæteris præstant omnibus: quorum capita rotundiora etiam quam humerorum sunt, cum illa ex cæteris rotundissima sint. Ad femoris ceruicem oriuntur processus duo, *ἐξ ὧν* dicti: quorum anteriorem, qui longe maior est, *πρῶτον* uocant: infra uero leniter patefcens in duo tubercula à priore & à posteriore parte defluit, adeo quidem grandæ, ut uel capita possint appellari: eæque tibi adnectuntur. Hæc uero commassura ossis paruo, rotundo, molli, cartilagineo tegitur: patellam uocant. Tibia, ut ante dictum est, ex ossibus duobus constat. Etenim pars omnia femur humero: tibia cubito similis est, adeo ut habitus quoque & decore alterius ex altero cognoscatur. Horum uero alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod sura nominatur: id breuius est (neque enim adeo protenditur, ut genu ipsam cōtingat) supraque tenuius, ad ipsos malleolos inueniatur. Alterum à priore parte positum, cui tibi nomen est, longius & in superiore parte plenius solum cum femore committitur, sicut cum humero cubitus: eaque parte duplicem habet sinum, qua femoris capita recipiat. Inter eos tibi sinus neruolum quoddam cartilagineumque eminet: quod inter femoris capita illa, ueluti in imâ quidam scissuram inseritur. Et hæc quoque ossa infra supraque coniuncta, media, ut in cubito dehiscunt. Imò ab utroque latere tibi suræque partes, malleoli nuncupantur: quæ gibbi & carni omnino expertes prominent: interius uero carni sunt. Excipitur autem tibia infra primo pedis osse: quod nos talum, Græci *ὑποπόδιον* uocant. à malleolis hæc continetur ac con tegitur, ut eum ne tangere quidem possis. Huius pars illa quam *ὑποπόδιον* uocant, sursum uergit: posterior uero orbiculata est, & ad superiora potius spectat. Prior autem pars, rotundo quidem capite, cum eo osse connectitur, quod ad scapulae similitudinem *σκαπὺν* nuncupatur. Hunc subest os pedis maximum, quod *ῥίζα*, id est calcem, uocant, durum, sine medulla eius pars qua ingredimur, leniter rotunda & latiuscula est: posterior quoque teretem figuram repræsentat, in posterioremque partem projecta, tibi rectitudinem admodum excedit. Ex partibus eius anterioribus, quæ è regione magni digiti sita est, capiti ipsius tali subiacet, nec cum alio osse copulatur, quæ uero minimo digito respondet, cum eo osse quod à tesseræ similitudine *τετάρτη* uocant, annectitur. *ὑποπόδιον* autem à parte exteriori iuxta *ὑποπόδιον* positum est. Tria deinceps ossa parua inferiori *ὑποπόδιον* parti adiunguntur, cum quibus etiam exteriori ex parte *ὑποπόδιον* utitur pottingitur. Atque prima quidem pedis pars, quam *ῥίζα* uocant, hæc septem continet ossa. Pars inde pedis inchoatur, quam Græci *ῥίζα* uocant: quæ ex quinque ossibus constructa est. Post hæc deinceps pedis digiti sunt, qui ex ternis internodiis omnes, ad eorum, quæ in manuum digitis sunt similitudinem, constant, pollicem tantum excepto: qui solus ornatum ex duplici osse constitutus est. Itaque pedis ossa præterque ad eorum quæ in manu sunt similitudinem, instructa sunt plantæ, palma, digiti digiti, sicuti & ungues: unguibus respondent. Hæc, ut arbitror, de ossibus ueluti rudimenta discitis: dicta satis sunt. Quod si quod ossiculum alibi, utpote in corde, in naso, in

gatur,

A guttare, itemque in aliquo ex digitis, (ut quæ à felani similitudine *felinae* vocantur) aliudue eius generis apprehenditur, non necessarium arbitror hoc opere pertractare.

F Spina, *σπίνα*. Calus, vel caluscia, *αγρία*. Totum capitis os *ὀστέον* *ἀνθρώπου* dicitur. *Συνταξία*, *σύνταξις*. Sunt & alie sinues, & enfacie ossibus, & quæ communiter sunt superioris maxilla & caluaria videri licet apud Galeni lib. De ossib. & Celsi, & Introduct. Galeni. Iugale, *ὀστέον* *ἰγυρίων* uerum Pollux *ἰγυρίων* appellat & postea temporis hanc obliquam quorundam connexus iures complectitur, qui *εγρίων* & diam dicuntur, sed anidem sic *ἰγυρίων* Galeno quod Celsio, consideremus lectorem. Venteros, Colli uenteros etiam quosdam dicuntur, *ὀστέον* *ἰγυρίων* *ἰγυρίων* Homerus etiam *ἰγυρίων* uocant. *ἰγυρίων*, Spina arctotham, siue nodus (inquit Plinius) & *ἰγυρίων* uocantur etiam uenteros primos. Processus, *ἐκφυλάσσει* Pollux *ἐκφυλάσσει* uocat. Celsio, processus, & excessus, & tubercula. Quam formam firmiorem habent processus isti, luculentissime ostendit Galenus lib. De ossib. & lib. de usu part. & Celsus lib. 8. Scapula, *ἀπὸ πλάτης*, & *ἀπὸ πλάτης*, & *πλάτης* quidam uocant. Celsus hanc etiam scapula, & lata scapula nam ossa nominat. Sane qui hoc loco apud Celsum scapula aperta legi uolunt. Colla, *ὀστέον* *ἀπὸ πλάτης*, quo pacto colla cum spina uenteros processus conneclantur, leges apud Galenum lib. Anasomoc. 8. & lib. De ossib. *ὀστέον*, maiores colla dicuntur, sicut *γυρίων* maiores. Colla utriusque duæ primæ *ἰγυρίων* uocantur, quæ has sequuntur item duæ, *σύνταξις*. Post hæc *σύνταξις* duæ. Et deinde quæ ad pectoris cartilagem desinunt, *σύνταξις*. Quæ reliquæ sunt quatuor notæ *σύνταξις* uocantur, id est molles. Humeri, *ἰγυρίων* uocat Galenus. Radix, *ἰγυρίων*, *ἰγυρίων*, *ἰγυρίων*. Cubitus, *ὀστέον*, *ἰγυρίων*. Quatuor ossa, ita Galenus uerum Pollux hanc palmam partem (ut supra diximus) exceptis quinque ossibus ad digitos uindictibus consistere, primumque pollicis quatuordecim metacarpum partem esse scribit. Ium ossa, *σύνταξις* *ὀστέον*. Coxæ & coxendices, *ἰγυρίων*, *ἰγυρίων*, *ἰγυρίων*. Pedes, *ἰγυρίων* *ὀστέον*. Femur & femur, *ὀστέον*. Caput femoris, *ὀστέον* *ἰγυρίων*, *ἰγυρίων*. Parsilla, mola, *ὀστέον*, *ἰγυρίων*, *ἰγυρίων*. Tibia, *ὀστέον*. Sura, *ὀστέον* recentiores fibulam uocant. Tibia, *ὀστέον* quidam etiam *σύνταξις* uocant. *σύνταξις* *ὀστέον* *ἰγυρίων* *ἰγυρίων* hoc est, de quo lib. 1. De temperam. Malleoli, *σύνταξις* Celsus hos etiam talos uocat, & talos ita appellat os illud quod & nos, quod scilicet *σύνταξις* uocat Galenus. Talus *σύνταξις* Aristot. lib. de hist. animal. & talus Plinio lib. 11. uidetur aliud significare de quo infra plura dicemus in quadripedibus uicariis. Ossiculum, Sub costilla ossiculum est *ἰγυρίων* dictum, id quod simile sit *ἰγυρίων*, quod arteria caput amplectitur: alij *σύνταξις* uocant.

De cartilagine.

Cap. XXI.

Eiusdem fere naturæ cum osse cartilago est: & quemadmodum os præcisum nunquam recrescit, ita & cartilago ablata nunquam reparatur. Differt autem ab osse plura minorisque ratione: & uidetur quidem cartilago ex osse ligamentoque consistere: utriusque enim aliqua ex parte similis naturæ est: uerum ligamento durior, sicut osse mollior est. Ex partes cartilaginosæ membrorum articulis inferuntur, acuti pulmar, & artus manuum laedunt ossa. Terrestrium quæ & sanguine habet, & animala gignunt, cartilago nullo foramine habet: nec ossium more medullam continet. At uero aquatiliū cartilagineis, quod per dorsum ossibus proportionatum tendit, cartilago est humorem in medullæ speciem continens: & Plinius, cartilaginea medullam in spina habent, inquit. Gressilium, quæ animala gignunt, autem, nates, extrema ossium nonnulla cartilagine consistunt. Priuatim uero quæ in extrema ora est ossis, quod in medio pectore *σύνταξις* uocatur, prope os uentriculi *σύνταξις* cartilago dicitur, & triquetra est.

C liij

De ungulibus, ungulis, chelis, id est ungulis bifurcis, cornibus & rostris.

E

Cap. XXIII.

Ungues, im-
pro ungula, in-
terui. Apud
Celfum pro po-
deris ipse ca-
pientur ungu-
le. Chela, ge-
nal. Cornua,
alegoria. Ro-
strum, pterger,
hideoque.

Sunt uero alia partium genera, quæ naturam nec eandem habent, quam ea quæ exposita sunt nec longe ab iis remotam, ut ungues, ungulæ, chelæ, cornua: præterea rostrum, quale datum a iuuibus est: hæc enim & flexilia & fililia sunt nec unum os fundi possit, sed fragile quodque habeatur. Colores cornuum, unguium, ungularum & chelarum, cutis pilorumque colorem sequuntur ut enim cutis nigra, cornua nigra, & ungues ungulæque nigra oriuntur. Et candidæ pari modo in colore respondent: medius etiam medium eadem colorem præferunt. At dentes naturam ossium æmulantur: quæ uero etiam hominum nigrotum ut Aethiopum, atque simulum den-
te, ut ossa cidentur ungues nigri, modo sunt cutis apparent. Cornua parte plurima caua sunt ab radice, quatenus ambiunt os, quod ortum à capite, cauo cornu inferitur, rostrumque implet in mucronem tamen solidam & simplicem exeunt. Adherent cornua cuti potius quam ossi. Cernuino generi tota solida & sparsa in ramos, & omnibus annis decidua, nisi castrantur: cum ex cæteris cornigeris nullum cornua amittat. Cornua quibusdam inesse dicimus, sed per similitudinem: cum nullum ex iis cornu officio fungatur: qualia cochleis data sunt ad prætentandum iter: quæ enim iure cornua intelliguntur, gerunt quadrupedes uisipare ad uim, aut inferendam, aut depellendam, quæ unum sunt officia: quod nulli ex cæteris quæ cornua habere dicuntur, contingit. Ungues à neruis neruosis ut ligamentis orti, iis scilicet quæ digitorum ossa continent, indurescunt. Habent autem ungues quibus digitus tantus: digitus uero iis sunt, quibus pedes articulis formati, excepto elephanto, ungues etiam in senectute, & defuncto augescunt, durioresque redduntur: & ungula quoque maiores in fenestra red duntur: quod idem rostris etiam auium cœnit. Ungues præterea nonnullis animalium adeo duritate de generant, ut præ nimia duritudine nihil ab ossibus differre uideantur.

De ungulibus
ante plura et
post Pollicem.

De pilis & cute, & quæ his proportionem respondent, scilicet cortice, squama, testa & crusta.

Cap. XXIII.

Cutis, Alipha,
Pilus, Apis.
Lana, Agor.
Cortex, Chalcis.
Squama, M-
mio.

De pilis & cute, atque de his, quæ uicem pilorum cutisque suppetunt, ita se res habet: cutem omnia habent quibus inest sanguis: pilos habent quæ pedestria eademque uisipara sunt: nam lana etiam pilus est, sed pilus propterea crassior est & procerior: lana uero crispæ magis ac tenuis. Cortice autem integuntur quæ ouisipara sunt pedestria, appellanturque squama uero pilces tantum, seu penna uoce & testa filicea includuntur, quæ testacea dicuntur, ut ostrea: crusta operiuntur, quæ crustata uocantur, ut cancri locustæ. Gignuntur pilæ ex uaporibus fuliginosis à cute excubis, iam formam adeptis: quotum quod in meatibus est, stirpis radici simile uidetur: quod uero ex cute extat, apuli ueluti stirpi. Habent autem pilæ ad suam radicem lentum quoddam humorem, quo protinus, ubi euius pilus est, si qua leuiuscula tangat, ita adheret ut trahere possit. Quibusdam animalibus

P. 11.

- A malibus nulla dati sunt pilusculi supina in parte nulli, aut pauciores quàm in pronalis animalibus qui molli sunt cute, ut homo, quanto siccor calidiorque cutis fuerit, tanto magis pilos gignere potest. at neque inais, que silicea testa includuntur, acuti odore nec crustatis, ut locustis, canisus: sed nec quæ corticem habent, aut squamas, ut serpentes, ut pisces, oriri pili possunt. Sunt enim hominum quæ summe cutis loco habentur, uere & in totam sicca rima testis uel petra. Pili præfecti augeri inferius ab radice possunt, superne non possunt. Pennæ autem nec ab radice, neque superne ab incutura possunt, sed cadit necesse est. Cortex squamæ loco est, & illi similis: sed natura rigidior atque durior: quod in testudine & serpentibus magnis, & crocodilo fluuianti palam fit: firmior enim ossi euadat. Cutem, ut diximus, omnia habent, quibus est sanguis: plos non omnia, sed facie distinctum tam est. Inest in cute omnium lentor quidam mucosus: uerum alius minis, alius magis at in tergore bubulo, ex quo glutinum facere solent. ubiunque cutis per se ac sine carne est, uulnerata nõ coit, ut in gena, preputio, palpebra. Sed neque in carnosis etiã paribus restitui cutis potest: talis omnino qualis erat quæ perierat: simile quiddam cuti, & quod eius officium supplicat, potest, non tamen plane cutis. Cõserta perpetuo cutis in omnibus animalibus continuatur: nec alibi interpellatur, quàm ubi sunt naturales meatus: ut in ore & excrementorum exitibus, atq; etiam in unguibus. Cutis hominis proportionè magnitudinis tenuissima est. Cutis quæ quidem totam corpus ambit, *Αἴψη*, id est excoriari potest à subiecta carne, & membrana eam circumdante, ideoç. *Ἀψα* Græci uocant: manuum autem internam & infimæ planæ cuti, præterea frontis & totius fere faciei, aliarumq; quorundam partium animalis excoriari nõ contingit. Cui superioret summa cuticula, quæ Græcis *Ἀἴψη* dicitur, tenue quiddã, quale est quod serpentis semectus nominatur: id quod in scabie, lepra, & lichenibus maxime cernitur.

*quæq; cutis dicitur
frontis mem-
bra calidior lib.
ii. ter asu parit.
quorum aliquæ
excoriari possunt,
aliquæ uero non.
Quæ par-
te autem car-
nium debet car-
ni à subiecta fi-
liu membrana do-
ceat illi dicitur
lib. 3. Anatomia.*

De membranis.

Cap. XXV.

- Sunt & membranz in sanguineis animalibus: quæ quidem pars similis cuti præterit spissèç. est. Sed diuersum genus id est: quandoquidè neque fissilis, neque emulilis cutis est: membranz etiam omnes, cute hociotes sunt. Ambet singula, tum ossa, tum musculos, tum etiam uiscera, membrana tam in maiore, quàm in minore animalium genere: uerum in minore sensum effugit. Quæ ossa contegit membrana, *μεμβράνη* dicitur: quo in genere est quod *μεμβράνη* uocatur, membrana scilicet caluarium ambiens. Ligamenta per quæ musculi ossibus colligantur, mēbranz circa ipsos musculos efficiunt. Inter membranas præcipue duæ sunt, quibus cerebrũ operum munitur, *μεμβράνη* dicuntur: altera superior adhæret ossi, quæ firmior & crassior est: hæc *μεμβράνη* dicitur, & *μεμβράνη*, & *μεμβράνη*, hoc est dura, crassa & coriacea: altera inferior cõtigua est cerebro, quæ *μεμβράνη* uocatur, quod *μεμβράνη* membranz similiter, uenas in se & arterias habeat connezas atq; hæc cerebro tanto durior est, quanto altera, crassior uidelicet illa, ossi sit mollior. Adhærent uero membranz duæ sepeo tràuerso, ex utraque eius parte

*Membranz Plu-
rimæ continen-
tur cerebrũ mē-
branz uero mē-
bra.*

lingule, superiore scilicet parte & inferiore Superior *σπλην*, id est succin- E
 gens, inferior vero *σπλην* nominatur: quod à renibus ortum, cori abdo-
 mini interne obtenditur, atque adheret ad pubem usque infimam. Vtra-
 que siue membranam dicere placet, siue tunicam, (*σπλην* namque Græci
 dicunt) substantia omnino simili est: utraque enim araneæ modo
 prætereuntes: si non ut tendines quidam, qui cum in membranam spe-
 ciem transierint, si tamen eas clara luce inspectas, sibi quoddam tenues
 intercurrentes ostendent. At non ita peritonæum: est enim simplex, to-
 tum sibi continuum & admodum simile corpus, quod inde nomen ha-
 bet *σπλην*, id est quod prætendatur omnibus, quæ inter septum
 transuersum & crura continentur. Eodem etiam modo succingens costas
 membrana simplex est peritonæo similis, eandemq; usum omnibus spaci- F
 is instrumentis, quæ intra pectus sunt præstat, quem peritonæum ut quæ
 nutrienda gratia in uentre sua sunt. Costas namque omnes internè succin-
 git: & opertimentum est eorum quæ intra pectus continentur omnium. Ve-
 rum non una est membrana quæ utriusq; lateris costas succingit: à dextra et-
 nim parte una est, à sinistra altera. Neque unum & continuum est totius
 pectoris spatium intermedium ita cum uoco *σπλην* sed membranis distin-
 guitur. Ex membranis namque illis succingentibus oriuntur partes duæ, quæ
 totum hoc pectoris spatium diuidunt, atque ob id *σπλην* uocantur. Hæ
 ad iugulum usque à dorso ascendentes, & per totam ossis, quod in medio
 pectoris est, longitudinem ad mucronatam usque cartilagineam, quæ *σπλην*
 dicitur, porrectæ, mutuo sibi coherere: nisi ex tantâ parte qua cor situm G
 est. Hæc namque se paratæ, cor ipsum unâ cum propria quadam membrana,
 siue tunica crassiuscula cor ipsum ambiens (*σπλην* uocant) inter se cõ-
 prehendunt. Succingentium autem bases, superius se per transuersi parti-
 bus superabascunt: quemadmodum alia quædam membrana similis, inferius
 substrata est, quæ peritonæi uertex, aut principium non inepte dicitur.
 Hæc totam inferiorem septi regionem subleuat ubi septum perforatam
 est, quo uasis transuersus patet, ibi ut ipsæ quæ permeant, undique adheret,
 ferrûque una per totum corpus, ut quæ iam ipsæ simul & opertimentum
 fiat, & quasi firmamentum. Eodem modo & membranz illæ succingentes
 quæ supra septum sunt, uasis septam permeantibus iunguntur, & simul per
 corpus scuntur. Membranæ præterea quædam corpora multis in locis H
 præter hæc existunt: quædam ex ossibus procedentia in ipsa ligamentorum
 substantia, quædam ex nervosis musculorû finibus (*σπλην* uocant) inel-
 dinam substantia. At quæ uere maximeq; proprie membranæ dicuntur, ex
 sunt. Omentum quoque non nisi membrana est, *σπλην* à Græcis dictû.
 hoc omnia habent animalia quæ sanguine misce, alia pingue, alia macilentum.
 Nomen hoc à uetribus *σπλην* sortitû est, quoniam nulli intesti-
 norum adheret: sed neque ulli ali perperpetuo præterquam his tribus, uentri-
 culo scilicet à quo ortum atque dependet, lien & colo, quibus semper con-
 nexum est. Adhæscit etiam nonnunquam, sed raro iecoris fibre: cui-
 pam, aut ex noctis costas alicui. Est autem corpus ex duplici peritonæi ceu
 flexu

brex, quales in mufculus ceterumque, quibus caro circūdarct. Eft & uentricu- E
lus, inteftinumque, uteri, uelut utriusque propria quædam caro, quæ fuis pro-
pria fibris circumfufitur. Lingua præterea fubftantiâ quandam habet
fibi propriam: eft enim ramor fungofiorque eius caro, & ramus habens fun-
guinis, quàm fit mufculorum. Neque enim eandem penitus formam ha-
bent hæc carnis genera. Mufculorum namque caro rubicundior eft ac mol-
lior, quàm uentriculi aut uuluar, uelut utriusque aut inteftinorum: cordis autem
dunor, & fibris magis uariis: mufculi enim fibras habent politas fimplices, &
quæ nervorumque ligamentorumque funt particule, ut fuprà dictum eft: cor-
dis autem propria fibrofa cūm eft fpecies, quæ fua funt magis uario.

De glandulis.

Cap. XXVII.

F

*Glandula, à
Graec. ἡ δὲ δὲ δὲ δὲ
ἀποφύγις, quæ
ἀποφύγις.*

Carni proxima eft adernam fivè glandularum natiua: eft enim ueluti
caro conglomerata. quantum autem lingua differt ab ea quæ proprie
caro appellatur, tantum glandulæ à linguae fubftantiâ reccellerunt. Harum
cum duplex fit ufus, duplex quoque genus eſſe debet: alterum denſum ac
ficcus, quod uaforum, uenarum dico & artèriarum, fulcimentum eſt in iis
locis, quibus in ramos difciſſa, periculum fubeunt, ne in uehementioribus
agitationibus deftruantur: alteram uero glandularū genus, ramoris ſub-
ſtantia eſt, cauernofum fiſtuloſumque, ac modicè ſpongæ in modum, hu-
more imbutum. Hoc namque glandularum genus humorem quendam in
ſe gignit, aut ad aliorum membrorum uſum, irrigandorum ſcilicet cauſa,
ne facile exſiccentur: tum quæ linguae adiacent adenes ſalivam protrahunt: aut G
ad generis propagationem, ut teſtes ſemen, nam & hi è glandularum ge-
nere ſunt) aut ad conceptus nutritionem, ut quæ in mammillis ſunt glan-
dulæ, lac generant. Huius generis adenes uenas & artèrias, perſpicuas qui-
dem, ac nonnunquam magnas, & item nervos in ſe habent: alie uero altere
neque ſenſum habent, neque motū, neque nervum in ſe ullum. Sunt præ-
terea nonnullæ in quibuſdā corporis partibus adeo exiguae, ut uulgus ipſam
latenti uelut in lætibus, *μυστήρια* dicunt) in quibus utriuſque generis glan-
dulæ reperiuntur. Et in aliis quoque corporis partibus ſunt exiles quædam,
uaforum diſtentiones fulcientes circa fauces autem & laringa magnæ ſunt
atque conſpicuæ. Haud longe à cordis radice & pericardij membranæ, ad
ſeptimam ſpinæ uertebra, *ἡ δὲ δὲ δὲ δὲ* glandula eſt, haudquaquam exigua, glan- H
dularum Latini dicunt. hæc in recens natis animantibus eſt quæ maxima, cre-
ſcentibus autem minuitur. *ἡ δὲ δὲ δὲ δὲ* dicuntur glandulæ, ceruici uelut ad-
iacentes, quæ & *ἡ δὲ δὲ δὲ δὲ* quandoque uocat Galenus, in maribus
maiores, formis minores. Sunt qui renes quoque inter glandulas nume-
rant, namque etiam glanduloſum quiddam habere uidentur. Glandularū
omniū natiua exanguiſ eſt.

De adipè & ſebo.

Cap. XXVIII.

*Adipis eſt ſe-
bum, quod eſt
ſeuum dicitur.*

Adipem quoque & ſebum ex maxime communibus ſunt inter animantium
partes: nam quæ nunc alius, ſanguinea dico, ea omnia aut adipem ha-
bent,

A bent, aut sebum. Quòd si uoles, licet ut omane quæ in animalis corpore est, oleosam & pinguem substantiam, utrinum appellare, sebum scilicet aut adipem: utrumque enim oleosum & pingue est, & utrumque sanguis est concoctus per bonitatem nutrimenti. humiditate tamen & licetitate diffundunt inter se, cum sebum fragile usquequaque sit, nec ad ignem admodum tam facile liquefcat, & cum refrigat, concrefcat, ut ovis, ut capra: adeps liquidior sit, hoc est, ad ignem facile liquefcent, minimeque aptus durari, oleo longa uetustate in crassum similis, ut equi, ut fuis. Locus etiam differant, adeps enim inter carnem censemque solet consistere: sebum in fine carnis semper est. Itaque si ex hominibus quempiam incidas, qui uel graciles sint, & paruus uenas habeant, formam præcipue (ut quæ de frigidioribus est nature, & uix magis desiderat) adeps excidet, quam constat cum ad internam eius membranam subnasci. Omne uero omnibus adipe pinguescentibus adipem est, sebo obesus secale. Quæ parte utraq; dentata sunt, adipe pinguescunt: quæ una, sebo. Generatur autem pinguedo omnis ex sanguinis parte pinguiore, per tenuis uenas effusa, circa partis arumens membranosis ac nervosis: cum concretio ideo contingit, quòd membranis adhaeret: crasso namque oleo est similis, eoque congelatur, ubi cum frigidis & exangibus partibus coniungitur. At neque circa secut coire potest (inquit Galenus) neque circa arterias uenarum aut cor: sed neque circa ullam aliam partem calidam. Renes autem ex uisceribus maxime pinguescunt, perum dexter minus semper quam sinister: & quamuis uehementer fuerint pingues, tamen aliquid fere medius deest. Quæ sebo pinguescunt, maxima pro parte magis quam quæ adipe in rebus opimandis luxuriant, ac omnium præcipue oues quippe quæ renibus pingui obdusas intendant, quod ubertate pabula sit. Plerumque animalium est pinguedo sine sensu quam ob causam foet spirantes à muribus tradunt rolas. Animalia quærens aut intra carnem, aut seorsum pinguescunt, quibus autem pingue separatam non est, ea minus per uentrem omentumque pinguescunt, ut anguilla: paucum est enim eis pingue in omento. Plurima tamen pars animalium uentre pinguescit, & præcipue quæ parum se moueant: est namque uix magis desiderat eiusmodi nota. Minus esse fecunda, quæ admodum pinguescunt, siue maris sint, siue feminae notum est.

*musculi ad
dier.*

*Pinguedo est
omne omentum
est Latus.
aut pinguedo,
sebum, ut cap.
Adips, uero
lib.*

*Minus causa
redditor ab
Angustia lib.
De part. con-
solidum 2.*

D

De medulla.

Cap. XXIX.

Medullæ rationem his addere debemus: nam ex quoque humidis adnumeranda generibus in nonnullis sanguineis animalibus est: humida est enim, & propemodum fluxilis. Maxime uero mollem ipsius substantiam ad similitudinem pinguedinis possis: nam cum nouellis adhuc animalibus medulla cruenta admodum sit, ætate prouectis, ut adipe pinguescentibus, adipi similis est & albescens: sic sebo deputatis generibus, sebum præ se fert. Quod in spinæ ossibus continetur, colorem habet medullæ similem, substantiam autem, ad est spinalem medullam uocant. Est porro spinæ medulla cerebro cõtinnua, ac eiusdẽ cum eo substantiæ, nisi quòd compacter multo

*Medulla, per
lib.*

*medulla, uero
lib., i. uero
lib.*

D

fit & durior, pouissimum in infernis sponz simbus: quanto enim ab cerebro abscedit, tanto magis durefcit. Eandem uero esse ei naturam, quam cerebello colligunt (inquit Plinius) quoniam præ tenui eius membrana modo incisa statim exparetur. Quæquam medulla non nisi inclusa offibus est, ut reliqua quoque omnia, quæ suapte natura humida in corpore sunt, receptacula: quibusdam tanquam uasculis continentur: ut sanguis in uenis, & alia in membranis, aut cutibus, aut ueneribus: tamen ossa nō omnia medullam intra se cōtinent: sed ea tantum quæ caua habentur, tametsi ne ipsa quidē omnia continent: ossa enim leuiss partim nullam, partim admodū exiguum habent, ut dictum est. Hæc fere semper in animalibus uaria, & congenera humidi genera habentur.

De lacte & coagulo.

Cap. XXX. F

Admata autem posterioraq; sunt lac & generata: præterea excrementa tam alui quàm uellicæ, atque alia quædam, scilicet in his quorum natura hæc obtinet: hæc enim similitudine uidentur, hæc re uera nō sine omnia simularia: lac etenim tametsi sensu quidē similitate appareat, ex tribus tamē naturis diuersis est cōpositum: prima quidem crassa, ex qua cascus confectur: altera pinguis, ex qua butyrum: & tertia aquea, quod serū nōcupamus. Plus casci lac illud habere uidemus, quod crassius est. eorū lac eorum, quæ non utrinque dentata sunt: quapropter cascus ex his sit, quæ inter urbana dentium ordine eant superiore. Eorū autē quæ utrinque dentata sunt, lac coire tam facile non potest, (sicuti neque adeps) & tenuis & dulcis est: tenuissimum cameli est, mox equæ, tum asinæ: crassissimum bubulum est **G** & pinguisimum: mediocri consistentiæ est caprarum, crassius hoc est ouinum lac: sed lactis differentiæ plures infra explicabimus. Nulli fere animalium lac fieri solet, antequam uterū ferat: nec dum ferat, nisi omne est lac enim fieri incipit ad speciem parit statim cum coire inciperit: sed uelle postea est cum pepererint. Prima autem à paru spongiosa densitas lactis, colostræ uocatur & colostrū. & ex primo lacte in bobus semper à paru colostræ sunt: quæ, si admisceatur aqua, in pumici modum coctis duritia, uel perinde ut lapis durefcunt, ut prodit Aristoteles. Non pregnantibus aliquando, sed raro, edulus quibusdam, aliisq; artibus (ut uberum frictione) efficitur ut lactescant. Quæ lac habent omnia, mām̄s id concinent. Maribus magna ex parte nec bestiis nec hominibus gignitur lac, fieri tamē **H** potest, ut aliquibus interdum gignatur: uis enim post pueriā, exiguum nonnullis exprimitur. Cogitur lac succo ficulneo & coagulo. Coagulum lac etiam est: quippe quod in eorum uentriculo, quæ adhuc lactem, continetur. est ergo coagulum lac ignem habens intra sese, quod cum animalis tepore concoqueretur, cascum traxerit. Habent coagulum omnia rumantina, & inter dentata utrinque dasypos. Coagulum, inquit Plinius, humilibus leporis, hœdi laudatur: præcipuum tamen dasypodis. Habent quibus hoc datum est, non in magno uentre, neque in reuculo, neque in ultimo, quod abomafum nominatur, sed in eo qui inter ultimam & duos primos positus est, quod omasum uocatur. Quo uentris coagulū est, eò præstans

A tiasale proflatio alui modici potest, atque etiam quod leporis est, sed lassissimum huiusmodi, inquit Aristoteles.

F. Lac, *γάλα*. Butyrum, *βούτυρον*. Serum, *σῆμα*. Castus, cactus non fit ex utroque dictis, inquit Plinius, quoniam eorū lac non coit. Lac, Isthmus, crassissimū est aliud lac, inquit, ut coaguli vice utantur nisi fortasse menda sit. H. Coagulum, *κωτός*. Est ergo, &c. Alius libro secundo de generis animalium, Coagulum lac est cōtinuus calorem autalem, qui partem similes duci eodem, & uice atque conditur. Coagulum etiam unguis marini, & balanus quoque reperitur apud Plinium & Dioscoridem.

De semine.

Cap. XXXI.

B Genitura nō eodem modo in omnibus est: sed quibusdam pro genitura, *Γενitura*, *γενε* Graecis, id est genitale uirus sui generis habetur, ut piscibus. *σπέρμα*, id est semen genitale habent omnia quae sanguinem. exit profecto semen genitale à matribus album & crassum, si integrum est: sed foris tenuae totū rediit, & nigrificulum. Nunquam id gela concreuit: imo admodum extenuatur, & aquae tum colorem, tum substantiam trahit: calore autem coit, & crassescit. Delabitur in aqua quod secundum est atque subdit: quod autem insitandum, diffunditur atque exolefcit.

De excrementis.

Cap. XXXII.

E xcrementum appello reliquias alimentis: cuius namque sunt species naturalibus excrementis omnibus fere locus praescriptus est, ut sic humoris ueluti conceptacula uerbi gratia, alimentis licet excrementis, albus infertur, humidi uesica, lactis mammae, seminalis: nam & haec excrementa dicuntur: quae circa uterum & genitale sunt uascula: in ea namque loca se colligunt, atque coeunt. Quod enim stercus & fæcus excrementum uocatur, à lytico nutrimento separatum, paulatim impellitur per omnia intestina usque ad satis amplum spatium, quod ad illud intestinum uisitur, quod rectum uocant: postea uero quam plurimum congestū iam graue animalis fuerit, nam foras egeritur. Stercorum uero excrementum, renes à sanguine secermentes, ad uesicam maiorem transmittunt: ea porro id colligit seruatque, ad eundem ferme modum, quo de fæco excremento reculamur. Biliosum excrementum ex iecore attrahitur à uesicula, quae illi subicitur: alterum uero à hepate. in eis collecta excrentur, alteram in priorem tenuis intestini partem, alteram uero in uentriculum: ab usque, iam per omnia intestina unā cum sicciore excremento permeant. Quod uero purum expurget, natura nullū instrumentum cōdidit singulare: mixta enim cum cibo puro, alere potest, & in laborantibus in alimentum absumitur. pituita ergo illa, quae ad iecur unā cum succo petrosa est, non uacuari desiderat, sed in corpore manere aliter: dum enim cum succo illo unā concoquunt, sanguis euadit: & quod in uentriculo reliquum ex cibo est, & in intestinis, à defluere in ea loca bene exterius, per inferiora egeritur. Quod uero à cerebro defillat (mucū uocant, & defillationem, graece *ῥοή* *ἢ* *ῥοή*) per palatum & nares exitum habet manifestū. Ex hoc genere esse uidetur, & quae quotidie expe-

DE DIFFERENTIIS

do extenuatur salua. Aliud extremorum genus est, quod in singulis ani- E
malis nascitur particula, ex ipso unde aluntur succo, humidum tenuisque;
cui nullus certus à natura præscriptus modus est: expellitur tamen per ex-
iguos omneis corporeis modis meatus, ut per Græci uocant, quorum nō mo-
do reliquum corpus uniuersum, sed etiā tota cutis plena est: partim uolē-
to motu confertim erupens: appellant uero quod ita extenuatur, sudorem,)
partim in speciem halitus ab infuso calore solutum, quod per flanas sensum
latens uocatur. ueteres quidem authores hoc excrementorum genus to-
tum *σύνολον*, id est colliquamentū (ni fallor) uocauere: quod etiam ex cor-
poris incremento secretatur propter motus calorem, uim habet colliqua-
menti. In hoc insensibili persillu, crassioris excrementi nonnihil excerni-
taretur quo tum pilas origo est (natura enim commodè uel excrementis suis F
interdum abutitur) tum uero is quæ circa omnem cutem semper accru-
tur sordibus. In hoc genere excrementum est, quod Græci *σύνολον* dicitur, ita
uocant aurum sordes, quæ interdum etiam auditum multitudine sua ob-
struunt. De partibus animalium us, quas similes dissimilesque apella-
mus, deniq; de omnibus tam interioribus, quàm exterioribus partibus di-
ctum iam est: reliquum est, ut ad instituta pergamus.

B Excrementum, *σύνολον*. C Sucus, *σύνολον*. Vena, *ἀρτηρία*. Bile, *χολή*. D
Atra bile, *χολή πικρά*. Ficaria, *φάρμακον*. E Salua, *σάλια*, *σύνολον*, *σύνολον*, *σύνολον*.
Sudor, *σύνολον*, quo pacto in corpore generatur, leges apud Galenum lib. 10. De simplic.
med. facula. F Persillus sensum latens, uel transpirans sensum latens, uel perspi-
rans, græce *σύνολον*, *σύνολον*, *σύνολον*.

G

DE ANIMALIUM DIFFERENTIIS LIBER II.

Perque possimum constitui, inueniriue possint animalium
differentiæ. Cap. XXXIII.



Venadmodum corpus totam animi gratia
conditum est, (organum namq; animi corpus
censetur) ita & corporis partes officiorū gra-
tia constant, & operum ad quæ singulæ ac-
commodantur: indeq; fit, ut quorum actio-
nes officiaque plura sunt, ea plureis exerceant
motiones, pluresque & uarias desiderēt cor-
poris partes, quæ sunt ipsarū motionum in-
strumenta: quæ uero aut immobilia sunt,
aut parum motus adipiscuntur, ut restata, eo-
rum corpus non adeo multiplex, ut sit necesse est. Atque hæc quidem cum
ita se habeant, præter corporis partes, earumq; actiones motionesq; etiam
etiam

A etiam quoddam adesse est necesse, nempe affectus. Porro actiones & affectus intelligi diximus, incessum & quatuor loci mutationem, in ictu pariendo solertiam, ortum, incrementum, coitum uenerem, sensum, spirationem, nocem, ungulam & sonitum, aetatem, ut naucitatem & senectutem: utri, ualerudinem prope ram & aduersam, atque mores: & quaecumque huiusmodi alia possunt generi animalium tribui. Per haec, ut diximus, potissimum, partes dico, actiones & affectus, animalium differentias conitari dignū est: sunt enim haec animalibus partium omnibus communia, partim uero pluribus.

De differentiis animalium, quae à partium discrimine
oriuntur.

Cap. XXXIII.

Habent uero animalia partes, aut eiusdem sibi omnes, aut diuersas partes: ad idem, uel specie intelligi uolo, ut hominis natus aut oculus speciei cum oculo aut naso aliteras hominis conuenit, & caro cum carne, & os cum osse: (ut enim totū se habet ad totum, sic partes singulae sese ad singulas habeant, necesse est) uel genere, quanquam excessu defectūque differunt. de iis loquor, quorum idem est genus, uerba gratia, uis aut piscis: id enim utrumque differentiis cōsumitur generis: & species complures cō piscium, tum etiam animum habentur. Diuersae uero inter se sunt animalium partes pene plurimae, contraria affectuum qualitas ut coloris & figurae, eod quod aliae magis, aliae minus affectu: uis ipsas qualitatibus stimulatitudine etiam & paucitate, & magnitudine paruitatēque, mollitie & duritate, leuitate & asperitate, & reliquis generis eiusdem, atque omnino excessu defectūque differere: ad id est quod magis minusue quicquā horū habeat, uerū grana, oris magnitudine discrimen existeret animalibus palli est: alius enim os magno hiatus recessum est, ut canis, leoni: alius paruum, ut hominialis mediocre, ut generis suū. Multitudine & paucitate differunt partes. ut eorum quae pedes habent, alia bipeda sunt, alia quadrupeda, alia multipeda. mollitia & duritate, ut inter ea quae oculos habent alia duris oculis sunt, ut cancri, locustae alia humidis mollioribusque. leuitate & asperitate, ut concharum quibusdam testae leues sunt, alius scabrae. praeterea aliquae longae sunt, quaedam rotundae, itaque in figura notatur differentia. item alius crassa, alius testa pro regimine habetur: & alius rostrū porrectius est, ut gruibus: alius breue. Penna item alius uberius, alius parcius data est. Sunt item animum aliter longo erure, aliae breui. Linguam etiam aliae latiusculam habent, aliae angustam. Pectus animalia plurima humano proportionatum pectori habere uisuntur, uerū non similes hominibus enim pectus latum est, ceteris uero, ut quadrupedibus, angustum. sed & in iis quoque ratio partium nonnullarum diuersa est: eod scilicet quod quas alia animalia habent, alia ipsidem careant. Alia enim calcari aut aliquo armantur aculeo, alia nihil eiusmodi habent: & alius apex in capite est, alius deest: & eorum, quae loco se mouent animalia, quaedam pedes habent: ut bipeda, quadrupeda, multipeda: (sed omnia pedes pari numero possident) alia nullis friciuntur pedibus. & oculos habentium, alia carent palpebris, alia habent, ut usus sic & equisior. Partes ita-



DE DIFFERENTIIS

que animalium (prope dictum) plurimæ aut eadẽ sunt, veluti dictum est, E
aut ratione contrariis cum differunt, aut per excessum defectumque. Non
desinit tamen quibus partes nec specie sunt eadem, neque secundum exces-
sum defectumque, sed proportionem conueniant: quodamodum os cum car-
tilagine aut piscium spina, & unguem cum solidatungula, & manus cum
chela, id est hoc caputo pede, & pennam cum squama conueniunt animaduer-
timus, quod etiam penna in auium genere est, eadem squama in piscibus ha-
betur. Proportionem item conueniunt, quod alius pulmo datus est: alius pul-
mo quidem negatus, sed vice pulmonis iunctum aliquid est, quod pulmo-
ni respondeat: alius item sanguis inest, alius sanguinis proportionale, quod
eamdem in genere exanguis obtinetuim, quam sanguis in corpore illo san-
guinis habet. Differentias præterea nonnullas paruum sive atque ordine F
contemplamur: sunt etiam complura animalia quæ eadem habeant par-
tes, sed non situ eodem: verbi gratia, mammae alia in pectore habent, alia
inter foramina, ut uacca. Partes quas singula animalia habent, hunc in mo-
dum diuersas easdemque intelligimus. Differunt autem sive partibus anima-
liarum alie omnium communes sunt, alie vero plurimorum, alie quorũ-
dam generum propriæ: ut piscium branchia, ut auium penna. Omnium
animalium communes partes sunt, quæ cibo recipitur, & in quam desor-
ratur: communes etiam partes tam sanguineo generi, quàm exanguis sunt
os, uenter, & plurima ex parte stomachus & intestinum, aut quæ his propor-
tionalia habentur: plurimorum namque animalium cõmunes partes sunt,
per quas transit cibus, & quibus cibo excrementũ emittitur. Et cum excre- G
mentum hoc, ut antea docuimus, duplex sit, humidum & siccum, quæ par-
tem illam humidi excrementi capacem habent, hæc siccæ receptaculũ con-
tinent: quæ uero hoc habent, non illud etiã habere omnia nouimus. quan-
to breuior quæ uesicam habent, aluum inferiorem eadem etiam obtinent: ut
uero quæ aluum habent, non omnia & uesicam possident. Oculos item
habent animalium genera omnia, præterquam talpa, (quem tamen modo
quodam habere dixerim) & quæ testis integuntur, & si quid imperfectum
aliud est, ut uermes. Et per partes quidem animalium differentia his mo-
dis constituta debent.

De differentiis quæ ab animalium actionibus oriuntur. Cap. XXXV.

ACTIONES animalium plurimæ circa coitum, sicut procreationem, ac H
quæ uictus solertiam versantur: necnon ad singulos & æstus, mutatio-
nes denique temporũ pertinent: uel etiam omnibus ex natura sensus mu-
tationis factæ ex frigore aut calore. Itaque ut homines alij domicilia hye-
me reperunt, alij qui amplioris prouinciæ principes sunt, sedem pro tem-
pore mutant, ut morã æstare locis frigidis, hyeme tepidis trahant: sic bruta
quæ loca possunt permutare, faciunt. Atque alia uiam in ipsis consuetis
sibi locis compertiunt, alia locum mutæ: iam etiam post autumnale æquino-
ctium, aliqua ex ponto locosq; frigidos fugiunt hyemem futuram: à ueterno
autem, ex tepida regione ad frigidam sese conferunt, æstus metu futuri: &
alia

A alia de locis uicinis dulcedunt, alia de ultimis (prope dixerim), ut grues faciunt, quæ ex Scythiæ campos ad paludes Aegypto superiores, unde Nilus profuit, ueniunt. Quinetiam palces modo eodem, alij ex ponto aut in pontum transantaly per hyemem ex alto ad litora teporis graui ueniunt: contra, aestate ex litore in altum uicantes altum discedunt. Aues quoque imbecilliores hyberno & gelido tempore dulcedunt in campos, ut tepore potius: resilio autem repetunt montes, ut aliu carcane. Idem hoc affectus, fugiendi scilicet caloris frigorisq; exuperantia, euenit his, quæ æstiuibus quibusdam se absdunt & latentur: terrestria quædam hyemē latebras subeunt, tempore iam tepidiore exeunt. Condi autem plurima hyeme, diebus scilicet frigidissimis, uel eo maxime argumēto constat, quod maxime cum al-

B gor est capiuntur. Sed pſcium nonnulli aestate etiam latent, ut glaucus, later aliquorum genus: notum aliquorum partim latet, partim non latet. restacea omnia latent, uerum non eodem modo absolutione: enim latibulum euidētius est: condunt enim se suas testas, ut pectines facere uisuntur: aliqua leuiore tegmine superimposito delitescunt, ut limaces: eorum autem quæ adherent, non est tam manifesta latitatio. insecta penē omnia hyeme conduntur. Sanguinea quoq; generis multa se condunt: ut ea quæ cornu intercepta sunt, serpentes dico, lacertæ, crocodilos fluuantes. Piscis etiam complures latere nouimus: alios hyemē, ut coracinum, thum nū: nonnulli aestate etiam latent, uti diximus, ut glaucum etiam complures conduntur, ut hirundines. iam enim uide sunt multe: hirundines in angustis cō-

C ualuum nodæ atque omnino deplumæ. Quadrupedum quoque quæ animal generant, nonnulla conduntur: ut hystices, arcti: glutes etiam latent in apīs arboribus. Nonnulla ex his quæ conduntur, exiunt id, quod senectus ^{Senectus} uocatur, (est autē senectus ueluti cutis ultima, uel cortex, qui ueluti operculum cui est) ut ex sanguineus quæ cortex mollior insecta sunt, serpentes scilicet & lacerti. insecta etiam quædam senectutem exiunt, ut silpha & coleæ: & ea quarum pennæ uagina continentur, ut Scarabæ & omnia quidem, ubi iam factum est, quod gigna debuerit, exiunt: quædam etiam inter matina senectutem exiunt, ut locustæ, gammari & cancri. Sed quarum latent, & quo modo & tempore: atque etiam quo tempore exiunt senectutem dictum iam est.

D Ab animalium motu quæ cōstituantur differentiæ. Cap. XXXVI.

Differunt animalia inter se etiam ipsa motione: animalium namque alia sede stabili degunt, alia mutabili & uaga. Sedes stabilis in humore tantummodo est: terrestrium nulla statu immutabili uiuūt: ac aquatiliū plura faxis affixa unam omnem traducunt: ut conchæ genera complura. Sunt itē quæ & adherere soleant, & quoties libeat absolui: ut genus quoddam quod urticam uocamus: quippe cum nonnullæ ex his noctu absolute pascantur. Non desunt complura, quæ cum sint absoluta, mouere tamen se nequeant, ut ostrea. Omnia uero tam natantia tum stabilia, locis eisdem quibus orta sint, aut similibus degunt: sius enim quibusque cubus in his est:

uagantur maxime & oberrant quæ carne aluntur. Quæ loco mouentur E animalia, ut initium incedenda omnibus à dextra partibus est: & omnia aut quaternis notis mouentur, aut pluribus, quaternis tantum, quæ habent sanguinem, ut homines binis manibus binisque pedibus, quadrupedes pedibus quaternis, pèdes pennis quaternis: nam & quæ pennis, aut non amplius binis, aut nullis, ut serpentes, urantur, quaternis ea quoque notis nihilominus mouentur: flexus enim aut quærens us aguntur, aut bini cum pennis binis. Ac quæ sanguine uacua, pedibus se pluribus moueant, siue uolucres sunt siue pedestres, iis certe motus per notas plures exercetur: nam & ephemerum pedibus quatuor, pennisque totidem mouetur in quocunque uero ambulant, omnia pedes pari numero possident. Animalium quoque alia uolantia sunt, ut aues, apes: alia gressilia, ut quadrupedes, multipedes: F alia natantia, ut pisces: alia reptilia, ut angues: alia tractilia, ut horudines. Animal quod uolucere tantum sit, ut piscis natante solum est, nullam nouimus: utroque gressilia eademque natantia sunt, complura reperiuntur.

Item eorum quæ pedibus carent, alia incesu undant fluctuantque, *(quædam* *Græci vocant)* hocque basanam accidunt quædam nique flexuosis impulsibus per terram labuntur, ut angues: quædam corpus sursum flexuosa progrediuntur, (parte enim innitenti priore, contrahunt sese, ad ducentes posteriorem, arcuat inque incedant) ut cruce: quædam alia in incesu *incedentes* utuntur (ac si per lumen trahi dixeris) hoc est præcedente parte priore progrediuntur, & quod reliquum est corporis ad illam contrahunt: quo mouentur modo hîrudines & uermes terreni. Animalium præterea quæ G loco se mouent, alia toto corpore id præstant, ut saltentia: alia per partes, ut incedentia omnia. Quæ per saltum sese loco mouent, ut serpentis genus, qui iaculus dicitur, nullum pedum ministerium ad eiusmodi saltum nonnem desiderant: at quæ saltu utuntur, & gressus insuper indigent, cum illis saltus satis non sit, iis pedibus opus est.

Incedit, m. p. d. saltus.

E Nota, *maïa* partes significare uidetur Aristoteli, per quas motio fiat: libro etenim de animalium gressu, *maïa*, id est notes uocat & alas, & brachia manusque, ut ambus atque hominibus, & pedestrem in reliquis.

A generatione quæ oriuntur differentiæ.

Cap. XXXVII.

EX omnibus uitæ muneribus, animalium quibusdam nihil præter generatio- H rationem inesse percipitur quædam uero non tantum procreandi officio suis quodque temporibus funguntur, sed in nutrinda etiam prole laborant, atque horum quædam cum hoc perfecerint, nullam insuper cū prole seruare societatem, sed sibi tantum uiuunt: alia uero cuiuslibet agi cū prole. Prima igitur pars uitæ animalium, in officio procreanda consistit: altera in alédo: in his enim duobus studium omnium uitæque uersatur. cibum enim cuique suauisque contingit, quod per naturam habetur: sequunturque omnia cum uoluptatem quæ secundum naturam est. Sunt autem generationes animalium multæ ac uariæ: hoc enim commune animalia cum stirpibus habent, quod alia semine, alia sponte naturæ oriuntur, nullo cognatio-

A cognationis semine antecedente: quorum alia humo aut stirpe putrescente consistunt, ut plura insecta generantur: alia ex rore, qui frondibus infidat, ut erucenalia à limo, ut testaceæ alia in animalibus ipsis excrementisq. partium gignuntur. Quæ uerò ex semine cognato procreantur, ut omnibus ortus per cotum est, dummodo sexus discrimen id habeant, quod marem & feminam de scribere potest: non enim in omnibus animalibus, sed in prædictis sanguine omnibus, paucis quibusdam exceptis, alterum mas, alterum femina perfectum euadit. marem appellamus, quod in alterum, *femina*, quod in seipsa semen illud prolificum mittit. Et quamquam diuersa sunt animalia mas & femina, tamen speciei idem sunt: homo namque uterque est. In piscium genere, nonnulli nec mares nec feminæ gignuntur.

Mas, Vir, Puer, &c. Femina, Mulier, &c.

B tur. Exanguium etiam quodam marem & feminam habent, ut sobolem eiusdem generis procreant. Alia procreant quidem, sed non sui generis prolem: scilicet quæ non ex coitu animalium procedunt, sed quæ per se uel in animalia, uel in terra putri, uel in stirpe, uel etiam in eorum ipsorum partibus uel excrementis gignuntur: quæ namque hoc modo per se generantur, si in mares ac feminas descripta sunt, ita generant quidem ea aliquid coitu, sed imperfectum & dissimile, & ex quo nihil amplius gignatur: sed id quod sunt, in nonnullis, sordes perisstant ut uermiculi ex muscis, ut pulicem aut pediculorum fetus: id namque magis declarat naturæ eorum quæ insecta dicuntur. Coitus nec similes omnibus sunt, nec similem in modum aguntur: quæ enim ex sanguine pedestria uisipara sunt, & retro urinam mutant, uersa coeunt: ut leo, lupus, canis: crustacea quoque & insecta eodem modo. Cæterorum, quæ sanguine uisipara sunt, magna ex parte modus coeundi idem est, *femina* scilicet marem superingrediente: quamquam non omnia simili modo coeunguntur. Aliis enim coitus cõplexi mutuo supinatum partium agitur, ut scorpibus, murenis, & lacertarum generi: alia, ut pisces omnes, exceptis planis cartilaginet generis, ad motus inuicem partibus supinis copulatur. Aues marem *femina* superueniente coeuntque mollia ducuntur oribus inuicem ad motus, cõpletaq. mutuo brachiorum, abedine explent. Coitum omnium animalium ad hunc modum fieri apertum est. Tempora autem coitus descripta, & ætates certas ad uenerem singulis animalibus natura fixit & statuit. Ergo plurimum animantium natura uult quidem rem uenereâ per id tẽpus cũ hyemis cessante serinita, æstatis clementia oritur: quod sane tẽpus ueris est, quo animalia, prope dixi omnia, & uolatilia, & pedestria, & natantia ad coitum excitantur: sed sunt tamen quæ non eo tempore coeant: utrum prout quæque alere suos fetus cõmodius possunt, ita tempus sibi conueniens habeant. sunt enim quæ per autumnum etiam & hyemem coeant & partiantur nonnulla tum aquarum tum uolucrum genera. sicut enim temporis beneficio, ita & corporis ualitudine propensiora ad uenerem redduntur animalia. Homo uero atque etiam plura alia pedestria, quæ cum homine uiuunt, coitum nullo tempore aspernântur, (unde licet propter repositum & pabuli ubertatẽ) ut sus, canis, & uolucres quædam. Ceteris autem animam parte plurima uite ac inuenit cõstare coit &

Amphibia, &c. &c.

D tur. quod sane tẽpus ueris est, quo animalia, prope dixi omnia, & uolatilia, & pedestria, & natantia ad coitum excitantur: sed sunt tamen quæ non eo tempore coeant: utrum prout quæque alere suos fetus cõmodius possunt, ita tempus sibi conueniens habeant. sunt enim quæ per autumnum etiam & hyemem coeant & partiantur nonnulla tum aquarum tum uolucrum genera. sicut enim temporis beneficio, ita & corporis ualitudine propensiora ad uenerem redduntur animalia. Homo uero atque etiam plura alia pedestria, quæ cum homine uiuunt, coitum nullo tempore aspernântur, (unde licet propter repositum & pabuli ubertatẽ) ut sus, canis, & uolucres quædam. Ceteris autem animam parte plurima uite ac inuenit cõstare coit &

DE DIFFERENTIIS

parit, excepta alcyone, quæ circa brumam parere solita est: quædam etiam E. æstate aliq̃ à bruma incunte uere pariunt & incubant. Iuscina æstate parit: insecta hybetno quoque tẽpore cõcunt, non defunt quæ omnibus ante tem-
poribus pariunt, ut ex piscibus murena, & ex mollibus sepiæ. Aetate etiam ad coitum differunt animalia: aprium enim magnæ eorum parti semen nõ simul incipit, & excerni, & posse generari: sed uis illa proficua postea accedit: nouellorum enim in omnibus animalium generibus, prima emissio seminis, aut infecunda, aut si forecũda sit, imbecilliora tamen generat & minora: quod potissimum in hominum, & quadrupedum animal gignituum genere, atque etiam animi patet: alterum enim prolem minorem procreat, alterum oia edit minora. Aetas uero accommodata ad coitum cuique suo in genere, plurima ex parte, fere tempus idem fornicur, nisi quod præmatur-
ret, & aut ob aliquam rem monstruam, aut ex detrimento nature & uitio F anticipetur oues & capræ anniculae cõcunt, atq; utero serunt: amares quoq; in ipsis generibus eodem illo tẽpore incunt. Sæc tum mares tam formi-
næ coire incipiunt mense sive ætatis octauo: sed tamen non omnibus locis eadem ætatis ratio est: nam etiam sices nonnusquam tam mares, quam fe-
minæ quarto cõcunt mense: sexto tamen ita, ut uel progenerare & educare possint. Ex quadrupedibus itaque uulpis, alie anniculae & cõcunt & pa-
riunt, ut oues, capræ, canes: alie mense sive ætatis octauo, ut sices, ut iam di-
ximus: alie uero biennies cõcunt, ut equus, alinus, tam mas, quam femina coire incipit in trumano: fere uenerẽ menses duodecim. Elephas tam mas, quam femina incipit coire ante annum ætatis uicessimũ: incipit enim for-
mina coire anno duodecimo cum celestine, aut quindodecimo cum lœti G
sum: mas quinque aut sex annos natus superuenit incũte ueris cõitũ trien-
nio interpidio repetit. Lacustres & palustres pisces, quinto sive ætatis mense uerum gestare magna ex parte incipiunt. Cõcunt quandoque uel alieni-
gena, ut in Cyrensi agro lupi cum canibus cõcunt. Indicos etiam canes ex tigride & cane gigni confirmant. Raro quidem id fieri: sed tamen id fieri, & in canibus, & in uulpibus, & lupis certũ est: necnon in aui-
bus salacioribus idem fieri uisum est, ut perdicibus & gallinis. In Africa cõcunt & generat etiam quæ genere diuersa sunt, sed quorum tempora eadem ferendi ueris sunt, & magnitudines non multò inter se discrepent. Obseruatum, inquit Plinius, è duobus diuersis generibus nara tertij generis fieri, & neutri par-
tum esse similia: eaque ipsa quæ ita nata sunt, non gignere in omni anima- H
lium genere: idcirco mulas non parere. Cõsum animalium, quæ non nisi cõcundo progenerant, ad hunc modum se habere intelligimus. Generant autem hæc, alia uermes, ut aranei & aliorum insectorum quædam: alia oua (ouipara dicuntur), ut aues, serpentum maxima pars, & quadrupedes ouiparae, & pisces plurimi: alia animal pariunt (appellaturq; unipara, ut ho-
mo, equus, auitulus marinus, & reliqua quæ pilis integuntur: & quæ ceteri di-
cantur, ut de lphanis: & ex piscibus cartilaginei, & ex serpentibus, uiperæ. At uero eorum quæ animal pariunt, aut oua intra se prius cõducunt, ut cartila-
ginea, aut alio animal intra se formant, ut homo & equus. Ouiparorum alia
osum

Ouipara, di-
uina.
Unipara, ou-
uina.

A ouum edunt perfectū, ut aues, & quæ quadrupes ouum pariunt, & serpentium pars plurima: (oua enim eorum postquam prodierūt, nullum insuper capiunt incrementū) alia imperfectum edunt, ut pisces, & quæ crustata, & quæ mollia dicuntur: namque eorum oua postquam edita sunt augentur. Quæ ex ouo generantur, fere omnia coma oriuntur, mare in femininam emittente semē genitale. Ouum id uocamus, quod ubi in scutura perfectū est, citius ex parte principio animal constituitur, reliquū uero, alimento ei quod gignitur est. Coniunetur autem ouum ipsum, aut puramine testaceo, & bacolor est, quale aurum esse uidemus: aut cute mollī obducitur, unicolorque est, quale est carulagineorum & piscium omnium. Vermē id esse dicimus, ex quo toto nō ex parte aliqua animal eorum per subiecti futuri formatio-

Ouum, dicitur.

Vermē, unde
parit.

B nem incrementumq; gignitur. Quæ ex ouo generantur, conlat non similiter gigni, atque ea quæ ex uermibus in ouo namque oculi primū in capite patenti grādes: contra uero in illis euenit, ut scilicet pars inferior maior inter initia sit, oculi & caput postea augeantur. Hic admirari naturam subit, quā bene mirorq; deinceps ordine generationem reddidit: alia enim & quæ perfectiora sunt, animalia intra se statim generant perfectā, sed tamen quæ foris incrementum recipiunt: alia non statim animalia, sed cum prius intra se ouum pepererint, mox animal edunt in lucem: alia non perfectum animal generant, sed ouum, idq; edunt perfectum, ut aues: alia, ut quæ frigidiora eis consent, generant quidem ouum, sed nondum perfectum uerū quod foris perficiatur, ut genus piscium squamatum, crustata & mollia.

C quinquem genus, ne ouum quidem ex se se parere possit, nisi quod hac affectio foris eueniat ei, uti infra docebimus: insecta enim primo uermicula in pariunt, qui addito tempore, speciem accipit ouis: quæ enim chrysalis appellatur, ouis obtinet facultatē, nam ex eo animal nascitur, tertia mutatione finem accipiens generationis. Differunt etiā animalia, tum gerendi uteri tempore, tum parendi, tum partus etiā numero: semel auno pariunt quedam, ut magna pars syluestrium animalū: alia bis, alia ter, alia sepius. Dasy-podes & eocura, & pariunt quoque tempore, & singulis mēibus: & alia uere, alia æstate, alia autumnō, alia bruma pariuntur inter aues halcyone, ex piscibus menades: alia omni tempore, ut homo, uululus marinus. rursum alia breui à coma pariunt, ut insecta maxima sui parte, quæ solēt coire: alia diutius uterum ferunt: alia denique singulos fetus pariunt: alia, binos, ternos, aut quatermos: alia numero magis partu fortificā. In ouiparo genere sanguineo, quadrupedum ortus uerno tempore agitur: autē syluestres semel magna ex parte pariunt: aliquæ tamen bis, ut hirundo, alæ & coeunt, & pariunt omni tempore anni, ut gallinæ: columbæ decies anno pariunt: & columbaceum genus magna ex parte bina parit oua: turtur tamen & palumbes uere, nec plus quā bis pariunt. Piscium alij diebus amplius tricenā uterum ferunt, alij minus. alij uem circa æquinoctium uernum paritūculis æstas, alij autumnale æquinoctium attribuitur: mactides bruma pariunt, ut dictum est. Ex his qui in lacubus fluminib; degūt, Cyprini quinquies aut sexies anno pariunt: choleis ter: reliqui semel edunt oua. in exanguis uero

D diutius uterum ferunt: alia denique singulos fetus pariunt: alia, binos, ternos, aut quatermos: alia numero magis partu fortificā. In ouiparo genere sanguineo, quadrupedum ortus uerno tempore agitur: autē syluestres semel magna ex parte pariunt: aliquæ tamen bis, ut hirundo, alæ & coeunt, & pariunt omni tempore anni, ut gallinæ: columbæ decies anno pariunt: & columbaceum genus magna ex parte bina parit oua: turtur tamen & palumbes uere, nec plus quā bis pariunt. Piscium alij diebus amplius tricenā uterum ferunt, alij minus. alij uem circa æquinoctium uernum paritūculis æstas, alij autumnale æquinoctium attribuitur: mactides bruma pariunt, ut dictum est. Ex his qui in lacubus fluminib; degūt, Cyprini quinquies aut sexies anno pariunt: choleis ter: reliqui semel edunt oua. in exanguis uero

genere, tribus mensibus ovis gerunt locustæ: quatuor mensibus squallæ: un- E
tra diem decimum quinquē partē septa. Ex uniparis delphini singulos ma-
gna ex parte edunt, interdum tamen & binos. Saes cicures utrum ferunt
mēses quatuor: numerus partus cum plurimum ad uicenos. Oves & capræ
magna ex parte singulos: aliquando binos, & ternos, & quaternos. utrum
ferant quinque mensibus, num oves, num capræ. Partus canis duodecim cum
plurimum: sed magna ex parte quinque, aut sex: unum etiam aliquam pe-
perisse certum est. Gērūt utrum canes Laconicę sexagenis diebus, aut uno
aut altero plus minusc. sunt & canes, quæ quanta anni parte uterū ferant,
hoc est tribus & septuaginta diebus: in octuillā quarta parte anni. Vacat de-
cimo mense parunt singulos, geminos uero raro. Ferunt uterū equæ men-
ses undecim: pariunt duo decimo mense, magna ex parte singulos, sed ge- F
mellos quoque aliquando eodem modo alunt. Camelus fert utrum mē-
ses decem. Elephantus ferendi uteri tempus incertum: alij annū & sex men-
ses, alij biennium, alij triennium statuunt. Cervæ utrum gerunt octo mē-
ses: pariunt magna ex parte unum. Vrsā fert utrum dies triginta: parit tum
unum tum duos: sed cum plurimum quinque. Histrix eodem diebus fert
utero, & reliqua facit perinde, ut ursā. Læna singulis annis uere parit, &
magna ex parte geminos, sed cum plurimos sex cæcellos. Vulpes cum pluri-
mos quatuor edat. Lupus fert, & parit ut canis, nam tempore, tum etiā fec-
tus numero parit inuente estatē. Felis & ichneumaones tot paritū numero
quot canes. Thos ut canis impletur, & generat numero duos, aut tres, aut
quatuor. Murum generatio mirabilis præter cætera animalia maiorem in G
modum est, tum numero, tum celeritate.

A locis in quibus gignantur animalia, & in quibus degant, col-
liguntur differentie.

Cap. XXXVIII.

A D generationem pertinet & locus: est enim uel locus generationis
principium, ac proinde à diuersitate etiam locorum differentia oritur:
ut enim locis nonnullis gigni omnino aliqua nequeunt, sic alius generetur
quidem, sed minora aut pauciora & uita breuiore, nec prospera: serpentes
enim & lacertę cornuicęque omnia, in locis calidis, & in mari rubro testa-
ta omnia gignantur prægrandia. In frigidis autem, ut septentrionali plaga,
ex animalibus, quæ aut parum sanguinis habent, aut eodē uacant, quædam H
omnino nō gignantur: quædā gignantur quidem, sed minora uterq; sunt
breuioris. Maxima in India gignantur animalia: indicio sunt canes gran-
diores cæteris. Plurimum autem discriminat ex ipsa regione oriri certum
est, non ad magnitudinem tantum habitudinēque uegetiorem, uerum ad
cōtum etiam & partum eadem alibi plures generent, alibi minus. In
universa Africa non asper, non cœrus, nō capra syluestris est: & locus quo-
que uicinis discrimen huiusmodi existit, ut agri Malesij locus sibi propin-
quis cicadæ alteris gignantur, alteris non. Annus in Cephalina insulam di-
uisus, cuius citra alterum latus cicadarum copia est, ultra alterum nullæ.
Terræ Beroæ in Orchomeno agro talpæ habentur multe: at in Lebæico
uicino

Ducit &
septuaginta.

Minus ca-
pitulis docet.

A uicino nulla sanneque si aliunde portatæ eò fuerint, uolunt infedere. India quæ sanguine caret, & quæ fecit illi tempore conduntur, grandiora namque illa possidet, sicuti & reliqua quoque animalia, ut modo diximus. In Africa, magnitudo angulæ mura, sicut & ferar. In Arabia, Jacenti magnitudine cubitum excedunt. In Ponto, neque mollia sunt, neque testata, nisi locis quibusdam pauca. In mari rubro, testata omnia mura quædam magnitudine augentur. In Syria oues sunt cauda lata ad cubitum menturam: capræ auriculis mensura palmari & dodrantali, ac nonnullæ de mullis, ut ipse dicent terram. In Cælia capræ condentur, ut alibi oues. In Aegypto aliqua maiora quàm in Græcia sunt, ut boues & oues aliquæ minores, ut canes, lupi, lepores, uulpes, cerui, accipitres: aliqua magnitudine paræ, ut cornices & capreolus rei causam attribunt cibo, qui alius large alius parce sit: tum etiam cæli conditio temperaturæ causa citat in terra Illyria & Thracia & Epiro, asini parui habentur: in Scythia & Celica nulli aut omnino pauci, propter immodicum frigus. Item leones in Europa potius sunt: pantheræ in Asia: in Europa autem nullæ. Bestiæ denique omnes feræ efferaiores in Asia sunt, fortiores in Europa, multiformiores in Africa: quo quidem loco etiam quæ alienigenæ sunt, coeunt & generant, ut ante dictum est. Morum etiam diuersitatem loca efficiunt, ut montana & aspera suas bestias reddunt, & aspectu efferaiores, & uiribus robustiores, quàm plana & molliora. Morius etiam ferarum & ictus ex locorum diuersitate plurimum differunt: ut in Phæto locis quædam scorpiones non ledunt: at aliis, & præcipue in Scythia muli & magni, & nocui sunt. Angulam quoque morius per loca plurimum differunt. Genera etiam serpentium peregrina aliquando magis pestifera sunt maxime quæ aestuosis locis gignantur. Italia frigidioris quæ regiones minus terribiles angues edunt. Atque hæc ita se habent.

De sexuum differentis, masculinis scilicet & femininis.

Cap. XXXIX.

Sexus item masculinus femininique distinctus quidem, sed non in omnibus animalibus, est: sunt enim quibus id desit, ac similitudine quadam & paritate dicuntur & ferre uterum. In his enim animalibus quæ uitam stabilem uiuunt, aut omnino is, quæ testa integuntur, sexus discrimen nullum omnino est: in mollibus uero, crusta operis, & pedestribus omnibus, rum bipedibus tum quadrupedibus sexus uterque est: atque etiam in aliis quæ animal per coitum generant, aut ouum aut uermem. At uero in genere insectarum & piscium, sunt quæ omnino sexus hoc discrimen alterutrum partem non habeant. Nulla parte interiore sexus inter se differunt, nisi uero & testibus, atque is quæ illis aduincta sunt. Feminis enim omnibus sanguineis intus condita habentur hæc partes: maribus autem multiplex differentia curantur testes: alius enim nulli omnino sunt, ut piscibus, serpentibus alius sunt quædam, sed intus: & is quæ intus conuertitur, non etiam omnibus eodem modo habentur, ut infra docebimus. Maribus in quo cumque animalium genere, partes superiores prioris quæ sunt potiores, ualidiores

Sunt autem qui
dicitur quæ in
nostris ge-
neris maxime
sunt ut uter
non excludit.

& aptiores. Quæ autem dici possint inferiores posterioreſque, eas femi-
næ habent robustiores, tum in hominibus, tum cæteris animalibus omni-
bus, quæ pedestria sunt atque animal generant. Et femina fete innumeræ
atque infinitæ sunt à partu tamè femina in educanda sobole fete acerbior
mare est. In pedestribus sanguineis uimparis, maxima ex parte maiores
sunt mares quàm formiæ: at in his quæ aut ovum pariunt aut uetrem, ut
pescibus atque insectis, feminae maiores suis maribus evadunt. Feminis
sanguis nigrior & crassior quàm maribus est, dummodo cætera adfuerint pa-
riter, quæ uel ab ætate uel similitudine proficiscitur. Et minus sanguis per sum-
ma corporis feminatum est, plus enim parte interiore continetur. Caro
quoque humidior est feminae quàm maris: polum etiam habet tenuiorem
femina quàm mas: uox item feminis omnibus tenior & acutior, boue
eæce pro. Partes autem quas uelut arma natura animalibus dedit, cum simo-
di sunt dentes exerti, cornua, calcaria, & cætera generis eiusdem: eas certe
in nonnullis generibus omnino mares habent, feminae non habent: uelut
generis ceruini, femina coruium inops nullâque est: & auium nonnul-
larum quibus data calcaria sunt, feminae omnino his carent: pari modo ut
fues feminae densibus uascent exerti. At in nonnullis generibus sunt qui-
dem hæc sexus utriusque, sed maribus potiora, ut cornua tauris robustiora
quàm uacris.

Auſcultatione diuersa oriuntur animalium differentie. Cap. XL.

DEgunt animalia locis diuisa, alia nanque terrestria, alia aquatilia
sunt: quam differentiam trifariam intelligimus: aut enim recipiendi
aeris aut aquæ ratione, alia terrestria, alia aquatilia dicimus: aut quod
apta natura sunt seruari temperamento alterutris, quanquam ætrem a-
quâque non recipiant: aut etiam quod cibum petant, uersanturque utro-
boque diutius. Completa enim cum recipiant ætrem, ad est spiritant, partul-
que faciant in terra, cibum tamen à madidis locis petunt, uersanturque in
humore partem maximam temporis:que sola uiaque uolunt, ad est uitam am-
biguam agere uidentur: quippe eadem & uelut pedestria & uelut aquatica
statui possunt. At eorum quæ humore recipiunt, pariter unum cordulû, nul-
lum uel pedestre uel uolantè est, nec cibû sibi ex terra petit: quanquâ mul-
ta spontabilia pedestrisque generis humore gaudent: & adeo nonnulla ut ne
uiuere quidem disicula ab aquæ natura ualeant, ut testudines marinæ &
lutariæ, crocodili, fluuianiles equi, uenuli marini. Hæc enim omnia nasci ali-
quando sparent, intereunt: & parere educatæque solent in sicco. Quæ uero
in cetaceo uel in reliquo aquatili genere fistulam gerunt in capite, ut del-
phinus, balæna, hæc natura quadam peculiari, nec aquatilia tantum, sed nec
terrestria facile dixeris: siquidè terrestre quod ætrem recipit, aquatile quod
aquam, secundum naturam est: particeps nanque est hoc genus utriusque,
cum & mare accipiat, redatque per fistulam, & ætrem per pulmonem: ha-
bent enim hoc membrum & spirant, uerum in utraque diuisionis tam co-
trationum generum parte collocari hoc genus absurdum est. Quamobrem
aqua-

*Terrestria, aut
pedestria, ut
aquatilia, in-
dita.*

*Terrestria, ut
pedestria, in-
dita.*

- A** aquaticum genus amplius distinguendum videtur: ut alia accipiant reddantque aquam, ea causa, qua spirantia aerē, quo scilicet refrigerentur, alia propter cibum. Cum enim in humore cibum accipiunt, fieri non potest, quin simul aliquid humoris admittatur: quod admissum, quo emittant, instrumentum habeant necesse est. Quae igitur loco aeris, qui per inspirationem attrahitur, humore utuntur, quo scilicet refrigerentur, branchias habent: quibus autem cum cibo humor illabatur, ut sifcula in sanguineo genere data est. Mollibus etiam & crustaceis hoc idem adhibatum est: nam ex quoque humorem propter cibum accipere coguntur. Altero etiam modo aquantia sunt, (ob temperationem corporis dico & uictum) quae accipiant quidem aerem, sed in humore aetate degant: aut quae recipiant quidem humorem & branchias habeant, sed terram petunt, unde cibū accipiunt: quale cordulū esse dicimus. Sed horum omnium natura quasi peruersa depravatū videtur: sicut marium nonnullorum natura femininam refert, & femininarum maris. Cum ergo animalia trisariam in aquaticā & terrestrem diuidantur, ut dictum iam est: aut enim recipiendi aeris aquae uel necessitudine, aut corporis temperatione, aut tertio cibi ratione, uictus proflus discrimen pro his diuisionum membris consequitur: alia enim temperant corporis gratia, & propter cibum, atque etiam recipiendi aeris aut aquae necessitate ut degunt: alia temperantur nichilque causa tantum. In utrorumque testa operiuntur, quae quidem sua natura immobilia sunt, plurima a suntur humore dulci & potulento, qui tenuior ex aqua salia elatum quae autē mobilis eademque carne uescitū sunt, *per se ipse* Graeci dicunt & *enquēte*, ut uictus ex pisciculis est, ut purpuris: alia & ut quae in mari pululāt uescuntur. Quae crusta integuntur, omnia oia sunt: quippe quae & lapillos, & limū, & algā deuorant atque quaedam etiā stercore, ut canem fluminales carnes etiam nimirum appetūt. Locustae uel pisces maiores conuincere possunt. Mollia omnia carniuora sunt: molligines etiam atque sepe pisces uel maiores euincunt: polypi conchulis maxime uescuntur. Pisces fere omnes futuram suo tempore, aliter etiam alterum edunt, maioresque minores sunt preda: reliqua uictus ratio nō eadem omnibus est. In auium genere, quibus unguis aduincit, omnes carniuorae sunt. In genere etiam non aduincit sunt, quae carne uescuntur, ut hirundo. Sane quae uermiculos cum alios, ut qui in lignis nascuntur, pascant: aliae spinam appetunt: aliae fragibus utuntur.
- D** Omnium fere auium, aliae uictum à terra petunt: aliae à fluuiis & lacu, ut ardeolae: aliae mari, ut halcedo & falica. Genus auium omne cum potu exiguo contentum sit, nam aduincit nullus usus bibendi est, praeterquam paucissimis quibusdam, quae & ipsae raro utuntur. Auium ceterarū sorpus bibēs sed quibus collum est longum, intermitunt, caputque resupinant. porphy no unus modus bibit. Genus animalium coriis uictum, ut lacerti & reliquae huiusmodi quadrupedes, atque etiam serpentes, omnium est: nam & carnem edunt & herbam: sed desiderium ut quoque bibendi erigunt, & reliquis quibus pulmo singulosus est. Quadrupedes quae animal generant, syloestres eademque ferratae dentibus, ut leo, lupus, carne omnes

uescuntur, urfus animal omnivorum est. Corrigeria animalia, & quibus Edentes ferrati non sunt, omnia fruge herbâque vescuntur, nisi uehementer esuriant, sive excepto, qui minime herbe frugumue appetens est, sed radicū maxime ex omnibus animalibus. Sunt & inter quadrupedes ferâque, quæ utrum ex lacu & fluuiis petunt, ut fîber, lutris, lacæ: ut uero à mari nullum præterquam uitulus marinus. Bibunt, quibus dentes ferrati animalia, lambentibus: atque etiam nonnulla ex non ferratis, ut mares. Quibus autem conuinui, sorbendo, ut equi, boues: urfus neque sorbendo neque lambendo, sed moriū. Bibunt cætera quidem magis tempore æstiuo quàm hyberno: quæ autem in Africa degunt animalia, contra: infuetum nâque eis est bibere æstate, propterea quod imbres per id tempus fieri non soleant. Insecta animalia quibus dentes omnivora sunt: quibus autem lingua tantum humorem undæque exugendo sua lingua uescitur: quorum alia omnivora sunt, quibus gustus omnium saporum est, ut muscicæ: alia sanguiniora, ut tabani & asilæ: alia succis plantarum & fructuum uiuant. Animalium quibus idâ ruminare in more est, proficiuntque ac delectantur non minus in ruminando, quàm edendo. Ruminant, quæ superiore dentium ordine carent, ut boues, oues, capræ. Ex feris nullum ruminare constat, præterquam ea, quæ aliquando cum hominibus erigunt, ut ceruus: hunc etenim ruminare placuisse nati est. Sunt etiam de dentatis utrinque nonnulla quæ ruminant, ut mures pōta, lepores & piscis quidam, quem ab ea re uiscus, id est ruminalem quidam appellant. Talis amantium uetus est.

*Uide an hoc p
sto leprati sit
apud Aristote
lem, & p
quid. & qu
ab eam, &c.*

A sensibus quæ oriuntur animalium discrimina.

Cap. XLII.

Sensus quidem, ut ante dictum est, omnibus animalibus communis est: aliis tamen omnes, aliis uero pauciores dedit natura. Quæ nanque sanguine prædita sunt omnia, omnes habent sensus, nisi quid lesum mutilumue sit, ut talpa: præterea, illis quæ mollia, quæ crusta insecta, & quæ insecta dicuntur, prope dixerim omnibus, sensus omnes insunt. Quæ autem siccio tegmine operiuntur, quæquam talium (quem omnibus animalibus communem esse diximus) & olfactû gustumq; habere constat, de usu tamen & auditu nihil certi manifestiq; habemus: quædam tamen ut echina, tethya, glandesq; olfactum maname habere uidentur. Eorum quæ non spirant, alia branchas, alia fistula, alia præcincta, ut insecta, odorē sentiunt. Nec pro cōpari modo genera animalium omnia, sensibus prædita omnibus sunt: sed olfactu canes præcellunt, uti quibusdam placet: usu aquilæ: gustu protogustæ animalia Indica, unde & nomen acceperunt: tactu serpētes, & quædam aues: auditu asneres. Verum Plinio auctore, ex sensibus ante cætera homini tactus, deinde gustus: reliquis superatur à multis. Aquilæ clarius cernunt: uolures sagacius odorantur: quidam audiunt talpæ. Cicero, omnis, inquit, sensus hominum multo antecellit sensibus bestiarum: quorum ita clara iudicia & certa sunt, ut si optio naturæ detur, & ab ea deus aliquis requiratur, contenti sint suis integris incorruptisq; sensibus, an postulet melius aliquid, non uideam quid querat amplius. Hæc Cicero.

*Quem sint cer
ra uiscerum
sensum radi
cus, plantæ ex
plicat Cicero
libr. 2. De nat.
deor. et 4. Acci
dem. quæst.*

A respirations

A A respirazione & uoce, animalium discrimina. Cap. XLII.

A Nimanitum alia accipiunt redduntq; aeterniq; res respiratio nominatur, ut homo, & quicunque tertia habent pulmonem: alia uero minime, ueluti pisces & insectorum genus omne: & his quidem neq; uocis emittende, neque locutionis ulla facultas est, sed sonus tantum in nonnullis differt enim uox à sono, & cum is tertia res adnumeranda est locutionis: gutture (ααφης dicunt) parte una, uox agitur locutio non nisi uocis per linguam explanatio est. Quamobrem quibus animantium lingua libera absolutaq; non est, neque sermone utuntur, neque uocem emittunt, sed sonum tantum. Insectorum alia marmur edūt, ut apicalia canere dicuntur, ut cicada: nullum molle, nullum crustatum, uel uocem uel sonum mittit natu-

B ralem. Pisces uocis quidem expertes sunt, sed sonos stridoresq; mouēt, qui uocales esse existimantur: ut uero, quæ de linguam habent & pulmonem, si quadrupedes cui paræ sunt, uocem quidem emittūt, sed exilem: & alia longum sibilum edunt, ut serpentes: alia abruptum & perexiguum, ut testudines: alia uero exilem & imbecillē uocem: rana suum habet ululatum, quā ololyginem narrant. Genus auium uocem mittere potestiusq; præcipuā facultas conficiēde locutionis, quibus lingua mediocriter lica uel tenax. Quadrupedū genus quod animal procreat, uocem uarie mittit: neque est quod loqui possit, sed proprium id hominis est: omnū uero uocaliū animantium communis mos est, ut sui conuassentore possimam canant & blaterent præter hominem, ut aues uic maxime plurimāq; emittunt uoces

C cum coeunt. Differunt tum uoces animalium, tum locutiones tractibus ratione & regionis. Et uox quidem acutiusq; grauiusq; maxime innotescit: in his tamen specie nequaquam discrepāt, quæ generis eiusdem sunt. Aitatus quoque ratione differunt uoces: immo istibus enim quā uociferioribus fere acutior uox est. Magna etiam ex parte uox marium sermōnariq; differit: eo quod mates grauius sonant quā sermōnāt: uerū non in omni animalium genere ita agitur: sunt enim in quibus è contrario fit, ut in bubus: nam boum sermō grauiorem, quā mas agit uocem: & uocalis grauior, quā adulus. Quamobrem castratis uox è contrario mutatur: transiunt enim quæ castrantur in sermōnem.

A Spiratio, ἀεμίς q; ἀεμίς. Vox, φωνή. Locutio, λόγος. Sonus, ἡσυχία.
D B Longum sibilum, ααφίς. Abruptum & perexiguū sibilum, ααφίς μικρά, uel potius ααφίς. Ololyge, ὀλολυγία.

Animalium discrimina, quæ à somno & uigilia oriuntur: aut ætate, iuuentute scilicet & senectute, aut uic proleptate & breuitate. Cap. XLIII.

S Vnt uero hæc animalibus omnibus cōmunia, uigilia & somnus, iuuentutis & senectutis, uita & mors: non tamen pariter omnibus eodemq; modo insunt: omnia enim animalia dormiunt quidem & uigilant: (nullū enim reperitur, quod uel semper dormiat, uigiletue semper) sunt tamen quæ somno omnino adeo exiguo contenta sunt, ut serpentum quous latet, dormiant, necne. Pedestria omnia & prædica sanguine dormire ac uigilare,

*Aquarilium,
Quid pſier et
aquarilium reli-
quas dormiant,
unde arguuntur
Ariſto. Aſtor.
animal lib. 4.*

ſenſu ipſo percipiuntur: quibus enim palpebre adiunctæ ſunt, conſuendo & obdormiſcunt. Aquarilium quoque ſomnus apparet, ut piſcium, mollium, & cruſta opertorum, locuſtarum inquam, & ceterorum generis eiufdem. Argumentum uero, quibus nullum deduci ab oculis poteſt, quia palpebris carent, ipſa tamen quiete cernantur placida, ſeu ſoporata. Inſeſta etiã dormiunt argumentum, quod requiem capiunt, motuq; omni procul dubio ceſſant, quod præcipue patet in apiſibus: quieſcant enim nocta & conſueſcunt, ut nullus omnino hominibus ſentiat. Item ſomnare non ſolũ homines, ſed & alia quædam animalia, ut equos, canes, & boues palam eſt. Doctus uero ſanguinis copia partes exteriores deſerit, ſubit interiores: ita ut ad hæc cultello non æque eſſilare poſſit. Aetatem etiam ratione nonnulliſque diſcriminis accidit: etenim in prima ætate, & admodum uentilis, ſanguis ſaniẽ trahit, & copioſior eſt: in ſenectute autem craſſus, niger & paucus, medium tenet in media firmiſſq; ætate. Concreſcit etiam ſacile ſemina, uel in corpore ſanguis, qui per ſumma eſt, quod idem nunquam in iuuenibus accidit. Augelcunt animalibus pilæ in ſenectute, durioreſque redduntur: quod idem ungibus quoque euenit: piſcibus quoq; ſenelcibus ſquamæ durioreſ & craſſiorẽſque efficiuntur. Quadrupedum etiã ualla lanæue ſenectute prolixius augentur, quanquam rareſcant, ſianq; pauciores. & ungulæ quoque maiores in ſenecta redduntur, quod idem ſolſtris etiam autumn euenit. Pennas grauiam in ſenecta nigreſcere perſpectum eſt. Vivunt certe alia diutius, alia uero quo nata ſunt, eodem die emouuntur, ut ephemeras: longioris uitæ ſunt alius, quæ greſſilia ſunt, pariſter & ſanguine prædita, ut homo & elephas: & aquatilia terreſtribus breuioris uitæ ſunt. In pedeſtribus ſanguinis uicariis maxima ex parte longioris uitæ ſunt: mares quàm ſemina: ſeminas autem piſcium maribus eſſe uiuaciorẽ coſtat, cõ quod ſeminae uetuloſiores quàm mares capiuntur. Quæ ſeminae abũdant, & ſalacia ſunt, citius ſenelcunt: quæ contra, diutius uiuunt: ideoque mulus longioretem degit uitam, quàm aut equus aut aſinus, ex quibus procreari ſolet. Mares, prope dixerim omnes, diutius uiuunt, quàm ſeminae: accidit tamen uel ob ſalacitatem, ut in paſſeribus, uel ob nimium laborem, ut in iumentis, ut mares quidam ſuis ſeminis ocys ſenelcant.

Differentiæ animalũ, quæ à moribus conſtituuntur. Cap. XLIIII

MORIBUS item animalia diſtincta natura: habere enim uim quandam naturalem animantes in quauis animi affectione uidentur: hoc eſt prudentia, ſtulticia, animoſitate, agnauiã, clementia, atrocitate, & reliquis habitibus generis eiufdem. in quibusdam etiam commune aliquid diſtinctiæ eruditioniſque habetur: atque etiam prædẽtur imago quidam in eſt in nonnullis: alia enim uiciliſim inter ſe, alia ab homine (quæ ſcilicet auditu non carent) non modo ſtrepẽdi, uerum ſignificandi differentias poſſunt diſcoſcere. Sunt etiam animantium alia ciuiles, alia inciuiles: ciuiles appello animantes, quæ labori communiciũ eſt, quarum opus communi efficiuntur opera, ut homo, apis, ſomice, grus. In omnibus uero generibus, in quibus

*Caudæ, mte.
real.*

A bes per matrem & fortunam procreatio est, mores diffinit natura, quibus
 enas differt à femina: quod precipue cum in homine, cum etiam in iis, quæ
 magnitudine præstant, & quadrupedes uniparæ sunt, percipitur. (mores
 itaque minorum animalium, parumq; uiuentium temporis, nimis sensu
 percipiuntur: maiorem euidemores sunt) feminae etiam in iis moribus
 sunt mollioribus, marescunt celerius, & maiorem facilius patiuntur: discunt
 etiam, imitanturq; ingeniosius ut in genere canum Laconico: sed fere mi-
 nus quàm mares sunt animosæ, uerum malitiosiores, astutiores, & infido-
 siores feminae sunt, atque in nutrienda prole sollicitiores mares còtrà, ani-
 mosiores, ferociiores, simpliciiores, minùque infidiosi. Pugnant inter se ipsa
 animalia, quæ loca eadem incolunt, atque iisdem uelutur cibis: nam si ui-

B òlus penuria sit, fit certe ob eam rem, ut uel eiusdem generis animantes pu-
 gnare inter se conentant. Et quidam marinos uiculis eiusdem loci pugna-
 re inuicem aiunt, & matrem cum mare, & feminam cum femina, donec al-
 ter ab altero, uel occidatur, uel eiciatur: idemq; eorū catulos facere. Carni-
 uora etiam (Græci *κάρνηα* uocant) oppugnantur à ceteris omnibus: & ipsa
 cum ceteris pugnat, quoniã uisus iis ab animalibus est. Sunt ferarum alie
 semper inter se infeste: aliæ hominum ritu, cum res ita uulerit. Piscium au-
 tem, aliæ gregatim degunt, amariq; sunt: aliæ non gregatim, inimi-
 cæque uiuunt. Conger & muræna caudas inter se prærodunt. Polypum in-
 tantum locusta pauet, ut si iuxta uiderit, omnino moriatur. Locustam cò-
 gger, rursus polypum congrui lacerant. Genus ouile amens, & moribus stu-
 pidissimis est. Ferarum quadrupedum cetera non minime prudentia præflare
 uidetur: id quod & paricida, & fecum educando ostendit. Omnino ratio

C brutorum magnam refert uiræ humane similitudinem: magisq; in mi-
 nore genere, quàm in maiore uidetur intelligentiæ rationem: quod primò
 in auum genere, hirundo in effigendo construendq; nido, ac pullis edu-
 candis ostendit. Columbi cum pluribus coire nolunt, neque coniugiũ iam
 inde à primo ortu initum deferunt, nisi cœlebs aut uidua. quoniam etiam femi-
 nę partorienti mas adest, & cultu, omnib; officio fungitur. Domicilia quo-
 que agrestes uolucres aptissime ad metum, & prolis salutē moluntur. Sunt
 item alie parentes feliciores, & suorum gnatorum diligentiores: aliæ con-
 tra. Et alius ingenium ad metum acutus, alius obusus est. Sed in marinis

*Feliciores, &
 rari.*

D quoque animalibus permulta intelligi possunt, nò sine solerti ingenio ef-
 fici ratione uiræ commodioris: rana namque, quæ piscatrix appellatur, præ-
 terea torpedo & pastinaca sese abscondentes piscantur. Obuiant arena sese
 & asella, & rana, & passeris, & squamæ: cumque nullam sui corporis partē
 intactam reliquerint, uerberant radiolis sui oris, quos piscatores ungulas
 uocant, quas pisciculi cum aspererint, adnascit quib; ad algis, quibus uesci
 solent sunt. Mollum astutissima sepa est: maxime etiam hæc suo uisus atra-
 mento, non modo cum metuerit, uerum etiam abscondendi causa. Poly-
 pus fatuus quidem est, cum ad manum demissam hominis accedit: sed præ-
 dens rei familiaris, cum omnia colligit, & suo in domicilio recondat: sui
 etiam mutatione coloris uenatur pilices. Insectorum operosissimum, &

propter ceteris fere animalibus officiosissimum genus fornicarum & apus est. E Crabrones item & uespæ, & prope dixerim omnia huius cognata generis, & aranei quidam in uite muneribus ingeniosiores habentur. In moribus animantium percipi differentias licet: præcipue quidem ad fortunam & timiditatem, ad mansuetudinem quoque & feritatem, etiam in ipso sylvestrii genere: leo enim quantum in edendo ferocissimus sit, tamen passus & fameliâ uacans, facilis multique maiorem in modum est: elephans omnium ferarum iustissimus & placidissimus est. E terrestribus mures, è uolucris hirundines indociles sunt: cum elephanti iussa faciant, leones iugum subeant, in mari uiruli, totque piscium genera mitescant. In mariuo etiam genere plurima de delphinis natrantur: indacia morum placidorum ac mitrum. Genera autem quæcunque placida sunt, hæc eadē quoque fera F possunt repetiri, ut fues, equi, homines, oues, capre, canes, boues.

Ab affectuum quorundam immutatione, quæ oriuntur animalium differentie.

Cap. XLV.

VT quæque animalia pro suis affectibus agere, sic contra, pro suis quoque actionibus affici immutariq; moribus solent: quæ & partes corporis nonnullæ sæpenumero ratione agendi immutantur. In auium enim genere gallinæ cum mares uicerint, cocantur: & exemplo marium stant superuenti coite, crista etiam caudæque erigitur. Cuculus etiam immutatur colore, & uocem minus explanat cum se abditurus est. Complures etiā alie immutantur aues per tempora, & colore & uoce: ut merula quæ ex nigra redditur rufa, & uocem multā diuersā: strepitat etiam per hyemem, cum per aestatem tumultuante cæcet, mutat & tardus colorem, uoce tamen eadem est. Luscinia quoque & colorem per tempora mutat & uocē & quidem in terra Italia per id tempus, quo sic immutari solet, alio nomine appellatur. Denique aues tunc maxime plurimæque emittunt uoces, cū coeunt. Colorem etiam mutant & pisces, merula & tardi, pluca etiam mutat colorem: cum enim ceteris temporibus candida sit, uermis uaria redditur. Mutantur uero animantium aliqua, forma & moribus, nō modo per ætates & tempora, uerum etiam castratione. Castrantur autem ea quibus sunt testes. Gallinaceus si perfecta ætate est qui castratur, illi crista pallescit, & cocantire desinit: neque coitum uenereum repetit: sed si adhuc pul- H lus est, ne inchoari quidem ex iis quicquam potest cū accrescit. Quod idē in homine quoque accidere certum est: nam si puer adhuc excubatur, neq; post geniti poli crescunt, neque uox immutatur, sed suum seruat acumen: at si iam puber, post geniti desuunt poli præterquā pubescere enim quantum minuat, tamen manet, & congeniti non desuunt: nemo enim ipso caluescit. Quadrupedum etiam excuborum uox omnium serminalium mutatur. Omnia denique si dum crescunt, castrantur, maiora elegantiorique, quam incastrata eruant: sed si posteaquam adoleuerunt & iam incrementō consueverunt castris, nihil præterea accedere ad magnitudinem potest. Ceteri si cum per ætatem nondū comua gerunt, castrantur, non edunt cor-
nua:

A noua: sed si cornigera exciduntur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem feruantur. Et castrata denique auctiora quam incastrata euadunt.

A ualitudine prospera uel aduersa differentia. Cap. XLVI.

VAletudines etiam & morbi per tempora, pro generum diuersitate uarie accidunt, & in totum non eadem omnibus ualitudo existit: uisum cum animalia prospere, non eisdem temporibus, nec omnibus & que qualitatibus exasperantur. Iam auctus per os sunt squalores, nam ad ceteram sanitatem, nam ad partum. At uero piscibus (exceptis quibusdam paucis) imbres conducunt ancommodi coetera auctus anni pluuui sunt, piscibus sicci. Et pisces quidam suos morbos habent, ut cyprinus, glanis. Testaceo generi B anni pluuui pro sunt, praeterquam purpuris. Quadrupedum, saes uariis morbi generibus laborant, scilicet raucedine, dolore capitis, alui profluitio, & grandine: canes, rabie, angina & podagra. Boues gregales morbos duobus tenentur, podagra & struma. Equi gregales morbo immunes sunt, excepta podagra: at uero equi domestici morbus plurimis obnoxii sunt. Asini maxime morbo laborant, quam malicidiam uocant, Graeci *μαλίκεια* elephanti morbis ex inflatione contractis: egrotant etiam si comedant terram, nisi ea frequenter urantur: necnon profluitio alui tenentur, & alius quibusdam morbis. Insectorum maxima pars eo tempore ualet, cum annus humidus est & tepidus. Apibus praecipue nocere bestiola quaedam, quae in aluiis innascitur. Discrimen animalium ut prospere contrarie exigant, etiam cum uero C grauescant, existere nos imas: testa enim insecta atque etiam crustacea, nunc opima sunt cum grauida, ut locustae: mollia etiam praestant cum grauida sunt. Et pisces cum impleri incipiunt ad coitum, boni omnes fere sunt: sed procedente ueteri tempore alij praestant, alij non.

Animalium discriminia, eo quod commoda magis minusue, aut incommoda nobis sint. Cap. XLVII.

HOminis causa uidetur natura cuncta animalia genuisse: alia namque in consortium operum nobis ueniunt, ut ea quae iumentum nomen a re trahunt: quod nostrum laborem, uel onera subuectando uel arando iuuarent alia uoluptatis ac redditus & custodit causa parati solent, ut ouis, capella, fex, canis. Ouellum namque pecus & contra frigoris uolentiam nos protegit, corporibusque nostris liberaliora praebet uelaminatum etiam ca sui lactisque abundantia, non solum agrestes saturat, sed etiam elegantius in uentris iocundis & numerosis dapibus exornat: quibusdam uero nationibus frumenti expertibus, uictum commodat: ex quo Nomadum Getaarumque plerumque *περὶ βοτάνης* dicuntur. Capra pulos ministrat ad usum nauticum, & ad bellica tormenta, & fabrilis uasa: necnon quaedam nationes harum pellibus sunt uelutae, ut in Getalia & Sardinia. Canis aut custodire paratur, propellenda scilicet iniuriis hominum scaramque: aut uenationis. Mella contrahunt apes, succumque dulcissimum ac saluberrimum, fauolique conficiunt & ceras. alimenta nobis praebent & alia nonnulla, nam

ex suis partibus, tum ex quibusdam, quæ in partibus ipsis continentur aut E generantur cuius generis sunt sanguis, oua, lac, cæcus & beryrum. E diuersio alia, ut serpentes & pisces nonnulli, mortem sibi afferre in cibis ferunt: & plurima ex animalibus morborum colliguntur remedia.

Ab alimentis, quæ ex animalibus nobis suppeditantur, differentiæ quibus modis constituuntur. Cap. XLVIII.

IN his quæ nos alunt, scire oportet hæc inueniri discrimina. Omne animal quadrupes domesticum, omnem grædem feram, quales sunt capre, ceruus, aper, ouager: omnem grandem auem, quales sunt anser, pavo, grus: omnes beluas marinas, ex quibus cetos est, quæq; his pares sunt, alimentorum validissimi generis esset id ualentissimum uoco, in quo plurimum alimentum est. Caro quæ durior est, inquit Galenus, & crassiorum partium, si probe concoquatur: alimentum corpori præstat copiosius, quàm quæ humidior est ac mollior. In media uero materia numeratur, ex quadrupedibus lepores: & gallinaceum genus, phasiani, perdices, atragene, columbae, merulae, tardi, auculae omnes à minimis (ut inquit Celsus) ad phœniceptera. Item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidius saluti: uel ut Galeno placeat, pisces omnes & litorales & pelagici qui neque glutinosum habeant fucum, neque insuauem quicquam aut uirosam referant. Imbecillissimam uero materiam esse tradunt, ex auibus, eas quæ in montibus uiuunt: thurnos scilicet, tardos, merulas, columbasq; & passeret, qui in turribus degunt: ex piscibus eos, qui in saxis uitam agunt, ut ualides, phocas, scaros, merulas, tardos. Sed quauis hæc ita discreta sint, tamen etiam quæ sub eadē specie sunt, magna discrimina recipiunt: alia namque res, alia uel ualentior est, uel infirmior. Si quidem ex auibus, quæ in media specie sunt, ualētior ea quæ pedibus, quàm quæ uolata magis nititur: & ex istis quæ uolatu fidunt, humiores sunt quæ grādiore, quàm quæ minuta sunt, ut siccula & tardus. Inter domesticas uero quadrupedes leuissima suilla est: grauiuscula bubula: item quæ ex feris, quod maius quodque animal, eò robustior ex eo cibis est. Pisciumque totum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utimur, grauius sunt, ex quibus salamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est: deinde, qui quauis tenetiores, tamen duri sunt, ut aurata, coruus, scarus, oculata, tum plana: post quos etiam leuiiores, lupi nulliq; & post hos sunt omnes saxatiles. Leuiorem cibum præstant pisces, quàm uolucres: & hæc leuiorem quàm caro suilla: quæ inter domesticas quadrupedes, ut modo diximus, leuissima est. Neque uero in generibus rerum tantummodo discrimē est, sed etiam in speciebus ipsis quod & pabulo fit, & ætate, & membro, & solo, & celo, & habitu affectione. Nam animalia omnia quibus abunde suppetunt idonea alimenta, longe seipis euadunt in alendo præstantiora: quæ admodum si desint, multo fiunt deteriora. Ex quadrupes animal omne, si lactens est, minus alimentum præstat: item quod tenetior pullus cohortalis est: in piscibus quoque media ætas, quæ nondum summam magnitudinē impleat: nam alimentum humidius, ut distribuitur, ita etiam celerius discutitur.

Galenus de uisibilibus.

A pabulo.

Ab ætate.

- A nter. Deinde ex eodem fac, angule, rostrum, aures, cerebellum: ex eodem *A membra.*
 agno hedœe cum pectolis totum caput, aliquanto quam cætera membra
 leuora sunt, adeo ut in media materia poni possint: & ex eodem sue pedes,
 quàm iunior crur leuiores sunt, & hoc quàm reliquis partibus ambus col-
 lis, alæ uel recte infirmis cibus annumeratur. Quoad solum uero pertinet, *A sola ex-
 celsa.*
 leuor piscis inter saxa edutus, quàm in arena: leuior in arena, quàm in li-
 mo; quod fit, ut ex stagno uel lacu, uel flumine eadem genera grauiora sint,
 leuiorq; qui in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam ferū animal do-
 mestico leuius est, & quodcumque humido celo, quàm quod secco natum
 est; quandoquidem ea quæ in montibus uiuunt, temperamento sunt siccio-
 re, atque corū caro minime pituitosa aut lenta est; quæ uero in locis aquo-
 sis & campestribus degunt, humidiora sunt, & excrementosa magis. Eadem *Ab habit.*
 omnia pingua quàm macra; recentia quàm fassa: noua quàm uetusta plus
 alimenti habent. Tum idem magis alit uulcerum, quàm assium, magis as-
 sum, quàm frizum, ut Celsus prodit. Ouum durum ualentissimæ materie
 est; molle uel forbile, imbecillissimæ. Fere uero sequitur, quod ualentior quæ-
 que materia est, eò minus facile concoquatur: sed si concocta est, plus alit,
 ut dictū est. Et imbecillis hominibus, rebus infirmis simis opus est medio-
 criter firmos media materia optime sustinet: & robustis apta ualidissima
 est. Plus deinde assumere ex leuionibus potest magis in iis, quæ ualentissi-
 ma sunt, temperare debet: uerum hæc potius ad medicinam pertinent,
 faciemus scilicet.

C A Caro humidior, suillam carnem tradit Galenus ualentissime nutrire. Cōsidera.

B Ex ambubus hæc aues inter ea recenset Galenus, quæ in tenui uisus ratione comu-
 nantur; Celsus aues omnes à minimis ad phœnicopterum, in media materia reponit.

C Suilla. Ommum ciborum, inquit Galenus, plurimū nutrit caro suilla idemque in
 ratione uisus a nature prædictæ reuincit, à piscibus, ac deinde ab auiibus ad carnes
 suillas & maris tum uocat. A Et quodcumque uide an ea legendum, sit apud Cel-
 sum Et quodcumque secco celo, quàm quod humido natum est; sed nihil mirum.

Alia quedam ab alimentis quæ nobis præstant
 animalium discrimina. Cap. XLIX.

- D N Equæ hæc sola quæ diximus, discrimina sunt, sed etiam alia boni suc-
 ci, alia mali sunt, (σῆκος & υἰός) Græci uocāt; alia stomacho ido-
 nea sunt, alia aliena; alia facile concoquuntur, alia difficilia; alia inflāt, alia
 ab hoc absunt; alia utras facile commpungunt, alia minime uariantur: alia
 moquent alium, alia supprimunt; alia citant urinam, alia tardant; alia succū
 procreant crassiores, alia tenuiores; alia glutinosum, alia mediocrem: si-
 cut alia magis excrementosum gignūt, alia minus. Boni succi sunt, ex qui-
 bus probus gignitur sanguis: ut aues piscēsque fere omnes, præterquam qui
 in lacubus, paludibus, fluminib; uiuunt; huiusmodi alioque quouis modo uicia-
 tis. Quadrupedū carnes, si bene cōcoquantur, & in us præcipue porcina quæ
 citate media est; hæc omnium penè alioquum ciborum optimū procreat suc-
 cum. Agrestium animalium caro succum efficit meliorem, quàm domesti-
 corum.

eorum. Boni succi sunt, inquit Celsus, omnis uenatio, omnes aues, quæ ex E media materia sunt, ex maioribus quoq; eo, quas supra memorauimus, medij inter necros durôsq; pisces, ut mulles & lupus. In summa, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne secur, ubera, rostra, & alie partes ec carnes ut uenter, intestina, uuluz, & omnes externæ partes, & eandẽ succum gignũt, quàm carnes minis bonum. Mali uero succi sunt, quæ sanguinem efficiunt minime probum, sed humoribus uisosis exuberantem: sunt autẽ & quæ frigidiõra sunt, & pituitosa: & quæ calidiõra bibulosaq; & quæ melancholico succo abundant. Sunt uero inter animalia huius gentis, pisces omnes, qui ex tenerissimo genere sunt, aut y rursus, qui nimium duri, uiciosi, sunt ut ferè quos stagna, lacus, limosa; riu serant, quos in nimã magnitudinem exceßerunt. Mali succi est, & ouilla caro: caprina uero, & actimoniam habet. Hirconum caro deterrima est: antequam deinde & taurorum. In omnibus autem iis, ut castracorum meliores, ita pessimæ sunt seniorum carnes: his nihilo meliorem succum gignit ceruina caro. Lepores crassiorẽ quodẽ sanguinem generũt, probiorem tamen succum, quàm aut bouilla caro, aut ouilla. In his sunt, & caro domestica permacta: & omnis caro falsa, omneq; falsamentum, atque animalium omnis caro, quæ in lacubus, paludibus, fluminibus, limosis uisum habent: præsertim si urbis circumspiciam populosa, purgantia, ut balnearum, lacinarumue, aut culinarum, in eas aquas defluant. Stomacho idonea sunt, inquit Celsus, omnis uenatio: atque utraq; uel assa, uel eluxa ex domesticis animalibus, bubula, siquid ex cæteris sumatur, mactum potius quàm pingue: ex sue ungula, rostra, aures, uulua; duri ex media materia pisces, ostrea, pedines, ma nees, purpure, cochleæ. Aliena à stomacho sunt omnia falsa, omnia pingua, cerebrum omne, & omnes medullæ. Ex his autem intelligi potest, nõ quicquid boni succi est, protinus stomacho cõuenire: neque quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse. Facile in uentre concoquuntur pisces, maxime saxatiles: autem genera omnia, si cum quadrupedibus cõteras. Ex quadrupedibus, nulla caro facillime concoquitur, uulua facilius q̃ bubula: hedina, quàm caprina: & omnium eorum carnes quæ adhuc adoleſcunt, facilius concoquuntur, quàm quæ ætate declinant: & hesternum, quàm recens necatum, facilius concoquitur. Caro caprina, bubula & ceruina difficiliter concoquuntur: & si uis cum senenit, & anno H sa omnia: anserum, turdorum, merularumq; & aucularum caroi quibus adhuc durior est turuna, palamibi & anatis caroi magisq; pauonis & turdi: rai, leuina, squatina, dracones, cuculi, strachin, mulli, & ex piscibus alij quidam: cochleæ, & ex cæteris testaceis, ea quæ duritiorem habent carnem, ut purpure, buccinæ, crustacea omnia, & quæ molliu uocantur.

Minima instano sit (inquit Celsus) ex uenatione, aucupio, piscibus, conchyliis, ouis, uel mollibus uel forbilibus. Instane autem omnis pinguis.

Minime intus utiantur aues, & ex potius duriores, atrati pisces, itam neque hi solam, sed etiam lollago, locusta, polypus. Instanque bubula, omniſque dura caro: adẽmque aptior est, si macta, si falsa est: omniſq; falsamenta, cochleæ,

Extrema per
na, maxime
huius uenat
Col
fua.
an aliq; p
na.

Exemplum.

Exemplum.

Exemplum.

Exemplum.

Exemplum.

Exemplum.

Exemplum.

- A terechiles, mutices, purpure, parvula chaner, & testacea alia quaecunque
durius habent carnem. Dantur uero his tunc elixa ut, quibus ob humores
cuiuspiam unum contumitur in ventre cibis. Facile autem intus cor- *et de m.*
rumpuntur lactentia omnia, teneri pisces, ostrica, lac, calceus, & vetus & re-
cens. Alium mouent lac & lactentia omnia, cochleæ, ostrica, pelorides, *et de m.*
echini, musculi, & omnes fere coctibili, maximeque ius earum: salamen-
ta, omnes teneri pisces, lepiarum stramentum: si qua caro assumitur pu-
gus, eadem uel uiolenta uel elixa, aues quæ nant. Cõtra, astringunt du- *et de m.*
ra oua, magisque si assa sunt, minuit aues, merula, palumbus, magisque si
in posca decoctus est, grass omnes aues, quæ magis currunt quàm uolantile
pus, caprea necur ex us quæ seuum habent, maximeque bubulum, ac seuum
B ipsius calceus, qui uehementior uetustate fit: in eadem carne, assa potius
quàm elixa. Urinam autem mouet, ex uenatione maxime lepus, pestan- *et de m.*
culi, purpure, & quæ coriphia uocantur. Ad tenuem uactus ratione ido-
nea sunt, pisces laxatiles, auriculæ montanes quæ enim in montibus degunt
animalia, omnia siocius præbent alimentum, minisque piratofum ac len-
tum. E diuerso sanguine in crassiore procreant, pisces grandiores *et de m.*
Genera uocet, ad est cetaceos) cuius generis sunt thummi, anguilla, cochleæ,
ostrica, & testaceum genus omne: & quæ mollia uocantur, ut lollignes, se-
piæ, polypi: caro ceruina, caprina, bouilla, leporina, porcina. Lencum glu-
tinofum succum gignunt suilla atque agnina caro, tendines omnes, &
quæ circa labra sunt partes atque lingua. Scire autem oportet, quæcunque
C crassius glutinosumque succum procreant, si recte in uentre ac seciore
concoquantur, optimum sanguinem efficere. Medium autem inter tenui
crassumque succum gignunt, gallinarum, phasianorum, perdicum, arage-
narum, merularum, omniumque paruarum auium caro. E piscibus, tam li-
torales quàm pelagici, goby, thurena, huglossi, & quicunque neque lento-
rem habent neque scitorem, neque aliis infusus sunt. In omni autem ge-
nere, ad salubrem uictus rationem præferuntur animalia quàm exercitatis-
sima, & quæ cibo siociore atque purissimo utuntur: quæ aut otiose de-
gunt, aut humidioris alimentis, aeris impuro crassoque uiuunt. Et ex pisci-
bus eliguntur, qui carnem teneram habent & friabilem: qui uero aut durâ
aut lentam glutinosamque reuoluntur: sicut & qui ex tenerrimo genere
B sunt: & ut paucis rem absolutam, duobus hisce indichis, quod scilicet mol-
les sunt & friabiles, omnium animalium carnes perpenduntur: quibus o-
mnium utrumque merit, tuto usque ad saturitatem edantur: cui uero neutri,
ab eo penitus abstinendum iudicium medici. Quod si cui alterum solum in-
sit, hoc genus quoque fugiendum admonent: nonnunquam tamen, ob a-
liorum inopiam in usu cibario esse solet, sed circa sanietatem acceptam: his
saltem qui sanietate tuenda student. In cibis quoque pituitosum succum ge-
nerant alia, ut testacea, caro agnina: alia melancholicum, ut bouina, capri-
na, & præsertim larcina raurinæque. Et nonnulla excrementosum pro-
creant succum, ut palumbi, anseres, & alie, quæ in paludibus aut stagnis ui-
citant aues. Porcina caro & ouilla, atque omnis nouellorum & domesti-

carumque.

eorum animalium caro, & eorum quæ ociose uiuunt: piscēſq; qui in lacu-
bus aut fluuiis limosis degunt, atque cetacea omnia. Nonnulla manuum
excrementa habent, ut fylueſtrum animalium caro, & eorum quæ in fic-
cionibus locis uiſitanti colla animalium & caudæ & alæ. Quin & ipſa
perparatione (quod ad alimenta attinet) differunt animalia: redditurque
nonnunquam & aliis & ſeipſis meliora detraſotære. Appatamus autē ea,
ſicuti & alios cibos: aut apponentes quæpiam, aut auferentes, aut modo
quodam immutantes. Sordes eluuntur: ingratum uero ſi quid ineſt ſaporis,
aut in humore macerando auferitur, ut ſallugo, aut elixando quæ enim ue-
hementer amara aut auſtera ſunt, ſi in aqua eluuntur, exuperantem illam
qualitatem exuunt: acia uero & mordacia in aceto diluto. Aſſorum quo-
que & elixorum uirus ſcſtōne, aut ſucci ipſius malitia, ſi qua adſit, partim **F**
auferitur, partim uero immutatur, & ab igne, & ab us, quæ cuique accom-
modata ſunt condimentis. Hæc Diocles. Differūt elixa ab aſſis, quod hæc
ſicciora, illa humidiora ſunt, ut Galeo placet atque Ruſo: contra Ariſto-
teli, elixa aſſis aridiora ſunt, aſſoremque externæ partes internis ſicciores:
cum in elixis è diuerſo, extremæ humectiores ſint. Ut tunc aſſetur, quæ car-
noſa aut pinguiſa ſunt, copioſiore indigent igne, æto autem, quæ macra aut
ſanguinis expertia. Non parū carnis diſcrimen contingit, ſi ſale macere-
tur: ſæpe namque fit, ut animal quod ſua natura ſit humidum, ſale in red-
datur albo, quod ſiccum natura ſit, aridius: & quæ edulia dura ſint, & ſua na-
tura ſicciora, eadem ſale macerata, reddantur ob nimiam ſiccitatem cibo
inepta: ſicuti contra, quæ excrementis abōdent, ſuccāmq; in ſe piſuiſum **G**
contincant undique permixtum, eadem ſale macerata euadant meliora.
Sunt quoque eadem ſapore grata, & tenuis uſtus rationi idonea, ſed à ſto-
macho aliena: & ſuccum gignunt non bonum, aliūſimque perturbant.
Diſcrimen quoque in illis nō paruum uel hinc oritur, quod alia duriores
habent carnem, alia mollem & ueluti ſturdam, ſicuti mediocrepialia. Rur-
ſum alia carnoſa ſunt, alia præpingua, & nonnulla graciliora macrius: &
quædam tændu, quædam uero non ita peſdem ſale condita ſunt. Sed de
ſalluris plura aliàs.

A medicamentis, quæ nobis præſtant animalia, quibus modis con-
ſtituuntur differentiæ.

Cap. I.

H

Non alimenta ſolum uariè nobis præbent animalia, ſed & medicas ui-
res ſuppeditant plurimas. Retū namque omnium parēs, nullum ani-
mal ad hoc tantum ut paſceretur, aut alia ſatiaret, naſci uoluit: quin artes
ſalutares inferunt & miſericibus: quippe cum ſurdus etiam tebus inferuerit,
cum uero illa animæ auxilia præſtantiffima, ex animæ alia eſſe uoluit, con-
templatione ante cuncta mirabeli. Exſiccant, humectant, calfaciunt, refri-
gerant, tum ex animalibus nonnulla, tum ex eorum partibus. Sunt præter-
ea quæ durities emolliant, ut adipēs atque medullæ: quæ concoquant, *μα-
μασίν* Græci uocant, ut cyſpus & butyrum. Pus mouent adeps uulturnus,
porcanus & butyrum: per halitum digerunt oſmalla, ut coagulam omne,
adeps

μασίν
μασίν
μασίν
μασίν

A adops leoninus, pantherarum & hyenar. Abstergendum habent, testaceorum omnium testæ, septarum ossa, erinaceorum uiscerum canes, lactis ferum. Causica uis cantharidi, boprestis, atque paryocampe: totis namque animalibus partum ulla, partum uero crudis nonnunquam absteruntur medicis. Torpedinem integrum capiti admotum eius dolores sanare trahunt. Terreni uermes triti, in potu ex passio urinam ciuntampolita præcæsis nervos glutinant. Limaces si totæ cum testis urantur, admixtis galla, omphacitide ac pipere albo, dysentericis murtice profunt. Hippocampi cremati cinis cum pice liquida aut argilla illitus, alopecyas replet. Per hæc potissimum, & si quæ huiusmodi alia possunt animalium generibus tribui, eorum dæfferentias constituendas censemus.

B

DE ANIMALIVM DIFFERENTIIS LIBER III.

De animalibus, quæ sanguine prædita sunt, partium exteriorum differentie. Cap. LI.



C

V. Æ in singulis animalium generibus repetantur differentie explicandæ iam est. Amplissima animalium genera, ut dictum est, hac ratione inter se differunt, quod hæc sanguinea sunt, illa exanguia. Sanguine prædita sunt, ut homo: quadrupedes, cū quæ animal, tum quæ oua pariunt (dixerim hæc *ovipara*, id est ovipara, illa *vivipara*, id est vivipara) atque etiam aves, pisces, ceteræ: & inter terrestria, quæ pedibus carent, serpentes. Caput habent omnia

D

animalia sanguine prædita: hoc, ut dictum antea est, superiorem in omnibus obtinet situm, corporis sui ratione: at homo solus partem istam habet respondentem parti sublimi universi, cū prona spectent reliqua fere. In capite paucis animalium, nasi volucris, apices. Cornua mulus quidem & aqualium, & macinorum, & serpentium, uariis data sunt modis, sed quæ rite cornua intelligantur, quadrupedum tantum viviparorum generi. Habent profecto oculos omnia præter talpam, quam modo quodam etiam habere dixerim. Et candidum oculi magna ex parte simile in omnibus est: ita quod nigrum dicitur variæ: alius enim ærum, alius modicum caesium, alius fulvum, alius caprinum est: & omnibus fere oculi in suo cuiusque genere unicolores sunt, ut bovis nigri, ouium aquiri: aborū rufi toto genere aut cæsi: nonnullorum caprinum, ut caprarum generis: at hominū oculos uarios uersicoloresque esse euenit. Cæterorum animalium, equus maxime uersicolor est: aliqui enim cæsi, altero oculo nascuntur, quod nulli fere ex cæte-

ris bellis euenit manifestant quorum oculi recens natōrū nō plus, quā E
 unum colorem habent sua natura. Genus hominum, quadrupedum tam
 uniparorum, quā ouiparorum, & animā, oculos uisus custodiendi gra-
 tia integunt, sed utriusque etiam animal patitur, geminam habent palpe-
 bram, & conuulere utraque solent. Aues graminiores, & quadrupedes ouipa-
 ræ palpebra inferiore conuulserit: columbæ autem & similia, utraq; .
 Præterea palpebrā non habent, sicut neque insecta aut crustacea. Cilium habet
 palpebris adiunctum omnia, quæ obinent pilos: aues, & quæ corneæ inte-
 guntur carent, ut quæ pilos habeant. Auriculæ alijs sunt, alijs defunt: in-
 tusq; parent quibusdam audiendi, ut his quæ penna aut corneæ integuntur.
 Quæ animal suam parit omnia auriculas habet, excepto uitulo marino,
 & delphino, & reliquis cetaceis: pisces uero auditus nullum continent mō-
 brum manifestum. Cetera sensus auriculas omnia mouent, uerū homo unus
 aurem non mouet. In his quæ spirant a animalibus, olfactus instrumentum
 modo quodam euanarique etiam unipara sunt, quibus maxillæ longæ ex-
 eunt in acutum, ut nares in nōta appellato continentur: ceteris explanator
 hæc pars habetur maxillis adiuncta: ut elephātus peculiarem hanc partem
 præ ceteris sortitus est animalibus. Aues uero & serpentes, & quæcunq; ex
 quadrupedibus sanguinis compositæ ouiparæ sunt, foramina quædam narium
 ante os habent, sed non ita explanata, ut nares appellari possint, nisi spirandi
 officio. Nares defunt ut quæ non spirant: ærem etiam hac quoq; parte red-
 dimus: atque accipimus efficiuntq; sensus olfactiendi per spirationem in his
 quæ obinent nares. Naribus labra subiacent ut, quæ simul & dentes habet G
 & sanguinem: anibus etiam cibi armamentiq; grana rostrum osseum habe-
 tur, non nares. Maxilla cum duplex sit, ut ante dictum est, superior scilicet
 & inferior, mouent animalia organa maxillam inferiorem, crocodilo flu-
 uatili excepto: ut enim unus superiorem mouet. Homo & uniparæ qua-
 drupedes maxillam inferiorem sursum deorsum, atque in latera agitant pi-
 ces uero, & aues, & ouiparæ quadrupedes sursum deorsumq; tantum mo-
 uent. Oris officium omnibus commune cibis conficiendis est: robur non-
 nullorum peculiare est: sermo aliorum: spirando etiam usus (ut scilicet quæ
 spirant) per os accedit. Fit itaque ut os alijs compressius, alijs amplius habe-
 tur: quibusdam etiam cibi tantum conficiendi, & spirandi, & loquendi gra-
 tia os datum est: atque ut compressius est: alius auxilij gratia: ut, si dentibus H
 sine ferratis, rescissum. Cum enim tota eorum uis in mordendo sit, huius
 oris amplior esse necesse est: plenus enim morsum intingit, quod amplius
 rescissum os sit. Piscum quoq; mordacibus, & carnuoris tale os est, sicut
 nō carnuoris in arcum se colligit. Aues, quod rostrum uocatur, pro labris
 & dentibus habent. Dentium serie os continetur & consistit: horum nana-
 ra communi quidem officio ad cibum conficiendum adiuncta est: quibus-
 dam tamen seorsum roboris gratia, tum ad inuadendum, tum ad defendē-
 dum, ut quæ ex sua natura carnuora sunt: alius auxilij tantum causa data
 est, scilicet ne male ab alijs afficiantur: quibus simul & auxilio & robori sunt
 dentes, hæc aut exertos habent: *quædam uero non est* ut fuscant acutos pecunia-
 rum

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.

- A**tim sese stipantes, unde ferraris dicuntur esse dentibus, *καταγρηστον* Graeci dicunt, ut pisces fere omnes. Dentium itaque tria genera, ferrati, aut cōtinui, aut exerti: ferrati postmanum cōcuntes, ne contrario occurſu atterantur, ut serpentibus, piscibus, canibus: continui, ut homini, equo: exerti, apro, hippopotamo, elephāto. Qui canis dicitur, fiant ferratis longissimi. Continui aut utraque parte oris sunt, ut equorum: superiores primores non sunt, ut bubus, ovis, omnibusque fere quæ ruminant. Nulli simul & ferrati & exerti sunt dentes: nec ulli, cui cornua, exerti. piscium omnibus ferrati, præter ita rum. Manibus dentes plures, quàm formis, ut in genere hominum, suum, ouem, caprarum patet: verum in ceteris nondum exploratum est. Quibus plures, hæc usuatiora magna ex parte sunt: quibus pauciores & rariore, hæc magna ex parte vitæ sunt brevioris. Cæteris cum ipsis nascuntur dentes homini postquam natus est septimo mense: reliquis perpetui manent, mutantur primores homini, leoni, iumento, cam, & ruminantibus: maxillares nullum animal mutat. Cæteris senecta rubescunt: equo tantum candidiores sunt. Lingua in ore palato subiacet: sed terrestribus fere omnibus modo cōsimili, cæteris dissimili, cum eorandem ipsorum, cum tenetrum comparatione. Hæc aut lata est, aut angusta, aut mediocris: quæ quidem optima & explanatissima est: utrum aut absoluta, aut constricta, qualis torcorum & balborum est, Graeci *ἀσπίδα* quædam uocant. Homo linguam habet absolutam, mollissimam & latam: quadrupes, quæ animal parium, duram, crassam, nec adeo absolutam. serpentes & lacerti longi habent, & bursam, piscium generi data est lingua impetrecta, ossica, nec fere absoluta, sed adherens. Linguae color varius est: pennde nāque eam, ac parte in aliquam esse exteriorem putandum est, qualis manus aut pes est, quāquam ore operiatur: itaque cum animantium colore variarū, cutis non sit unicolor, cutis quoque linguam ambiens varia erit. Linguam illam minorem operiendi munitram, quam *ἀσπίδα* Graeci vocant, quam etiam linguae partem aliquam esse diximus, ea tantum habent, quibus pulmo, & cutis pilo interfecta non cortex, non penna operimento est. Nullum enim ex his, quæ ovum pariunt, ut aues & quadrupes, superimpositā eam suæ arteriæ continet: sed meatum ipsam arteriæ, modo contrahunt, modo laxant, pro sui commodi desiderio: itaque ita efficitur, ne quid pōderis in pulmonem delabatur. Collum capiti subiacet, iis quæ ad habent animalibus: nō enim omnia habent, sed ea tantū, quibus aspera arteria productior est, æque gula. Asperam autem arteriam habent omnia, quæ pulmonem: eadem quoque & gula habet. Ea vero quæ carent collo: ut piscium genus: gulam hæc manifestam nō habent: & quidem à situ oris continuo venter esse potest, pulmo non potest. Collum itaque omnibus uniparis est: ouiparorum alius est, alius deest: quæ enim spiritum extrinsecus non accipiunt, carēt hac parte. serpentum etiam genus collū minime, sed proportionale collū habere videri potest. Hoc cæteris animalibus flexibile, & vertebis compactum est: ita lupo & leoni perpetuo esse riget. Quæ alimēta sibi à terra ore suppeditant animalia, collum habent longitudine cruribus æquale: ac homo, & quæ illi similia sunt ani-

DE DIFFERENTIIS

malis, brevius. Aures item quibus longa sunt crura, & collum longum, & E
præterea palmipedibus nonnullis: quibus brevia crura, us collum breve fe-
re. Pectus hominum latum, quadrupedibus arctius: aures pectus acutum,
carnosumq; omnibus est. Mamma omnibus negata est, quæ animal nequeat
generare: nec uero uniparis omnibus data est: sed us tantum, quæ protinus
animal intra se formant: nec primum ovum, deinde animal. Quæ pilis inte-
guntur, omnia mammas habent: & præterea cetera in aquatili genere. At ea
quæ ova pariunt, aut ovo intus concepito animal post in lucem excludunt,
hæc & mammas carent, & lacte, ut pisces, ut aves: lac enim fit us formans,
quæ animal statim intra se generat. Mammas homo sepe solus è manibus
habet: cetera animalia mammatum notas tantum. Mamas item uarie habe-
nt: certum est nam & inter se ipsæ quadrupedes, & ab homine mammatum F
differunt: ratione: alius enim mammas in pectoris parte priori sunt binæ, bi-
musq; papillis: ut homini: elephanto sub armis duæ, tam mari quam femi-
næ: perquam eæque, uisæ mammas habent quaternas. Alius mammas inter
femina binæ, papillisq; binæ, ut ouibus: alius papillis quaternæ, ut uacis.
Quibusdam nec in pectore, nec in feminibus mamas, sed in uentre habê-
tur, & quidem plures: uerum non omnes pares, ut canibus, ut suis. Cum
itaque cetera id genus habeant plures, pantheræ quaternas medio uentre
gerunt: camelus quoq; in uentre mamas duas cū papillis quatuor habet, ut
bos: leena etiam duas in uentre. Vmbilicū omnia habent, quæ uel utero ui-
uiparis, uel ovo ouiparis excludantur: sed aures iam adultis, hic de his sit
incertusq; est. Membrorū etiam, quæ ad ueneriū cotum accommodata habê-
tur, discrimen plene est: genitale maris, quæ animal gignunt, alius foris est,
ut homini, equo, & alius malis: alius intus, ut delphino. Quibus foris est, us
aut ante habetur, aut homini, & reliquis multis: aut retro. Quoniam us qui
ante gerunt, aut penis & testes absoluti pendent, ut hominibus: alio adhar-
rent & penis & testes: & aut plus aut minus absoluuntur: non enim pariter
pro & equo penis absoluta est: nec uero eodem modo ad alium omnibus
continetur, sed aliter us qui ex aduerso mangunt, aliter us qui ex auersio.
Alius itaque, ut diximus, testes absoluti pendent, ut equo: alius non sunt ab-
soluti, ut apio: elephantis non foris conspicuos, sed intus conditos habet.

Maris instrumentum alterum ab altero differt pro discrimine corporis:
alius cartilagineum carnosumque est, ut homini: alius nervosum, ut carne-
lo, ut ceruo: alius ossicam, ut lupo, ualpi, mustellæ, uicetræ. H
Augetur etiam & mutatur hoc membrū sine ulla ualitudinis mutatione: partium etiam ner-
uum, partum cartilagineum habet: itaque & contrahi potest & extendi, atq;
etiam flatus capax est. Parte eadem uiuitur natuta, cū ad humida excrementa
erunt, cum ad rē ueneriā: in sexu tum masculino, tum etiam feminino,
in omni uiuiparo genere. Atque hos quidem in usus omnia id genus, tam
feminae quam in maribus genitale habent, quo & excrementum humidum se-
cernatur: quoq; maribus genitura, & feminibus partus emittatur: parte scilicet
priori atque superiore, quibus se excrementum siccum meatus: diuersus enim
est in us meatus, quo excrementum siccum & quo humidum exit. Omni-
bus

A bus autem quibus deest humidi excrementi secretio, & quæ genitali caret, (etiam ouiparis, quæ vesicam habent, ut testudinibus) meatus idem siccæ excrementi, qui & seminis contritusque foris pertinet: antus uero alter iuxta habeturque quidem similiter tam in feminis eorum, quàm in maribus sunt. Caudam omnia fere non solum uiuipara, sed etiam ouipara habent: nam et si quibusdam magnitudine membrum id caret, tamè aliquid prominet, quod caudam describere possit. Homo unus cauda uacat: nares habet, quod nulli quadrupedi datum est. A collo & capite crura priora habentur: sed homo uice pedum priorum, brachia, & quas manus dicimus, habet, ut aues alas. Quadrupedibus autem pro brachijs & manibus, crura priora subdita sunt: posteriora uero bona omnibus gressilibus esse necesse est. Nullum quod pedibus consistit, excepto homine, crura habere carnosa perspectum est: sed nervosa ossulentæque sunt, carne autem deficiunt. Coraxum etiam carne exuberante in clune uacant omnia, quod in genere auium conspicitur apertius potest, at in homine contra. Homini pedes omnium maxime proportionem magnitudinis: seminis tenuiores in omni genere. Pedes quibusdam digitati: quibusdam uero solidi, sicut bisulci alius. Ex his quorum pedes in digitos finduntur, nonnulla quatermos digitos habent, ut aues alia quinos, ut homo, elephanti. Ex quadrupedibus uero nonnulli pedes priores quinos distinctos digitos habent, posteriores quatermos sed quæ paræ inter digitatas sunt, in posterioribus etiam quinos digitos obtinent. Ungues habent omnia fere quæ digitos, uti infra explicabimus. Humeri

C arminæ contra, quàm cubiti aut crura priora flectuntur omnibus, quæ ea possident: eorum etiam contra quàm suffragines. Flectit autem crura priora fere contra, atque posteriora: sed cetera è contrario, quàm homo membra inflectat: quadrupedes enim, quæ animal generant, priores pedes ante se flectunt: posteriores uero in auersum. Aues etiã suos inflexus similes quadrupedibus uiuiparis agunt: at ouiparis quadrupedibus, ut crocodilo, la-certe, & reliquis generis eiusdem crura, tum priora, tum etiam posteriora retro flectuntur, paulum in latus uergentia. Homo brachia retrorsum flectit, quanquam ita, ut paulum uergant in latera interiora: crura ante contrahit recte. Sed quod ante tam priora, quàm posteriora inflectat, nullum est.

Homo cum ad iusta incrementa peruenit, contra atque cetera fere animalia, quæ sanguine consistit, partem superiorem habet maiorem, quàm inferiorem: partem superiorem intelligi uolo, quantum de capite ad eam pertendit partem, quæ exitus patet excrementis: inferiorem autem, quantum ab ea ipsa subsequitur reliquam corporis. Animalibus ergo quæ pedibus inniti natura uoluit, crura posteriora, partem complent inferiorem: quæ autem pedibus carent, ut caudæ & quicquid uice caudæ similisque habetur, pro parte inferiore est. Et tales quidem perfectas iam incrementis, animalantes euadunt: discernimen autem in crescendo est. Homo enim priusquàm adulior sit, partem superiorem corporis habet maiorem, quàm inferiorem: & quò per ætatem amplius augetur, eò contrà euenit, ut scilicet inferiora sint superioribus longiora. Sunt quæ ex proportionem, incrementa partis u-

DE DIFFERENTIIS

trisque capere solent, ut canis. Nonnulla primum parte superiore minora E sunt, post minora cum creverint, eadem parte evadunt, ut iumenta. Partes extiores sanguineorum animalium, quibus differentis inter se differet, explicatum iam est.

C Sanguinea, vel sanguis præditæ, *sanguis*. D Cæsum, *caelum*. Pulsum, *perit*. Caput, *caput*. Aquini, *aquini*. Rasi, *rasi*. Varij ut nigris, *vari*. F Râstus, *rustus*. *rustus* sit hominum tantum: *rustus* & in canibus & aliis quadrupedibus *rustus* in subulis dicitur. Aristoteles tamen & in subulis *rustus* dixit. D Aspera arteria, *Plinius* aliter dicitur. Ceruix, inquit, nulla, nisi quibus utraque hæc, scilicet gula atque arteria ceteris collum, quibus tantum gula: sed quibus ceruix è multo vertebrelque ocellulæ cum ossibus, flexilis ad circumspicendum articulorum nodis magis leonum & lupi & hyæ singulis cellisque ossibus rigens. E Postus hominum cæsum latum, inquit Plinius, reliquis cæsum, vel cæsum magis. C Quoniam suffragines, *quoniam* *rustus*, id est, quibus poplitea aut suffraginea.

Interiorum partium discrimina in animalibus, quæ sanguine prædita sunt. Cap. LII.

EX interioribus vero, cerebrum omnibus animantibus datum est, quæ sanguinem obtinent, ut ante dictum est: hoc ut adipe pinguescentium pinguicula est, vel ut fatis: sic & bo obessorum squabulicula sentitur, ut ovis. In collo tendit arteria omnibus ad palmonem, gula ad ventrem perferret, ut arigens sepeum transveriam, in us scilicet quæ hæc habent: pisces enim arteriam illam asperam non habent, & magna ex parte gula carent. Sæpiam quoque utriusque, gulæ scilicet & arteriæ, similem habent omnia, sed discrimine species earum partium affert. Viscera eorum propria sunt, quæ sanguinem habent nulli enim ex animalium viscus ullum est: & quædam certe omnia habent, quibusdam aliqua defunt. Cor enim & iecur omnibus animalibus sanguine præditæ necessaria sunt: reliqua vero quibusdam defunt. Et in omnibus sanguine præditis primum omnium membrorum figuratur cor, ut Aristoteles author est: & in eo est innati caloris principium, sicuti in e sanguibus, in eo quod est cordi proportionale. at contra Galenus cor postterius iecore formari contendit. Statim vero cum consistunt quæ sanguinem habent, exiguaque admodum sunt, deprehendi cor, & iecur sine dubio possunt: & in ovis tria cubitis puncti iam magnitudine apparent: necnon in partibus abortivis perquam citi H gua cernuntur. Et in partium prima generatione, statim cor palpitare cernitur. Et vane quidem hæc habentur: neque enim cor simile habet ea, quæ corde prædita sunt, neque aliud, prope dixerim ex visceribus ullum. Cor, ut modo diximus, omnibus est, quibus sanguis: estque prorsus in medio pectore in homine, & omnibus præterquam piscibus suo turbinato mucrone tendit in priorem partem. Discrimina cordis, quæ amplitudine, exiguitate, duritia, mollitia exstant, vel ad mores pertinent aliquatenus: quæ enim sensu hebetiori sunt, cor habent durum & spissum: quæ vero sensu valent, mollis: quæ autem parva sunt, vis cor grandius est: cor enim magnum proportionem fere omnibus est, quæ aperte timida sunt, aut propter metum

A metum mælica, ac audentiora fidoniorisque, natus aut mediocres. Pulmo non omnibus datus est: quæ enim branchias habent, ut pisces, carent pulmonibus: quod nanque idem simul & pulmonem habeat & branchias, nullum adhuc animal usum est. Verum quæ spirant, omnia pulmonem habent, ut sanguinea pedestria omnia: & aquatilia nonnulla, ut balena. Pulmo omnium bipartitus esse solet: verum in us quæ animal generant, distinctio non æque apparet, munusque in homine: ac in ouiparo genere, ut in iunibus & quadrupedibus, quorum parvis oui primordio inchoari solitus est, pars altera pulmonis multum distans ab altera est, ita ut binos habere pulmones videantur: atque à singulari arteria partes in utrūque pulmonis latus duæ dependent. Pulmonis distinctio varia est: alius enim sanguineus ma-

Bgnusque, alius minor, fungosus, & minus habens sanguinis: quæ enim uivipara sunt, maiore, & copia resortu sanguinis habent: quæ contra ouipara sunt, quales sunt lacertæ, testudines, serpentes, atque aves, exigui & siccioris, sed aptius ampliari atque extrinsecus cum inflatur & probe dehiscenti us etiam bibendi exiguum est. Septum transversum habent omnia, quæ sanguinem obtinent, æque ut cor & iecur, quæ omnibus insunt, ut tam duximus, sed varie: tam enim iecur aliis multifidum est, aliis simplicius, uel in eorū genere quæ uivipara sunt: sed longe magis piscium iecinora & quadrupedum ouiparorum, tum inter seipsa, tum ab aliis dissident. Animum iecur maxime simile est iecori ouiparorum: imputo enim, & sanguineo colore exhilaratur: ac uero quadrupedum ouiparorum iecinora, maxime parte pallidit-

Cuscula sunt. Iecur si non fissum est, dextro latere tori continetur: sin à principio usque fissum est, uelut in his quibus nullus aut exiguus admodum lien, & uelut non tantum gratia habetur, in his, in quibus iecur bipartitum est, & dextro latere maior pars applicata est. Quibusdam uero partes ita sepoliæ sunt, ut bina esse iecinora videantur, nec eadem origine contineri: ut inter pisces galeorina præcipue generis: & inter quadrupedes, leporū generis cuiusdam. Iecur è uisceribus adipem nonnullis consistit, ut inter aquatilia cartilagineis: quorum iecinoribus colloquatis oleum facimus. Lien magna ex parte, omnibus quibus sanguis est: sed magne parti eorū, quæ non animal, sed oua pariunt, lien usque adeo exiguus est, ut propemodum sensum effugiat: quod magna in parte uul, & quadrupedibus ouiparis experitur. Ut lienis magnitudo, ita neque color idem omnibus inest: quippe leo, canis,

Domniisque fœstia & calida animalia nigram admodum: alius uero humidioris & singidioris magis candicantem habet. Fel enim habet maior pars animalium quibus sanguis: alius adnectitur iecori, aliis uero in uisceribus, ut piscibus quibusdam. Et alius quidē deest, ut quadrupedibus quibusdam uiviparis: & inter cetacea, Delphino. Aues autem piscesq; omnes fel habent: & quadrupodes quæ oua pariūt, dixerim in uniuersum omnes, aut plus, aut minus felis sortuantur. Hæc Aristoteles. Galenus uero, quæ iecur habent, inquit, is & lien omnino inest, & meatus, qui bilens recipiunt: est uelica ipsa, quæ bilis colligitur, non sit omnibus concessa. Retiem & uelice similis ratio esto: in tabus enim quæ sanguinem habent pulmonem, utranque

membrana natura tribuit: quæ autem oia partiant, ut aues, piscesq; & serpen- E
tes, renibus vesicisq; carent. Quadrupedum etiam, ouipararum, una testu-
do marina habentis enam tantum ea tribuere uoluisse natura uidetur, quæ
pulmonem habent sanguineum, quæ omnium maxime animalium sin-
tibunda sunt. Ventre in habent omnia, siue quidem simili, septe enim tran-
uerso continuo subest) magnitudine tamen ac specie dissimili: quadrupe-
des enim uisui paræ cornigæ et altera maxilla dentatæ, quæternos habent si-
nus, quæ quidem & ruminare dicuntur: in uero quæ uisui paræ sunt, & de-
tatæ maxilla utraq; uentrē simplicem parauimq; habent, ut homo, canis,
fîs. Differentiam autem duplicem fere omnia recipiunt, quæ utrinq; den-
tata sunt: alia enim canino similem, id est paruum, nec multo ampliore
intestino, leuēque intus alia fuallo, qui amplior est, mediocres quosdā ha-
bens cancellos rugasue, ut *uæes*. Grati uocantur: atque hæc tam in maiore, q̃
in minore animalium genere: sed discrimin en in us quoq; magnitudine,
figura, corpulentia, exilitate oritur. In ouiparis etiam, quadrupedibus sci-
licet, serpētib; atque piscibus eadem fere ratio est: uenter enim is unius
& simplex, sed figura uaria est: & piscibus etiā appendices extant circa uē-
triculum, alius plures, alius pauciores. Aues etiam inter seip̃as, & à cæteris
discrepare animalibus uentriculi ratione apertum est: alius enim ingluuires
præposita uentriculo est: alius ingluuires deest: nec desunt, quibus uētriculus
ip̃e similis sit ingluuires: parta plurimæ carnosus callosusq; est. A uentre
natura intestinalium posita in omnibus est: differūt autem inter se mag-
nitudine, crassitudine, replicamentis. Sunt certe maiora intestina non utrius-
que dētatis, nec immerito: nam ipsa ita dentata, omnia sunt inchoata: pau-
ca enim parua in eo genere habentur. Est uero intestinum, alius quidē sim-
plex & partibus omnibus simile, ut piscibus, alius uero dissimile: quosdā
enim, parte qua uētri iungitur, laxus est, qua desinit arctus, ut canis: sed ta-
men maiori animalium numero arctius parte superiore est, latus inferiore.
Quæcunque enim intestina habent minus recta, sed anfractus orbēsq; H
lures continēt, iis omnibus in latius tendunt: & quod colon uocatur ha-
bent, & cæcū in quiddam ac tinudum: mox arctatur, & in anfractus com-
plicatur. Ab hoc rectum ad exitum usque excrementi pertendit: quæ
pars alius pinguis, alius sine pinguis est. Quæ igitur continet: maiora esse ad cibi
desiderium conuenit, hæc sua in alio inferiori, neque intestinalium sinus H
latiores magnosue habent, nec intestino utuntur rectiore, sed quod anfra-
ctus orbēsq; plures continet: latus enim intestini undatatem auget cibi:
rectius modo accelerat ad exitum. Indēque fit, ut animalia quæ uel simplex, nec
adeo in anfractus conuolutum habent intestinum, uel conceptacula inte-
stinalium ampla, cibum aut copiosum capiunt, aut celerius repetit. Appē-
dices habent quædam infra, parte intestini extrema: ut aues, & ex ouiparis
etiam animalibus nonnulla. Lactes quoque & omentum habent omnia,
quæ sanguinem: sed alia pingue, alia macilentius oritur id, & depōder in us
quæ animal generant, eademq; dentata utraq; parte sunt, à medio uētre,
quæ ueluti quædam futura ducitur (inest enim & in uentre, ut in corde, su-
unt

A tunc uestigium quoddam nec secus in iis quæ altero dentium ordine carent,
 à maiore uentre dependet. In aliis quoque animalibus sanguines uentricu-
 lo intestinisq; & in quæ sub sepro sunt, uisceribus præcedunt: maximè
 hoc habent homines & simia. Quæ uero partes ad generationē ministrant,
 scemini omnibus inuis conditæ habentur: maribus enim multiplica diffe-
 rentia exornantur: alii enim testes nulli omnino sunt, ut piscibus, serpentibus.
 nulli denique quod pedibus carent, testes adfunt, nisi intra se formare ani-
 mal possit, ut delphini: aliis sunt quidem, sed inuis quibusdam, ut aubus:
 quibusdam foris dependent. Et in quæ intus continet, aut lumbis adheret
 circiter sedem renum, ut aubus & quadrupedibus omnis: aut in ultima
 alius parte priore conduntur, ut delphini: ex iis quæ pedibus uacant, & ele-
 phanto ex iis quæ quadrupedes sunt: omnibus enim quæ animal generant,
 testes ante habentur, uel intus, uel extra, præterquā cetaceo. Quibus ita-
 que testes intus continentur, iis protinus cū mestibus seminatus intus fir-
 mantur: quibus autem foris sunt, horum quibusdam, ut modo diximus, abso-
 luti pendent, ut homini: alii non sunt absolui, sed alio adherent, ut apro.
 Qui intus continet suos testes, eos nulla cura habent obductos: quæ autem
 foris, hæc eos ictos in conceptaculum, quod scortum uocamus, gerunt.
 Omnibus autem quæ ora edunt, siue bipeda, ut aues, siue quadrupeda sunt,
 testes lumbis annexi infra septū continentur, uel candidiores, uel pallidio-
 res, acutius admodum tenuibus circumdari: meatus singuli de singulis per-
 tinent, eadēque coeunt supra ostium excrementi, sicut & in piscibus se-
 C penitissimè: quæ res meatus, qui ex coitu amborum consiliū, genitale est:
 quod in minoribus latet in maioribus uero, auferunt dico & reliqua huius-
 modi, euidentius est, cum recens inierint. Iis quæ foris testes habent, mea-
 tus utrinque bini à uasis illis maximis, quæ per dorsum feruntur (uenā dico
 magnam atque artotiam, quā scortum uocari diximus) dorsum pertendunt
 ad eam partem, quæ *ἀνὰ σπῆν* dicitur: est autem *ἀνὰ σπῆν*, ut nomen ipsum
 indicat, testium superimposita capiti, ex qua meatus quidam ueluti fistule
 seroso quodam humore plena in testes permeant, suisq; partem quandam
 exiguam ipsis distribuunt, atque ita testibus committuntur. A capite dein-
 de ipsorum testium meatus utrinque oriuntur singuli, superioribus illis spissio-
 res atque neruosiore, (meatus uocāt, aut uasa seminaria: alii uero me-
 D *ἐσπῆν*, *ὑπὸ σπῆν*, quasi uaricosos dixerit) qui inde progressi masculinamque
 sese flectentes, in idem postea coeunt, & ceturacem subeunt genitalis, humo-
 rem ita habentes in se candentem, quæ *ζοῖα*, id est generura dicitur, quā
 ab epodidymu ad penis meatū defert. Quæ uero testibus carent, ut serpentes
 & pisces, meatus & ipsa seminarios cōtinent binos, qui de sepro exortu la-
 tus spinae utrinque perreptent coeantq; superne, & ad spinae locū in unum,
 atque ita ad ostium excrementi sinant. Testes animalium, & quæ semina-
 ria dicuntur uasa, ita se habere cognatum est. Pars autem seminarū ea, quæ
 semen recipit, nō meatus, ita *ἰσχυρὸς*; quidam est, sed uterus amplior. Vteri
 autem bipartiti omnium sunt: sed nec eodem situ habentur, nec similes om-
 nium sunt: sed differunt, tam eorum quæ animal generant inter se, tum

- A dem in omnibus habentur. Nec uero æque in omnibus pariter uenarum fenestres potissimum in eis constat, quibus sanguinis copia & præcipua magnitudo est. Nam in minutis, sanguinis inopibus, uel per nanicala, uel per immodicam corporis obestatem, hæc æque inspicari possunt: alteris etiam incatus quasi canales multo intersepti limo uix conspiciuntur: alteris pariter, eademque fibra potius quam uenæ habentur: una tamen, quam maiore in ea præcipua magnitudine cognominamus, potissimum eundem in omnibus etiam minutis animalibus est. Copta sanguinis in primis in animalibus inest, quæ animal & intra se formant, & in locum eductis mox in sanguinetis, quæ parant oua. Præpingua omnia sanguinem quantum purum, tamen paucum habent: & quo plus pinguedinis, eo minus possunt.
- B Sicut sanguis pinguis etiam omnis crassus est. Discrimina utro sanguinis ad sanguinem, qui melior sit aut deterior, hinc habentur: alius enim tenuior, alius crassior est: & alius syncretior, alius turbulentior: item alius frigidior, alius calidior, tam in eodem animali, quam in diuersis. Quorum enim sanguinis parte conueniunt superiore, his differentis discrepat cum inferiore: inferioribus namque partibus crassior & acrior est, quam superioribus. Animalium, fortiora quibus sanguis crassior: sapientiora, quibus tenuior: quibus minimus hebetior. Dormientibus porro sanguinis copia partes exteriore desinit, subit interiores, ita ut adacto cultello non æque effluere possit. Feminus sanguis nigrior & crassior quam maribus est, dummodo cætera adfuerint pariter, quæ uel ab ætate uel à sanitate proficiuntur: & minus sanguis per summa corporis seminaris est: plus enim parte interiore continetur. Atatum etiam ratione sanguis discrimen, tum in modo, tum in genere, (hoc est in quantitate & qualitate) recipit. Extremum in ætate iuuenilis, sanem trahit & copiosior est: in senectute autem crassus, niger, & paucus: mediū tenet in media firmaque ætate. Concreuit etiam facile senium, uel in corpore sanguis, qui per summa est, quod idem nunquam in iuuenibus euenit. Quibus datus est sanguis, isdem omnibus nerui adiuncti sunt: sed quæ nullis habent articulum flexus, priuatæque pedibus & manibus sunt, is prætenues incertique habentur: quapropter in piscibus, qui iuxta pinnae positi sunt, præcipue ueniunt in conspectum. Ossa habent, quæ sanguine prædita sunt omnia, aut aliquod, quod uice fungitur ossis, ut spinam, cartilaginem, ossa, inquam, caluariam, maxillas, dentium genus, uertebrae quæ spinam constituunt, & pectoris ossa: nullum enim animal est, quod circa uentrem ossa habeat. Sunt item ossa humerorum, & quæ scapula appellantur, & quæ us annexa dependet brachiorum & manuum ossa saltem in homine: & modus idem compaginum uel in eis est, quæ crura habent priora. A coxalibus ossa iam crurum oriuntur, quæ græco nomine *καλκ* dicuntur. Ab eis ossa pedis subeunt. Quæ igitur ex sanguine pedibus animal generant, hæc ossa non multo diuersa habent fere, sed ad proportionem tantum modo, duritia, molliore, magnitudine, figuræ uel multitudine discrepantia. Colla homini tantum octona, inquit Plinius, subus denæ, corrigentis tredecim, serpentibus ingenta. Ossium item

animalis eiusdem, alia medullam intra se continent, alia minime: sunt enim nonnulla, quæ suis in ossibus nullam omnino medullam habere videantur, ut leo. Cæterorum animalium sanguineorum ossa aut paulo differunt, ut asinus aut proportionem eadē sunt, ut piscium. Qui enim inter eos animal generant, cartilagineam pro spina habent, (αποσπένδα Græci vocant) ut ea quæ cartilaginea appellantur qui autem omnia parviunt, spinam continent, quæ perinde ut spina dorsi in quadrupedum genere habentur: omnia namque animalia quæ sanguinem habent, dorso constant, aut osseo, aut spinæ, aut cartilagineo. Cætera ossa alia sunt, alia defunt: ut enim partes corporis quæque habentur, ita ossa quoque ad partes accommodata habentur quibus enim crura & brachia desunt, ut petrae aut culinae cuius defunt: nec vero quibus partes eadem quidem sed dissimiles sunt, eadē ossum ratio servatur sed aut platis minorisve modo differunt, aut proportionem. Ossia igitur ita se habent. Cartilago terrestrium, quæ & sanguinem habent & animal gignunt, nullo foramine habet, nec ossum more medullam continet: ut vero aquariorum cartilagineis, quod per dorsum proportionatum ossibus tendit, cartilago est, humorem in modum speciem continens. Cartilagine constant gressuum, quæ animal gignunt, auncula, uares, extremitatesque ossium nonnulla. Ungues habent omnia fere, quæ digitos: alia vero, quæ scilicet solidos pedes habent, ut equus, pro ungibus ungulas obtinent, quæ autem basilicos, chelas. Quæ habent ungues, aut rectis ungibus sunt, ut homo: aut aduncis, ut inter pedestria leo: inter volatilia aquila: simæ umbricati sunt, & homini latr. Pilos habent, quæ pedestria eademque, G unipata sunt, cortice autem integuntur, quæ ouipata sunt pedestria: squama vero pisces marum. Differentiæ autem pilorum existunt duritie, molitie, longitudine, brevitate, rectitudine, crispitudine, multitudine, paucitate: ad hæc coloribus ut albedine, nigredine, eorumque modus. Crassitudinis, tenuitatis, copie, magnitudinis pilorum discrimina pro partium quibus adhaerent conditione, atque pro cutis qualitate proveniunt. Fit enim magna ex parte, ut pili duriores, & crassiores cuti crassiori enascantur: plures autem & longiores humidioribus (dummodo sint ad gignendum pilum idonei) prodeunt. Regionum etiam tepore & frigore differentia efficitur pili hominum locis calidis duri, frigidis molles oriuntur. Sunt præterea molles, qui promissili duri, qui crispi. Nonnulli pili paulatim adeo duritie dege-
nerant, ut non iam pilis, sed spinis similes esse videantur, ut erinaceorum.

Differunt & colore alius enim niger pilus est, alius albus, alius flavus, & rufus alius. Et colorum causa cæteris animalibus cuius natura est, & ut unicolora sint & varietatiborum enim alba est cutis, variorum petriarumque partium alba partium nigra esse conspicitur. Sed homini nihil cause cuius affert, (qui enim sunt albi, admodum nigras habent capillos), nisi quandoque ad canitiem, videlicet eam quæ morbo, non quæ senio accidat: nam co-
lurio corporis, quæ alba, id est vitiligo vocatur, pili efficiuntur albi. Mutatur color pilorum in senectute, candidique pili efficiuntur in hominibus: quod vel cæteris animalibus accidit, sed non adeo aperte, præterquam in equo.

- A equo. Pilos habent cetera animalia, nec intra os, nec parte pedum resupina: lepori una pali in bucca, & sub pedibus sunt. In sanguineis animalibus sunt & membranae, ut antea exposuimus, caroque & quod caru simile est & praeterea sebum & adeps: sebum enim habent, quae non utrinque dentata, sed comigera sunt. At uero genus utrinque dentatum & cornutum exceptis & multitudine, uter seu adipem habet. Animalia quaeuis aut intra carnem, aut seorsum pinguescunt: quibus autem pinguae separatae non est, ea minus per uentrem omentumque pinguescunt, ut anguilla: plurima tamen pars animalium uentre pinguescit, & praecipue quae parum se moueant. Seceriores cuncta, pingua & in maribus & in feminis. Senescunt celerius praepingua: quaedam non pinguescunt, ut lepus, perdix, auctor Plinius.
- B Semen genitale habent omnia, quae sanguinem: non eodem tamē modo in omnibus est, sed quibusdā pro genitura, & id est genitale urus sui generis habetur, ut pueris. Lentum semen est pilos habentium, ceterorum nullam habet lentitiam.

C Feminis sanguis nigrior, Contrā Plinius (nisi exemplaria sūt mendosa) masculis galem feminis nigrior, & in iuuentu magis quā seris. D Scopula, Theodorus lespulas uocat. & alio, Theodorus pernas aut culnas interpretatur. G Difformis & coloris, De his fufius apud Galenum secundo De temperamentis libro.

Eorum quae ad generationem pertinent discrimina, in iis quae sanguine praedita sunt animalibus. Cap. LIIII.

- C I N omnibus sanguine praeditis, paucis quibusdā exceptis, ut piscibus nonnullis, sexus discrimen ita habetur, ut alterum mas, alterum femina perfectum in euadat. Coitus autem in iis, nec similes omnibus sunt, nec similem in modum aguntur. Eorum enim quae pedestria uiuipara sunt, magna ex parte modus quidē coeundi idē est, femina scilicet mare superingrediente uerum non omnia simili modo coniungūtur. Aliis coitus completus mutuo supinarum partium agitur, ut serpentibus, murenis & laceriorum generi: alia, ut pisces omnes, exceptis planis cartilagineis, ad motus inuicem partibus supinis copulantur. Auct mare feminam superueniente coeunt. Morantur in coeundo diutius omnia quae animal generant, q̄ quae oua. Cum uero tempora coitus descripta, & aetates certas ad uenerem singulis animalium natura fixit & statuit: quae tamen cum homine uiuunt pedestria coitum nullo tempore aspernātur, uelidelicet propter teporem, & pabuli ubertatem: quorum tempus etiam getendi ueri breue est, ut fuis, ut canis, ut uolocrum quae sepius parūt. Semel anno magna pars syluestrium animalium pariterum eoru quae animal generant, quā quae oua, quae scilicet non ut lepus superfecundant. Omnium maxime animalium grauida coitum patiuntur mulier & equa: cetera ubi grauida fuerint, fugiunt in ares ea scilicet quorum natura superfecundare more leporis recusat. Quae sanguinem habent omnia, aut animal pariūt, aut ouata, nisi omnino sterilia sint: bipedum solus homo animal generat. Semen ubi à coitu infusum ē in utero fixum, aliquandūq. coactum, membrana obducitur: quippe quod si

antequam articulis discernitur membra, nascitur, uelut osum in sua mē- E
bracula consentiam apparet detractio putamine: membrana autem ipsa ue-
nis testata est. Omnia uero tum nascitila, tum pedestria, tum etiam uolati-
lia, siue animalia, siue omni forma procreantur, simili modo gignuntur: nisi
quod alia umbilicum habeant uelut adherentem, uidelicet quæ animalia
forma enascuntur, alia ouo, alia utroque modo, ut in quodam piscium ge-
nere, cartilagineo scilicet. Pari quoque modo tam in uisparis, quam ouipar-
is uocantur ea, quibus obuolutus est fœtus, ut inect membranas antea di-
ximus: aliter secunde Græci γῆδο dicunt, aliter membranz, quas γάρδο & ἐν-
λαρτιδ uocant nonnulli. Augentur omnia animalia, quibus est umbilicus,
per ipsum umbilicum. Est autē umbilicus uena in aliis simplex, in aliis mul-
tiplex (in maiore enim animali plures sunt uenæ, ut in boue: bene in me- F
diocribus singule in minimis, ut Aristoteles author est) quam uenam pu-
tamen cuticulari ambit, quod & umbilicus uocatur: uenæ autem quasi ra-
dices aguntur, per quas alimentum haurit fœtus. Hæc Aristoteles. Galenus,
Cœlius, inquit, in unam, & uenæ, & artenæ, quæ à γῆδο membrana, id est
à secundis producuntur in fœtum atque ex eo coitu, coniungū fit utrorum-
que unorum, quod in umbilicum inferitur. Animalia quæ non utrumque
dentata sunt omnia, etiam detatorum utrinque, quorum uterque uenâ non
singularem habet pertinentem grandē, sed pro una plures frequenter con-
tinent, hæc in utero habent, quæ acetabula appellantur, in quæ umbilicus de-
uocat atque adheret. Sunt autem acetabula, uasorum ora, quæ in ualuâ pe-
ne trahi: & in quæ ueluti in manum mas et ponitur à natura fœtui alimentum G
sanguinem, quæ ferendi utriusque tempore, quantum scilicet fœtus sit minor,
nec multum alimenti assumere possit, in matrem promanet, in puillarum
(ἡσυχαστῶν uocant) & inflammationum morem: & conspicua maiorisque
sunt, non aliter quam in recto intestino hæmorrhoides solent fœtus uero ac-
etescens proficiscentisque ad exitum, minora subinde redditur, denum-
que confidunt, obliteranturque, cū perfectus iam est: minora utro & utrinque
dentata nonnulla acetabula uteri carent: tendit umbilicus is in uenâ sin-
gularem, quæ per uterum mascula fertur: ians quæ ouo nascitur omnia
incrementum foris recipere abunda ab utero apertum est. Sicus in ute-
ro quadrupedum omnium extensus est: expeditum aut in obliquus, ut pi-
scium: hypodum uero inflexus contractusque, ut auium, hominum. O- H
mnibus æque animalibus, dum in utero continentur, caput primum supe-
rius est: sed cum cœterunt, & iam exitum appetit, deorsum deducitur: ita
fit, ut omnibus pariter secundum naturam in caput, contra naturam in pe-
des, aut inflexo circūactoque corpore agatur. Animalia quoniam natura im-
perfectior est, conceptum cum perfectus iam est, sed nondum animal per-
fectum foras edunt perfectum autem est animal, cum conceptus iam aut
mas, aut femina est, scilicet in quibus sexus hæc differentia habetur: sunt
enim quæ nec matrem nec formam generant: uidelicet quæ & ipsa nō ex
formam, matremque & coitu animalium procreantur. Quæ autem animal
intra se generant, scilicet nature perfectæ animalia, quousque animal pa-
riant

Umbilicus,
in fœtu.

Acetabula,
in utero.

A riant, forſiſque emittant, gerunt intra ſe innoxium quod ſignatur. At uero quæ foras animal parunt, cum intra ſe prius ouû genuerint, eorû nōnullis ouum iam perfectum abſoluitur, ut eorum quæ foras parunt ouum, atque ita animal ex ouo intra formam naſcitur: alius cum alimentû in ouo contentum abſumptum iam eſt, perficitur ab utero, atque ob eam rem ouum utero non abſinguit. Atque hoc fere carentia uero uſum pſcium differentia eſt, de quibus poſt ſortum per ſe differemus. Partus cæteris animalibus nimirum laborioſi eueniunt: manus enim cum paruntur inſectari uidentur: ac mulieribus dolores uehementiſſimi incidunt. Poſtquam conceperit forma, deſinit hæc atque exſtinguitur, tam in homine, quàm in quadrupedum uſiſparo genere. Habent quod coagulatum uocatur, omnia quæ plures com-
B uincunt uentres: carent fere quæ unum habent, excepto le pore.

Morû actionûq; & affectionû quarundâ aliarû differentia. Cap. LV.

Sanguinei generis multa temporibus quibuſdam ſe condunt, ut ea quæ cortice inſecta ſunt: ſerpentes dico, lacertos, ſtelliones crocodilos ſtimuliles. Piſcium etiam cōplures latere nouimus, alios hyeme, alios cū æſtate: & præterea aues nonnullas, ut hirundines. Quadrupedum etiam quæ animal generant, nonnulla cōducuntur, ut hiſtrices, glures. Et ex his nōnulla exiunt id quod ſeneſtus uocatur: ueluti ea quæ cortice molliori inſecta ſunt, ut ſerpentes: & lacerti. Maſora ſunt quæ ſanguinem habent, quàm quæ non habent: & in his magna ex parte, quæ maſora perfectioriſq; ſunt animalia, **C** plus temporis uiuant: ſed tamen non omnia maſora ſunt uiuaciora: homo enim plus temporis, quàm quoduis animal uiuit, excepto elephante: quam homo minoris eſt incrementi, quàm ueterina & alia multa. Singulis generibus pro ſua natura cibus ſtatutus eſt: nec omnibus eadē eſſe in cibo idoneum, cum in multis palam eſt, cum omnium fere conſenſu in cenis pateſcit, qui uiperæ edunt, quibus cætera moriuntur: & Lucretius,
 Præterea (inquit) nobis uer atrum eſt acre uenenum
 At capreis adipēs, & coturnicibus auget.
 Atque uidere læt pingueſcere ſæpe cicuta
 Barbigenas pecudes, homini quæ eſt acre uenenum.

D Eorum quæ in his alimentû aut medicamenti rationem obtinent, discrimina. Cap. LVI.

A limenta quæ ex his animalibus ſumuntur, non parum præ ſe ferunt differentiam: non omnium etenim caro (quæ maxime in uſu cibario eſt) idem præſtat nutrimentum: quædam hoc ipſum tantum ſunt, alimentum ſcilicet. Alia præterquam quod nutriunt, habent & medicam quidam facultatem: nempe ut excaſſando, refrigerando, humectando, ſiccâdōne corpus noſtrum immutent: ut uiperarum carnes, cum in anguillarum morem condiuntur, caſſant palam, deſiccantq; & corpus totum per cutem expurgant. Alia medicamenti duntaxat uim habent: eorum quibus quotidie uſicimur, quæ domeſtica ſunt, onofcæ; uiuunt, carnem habent humi-

DE DIFFERENTIIS

diorem, & quæ magis extremis abundet: quæ uero syluestria, duriorem & excrementosâ, uacuum: & quæ lacustribus palustribusue locis, aut in flumina-
 bus immundis ac turbidis lutoisq; degunt, deterrimam habent. Cômune & hoc quoque, & uolucibus & quadrupedibus, longe perstantiorem, concoctusq; faciliorem esse carnem eorum, quæ adolefcent, quàm aut rectes
 natorum, aut iam senescentium. Hæc enim dura est, nervosique & arida: ideoq; & concoctu difficilior, minusque alimentû præbet: illa uero mucosa, præhumida, atque excrementosa est, eorum præsertim animalium, quæ suapte
 natura humidiores sunt carne, ut agni & suæ uerû herdi & uisula, ut qui natura sunt sicciores, melius multo & concoquuntur & nutriunt. Sacuti enim in humidioribus natura animantibus ipse gratis flos temperie in affect
 mediocrem, ita in siccioribus itas adolefcent, & quæ adhuc crescat: nam **F**
 quod præhumidum est alimentum, ut distribuitur, ita etiam celerius discor-
 nitur. Non lóge post tempore, quàm macerata sunt animalia (inquit Rufus) coqui solent, ex quadrupedibus suilla caro, & ouilla atque caprina: ex avi-
 bus turtur, columba, & tardus alutius seruantur uenatio omnis, & bubula
 caro: maiores quoque aues & palustres: & gallinaceum genus, phasianus, perdix, pavo, & anatæna. Piscium genus omne sere, uel antea quàm exipret,
 coquendum est: haud facile namque seruari patitur. Castratorû animalium carnes in suo cuiusque genere præstantissimum caro, si cum quadrupedibus conderas, minus præstat alimentum. Pisces leuiorem cibû præstant, quàm ca-
 ro suilla, quæ inter domesticas quadrupedes leuissima est: & alimentum quod ex piscibus proveniat, sanguinem procreat tenuiorem, quàm quod **G**
 ex pedescribus animalibus, & qui non tam abunde nutriat. Ex piscibus ta-
 men nonnulli teneriorem, alij duriorem carnem habent: quæ certe appellat-
 ur, eorû caro dura est, maly, succi. Quod uero ad medicas vires attinet, syluestris suis caro uehementius exsiccat, quàm domestica: hæc siccior omis est, oue capra hanc bos superat, illum denique leo. Erinacei utriusque usi
 cinerem ulcoribus sordidis imponere quidam: hirsutinum quoque com-
 bustarum cinis, cum melle guttatis affectibus medetur.

Ex animalium sanguineorum partibus, alimentorum medica-
 minumque vires diuersæ. Cap. LVII.

E Reliquis animalium partibus, oculi à paucis eduntur. constant autem **H**
 ex partibus dissimilibus: alia namque tunax fortitè sunt naturam, mu-
 scula aliam: denique humores aliam, qui crystalloides & hyaloïdes uocan-
 tur, in quibus soli masculi facile concoquuntur. Lingua (ut diximus) car-
 ne substantia est rariore, minusque continens sanguis: huius natura fere
 glandulosa est: & glandula ipse à linguæ substantia tantum recedere, quàm
 lingua ab ipsa carne. Omnibus autem glandulis illud commune est,
 quod in cibo suaves pariter & friabiles sentiantur: siccum gignunt cras-
 siusculum. Mammarum autem lactantium certe animalium (idcirco appel-
 lant) habent à lacte comparatam dulcedinem: quocirca maxime à gustosis
 capuntur, præsertim suilla. Alimentum uero, quod ex his gignitur, si pro-
 be fuerint

A be fuerant in uentriculo concoctæ, prope ad carnis alimentum accedie, sed crassum efficit succum. Acque si animal ipsum, ex quo sumuntur, boni habitus fuerit, abunde nutriunt, & probum generant succum: sin matius inter glandulas adinuerint: habent uero q̃ ex urina utrosi quippum: ac proinde utrosolum gignant succum, concoctisque difficiles sunt. Virus quoque habent testes à semine contractum, ex adultis saltem quadrupedibus: altilium autem gallinæ eorum testes & suaves sunt, & optimam præbent corpori succum. Quadrupedum quoque iuniorum testes manducantur: taurorum uero, hircorum & arietum, sapore sunt ingrato, cōcocti difficiles, malique succi. Viscera ad concoctionem difficilia sunt, crassique succi, acque

B excrementosum his tamen secut uel quadrupedum nonnullarum succum procreat non omnino malum. Cerebrum omne pituitosum crassumque est, nec probum efficit succum, ægre concoquitur, tardèque permeat, acque à stomacho alienum est, idque haud modice: quippe quod nauseam concitat, adeo ut si cui à cibo uomitum erere decreuerint, cerebrum postremum ciborum exhibendum suadeant medici. Idem tamen si probe concoquatur, alimentum præstabit corpori nō exiguum. Animum cerebrum paruum quidem est, sed quod pedestrium cerebro tanto præstantius, quanto durius est. Cerebro dulcior est, suauior quoque & pinguior, quæ in ossibus reperitur medulla: ut si utrunque gustando inter se conferas, indebitur certe cerebrum austeri in se quiddam continere: & medulla ipsa quoque si liberius edatur, nauseam excitat ut cerebrum: & si probe fuerit concocta, nutrit non aliter atque cerebrum. Facillime omnium putredinem sentit medulla, ut Rufus auctor est: eoque fit, ut eorum animalium ossa, quorum caro grauius olet, quam primum confringi soleant. Emollit medulla, quæ in corpore nostro dura sunt: etiam quæ scierum patiuntur, siue in musculis, siue tendinibus aut ligamentis, siue etiam in uisceribus id accidat. Molliunt, inquit Dioscorides, omnes medullæ, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera exsiccant, & ut Plinio uidetur, exsiccant. Laudatissima est ceruina, proxima uiculina aut boum iuniorum: dein caprina, inquit Plinius. Hircorum uero, taurorumque medulla & acrior & siccior est, quàm ut scitrosas durities emollire possit, ut Galeno placet: Dioscorides taurinam caprinæ præfert & ouillæ. Curantur medullæ byeme, ut uult Galenus: aliquotio ætatis exitu, uel ante autem uentum. Utuntur autem medulla, non ea solum quæ in ossibus, sed & quæ in spina reperitur, quàm & spinalem medullam nuncupant: quæ altera illa & durior & siccior est. Hæc pinguedinis habet minimam, quo fit ut nauseam minime ciat: non exiguum dat corpori alimentum, sed quod crassiores succum efficiat. Pinguedo omnis, siue adipè dixero, siue seuum, pauci nutrimenti est: potiusque carnis, quæ nos alit, cōdinendum est, quàm alimentum. Escalfacit, molli, rarefacit & humectat omnis pinguedo: uerum cuiusque differentia in maioris minorisque ratione consistit. Nam pinguedo suilla, omnium est humidissima, oleiq; instar fluida: caprina ob crassitiem citius concreuit. Taurinus adeps suillo longe

calidior & siccior est, minus tamen, quàm sit leoninus: utilioris quoque & raurino minus tam calidus est, tam siccus: & hecminus quàm sit caprinus: minus quoque hac, quàm hircinus. Adeps asferinus suillo calidior est, inter quos medium locum obtinet gallinaceus. Piscem adipem ad suffusionem imponere nonnulli: Massurius palmam lupino adipi dedisse antiquos tradit. A renibus autem est laudatissimum omne sebum. Perficitur omne sebum exemptis uenis membranisque. Sanguis omnis concoctu difficilis est, præcipue qui crassius, qualis est bubulus: leporinus tamen, utpote omnium suauissimus, in pretio est. Suum quoque & maiorum & eorum qui castrati sunt, sanguinem pro alimento utantur quodammodo & gallinarum & caprarum nonnulli agrestesque nonnunquam caprarum sanguine unctum cum adipe seculo replent, ut & Homerus de Penelopeis protas rotat. Aptorum sanguinem, qui uel gustare quidè uelit, nemo est: taurorù sanguis recens epotus uenenum est. Sanguis asferis, anatis & herdi, utilissimus in antidota miscetur: palumbi autem, turbaris, columbaeque ac perdicti, oculis cruore suffusis, & recensibus eorundem uulneribus allunantur. Partes animalium externæ, ut pedes, rostra, aures, cartilaginee, minimum præstant alimentum: & neruosa partes omnes, ut ligamenta atque tendones alimentum gignunt lenium glutinosum: nec sane aliud, quàm partes ipsæ coctæ præstiterunt. Et quæ circa quadrupedum libra sunt, eandem habent naturam: glutinosum namque, sed minime grassum generant succum: uerum facile concoquuntur & hæc & uolucrum alæ. Ossa cremata digerunt atque exsiccant egregie: maxime uero (ut nonnullis placet) humana. Quidam autè G arthritis & comitalem morbum epotis ossibus ulla sanauere. Pili uili calfaciunt egregie, atque desiccant: & lana cremata eodem modo.

D Curande medullæ rationem uarie explicant Galenus, Dioscorides & Plinius. E Quomodo curari debeat omne pinguedinis genus, docent Dioscorides & Plinius.

De excrementorum, quæ in animalibus sanguineis reperiuntur, differentiis. Cap. LVIII

Humorum omnium qui in animalibus insunt, salis calidissima est: cuius proinde vis acris excalfaciensque est. Excalfacti, inquit Plinius, mordet, scindit, extrahit, disciunt. & calidissimorum animalium fel, cetera quoque in calore superare palam est. Quin & in animalibus, quæ magis calida sunt, colore flauo uidebatur bilis: quæ uero minus calida, pallidior erit. Et cum animal quoddam sua natura calidum est, sane sitique torquetur, ad atrum colorem uergit bilis. Porcorum fel omnium humidissimum est, ac proinde maxime imbecillum, præterquam agrestium: hoc itaque felle tanquam ad autium ulcera idoneo medicamento utuntur. Suillo felle acris paulo est ouillo mouillo caprinum, cui bubulum ursinumque similia sunt. taurinum ualentius est, quod tamen ab hyæne felle uincitur: hoc quoque superat callionymi bilis, scorpiique marini & testudinis marinae. Minorù animalium fel subtilius intelligitur: & ideo ad oculorù medicamenta uti-

lius

Alius existimatur. Auium fel omne & actius & siccius est, quàm quadrupedum. Predicis fel atque galline ad medicinę usum ceteris preferuntur. Felle quocunque facile, infantibus precipue, alui detractionem quis molietur, si intinctum linamentum sedi subociat. Sudor omnis falsus est: sepe vero & amaritudinem pre se fert minime obscuram. Vrinarum non minor est uisetas, quàm bilis esse diximus. Et omniū quidē us calida est: magis aurem eorum quæ calidiora sunt, sicuti frigidiorū minus. Homines, ut & ex ceteris suis domesticis, maxime est imbecilliscapri uero syluestris uasida est, ut ex odore facile apparet, qui utique acerrimus est. Salua canis certe rabida, in homine quoq; rabiem excitare potest, si in eius corpus incidit. Hominis salua uenenois omnibus bestis aduersatur. Hoc autem scire oportet, **B** saluæ discrimina contingere, tum in animalium speciebus, tum in eorum unoquoque sano aut aegro, ieiuno & sinitendo, aut cibo potuq; sumpto: à cibo namque imbecilla estualida acrisque earum, quę longa media aut siti uentantis mediocritas eorum, quę probe concoxere, nondum tamen cibum potumue hauserit. Stercus finiumue omne digerendi facultate polletuane tamen pro animalium temperaturis: eorum nāque quæ sicciores sunt temperatiora exsiccantius steruus est, sicuti & quæ calidiora, exsiccans magis. Quis & pro eorum quæ pascuntur natura, numerosa frange discrimina: id quod in hominibus maxime conspicuum fuerit: quandoquidem hoc animal ciborum generibus utitur maxime uariis: caprarum quoq; pilulæ, pro pastus uarietate nonnulla discriminis habent. **Q**uorundam animalium **C** finum non modo medicamentis quæ foris imponuntur, sed his quoque quæ intro in os sumuntur admalesceant nonnulli: caprarum etenim finum, eorum præsertim quæ in montibus uictuant, in uno posuim, regium morbum emendat. E sic syluestri finum aridum ex aqua aut uino epotum, san guinis reiectione sistit, dururnum lateris dolore lenit adrupta & conuulsa ex aceto bibitur. Horum certe usus contingit nonnūquam, dum aut uenamus, aut peregre, aut turi agimus: cum scilicet præstantius nihil affuerit: Humanum autem steruus ob fetorem omnino reicitur.

H Taurno felli, inquit Plin. præcipua potentia. **A** Quoniam modo curabitur fel in genus quoduis docet Dioscorid. lib. 2. & Plin. lib. 2. 9. **C** Fumi stercois animalium discrimina, quod ad agrum lenificandum attinet, ostendit rei rustice auctores, **D** Columella scilicet ac Plinius lib. 17.

De lacte, & his quæ ex lacte fiunt, ut caseo, butyro, & aliis. Cap. LIX.

IN lacte non parua est huius generis animalium differentia: humanū etenim lac corpori humano maxime accommodatum est, ut quod & suauissimum sit, & optime uariat: aliorum uero quot undam animalium lac, homini ingratum est, ut canis, lupi, leonis, uulpis, ursi, & id genus aliorum: caprino autem ouillo, bubulo, alpinūq; libētius uescimur: caseosq; nobis ex iisdem conficimus, præterquam ex asinano. Horum animalium lac generatum omne probatissimum gignit alimentum: discrimen uero est, quod crassius est bubulum, ouillum, capritum minus atq; crassum equinum, & asinum, quāquam Plinio crassissimum asinum, camelinum omnium

liquetissimum est. Vt utro paucis eius facultatem definiamus: lac medico E-
rum omnium consensu, inter omnia edulia quamopimum gignere succū,
multūque alimenti præstare dicimur: et contrariis quibuldam substanti-
is, ac facultatibus compositum uentrem scilicet mouendi, ac sistendi, ob-
struendūq; ac tenuandi. Quod namque in eo serosum est, succos extenuat
crassos, & aluum citius contra, quod caseosum aluum sistit, succosque reddit
crassos. Quod sit, ut lac, quod serosum ac tenue est, minus nutrat, aluum ma-
gis moueat: sicuti contra, quod crassius est, aluum minus citat magisq; nu-
trit. Camelinum, alimūq; serosi humoris plus habet: plus casei ouillum
panguetudinis bubulum: caprinum inter cetera mediocritatem obtinet, ut
quod nec pingue admodum, nec crassum sit: bubulum pingue, ouillū cras-
sius, cōtrā aluminum tenue. Optimi succi lac ex eis habetur animalibus, quæ
optimo sunt corporis habitū: idq; si ubi emulctum fuerit, quampeimū hau-
riatur: ubi namque diutius emulctum manserit, genuina bonitatis nōeshul
amittit. Quod uero postea coctū amplius fuerit, succum gignit crassiorē
multo uero ma iure, si uel farinam truceam, uel malum aut amygdalum in-
coctens. Lac, ne in uentre coaguletur, mellis, aquæ, & salis nonnihil ad-
misceat: quidam; nam uel caprinum ipsū, abq; melle sumere, maxime
et tutum: plerisque etiam qui illud parum hauserunt, in casei speciem in
uenticulo coactum est: quod cum acciderit, mirum quā apparet homi-
nem, ac ptope dixerim, strangalet. Non parus quoq; lactis discrimina sunt
ab anni repositis eo ipso spatio, quo à partu in locis educti, distat: ab ætate,
& à passionibus. Quamquam sunt qui pascuorum ratione plane pro nihilo
habeant, quasi nihil parumue ad lactis bonitatem conferant. Ceterū haud
dubie uidemus, animalium, quorum usuri lacte sumus, si scammonea aut
marinarum lactucarum quaptam (tribullum uocant) uescantur, in lacte
quoque laxandi uires inesse. Ex quo patet, quid ex uirido pascuo, acre, aci-
dum, & austerum reddatur, natura uidelicet herbarum imitari: & à uiridi
pabulo lac aluum magis emollit, inquit Dioscorides. Quod uero ad anni
tempora pertinet: uernum lac ut liquidissimum, ita copiosissimum: æstate
uero media, ipsum etiam mediocre est: post id uero temporis, sensim iam
crassescit, quoad prorsus deficiat. A partu diluissimum est: procedente de-
inceps tempore crassescit semper. Probi lactis improbiæ hæc sunt indica-
cia: quod optimum est, id gustanti olfacientiūq; suauē dulcēque mediocri-
ter: nec amarum, nec acidum salsumue aut acre, aut grauis odoris inueni-
candum, & quabile, liquidū, crassūq; medium apparebit, ut si ungui instil-
letur, hercat, nō defluat. Quod uiridius est, à diuerso crassum & caseosum:
aut liquidum & serosum ac liquidum consistentia ipsa calorēque uidebatur:
idem gustantibus amarorem, aut salsoledinem, aut qualitatē quamptiam ex-
trañeam exhibebit: tale uero nec olfacienti suauē erit. Lac animalium sa-
norum, ac uerius acres, mordacesq; fluxiores est utilissimum: quandoquā-
dem non solum à partibus affectis eas abluit, sed & corpora ipsa uelut illi-
nitione quod defluat, in loca nuda intodat. Continet enim in se extergentē
quandam humiditatem, quam se rum uocāt: & præterea crassum quiddam
pinguēq;

A pinguisq; quod corpori illinunt, atq; adheret, non aliter ac pinguedo adipsa
 ne aut certum aliquod ex triplici namq; substantia conficitur lac omne, ut an-
 te diximus: serosa scilicet, caseosa, & pingui. Serum abstergentem uim ha-
 bet, quia uel absque rosione abluat acres humores. Pars lactis crassior, & quæ
 casei naturam refert, cum illa adheret, non aliter atque pinguedo adipsaue,
 aut certatum aliquod, acrimosumq; humorum ea ratione obtrudit: lac uero
 ipsum totum lenè mingensq; pharmacum est (*μαρμακόν* uocant) & mor-
 dacitatis expers: precipue uero si ex mediocri decoctione partis serosæ plu-
 rimum sit exhaustum. Ob succi quem lac gignit probitatem, nonnulli uel
 pulmonis ulceribus afflicti, sola lactis potione curari putauere: antea scilicet
 quam ampliora fiant ulcera ipsa, callumq; contrahant. Sed in tabidis

B morbis, lac muliebree præcipue laudatur, tanquam eiusdem nature nobis-
 que accommodatissimum: maxime uero si infantum in morem ab ita affe-
 ctis ex ulceribus exugant. Ad acres oculorum fluxiones ipsam lacrum per
 se, tum cum molliorum collyriorum aliquo imponitur: præterea ad hypo-
 piam & hypophthalmiam. Palpebris quoque extrinsecus una cum oleo rosaceo
 & ouo impostum, in qui ophthalmia laborant, ubi somno sese dabant,
 phlegmonas ipsas cõcoquit mulieris autem lac cito, quod recens ex mam-
 mas expressum sit. Vbi uero exsiccantem uim quamprimum adiungit habue-
 rit, lac crassum caseosumque, optimè euadet dysenteria, acrimq; omnia
 uentris fluxionum remedium: quam sane facultatem accipiet potissime à
 lapillis, quos *αγχαί* uocant, uel ferreis quibusdam cylindris candentibus

C lacti ante decocto iniectis. Decoqui autem lac cõsueque debet (ut modo di-
 ximus) dum serosi in eo humoris pars maxima absumpta fuerit. Hæc Ga-
 lenus: Plinius uero, Et si urar dysenteria, inquit, infunditur decoctum cum
 marinis lapillis, aut cum pissina ordeacea. Item contra rosiones intestinor-
 um bubulum aut ouillum utiلاس, recens quoque dysentericis infunditur.
 Vt uero quoque ulcerato infunditur lac atq; omnibus, quæcunque leniri po-
 ssint, prodest impostum, siue ob phlegmonè, siue ob humorum acrimosità
 malignitatē, ut fœdis pudendorumq; ulceribus & cæcerosis omnibus.
 Infunditur quoque lac cõtra rosiones à medicamento factas. Oris, guttu-
 risq; inflammationes lenit collum gargarizantq;: ac prouide anginas
 mitigat, tonsillâsq; & columellam, si phlegmone afficiantur. Datur & ad

D uenena quæ erodendo intermunt, qualia sunt lepus marinus, & cancharis.
 Sunt qui lac exhabeant, & is qui aconitum & thapsiam sumplerint. Priu-
 tim bubulum, is qui ebolaccon habent, aut cicutam, aut donicium, aut le-
 porum marinum: licet asinum contra gypsum, & cerasam, & sal phur, &
 argentum uiuum. Sunt inter exempla, inquit Plinius, qui asinum habendo
 liberati sunt podagra chiægræ. Vias lactis ad omnia trus exulcerata,
 maxime renes, uelicam, anseranea, fauces, pulmones: foris prout in cutis,
 eruptiones prout post abstinentiam: thoraci quoque ac pulmone lac omne
 utile est. Lactis usus contrarius spleneticis, hepaticis, comitali morbo affe-
 ctis, uertiginosis, neruorum uim laborantibus, febres habentibus, caput do-
 lentibus, uertigini, inquam, præterquam purgationis gratia, grauedum, ruf-

*Resque ad diuini
 dum, ac uale
 Deservientes.*



DE DIFFERENTIIS

fientibus, lippis. Manus inflat quodcumque decoctum . nocet usus eius affi- E
 dus dentibus & gingivis. Lac quod feri habet plurimum (itaquit Galenus)
 nihil affert periculi : quod uero feri exiguum habet, crassiusque est & ca-
 scosum, non sine periculo assidue estur: ab us præsertim, qui renium calculo
 aut iecmoris obstructionibus obnoxii sint. Oxygala quod vocant, frigi-
 dum est, crassique succi de mris, qui subito sunt frigidiores, lactis: euenit na-
 que his, qui oxygala sumpserunt, symptoma quod dētum stupor vocant
 quale post a cæcorum aciditūque estum accidere solet . Venterculus fri-
 gidiior oxygala haud bene concoquit: temperatus uero, quamvis ægre, consi-
 cit tamen id qui iusto calidior est, præterquam quod minime læditur, cō-
 modi nonnihil ab eo sentit. Fit aut in oxygala uno modo, acido lacte addi-
 to in recens quod uelis acescere . Oxygala fit & alio modo, dum crebro ti-
 ctana in longis uasis conficitur butyrum, additur paulum aque ut acescat:
 quod est maxime coactum in summo fluit, æque id exemptum addito sale
 oxygala appellant. Medici speciem unā addidere lactis generibus, quod
 scilicet appellauerunt. Id fit uel citra coagulum, cum scilicet ipsius partes la-
 ctis secernuntur, & discedit serum à lacte, cum lacti abonde calido acetum
 multum affundimus, aut tantum multum. Insuperdum etiam extra omnem la-
 quorem in fulum uasculo frigidissimam aquam continēte, in lac dum fer-
 uet dimisso, lactis partes separamus. Ad hæc lac quod statim ab edito feru-
 e in fulum fuerit, uel absque coagulo concreuit, si super cineres calidos pau-
 lis per feruat: quod uero hoc pacto concreuerit, ueteres cornici *oxygala*, as-
 fuita uero *oxygala* uocant: & hoc quidem lac syncerum est, nulla admi-
 sta aliena natura. Cum uero una cum melle addito, per coagulum fiat *gala*,
 id est separatim concretūque: discedit certe quod tenue & aquosum est, ac
 rum id solum mandant nonnulli, quod coactum est, quod tum ex caseola
 lactis substantia, tum ex feruida igne coagula faciliare, cum uero ex
 melle ipsa admisto compositum est. Alij uero non hoc solum, sed unā cum
 eo quod concretum, serum etiam deuorant: & id quidem uel pariter totum
 serum cum eo toto quod concretum est, uel eorundem altero alterum co-
 piofius. Euenitque ut has quidem magis, illis uero minus uenter moueatur
 pro quantitas serosi humoris ratione. Ac præterea quodd, qui solū id quod
 coactum est comedant, uberius alantur: qui uero unā serosi quicquam hu-
 moris deuorauerint, minus ac longe minus ij, qui eius quod concretum pa-
 rum, serosi uero liquoris multum hauserint . Serum nanque postquam à
 lacte discessit, aluum egregie mouet, & ad purgationem ualentius redditur:
 datur autem potissimum, quibus sine acrimonia uolumus deiectionem
 moliri, ut in melancholicis, comitialibus, in lepro, elephantias, erumpentibus
 ex toto corpore pustulis, articularibusque morbis, (ut sentit Plinius) & pa-
 ralysiacis. Bona autem efficacia sunt hominis, per intervalla temporis usq;
 ad quinasura ut per intervalla illa temporis potantes ambulent. Serum ex-
 empto caseo potum cum exiguo sale, phthisiam à toto corpore inhibet.
 Lac coagulatum expressumque caseus est: non ita tamen ut uniuersa la-
 ctis moles in caseum cogatur, sed quod crassum est duntaxat, separatūque
 eo quod

Oxygala.

Aphorismi.
 Aphorismi, 22.
 Aphorismi.



Serum, 1111.

Cylindrus.

A eo quod serosum est. Porro dictum iam est habere lac in se naturam quandam pinguem, & oleosam: hæc ubi à reliquo lacte separata fuerit, solique per se consistere, butyrum appellatur: verum si unà cum crassiore lactis parte coacta coagulataque fuerit, (seroso duntaxat lactis humore separato) caseus ipse pinguis efficitur. Abunde nutrit in cibo caseus sine ulla re-
Augenti
 cecis, stomachoque idoneus est, & facile in corpus digeritur, corpus auge-
 & aluum leniter emolliat: habet tamen alio præstus, pro lactis natura ex quo
 conficitur. Elutus autem & expressus, ac deinde assatus aluum sistit: oculo-
 rum inflammationibus atque hypopis impeditus iuvat. Qui vero recens
 nuperque salinus est, in cibo minus alimentum præbet, carnique movendæ
 aptus, stomacho adversatur, ventrem & intestina turbat. Vetsatior aluum

Bilistat, corporisque minuit, & stomacho utilis est. Hæc ex Dioscoride & Pli-
 nio. Vt vero Galenus refert, caseus omnis crassum procreat succum, vetus
 etiam malum: recens autem & qui nuper coactus est, neque malum gignit,
 nec æque atque vetus, crassum. Caseus cum conficitur, acrimoniæ quan-
 dam ab initio coagulando contrahit, humiditatemque amittit, ad quod ma-
 xime cum inueteraverit, conspicuum est: quo tempore & acrior & manife-
 sto calidior sentitur. quo fit, ut & sitim & reictet magis, & concoctu diffici-
 lior, deteriorisque succi evadat. Quapropter reiciendum penitus suadent
 medici ad genus casei: ut quod neq; ad concoctionem sit utile, aut in corpus
 digestionem, nec unquam ad probi succi generationem. Malus deinde, sed præ-
 dicto minus, iudicatur, qui necdum vetus est, nec magnam contraxit acri-
 moniam: recens ut diximus, succi malignitate varet. Crassities cum len-
 tore non omni caseo inest: quandoquidem idem non parvum casei discrimen est,
 tum à lacte ex quo fit, tum ab animalium ex quibus colligitur natura, tum
 vero à pabuli varietate: non nihil ut à preparationis modo: præterea quodd
 alius mollior, alius durior, aut densior laxiorve, glutinosior aut friabilior
 sentitur. Sapor deinde alius acidus, acrior alius aut dulcior. Mollior durio-
 re præstat: rarior quoque & laxior eo, qui densus admodum aut eoque
 friabilis est, ut & asperitatem habeat. Inter hos qui mediocritatem obti-
 net, præferendus est. Quod vero ad sapores attinet, as omnium præstantis-
 simus esto, qui nullam refert qualitatem insignem, ut dulcis tamè alias mo-
 dice exuperet. Melior quoque suavis, quàm qui ingrati saporis est: & qui sa-

C
 D lis modicum, eo qui vel permultum habet, aut qui ex pers omnino salis est.
 Qui oxygalactinus à nonnullis appellatur, omnium caseorum rectum
 novellorumve præstantissimus est: ut qui in cibo suavisimus, & stomacho
 minime onerosus est, alisque concoctu facilior: sed neque ut mosum,
 neque usque adeo crassum præbet succum, quod utrum omnium caseorū
 commune esse dicimus. Huius generis est qui Romæ duntaxat habetur gra-
 tissimas, *Λαδο* nomine, & aliquædam in aliis regionibus. Quæ plures qua-
 ternis mammæ habent, inquit Plinius, caseo inutilis sunt, & inchoæ, quæ
 binæ. Caprarum gregibus sua laus est in recenti maxime, eam augente
 gratiam fumo, qualis in ipsa urbe conficitur, cunctis præferendus. Trans ma-
 ria vero Bithynus fere in gloria est. Commodam ad conficiendum repo-

DE DIFFERENTIIS

mensumque caseam, lac precipue ouillum caprinumque est, mox bubuli. E Equinum ac asinum miscet interdum. Bubuli fertibus caseo est, quam caprinum. Caseos, si cerebrum musteli coagulo addatur, uergunt corrumpi uetustate, aut à muribus attingi. Tradunt Zoroastrem in desertis caseo uisasse annis ulginti, ita temperato, ut uetustatem non sentiret. Vetus caseus pectus suillæ decocto in acetatis ac probe in mortario subactus, archetis, quibus topi (quos *scier* uocant) in articularis creuetur, impositus plurimum iuvat. mollis uero & qui recens iam coactus est, repulsiorem vim obtinet & modice frigidâ. Tritus itaque uulnus modice coagulat impositus. Oxygalactinus autem uim habet præterea digerendi, sed parum, ut uel magnum uulnus, etiam in rusticano corpore glutinare possit. Saprum uocant, inquit Plinius, qui cū sale & sorbis siccis è uino tritus potulq; F modetur casticis. Quod hippacen uocât, caseus est equinus ea uires olet, magnopere alit, bubuloque proportionè respondet. Non desunt qui hippacen equinum coagulum appellarint. Hippocrates Scytharum inuentû hippacen dixit esseque quod in equino lacte in aluelis tubactò, in fundo subsederit quo gens illa quotidie uesceretur. Hippace exiguo gustu famem sitimque sedat, ut Plinius auctor est. E lacte fit & buryrum, barbararum gentium laudatissimus cibus. Spuma id est lactis, inquit Plinius, concretûque quàm quod ferens uocatur: fit autem crebro lactis uictari in longis uasis, donec pinguior lactis pars separetur: plurius è bubulo (inde nomen) & pinguius, ut Galenus auctor est: ut uero Dioscoridi placet atque Plinio, pinguius, ex ouibus: fit & ex caprino. Quod magis uires respuit, hoc præstantius iudicatur. Recens obolus additum, olei uicem pensat: & in bellatis ad pis loco ponitur. Neque omittendum in eo olei uim esse: & barbaros omnes infantesque nostros ita ungi. Buryrum exiguo gustu famem sitimque sedat, conseruatque uires. Buryrum natura oleosum & emolliens est: unde si largius sumatur, alui soluit & contra uenena, si oleum desit, utile est. cū melle admissum densiliones adiuuat, si adfricetur. Phlegmonas qui in mollibus sunt corporibus, cõcoquit ac discutit, ut parotidas, bubonas, orisque ac similia partû phlegmonas in puerorum & mulierû corporibus postea quàm fluxio confisterit. Cõtra uulnè inflammationes, atque duritias efficax est buryrum, quod neque uirus resistit, neque uetustum est. In medicamenta additur, quæ pus mouent, præferunt in neruorum uulneribus aut cerebri membranarum, aut ceruicis uelicit. Natura buryri est mollire & (ut Dioscoridi placet) purgare, replere & carnem creare, & astringere quoque ut Plinio uidetur. Aspidis morsum uisasse nec imponitur. De uoracis uero & in corpus digestis, pleuriticis peripneumoniacisque conserit plurimû, ut & liberiores excreant & materiam cõcocto facilior. Quod si syncenam buryrû hinctu hauriatur, cõcoquit quidè magis, sed spiritum minus educiturû unâ cum melle & amygdalis amaris, minus certe concoquit, sed educit liberius. Fuligo ex buryro collecta, in oculatis medicamentis exsiccati astringendique num habet: oculorum flegmones colubet, & ulcera ad cicatricem facile perducit. Coagula omne

Caseus mollis.
Caseus mustel.
Caseus uulnus.

Saprum.

Hippacen.

Buryrum.

Coagulum.
Arta.

A DE Diocorides prodit, & dissipata cogit, & coacta separat. Ego utro (inquit Galenus) coagulo uti, acri certe medicamento, ad affectum aliquem qui adstrictionem desideraret, nunquam sum ausus. Porro coagulum omne acre est, faciliusque habet excruciantem, digerentem, & calcificantem. Lac in ventre coagulatum dissolcat & sanguinem in ventriculo concretum, non leporinum solum, sed coagulum quodvis eorum: quantum efficacius id faciat leporinū. Hædi, agni, humuli, dorcadis, plascronis, dorci, utiali, & beliali coagula similes habent naturas. Coagulum humuli, inquit Plinius, leporis, hædi, laudatum: præcipuum tamē dasypodis, quod & profluvio alui medetur, unius utrinque dentaxorum. Et hæc quidem animalibus quæ sanguine prædita sunt, partim omnibus communia sunt, quibus videlicet ab his quæ sanguine carent, ea differre constat: partim utro generibus quibusdam propriae de quibus accuratius generatim deinceps pertractandum: nam nobis restat, ab homine exorsis.

G Si flammæ aut ite. Hoc confirmat Theophrastus lib. 9. De historia plantarum, & Diocorides lib. 1. De lacte quoque tabularum, quantum discrepet ab aliis, legitur apud Galenum lib. 4. Mer bod. me dend. E Oxygala, aliis quoque modo oxygalam conficit Columella lib. 2. Est quod aphyrogala vocant, quod astare dant medici in caloris siccatilique leuamen: an idem sit quod hoc loco ex Plinio oxygala appellatur, consistere potius licet quàm certi aliquid pronuntiare: cum sciam em hædorum aut pecorum auctorem aut lanum (quod error memini) uocant, qui quid sit aphyrogala explicet. Melica autem quid sit (quod & lacte quoque obfirmum est, ceteris ac utrasdem quæ aphyrogala sit) descriptis nobis Constantinus Casar in agriculturæ lib. 2. ex Paxano auctor. Melicam scilicet lac est, in ovis filicis, quæ acrum seruofecit ebiberit, comestum repositumque: atque quod hoc pacto acidum fuerit reddendum, melicam uocat. Interdum etiam ite. Hoc à Diocoride & Plinio fit, non ad fraxinonem, sed ne superfundatur lac cum seret. Serum à lacte) Modus separandi describitur à Diocoride, & Plinio lib. 2. *oxygala, aliis oxygala, oxygala, inquit Athenæus, à nonnullis vocatur primum lac, quod statim ab edno fieri mulgetur.*

H Castus, Castus sciendi ratio traditur à Columella lib. 7. A Stomacho utilis, inquit Plinius, quoniam sibi sibi, id est recensera. Castus mollis, ut Plinio uidetur, alui sibi. Elixus, à potestate habetur in Diocoride, sed non sine suspitione mendo si exemplis. Castus recens cum melle, inquit Plinius, suggillata emendat. D A. Nr, aliis A. No. Lanius interpretatus baynticus legit: an forsitan berynnus ut idem sit, de quo statim ex Plinio. De castorum in præstantissimorum uarietate ex locis, plura habet exempla Plinius lib. 2. E Mollis, Mollem castum, & qui recens coctus est, Columella (arabibus) castum uindem, Phaius melicam uocant. Suprem, id est putridus castus, uel uetustate putridus. H Feligo ex butyro, *Asicis à Laniis.* Quo pacto colligitur ex butyro fuligo, docet Diocorid. lib. 1.

DE ANIMALIVM DIFFERENTIIS LIBER IIII.

De homine.

Cap. LX.

Homo.



VM animalium differentias quæ dictis dē-
gnū videbūtur, prout natura cuiusq; admonē-
bit generationē spectantēque sumas notaturi,
vire potissimum ab eo ordiemur quod pri-
mum est prima autē sunt quæ perfectissimū
modi vero sunt quæ animal generant perfe-
ctum, eorūque primum & præcipuum ho-
mo est: utpote quæ rerum natura, sensus iudi-
cio & rationis capacitate præposuit omni-
bus. Sapiēs enim est hoc animal, & unum ex
omnibus animalibus nobis cognitū: diuinitatis participes, aut omnium ma-
ximè finitū & prudētissimū omnium. Homo itaque cum sit animalū
omnium diuino cultui maximè dēdum, nō abire effectum est, ut omnium
maximè erectus uiuat, superiorem sui partem ad uniuersitatis supremam
erectum habet: caput scilicet, quod membrum corporis totum diuinitatē
esse exteriorūque principē asserit. Platonius totum corpus conuerū sub-
est & ueluti patet: atque in hoc tanquam in summa corporis acce præstan-
tissimam animi nostri partem, ipsam scilicet rationem, sedem habere dici-
mus. Et cum alia nem animalia imaginationem habeat, quæ per sensus sit,
(*ἡ δὲ φύσις αὐτῶν* uocant Græci) homo unus ex numero animalium, quæ
nobis cognita sunt, & *ἡ ἀνθρώπου*, ad est uim obtinet cogitandi deliberandique:
Et memorat quidem atque disciplinæ plures animantes participes: quin-
doque sunt nulla tamen præter hominem potest remitti: quādoquidem
ad nulli contingit absque *λογισμῷ*, id est rationis quodam ueluti discursu,
quid prius & quid postea factum fuerit colligere. Quod uero ad sensus at-
tinet, homo quāquam pro corporis magnitudine maxime sere omnium
animalium procul sentire potest, sensuum tamen discretiōem sensu aeq;
iudicio maximè omnium ualeat. Et in tactus quidē acuminē & gustus: nam H
& hac tactus quidam est: homo reliqua facile superat animalia: perum ol-
factum habet, nō solum aliis animantibus obtusiorē, sed & omnium sen-
suum, qui uel in seipso sunt, maxime stupidam.

G Præstantissimū. Vnam authorum sententiam de principali animi parte se-
de, explicat: Iulius Pollux, lib. 2. Quod uero ad sensus. Humanorum sensuum quā-
litas: certa iudicia pluribus explicat Cic. lib. 2. De nat. deor. & 4. Academ. quæst.

De partibus hominis exterioribus.

Cap. LXI.

HAbet siue homo solus inter animalia caput superiorem obtinens sensū,
non corporis sui ratione tantum, ut cetera, sed quod parti sublimi uni-
uersi

- A uerſi reſpondeat, ut ſupra dictum eſt. Eſt autem propria naturalis-que capi-
cis figura, ſecundu ſi excogitates ſphæram paulo longiſculam utroque com-
preſſam: prominet enim pars utraque, prior ſcilicet & poſterior. Facies ho-
mini tantum, noménque à re accepit uideatur *orthosomus* (quod enim unus ani-
malium homo crectus eſt, ſolus proſpicitur ante uerſus uocémque ante uer-
ſus mitit, ceteris os aut roſtrum: nam piſcis aut bovis faciē dicere non ſo-
lemus. front & alii ſed homini tantum inſtituitur *julianæ* ætis, elementæ, ſe-
ueritatis index eſt. Supercilia homini & pariter & alterne mobilia: & in iſ
pars animi, negamus an animamus: ſupercilium homini dextrum magis
amollitur, & arcuarum magis quàm ſiniſtrū habetur. Diſtant oculi homi-
nis ſibi interuallo proportionē magnitudinis reſpectu ceterorum anima-
lium minimo. Puerorū omnia oculi ſtatim à partu coſuiſcali ſunt: poſt
uero immutantur in eam naturam quæ ſancta eſt: quod in ceteris anima-
libus non euenit manifeſte. naſcantur enim nonnulli altero tantum oculo
diuerſo, coſiſo ſcilicet, quod item ceteris ſere non contingit. Cum ceteris
quidem animalibus in ſuo genere ſere ſingulis color ſit idem, ſolus, uel
ſaltem poſſiſſimum animalium homo numeroſa ocalorū uarietate nota-
tur: quod enim nigrum oculi dicitur, aliis atrum conſpiciatur, aliis admo-
dum cæciſſum, aliis fulſum, aliis caprinum, quod ad cernendi claritatē pri-
marum obtinet. Sunt & oculi in homine grādioreſ, modici, parui, promi-
nenteſ, (quos hebetiores putant) cœdici: (quos clariſſime cernere) præterea
aliy contuentur longinquas: aliyniſi prope admota nō cernunt, *uicæ* dicō-
Ctur & luſcioſi. Multorum uisus fulgore ſolſ conſtat, nullo die non cernē-
tium, nec poſt occaſum: aliy interdiu hebetiores, noctu præter ceteros cer-
nant: utique nyctalopet uocantur. Augurum eſt ex homine ipſo nō imē-
di mortem in ægritudine, quādiu ocalorum pupillæ imaginem reddāt. In-
ter ea quæ pilos habent, homo unus ciliū in utraq; palpebra obtinet, &
parte magis ſupina quàm prona, contra quā quadrupedum generi acci-
dae: & frequentius conuulſet homo, quàm alia. Aures homini tantum im-
mobileſ: & ſitum utroque ex latere, eodem in orbe quo oculi obnudent, nō,
ut quadrupedum nonnullis, poſitæ ſuperius ſunt, mobileſ eſſe nares natura
uoluit, nec ſicut aures immobileſ. Labra homini molliſ, carnoſa, & quæ ſe-
parari poſſint data ſunt: tum dentium tuendorum gratiā, ut & ceteris, tum
D etiam ad uſum ſermonis agilia. Barba nō pari modo effunditur omnibus,
ſed aliſ tam muſſax, quàm marilla & mentum, pilorum frequentia inte-
gunt: alius mentum lue & muſſax, marilla uero piloſe cernuntur. Ho-
mo contra quàm cetera animalia denubſ carens uenit in lucem, niſi quid
perat naturā interceſſerit: pueri deinde ſeptimo menſe dentire incipiunt:
primo edunt primores, aliſ ſuperiores, aliſ inferiores: ſed ſere ſuperiores, uti
Plinio uidetur. Denique omneſ maturus dētiunt, quorum nurices lic ha-
bēt calidius. Mutantur poſtea hominiſ denteſ (ſicut & quibuſdam aliſ) pri-
mores: nam ſeptimo ſolidem decidere anno, abſq; ſuffici palam eſt: ac ca-
num amiſſi caſu aliquo, nunquā renaſcūtur: & marillareſ nullū animal mu-
tat, ut dictum eſt. Homini nouiſſimi marillareſ, quos genium uocamus,

circiter usque finem annum gignuntur & uiris & mulieribus. Iam uero qui- E
 budam mulieribus anno etiam octogesimo maxillares illi nouissimi non
 sine dolore exierunt. Viris quoque idem euenisse accepimus: quod certe us
 accidit, quibus in iuuentute ipsi gemini nati non fuerint: sed quibus in iu-
 uenta non fuere nati, inquit Plinius, decidere in senectate, & mox renasci cer-
 tum est. Dentes habet plures mas, quam femina. triceni huius uiris attri-
 buuntur, feminas minor numerus. Aliqui uice dentium continuo esse gi-
 guuntur. Hominum dentibus quoddam inesse uirus traditur: manque &
 speculi nitorem ex aduerso nudatos hebetare, & columborum foras im-
 plumas necare. Linguam habet homo absolutam maxime, mollassimam
 & laram: ut sit non ad sapores solum percipiendos, sed ad literarum explana-
 tionem, & sermonis expressionem accommodatissima. Latius pectus humanum F
 est, cetera angusta. Et præter hominem nullum est animalium, quod mammas
 parte gerat priore. Mammas homo solus è maribus habet: cetera animalia
 mammarum notas tantum: maribus mammarum conspectiores & feruina-
 tiores tam iunioribus tum senioribus efficiuntur, qui humidiores, leuior-
 es, nec uentulosi sunt: eorumque ipsorum, us magis qui fusci, quam qui can-
 didi sunt. In maribus etiam maribus lac fieri potest: uerum caro us ipsi-
 sa, mulieribus fungosa foraminulentaque. uiris post pubem exiguum nõ
 nullis lac exprimitur: ac rursus tamen per suctum frequenter, uel multam
 prodisse aliquibus traditum est. In muliere lac quod a nec septimum men-
 sem contractum est, inutile est: sed simul infans natus est, & lac esse utile
 incipit: prius autem salum etiam est, ut pecoris. Mulieris lac commodius G
 lactentibus est, ex Aristotelis sententia, quod liuorem trahit, quam quod
 candidum est: & fuscus saluberrus quam candidus. Galenus candidum lac, Pau-
 lus quod nõ solum crassitudine, odore, & sapore, sed & colore quoque me-
 diocriter est, commodius arbitrat. Maris generale foris prominet & ante
 habetur, testis(que absoluti præcedunt. Genitale illi cartilagineum carnosum-
 que, quod ut parte carnosam inflari nequit, sic cartilaginea intramittit. Ho-
 mo unus sanguineorum cauda uacagenates habet, quod nulli quadrupedum
 datum est. Homo uice pedum priorum brachia habet & manus: & un-
 gues in digitis habet rectos ac latos. Solus quoque animalium ambidexter,
 hoc est dexter utraque manu nascitur. Hominis digitum articulos habet ter-
 nos pollex binos, & digitis aduersus unguem flectitur: per se uero in obli- H
 quam porrigitur, crassior ceteris. Huic nanimus nomen sura par est: duo reli-
 qui, sibi interser quos medius longissime proceditur. Dign quibusdam in
 manibus leni. Inflexus articulorum tum brachie, tum digitorum omnium
 agitur ad interiora. Crura homini formore suraque carnosissima sunt: nul-
 lamque fere sui corporis partem, tam carnosam habet, quam nates, formo-
 ra, nates: (quas enim suras uocamus, non nisi carnis copia parte tibiæ pos-
 teriore repletur) cum cetera animalia quæ cruribus constant omnia,
 uacua carne hæc habeant. Sura alitis cetera ad popliteum est, quibus scilicet
 nates sunt plenis: reualis detracta, quibus graciliores. In ipsa genu utroque,
 coramissura dextra lausque, à priore parte gemina quædam buccarum in-
 nicas

A ruras inest, qua personā, seu iugulo, spiritus fugit, ut Plinius auctor est. Homina pedes omnium maxima proportionē magnitudinis, quibus pars interior plantę non cauet, sed ita pleniuscula est, ut solū toto attingat uestigio, ij uestigi sunt, ut inquit Aristoteles, & fraudulenti. Digtorum manus magnitudo, contra quā pedis est, manus enim longos, pes uero breuiores habet digitos. ungues habet homo pro digitorum magnitudine minimos. Homo cōtra atque cetera animalia inflectit crura brachiisque: quippe qui brachia in posteriora flectit, (quanquam ita ut paulum uergant ad latera interiora) crura autem in anteriora. Partes naturales hominis unius, secundum naturam dispositę sunt, tam superiores quā inferiores: quando quidem partem superiorem ad uniuersi supremum erectam obinet: solus enim animalium erectus incedit. Homo cum ad iusta incrementa peruenit, partem superiorem habet minorem quā inferiorem, cōtra quā cetera animalia quę sanguine consistunt: (partem superiorem intelligi uolo, quantum de capite ad eam pertendit partem, qua exitus patet extremis inferiori autem, quantum ab ea ipsa subsequitur reliquis corporis.) homo namque in prima ipsa etate, antea quā adolescat, partem superiorem corporis habet maiorem quā inferiorem: & quod per etatem amplius augetur, cō contra euenit, ut inferiora superioribus magis crescant, donec nullam perueniant magnitudinem. Quamobrem unus ipse non eodē modo ingredi solet, infirma adhuc etate, quo iam firma ingreditur: sed dum infans est principio, ne serpere quidem potest, sed immobilis iacet: deinde

B primum quadrupes reptat: postea se erigit, bipēsque incedit, nisi formam positionis habeat. Est autē pomathio cuius pars superior magna est, inferior, quę sustinet pondus montisque exeret, parua. Parti dextra habitor adflectitur motus, leuiter firmitas maior: unde altera gestulationibus promptior est, altera oneri ferendo accommodatior. Vires tamen quibusdā dextra parte maiores esse, quibusdā equas utraq, aliquibus leuā manu precepius obseruatum est.

C Quosdam etiam cum dēstibus esse natos, exempla sunt & apud Plinium & Solinum. Geneni, *apocrite*, *idipore*. F. Natalis, *dequod* est ad parum habito: Plinius uiralem dicit. Quod liuorem trahit, *et moriturum*, id est quod ad liuorem accedat, uel subliuorem. H. Pollex, inquit Aristoteles, uno inflectitur nodo, ceteri bini adducuntur ut uero Galenus, compactus pollex est ex triplici ossi: primūque eius in eodem tanquam palmę pars emane est accipiendū. A. Partes etiam crurum brachiorumque, quo pacto & contrario modo inter se sestantur, & cetera quā in ceteris animalibus, pluribus explicat Aristoteles lib. De gressu animalium.

De partibus interioribus hominis, & similibus. Cap. LXII.

Homo plurimum cerebri proportionē magnitudinis, ac humidissimi habet: & mas plus quā femina. Vni animalium homini cerebrum in infantia palpitāt, nec roboratur ante primum sermōnis exordium. Cor animalibus ceteris in medio pectore est: homini tantum infra leuam papillam turbato mucrone in priora emittens. Est hominis pulmo simplicior, nec ita multifidus, ut nonnullorum animal procreantium est: nec leuius,

H in j

sed inaequalis est. Fibras habet, quas *Arteriae* vocant, quatuor quidem maiores, utraque scilicet parte binas, utram autem simplicem & minorem. Rotundum hominis iecur est, ac simile bubulo: superne quia manu tangitur, gibbum est, intrinsecus caenum. Iecur quatuor fibras habet, in eis duntaxat qui proceriore corpore sunt, uti Theophrastus producit: non in omnibus enim hominibus fibrarum numerus similis conspicitur, sicuti neque magnitudo. etenim uti recte scripsit Hippocrates, in quibusdam ne fibras quidem habet iecur, sed ex toto rotundum est: quibusdam duas, alius plures, nonnullis quatuor. Iecori vel adnexum habetur aliqui tamē eo carente nascuntur, quorū valetudo, inquit Plinius, firmitior, & vita longior. Carent eo qui ab insidiis uescuntur in Ponto. Est hominis lien fuisse similes specie angusta & longa. Hominiū renes, inquit Aristoteles, similes bubulis sunt: quippe qui tanquam compositi ex multis exiguis renibus consistunt: neque aequabiles sunt, quomodo renes orium ceterarūque quadrupedum habentur. Galenus uero eorum figuram, ea parte qua uenae atque arteriae in ipsos inferuntur, simam esse praedicat: altera uero, quae illi parti opposita est, plane rotundam. Venerculus humanus canino similis est: (quippe qui non multo amplior sit quam intestinum) figura illi rotunda, sed oblongior, & quasi intestino similis ampliori. Iacchinea hominis scissas ac fissuratas proxima sunt: in quibus quod colon appellatur, amplius est: & quod post ipsum in sedem porrigitur, breue id corpulentiusque est. Omneque homini proportionem magnitudinis maximam est: oritur id & dependet à medio uentre, quā ueluti sutura ducitur. Est & hominis uelica proportione, quā ceterorum amplior. Sanguis homini tenuissimus ac purissimus est: extremūque sanguinis uentrem habetur, cum sit uel in picas liquidus: modum crassus, uel serosus adeo, ut posteaquam à uena effusus concreuerit, plurimum habeat liquidī humoris supereminē: optimus uero qui inter hos medius est. Omnia uero femininarum maxime mulier sanguine abundat: & quae menstrua appellamus, plurima fieri in mulieribus solent. Sane & hominis uenae crassae proportionem humani corporis. Inter ossa sinciput ultimum confirmatur: tam enim cum partes in lucem uenit, molle hoc infantis os est, palpatūque, ut antea dictum est. Caluaria homini raro solida sine suturis est: sed tamen & uiri caput uisum sine ulla sutura est. Spina hominis ex uertebriis quatuor & uiginti constat: (excepto etiam osse sacro) nam in reliquis, ex pluribus compacta est. Homo omnium animalium, quae pilos habent, nudissimo corpore est: pilis enim paucissimis exiguisque interregitur, nisi in capite: quae quidem parte, barbosissimus omnium ipse est. Et cum ceteris, quae pilis ueluantur, partes prorsus pilosiores sunt, superne aut glabrae omnino, ut manus pilosae habentur: homo contra. Ciliū etiam homini utraque in palpebra, ut dictū est: & alae oppletae pilis, & pubes, quod ceteris deest. Pili in homine omnium animalium uno, partim simul, partim postea per aetates gignuntur. Congeniti sunt pili capitis, superciliariorū & palpebrarum: postgeniti pubis primum, mox alarum, postremo mentis loca enim quibus pili proueniunt, totidem sunt congenitis deputata, quos

Colon, Theophrastus dicit ab eo interpretatur.



post

- A** post genitum. Deficiunt ac defluunt maxime primisque per artem pilis capitis, non tamen omnes, sed tantum primos, ergo capitis leuitatem caluitium nuncupamus, Græci *ῥαλίστητος* dicunt: quam rem in supercillis *αὐτὸς ῥαλίστητος*, hoc est saltitum appellamus, quoad melius vocabulum inuenimus, inquit Theodoras. Mutatur color pilorum in senectute: cædidiq; pilis efficitur in hominibus, quod uel in quibusdā alais, per paucis animalibus accidit, sed non adeo aperte, præterquam in equo hinc pilorum candorem canitiem uocamus, Græci *καλίστητος*. Caluitium una tantum animalium homini, præterquam in natum parte itaque capitis priore nonnulli caluiscunt, sed pueri aut mulieres raro caluiscunt: uiri autem procedente ætate sæpius calui euadunt. necnon capite homines senescentes canescunt, quod nulli fere ex cæteris accidit manifeste. Canescunt homines primo temporibus: sed nemo uel temporibus, uel occipite caluiscit. Pili post genitum, qui ante pubertatem castrati sunt, non exiunt, & post pubertatem ex cælis, soli decidunt, præterquam pubes hæc enim quauis maneat, tamen manet. congenati uero us non defluunt: nemo enim spado caluiscit. Pili in mento mulieris non prodeunt, nisi interdum paucis reliqui pilis qui postea gigni solent, mulieribus quoque proueniunt, sed paucius. Fieri potest, ut homo cum mas cum etiam femina pilis post genitum careat, iam inde ab ortu nature uirgo contracto: & nisi ut pubescant contingat, steriles in gignendo sunt. Crescunt pilis quibusdā in morbis, ut præcipue in tabificis: quin etiam in senectute & defuncto augescunt durioresq; redduntur, quod eadem quoque unguitibus euenit. Copia pilorum defectusq; discrimina pro corporis temperatura, atque pro cutis qualitate proueniunt. Qui enim calida & sicca intemperie sunt, magna ex parte hirsuti euadunt, uerum hoc, si in summo fuerit, modiciter autem, si calida quidem est intemperies, sed in altera cōtarietate modicioritatem habeat. Similiter & qui sicca quidem, sed in calido & frigido media est temperie, est enim ea quoq; modice hirsuta. Raro pilo sunt omnia frigida temperamenta, siue ea modiciter se habeant in humiditate, siue immodice. Cæterum ad summum glabra est frigida temperies & humida minus hac quæ frigida est, sed in altera cōtarietate temperata: adhuc minus, quæ frigida & sicca est. Nō ut in cæteris animalibus quæ pilum habent, colorū causa cutis est: qui enim alba sunt cute, nonnquam nigros admodū habent pilos. Cutis homini proportionem magnitudinis tenuissima est: ea uero quæ in manu est, quàm proximè ad modicioritatem accedit, idēque & tactus instrumentum in homine præcipuū est, cuius quoque affectus secundum naturam est, cum Ægyptiorum nigritia, cum Gallorum candor, cum Scytharum rufus color.

De uoce hominis, & somno.

Cap. LXIII.

Vocem quidem mittunt & alia animalia: nullū tamen aliorū est, quod loqui possit, sed propriam id hominis est. Qui siue iam inde ab ortu nature sunt, idem etiam nulli uocem ergo emitte re possunt, locutionem autem nullam. Poeti ut cætera sua membra continere ac regere nequeunt,

in alio
in alio

sic etiam linguae sunt impotentes, & sensus linguae absoluantur: itaque magna ex parte balbutiunt, tortisque lingua sunt. Infans nascentis uox nulla auditur antequam totus emigat utero. Primus sermo amiculo esse qui celerius fieri coepere, tardius ingredi incipit. Vox roboratur à tredecim annis, eadem in senecta exaltior: neque in alio animalium sequis mutatur. Differunt tum uoces tum locutiones: ita ut ratione & responsis locutioque ipsa non perinde ut uox per naturam proscribitur, sed per disciplinam acquiritur: unde homines quoque locutione utuntur uaria, cum uocem omnes reddant eandem. Homo generis prematur somno per aliquot menses: deinde longior in dies uigilia. Infantes primis quadraginta diebus neque redit cum uigilant, neque lachrymantur, sed noctu & per quietem utrunque interdum faciunt. Somniansque statim infans: nam & pauore experspersione, & puerum mutatur. Homo maxime animalium somnians, sed edis ne per lucem, & infantibus adhuc, nullum ita cōtrahitur somnium, ut meminisse possint imaginum: sed plurimas anno circiter quarto aut quinto aetatis, uita incipiunt. Produuntur tamen & uiri & mulieres, qui nequam quicquam somnia in quorū nonnullis in processu aetatis accidunt, ut uiso somnium mutarentur habitu sui corporis, uel in mortem, uel in morbum.

De hominis generatione & partu, atque de his quae ad haec pertinent. Cap. LXIII.

Semen habet homo pro corporis magnitudine plurimum: & homini maxime omnium animalium temporibus omnibus oportunitas coitus est. **G** Ceteris enim animalibus statim per tempora anni concubitus: homini uero omnibus horis dierum nocturnumque ceteris satietas in coitu, homini prope nulla. Seminalur ad uenerem mas hominum magis tempore hyberno, femina aestiuo, ut Hesiodus prodidit. Aetas uero accommodata ad coitum innotescit homini, tum uocis mutatione, tum etiam testium non magnitudine tantum, uerum etiam specie: quemadmodum etiam maurus declaratur, sed praecipue oris pilorum pubis. Mas semen genitale magna ex parte incipit ferre anno peracto bis septimum simul etiam pubescere incipit eo tempore. Vox item per id tempus mutari in sonum asperiores inque qualiterque incipit: quamquam nondum grauis, neque acuta praeterea est, neque tota aequabilis. Mammis etiam exuberant: & genitale non solum magnitudine, **H** sed etiam specie proficit. Feminas etiam per id tempus emargunt ubera: & quae menstrua uocantur erumpunt: & uox eodem tempore puellarum mutatur in grauiorem. In puellis item diuersitas uberum est: alis enim admodum magna, alis exigua sunt: euenit sane ut in modice crescant, cum puellae excrementis redundant. Semen profecto infra eundem usque ad bis septimum annum est: mox proficuum quidem est, sed exigua imperfectaque generant iuniores & mares & feminae, ut in ceterorum quoque animalium plurimus euenit. Concupiunt quidem facilius natu minores: sed ubi coeperint, laborant in puerperio uehemētius: corpore etiam minus magna ex parte perficiuntur: & sentiscunt celerius mares salaces, & mulieres quae frequentius

A frequentius pariunt: nam ne incrementum quidem post tertium partum effici posse videtur. Post annum ter septimū mulieribus quidē opportune iam procreatio est: sed utinā accedere aliquid potest adhuc ad perfectionē. Homo mas ad annū usque septuagesimum, uidelicet termino ultimo potest generare: feminae usque ad quinquagesimum, uerum ad raro: pauci enim proles in eorumque tempore procreata est: sed magna ex parte manibus sesagesimus, aut quintus & sesagesimus annus finis progenerandi est: sermone quintus & quadragessimus. Bipedum solus homo animal generat: & homo maxime sua natura uniparum est: cum omnibus tamen generibus ambigienam & uniparum, & pauciparum, & multiparum interdum est: hunc tempus etiam uteri ferendi enorme unum hoc animal fortitū est. ca-

B teris enim unū est tempus hominis uero plura sunt. Nam & septimo mense & octavo & nono parere potest: & quod plurimū, decimo, nonnulli etiam undecimum attingunt. Fortis qui maturius quā septimo mēse prodeat, nullo pacto uitalis est: septimo, non nisi pridie posterorū plenilunij die aut interlunio concepti nascuntur, ut Plinius auctor est: qui septimo mense, uitalis quidem hic primus exit: sed magna ex parte infirmior. Nonnulli etiam mearus quidam insiliunt aurium & narū, septenumero generantur: sed accrescenti articulantur infanti, & demum suam formam recipiūt: & in his multi etiam uiuere atque adolēscere possunt. Qui autem mēse octauo nascuntur, non nisi per pauci seruantur: unde fit ut si quis in locis saltem Graeciae seruetur, non octauo mense natus exstiterit, sed mulierem

C sui conceptus initium lauisse. Simili modo & qui diuturniores quā undecimo mense nasci uidentur, eorum conceptus initium laedere potatur. Ita multiplex perficiendi tempus, paritēque diuersum homini datum est. Et cum alia singulos pariant fortis, alia plures, genus humanum, uci diximus, incipit. Nam quod plurimum & locus plurimis agitur, mulieres singulos singule pariunt: sed saepe geminos etiam: (nam in Aegypto plerumque geminos pariunt) quandoque etiā & tres & quatuor: sed quinque cum plurimum nascuntur: nam etiam hoc pluribus euenisse cōspectum est. Et quaedam uiginti, partibus quatuor edidit: quinque enim singulis partibus enixa est. Verum supra ter geminos nasci, antea adductum, (ut inquit Plinius) praeterquam in Aegypto, ubi scitetur potu Nilus: quo in loco septenos

D uno utero simul gigni auctor est Trogus. Et cū in ceteris animalibus gemini nati, etiam si mas & femina sint, nihilominus enutrientur seruenturque, quā si mares ambo aut feminae sint: in genere certe humano pauci gemini seruātur, si alter mas sit alter femina. Et gemini si remanēte altero alter abortiuo fluxu exciderit, alter qui legitime natus est, uopiscus nominatur. Mulier grauida quidem maxime fere animalū eorum paritur: uerum raro euenit ut superfoetet, sed factum tamē aliquando est. Qui itaque longo post tēpore sint cōcepti, minime perisci possunt, sed praematurus do-

uopiscus.

bulannarum unum quidem omnino, aut alterum superstitat mulier. Extat in E
monumentis: etiā medicorū, & quibus talia cōfēctari curę sunt, uno abortu
duodecim puerperia cępta. In ferendo etiā utero homines cum cęte-
ris animalibus differunt: cum enim cętera animalia plurimum temporis
valeant corpore cum utero ferant, mulieres magna ex parte egre degūt.
Quibus autem genibus solū est, ut mulieres labores suscipiant, ut nec
uterus tam difficulter gestatur, & partus facilis est. denaque quibusvis lo-
cis mulieres quę laborare consueverant, facilius pariunt. Omnium ani-
malium mulieribus inter feminas plurima mensium purgatio cōuenit: ut
uero Democritus physicus ostendit, mulier solū animal menstruale est.
Concepis mulieribus à menstruorum profusio sua natura contingit: &
quę iis carent, steriles magna ex parte cęgant: uerum fieri potest, ut aliquę
etiā sine eorum profusio concipiant, uidelicet quibus tantum humoris
colligitur, quantum iis mulieribus, quę purgātur restare solet: quāquam
non tanta copia ut & foris possit profluere. Sunt quibus pręgnantibus etiā
menstrua ulque in postremum gerendi tempus cōueniunt: quibus accide ut
paruos fetus pariant, & proles aut minus uitalis, aut infirma procreetur.
Desinunt plurimum menstrua circa quadragesimum annum: quod tempus
quę excesserunt, us ad quinquagesimum seruantur nonnunquam: etiā non-
nullę eo tempore pepererunt, ut dictum est: sed ultra hoc tempus nulla po-
tēst protrahere. Et ipse feminę quibus manus est necessitatis huiusmodi,
quandiu sunt in sua lege, non innocens oculis contuentur: aspectu spe-
cula uisitant, ita ut hebetetur uisu fulgor offensus, & solita emulationem
uultus extinctus splendor amittat, faciesque obtusi uisus quadam caligi-
ne nubiletur. Mulierum alie in æternam steriles sunt: alie mutatis coniu-
giis exiunt sterilitatem, nonnullę tantum semel pariunt: quędam autem
feminas aut mares semper. Euenit quippe multis & uiris & mulieribus, ut
qui coniuncti inter se nequeant procreare, ubi dissociati se iungere cum a-
liis, queant. Quod idem in maris quoque aut feminę procreatione nimi-
rum euenire certum est. plerumque enim cum mulieres cum uiri, quandiu
cum eisdem iunguntur, feminam tantū maritum procreant, sciunt autem
cōtra. Etatis etiā ratione immutatur, ut scilicet iuuenes inter se for-
minas generent, seniores facti, mares, aut contra. Et qui iuuenes nihil pro-
creant, seniores iam incipiunt generare aut contra, ut qui ante possent, post
nihil possint fecundificare. Sunt etiā alie mulieres, quę uix concipiant: sed
si concipiant, perficiunt atque odant: alie contra, facili quidem cōcipiunt,
sed feruare non possunt. Sunt & uiri qui non nisi feminam procreant, &
mulieres quę non nisi marem: & contra, ut de Hercule fabulatur, qui in-
ter duos & septuaginta liberos, feminam unam trisummodo genuit. Quę
concepere nequeunt, si uel cura adhibita, aut aliquo casu conceperint, fe-
minam magna ex parte pariūt potius quā marem. Multis etiā uiris e-
uenit, ut cum antea possent generare, post nequeant: deinde rursus faculta-
tem recipiant generandi. Fetus in utero in semet conglobatus, sic gesta-
tur, ut nasum inter genua habeat. Nascuntur pueri (ut cętera etiā anima-
lia)

- A**lia in caput uersu in pedes autem procedere nascentem, contra naturā est: quapropter uelut agre parti appellantur agrippæ. Ita editi minus prospere usuunt, & de uita breuiori decedunt. Sed pueri manus quoque ad costas porrectas extendisse habent: qui cum exierint, uocem statim erunt, & manus in os admovent. Excrementum etiam reddunt, alij statim, alij breui, sed omnes intra diem: quod excrementum copiosius quā pro infantis magnitudine est: *masures*, id est papauerulum hoc mulieres uocant, colore cruentum atque admodum nigrum & poceum est: postea lacteum uim & albidum redditur: fugit etiam confestim ubera infans. Vocem antequam egrediatur nunquam emittit, uti ante dictum est: etiam si cum dissculter egredietur, caput exet, corpus inuis sit totum. Nascentium uox prima uagitus est: lenitæ enim sensus differtur in quadragensimū diem. Nam infantes, ut modo diximus, primas quadraginta diebus, neque ridet cum uigilant, neque lachrymantur: sed noctu & per quietem utranque interdū faciunt: nec uero sentiunt magna ex parte, cum scalpimur. Plurimam huius temporis partem dormiunt: ceterum in dies quō subinde auctiores fuerint, eo magis ad uagillandum immutantur. Pueris siue caput, ut modo diximus, molle est, serōque duratur: cum tamen ceteris animalibus discrimen ossium nullum sit: sed omnia perfecta iam à natuitate proueniunt.
- Femine non similiter atque mares perficiuntur: quippe cum & intra parentem forma tempore longiore conficiatur: quā mās: & ubi in locum uenerint, celerius formæ quā mares perficiantur. Nam & pubes & uigor & senectus formæ prius ueniūt quā maribus. Pares ceteris quidem animalibus minime laboriosi exiunt: at mulieribus dolores vehementissimi incidunt, & præcipue stabilibus & solutariis, & quibus nō bona latera sunt, neque facilitas retinendi spiritus suppetit. Post partum purgationēque lactis copia excitatur, & nonnullis effluit non solum de pagillis, sed etiam passim per ubera: aliquibus etiam per alas. Edurāt in posterū globuli, (*per-rositas* dicunt) quoniam humor non coquatur nec exeat, sed redundet: ubera enim tota fungosa ita sunt, ut si in poculo pilum forte hausierit mulier, dolor moueatur in mamma, quod malum *rositas* uocant, id est pilare appellant: nec sedatur, donec pilus uel pressus exeat sponte, uel cum lacte exurgatur. Solent pueri plurimi conuulsione excipi: & præcipue corpora leniores, & lacte utentes copiosiore aut crassiore, & nutricem lactentes succi plenam & copulentiam. Plurimi ante septimum diem intereunt: plenitudo etiam infanti hoc malo periculosa. Et quia solus homo, aut certe maxime animalium omnium homo comitiali morbo in tenera ætate laborat, quod morbi genus transuerrere oculos, sicut & cetera etiam membra potest, eo fit, ut soli aut certe maxime animalium homini oculi depræsentur per limatatem, si autemque lima. Mares potius quā feminae obliti in utero in genere hominum nascuntur: cum in ceteris animalibus nihil potius mares quā feminae ita proueniunt.

A Exatū apud Plinium & Solinum exempla quorundam, qui uel post septagesimum anni liberos genuerunt. **D** De partu superfluo exemplo uidetur apud Aristotelem lib. 7. hist. animalium, & Plinium lib. 7, & Solinum cap. 4.

Vult homo plus temporis quàm quoduis animal, excepto elephanto, quod quidem usu rerū adhuc fide digno nouerimus, inquit Aristoteles: quatinus alij aliter sentiant, uti ex Hesiodo circumferuntur uerfus. Tertia secula hominis transmittit garrula cortex. Quatuor & peragat corticis tempora ceruus. Porro ætati gradus Varro ita distinxit: pueritiā ex paritatis ratione ad quintum inde annum extendit annum; inde ad tricesimum, adoleſcentiam; ad quintum uero & quadragesimum iuuetam; ad sexagesimum denique senectutem: in qua qui agunt, iam uocantur senes. Quinquennio fere corpus in homine qualem dimidium capere uidetur omnis magnitudinis eius, quæ reliquo toto tempore comparetur, ut sentit Aristoteles. In trimatu suo, inquit Plinius, cuiusque dimidiam esse mensuram staturæ certū est. Homo crescit in lōgitudinem ad annos usque ter septenos; tum deinde ad plenitudinem. Maxime autem pubescens, nodum quendam soluere, & præcipue ægritudine sentitur. Proficere uero homines ad annum usque tricesimum, aut longitudine aut crassitudine prodit Aristoteles. Corporis mensuræ ratio bisariam conuenit: nam quantus manibus expansis inter digitos longissimos modus est, tantum constat esse inter calces & uerucem. Nunc si de ipsius hominum formis requiramus, siquido manifestabitur, inquit Solinus, nihil de se antiquitatem mendaciter prædicasse, sed corruptā degeneri successione sobolem nostri temporis, per nascēuam detrimenta decus ueteris pulchritudinis perdidisse. Licet ergo plerique definiant nullū posse excedere longitudinem septem pedū, quod intra hunc modum Hercules fuerit præcorū timen molem testantur etiam Orestis suprema, cuius ossa Tegeæ inuenta à Spartanis didicimus impleſse longitudinem cubitorū septem. Procerissimum hominem ætas nostra, inquit Plinius, duo Claudio principe, Gabbarum nomine ex Arabia aduectum, nouem pedum & totidem unciarum uidit. Iam uero ante tot annos uates ille Homerus non cessauit minora corpora mortalium, quàm perſica conueni. In India multos quina cubita constat longitudine excedere. Onſicritus, quibus in locis Indæ umbrę nō sunt, corpora hominum cubitorum quinū & binorū palmarum exiſtere prodidit: & uiuere annos 130, nec senescere, sed ut medio æuo mori. Citius Indorum genus lūgeus tradit annis centenis quadragenis uiuere.

G Longitudine septem pedum. Et alia inueniuntur exempla magnitudinis humanorum corporum: & apud Plinium & Solinum.

Multiformes hominum effigies, & mira quedam de hominibus alia. Cap. LXVI.

ET monstriferæ narrantur hominum effigies: litore Scytharum tridui nauigatione feruntur insula, in quibus equinus pedibus homines nascuntur. Hippodes appellantur in quibus nuda alioque corpora prægrādes ipsorum aures tota tegant. In quadam conualle magna linas montis regio quæ uocatur Abarimon, in qua syluestres uiuūt homines, auerſis post crura plantis, eximur uelocitate, pulſim cū ſeris uagantes. Hos in alio non sperare

Alia, ad que
dragimi non
possunt.

Hippodes
Alia, Timoni
inuenit.

H

A spirare solo, ideoq; ad finissimos reges non penetrari auro: & in quadâ Aethi-
cæ parte quoque homines feri sunt, & viri & mulieres. In Scythia nam se-
pentionem produntur Arimaspi uno oculo in fronte media indigens: id
quod ne crederem quidem, inquit Herodotus, ut viri nascantur unoculi,
ceterum naturam habentes hominibus parem. Ferunt certe in Aethiopia
ab orientis parte intra gentes esse sine naribus, aquali totius oris planities:
alias superiore labro oribus, alias sine linguis. Pars etiam ore concreto & na-
ribus carens, uno tantum foramine spirat: postquam calamus aenæ trahit,
& grana eiusdem sponte proeuentis ad uescendum: quibusdam pro ser-
mone, nutus monsq; membrorum. Megasthenes gentem inter Nomadas
Indos narium loco tantum foramina habentem producit. Supra Nasamonas

B continensque illis Machias Androgynas esse utriusq; naturæ, inter se uicibus
coeunt, Caliphanes tradit: Aristoteles adiicit, dextram mânam us utri-
usque, quam muliebrem esse. In monte cui nomen est Milo, homines esse &
uersis plantis, octonos digitos in singulis pedibus habentes, auctor est Me-
gasthenes. In multis autem montibus genus hominum, capitisq; caninus,
forarum pellibus uelare: pro uoce latratum edere, anguibus armati: uena-
tus & aucupio uesci. Cretas scribit, in quadam gente Indiæ feminas semel
in uita parere, genitæque confectum canescere: esse rursum generi alteram
quæ in iuuentis sit cana, nigrescat in senectute, ultra æui nostri terminos
perennârem. Perhibent esse & gentem forminarum in Calingis Indiæ gentem,
quæ quinquennis concipiant: sed ultra octauum ætatis uiuendi spatium

C non protrahunt. At Cirios Indorum genus Iligonus tradit annis centenis
quadragenis uiuere. Legimus quoque Monoscelos in India nasci singulis
cruribus, & singulari pernacitate ad salnam, cõsistẽtque Scio podas uocari:
qui in maiore altu humi iacentes resupini, umbra se pedum protegant: nõ
longe eos à Trogodytis abesse: rursusq; ab his occidentem uersus, quosdam
sine ceruice, oculos in humeras habentes. Sunt & Satyri in subsolanis Indo-
rum montibus, perniciissimum animal, siquam quadrupedes tamen recte
currentes, humana effigie, ut propter uelocitatem, nisi senes aut egni, non
capiantur. Satyri cum tenuerint Salem uocantur, inquit Pausanias. Euphe-
mus prodidit in insulis, quæ Satyrides in extero mari uocantur, incolæ ru-
fos esse, & caudas habere haud multo equinis minores. Satyri in Aethiopia,

Satyri
in Aethiopia,
utque Solinus
et Plin. quo-
que lib. 5. cap. 8.
Solin.

D ut inquit Plinius, in Lybia, ut Solinus, de hominibus nihil aliud præferunt,
præterquam figuram. India præterea habet genus hominum, qui non alia
quàm testudinis carne uiuunt: hirsuti omnes facie tenues, quæ sola leuis est:
idem coris piscum uestiuntur, Chelotophagi cognominati. Blemnyas
in Aethiopia credunt truncos nasci parte quæ caput est: hos tamen & oculos
habere in pectore. Humano pedes flexis talibus ci utum, repit potius quàm
incedunt, & perpendi usum lapsu magis destinant quàm ingressu. Post ua-
stam Aegypti solitudinem feruntur Cynoprosopi homines habitantes, qui
ex uena in dorcadum & bubalorum uiuant, nigro aspectu, capite & den-
tibus caninis uocis quidem expertes, sed strident acule. eorum manus ro-
bustis armantur ungibus atque acutis simulatque toto pectore, ut capite

Cynoprosopi.
Cynoprosopi.

DE DIFFERENTIIS

ipſo, haſtuti habentur, pedum celeritate ualent. Cynocephali ex eo nomen E
trahere, quod caninum caput habeant, cetera membra homini ſimilia. Fe-
rarum pellibus induuntur: & ſuſtine reſiſtentes ledunt neminem: cūq;
Indici ſermonis intelligentes ſint, nihil tamē loquuntur. Choromādaſum
gentē uocat Tauron ſylueſtrem, ſine uoce, ſtridens horrendi, haruſ corpori-
bus, oculis glaciis, dentibus caninis. Eudoxus in meridianaſ Indiae uiris
plantas eſſe cubitales prodiſt feminis adeo paruas, ut ſit uſtopodes appellē-
tur. Megallhe nec ad extremos fines Indiae ab oriente circa fontem Gangis
Aſſonorum gentem ſine ore, toto corpore hirtant: ueſtus frondum lanu-
gine, habitu tantum uiuacem, & odore quem natiuis trahūt: nullum illas
cibum, nullūque potum tantum radicum florūque uarios odores ſyl-
ueſtrium malorumq; ſecū portant longiore itinere, ne deſit olfactus. gra-
uore paulo odore haud diſſiciliter examinati. Super hos extrema in parte
montium, ſpichameti Pygmaei narrantur, tetras ſpichanias longitudine, hoc
eſt terminos doli aures non excedentes. Quidam & Pygmaeorum gēis pro-
diderūt ante paludes ex quibus Nalus oritur: ubi & cum gribus pagna-
re dicuntur. Degunt uero in cauernis: neq; ad fabulam eſſe arbitrantur Ari-
ſtoteles. Scribo autē qui uidiſſe ſe diceret, ſide dignum neminē eſſe prodi-

Homini, quae ex homine aut eius partibus, oriuntur
commoda. Cap. LXVII.

Nunc quae in ipſo homine homini utilia inueniuntur indicabimus,
ipſum ſibi exquirentes. Quorundam hominū tota corpora profunt **G**
ut ex uis ſimilis, quae ſunt terrori ſerpentibus, tactu ipſo leuant percuſſos
ſuſtine modico: quorum ē genere ſunt Phyli Maritimi, & qui Ophiogenes
uocantur in inſula Cypro. Et in inſula Nili Teutini naſcentes tanto ſunt cro-
codilis terrori, ut uocem quoque eorum fugiant. Quae autem nonnulli de
humanis partibus exreſcentisq; prodiderint, nec referenda arbitror: ſan-
guinem nanque gladiatorum bibere nonnulli, ut habentibus populis pro-
cul eſſent comitales morbi. Et hercule illa ex homine ipſo ſocieri efficacif-
ſimam poſſe calidum ſpirantēque, & una ipſam animam ex oſculo uul-
nerum, cum ē plagis hanc, ne ſecutum quidem admoſuēti ori ſas ſit huma-
na. Ad elephanſin quoque in Aegypto, cum in reges incidere morbus,
in balneis lolia temperabantur humano ſanguine: alymedullam ceruicium **H**
quarunt, & cerebrum infantium. Nec pauci apud Graecos ſingulorum u-
ſerum, membrorumque etiam ſapores diſcite, omnia perſecuti uſque ad
reſegmina unguium: quaſi uero ſanitas uideſi poſſit, ſerā ex homine fieri.
Xenocrates, tanquam ſane ille ipſe ſocieri expertus quoſnam affectus cuta-
re ualeat in cibo cerebrum, aut carnes, aut iecur humanum, prodidit: quos
etiam capitis, abux, & digitorum oſſa epota: quos denique ſanguis, ſudor,
urina, muliebria, & ſtercus denotata: inſtabilia haec & dicta quoq; taſti-
dienda. Quae autem reſuſſe ſas ſit, pleraque etiam ex his non ſine honore
diſto, explicabimus. Sanguine ipſius hominis ex quacumque parte emiſſo
efficaciſſime anginaem illam tradunt Orpheus & Archelaus: item ora comi-

nali

*Alia, et plu-
rima sunt
quidem ad
ueteris et
humana.*

- A** nali morbo lapsonum, exurgere etiam protinus: quodam si pollices pedum purgantur, eorūq; his guttæ referantur in faciem. Lac mulæbre corpori hu- *Lac*
mano inter omnia lactis genera accommodatissimum est, ut quod & dul-
cissimum mollissimūque est, & plurimum alit. Mulieri ante septimum
mensem profusum lac inutile ab eo mense, quod utalis est partus, salubre.
Lac utilissimum cuique maternum est. Cōcipere natrices exuolūm est: hi
sunt enim infantes, qui colostrati appellantur, densatō lacte in casū spectō.
Mammis quoque contactū lac, stomachi roboribus prodest & rabī, pulmō-
nūque incommodis. In longa febre cœliaci utilissimū arbitrantur, ma-
xime eius que iam infantem remouent. Item mammarum collectionibus
cum thure: & oculis ab ictu cruore suffusis: & in dolore aut epiphoris si e-
B mulgeatur, plurimum prodest: magisque cum melle & narcisci succo, aut
thuris polline mixto præterea ouonum candido liquore, madidāque lana
frontibus imposita, fluxiones oculorum suspendit: nam si rana salua sua
oculum asperserit, præcipuum est remedium: & contra morbum eius bibi-
tur stillatūq;. Qui simul matris filiorūq; lacte inunctus sit, liberari oculorū
metu in totam uitam affirmant. Aurium quoque vitis medetur, modice
admixto oleo: aut si ab ictu dolent, anserino adipe repestictū: & contra mor-
bum regium in morbū relictum, insillatur cum elateno. Podagris quoq;
mibent illius cum cicutaaly cum celypo & adipe anserino: (qualiter etiam
uulnarum doloribus imponitur) alij cum opio & ceruo: peculiariter ualor
potū contra uenena, que data sunt cum marino lepore buprestiq;: & con-
C tra infamā, que fit hyosciamā potu. Semp̄rque in omeni ulū efficacius eius
que marem enixa sit: multoq; efficacissimum eius, que geminos peperit
mares, & si uino cibisq; acrioribus abstineat: eius uero que feminā eni-
xa sit, ad uitā tantum in facie sananda preualet: eius que marem peperit
lacte gustato, canes rabiosos fieri negant. Hominum qui probe conco- *Salua*
runt leuina salua, lichenas puerorum illius assiduo sanat: item lippitudines
matutina quotidie uelut inunctione. Mulieri quoque saluā reuina, postē-
tem diuidi cane oculis cruentatis, & si contra epiphoras feruentes anguli o-
culorum subinde madeficiuntur: efficacius si cibo uinōque se pridie ea absti-
nuerit. Scorpiones interficit hominas salua: & omnibus bestias uenenosas
sua natura aduersatur: ferūq; ictus salua, ut feruentis aque contactū fu-
D gere. Martion Smyrneus qui de simplicibus effectibus scripsit, rumpā sco-
lopendras marinas spūto tradit. item rubetis aliasque ranas: Ophiū serpentis,
si quis in huiusmodi earum exuat. Nunc murum dicimus, sed experi-
mento facile: So quē penetrat ictus emanus comunisue illati, & statim ex-
puat mediam in manum qua percussit, leuatur ilico percussus à penna.
Hoc sape delumbata quadripede approbatur, statim à tali remedio, cor-
recto animalis ingressu. Morbus hominis inter asperitimos indicatur: me- *Aurū sordidū*
duntur sordes ex auribus: ac ne quis miretur, etiam scorpionum ictibus,
serpētrūque statim imponit. Melius ē percussis auribus profum: ita &
reduius sanari. Gymnasiorum strigmenta molliunt, calfaciunt, discut- *Strigmenta gyno-
masticum*
tium, complent, sudore & oleo medicinarū facientibus. Vulus inflamma-

DE DIFFERENTIIS

us contractisque admoventur die & menses eient, sedis inflammationes & E
condylomata leniunt: item nervorum dolores, luxata, articulorum no-
dos. Efficaciora ad eadem, strigmenta à balneis, & ideo mofcentur fuppu-
ratorius medicamentis. Nam illa quæ funt ex octomate petunio cono,
articulos tantum molliunt, calfaciunt, difcutiunt efficacius: fed ad cete-
ra minus valent. Imo etiam ipfos gymnafiorû rafere partes: & illæ quo-
que fordes ex calfaciorum uim habere dicuntur. panos difcutiunt. ulceri-
bus fenam putrorumque & defquamatis ambuftis ue dilinunt. Hæc Pli-
nius. Ut nero Galenus prodidit, hominum fudor in paleftris mifcetur
fubiecto pulveri, quem melle Greci uocant. Quod ex his componitur, con-
filiu dicunt, uim habet digerendi cum adftrictione quadamquo fit, ut ef-
ficaciffimum fit mammae inflammatis remedium: & hoc quod à partu in p
mamillis erundet, reprimat. inguinum quoque tumores difcutit. Vri-
na hominis, quàm fit aliorum animalium, multo imbecillior eft, abftergē-
di tamen uim obtinet: id quod uel maxime oftendunt fullones, qui ea præ-
cipue ad uellum fordes eluendas utuntur. Quin & medici ploras & lepras
ea colluunt, ulcerisque præhumida ac fordida, maxime ubi putridi infe-
quipiam. Im pabium puerorum urina contra falinas afpidû, quas pyradas
uocant, quoniam uenera in oculos hominum expuunt, prodeft: contra oeu-
lorum albugines, obfcuritates, cicatrices, argemæ palpebras & cum erui fa-
rina contra adhaſiones, contra aurium pinatitas uermiculôſque, fi decoqua-
tur ad dimidias partes cum porro capitato, nouo fictili. Vaporatio quoque
ea menses feminarum ciet. Hæc & atramenti litæe abluantur uarilis, po-
dagris medeat, argumento fullonum, quos ideo tentant eo morbo negit. G
Vetri mifcetur cinis oſtreorum aduerfus eruptiones in corpore infantû,
& omnia ulcera manifefta. Ea ex eis, ambuftis, fedis uiridis, rhagadibus, & ſcor-
pionum icibus illanitur. Obſetricum nobilitas non alio ſucco efficacius
curari pronuntiauit corporum pruritus nitro addito, ulcera capinum, præ-
rigines, nomas præcipue genitalium. Sua cuique autem (quod ſas ſit dixiſ-
ſe) maxime prodeſt, confilium petuſo canis morſu, echinordineque ſpina
inhærentibus, & in ſpôgia laniſſe impoſita, aut aduerſus canis rabidi mor-
ſus cinere ex ea ſubiecto: contraſque ſerpentium icus. Oſtanes contra ma-
la medicamēta omnia promiſit auxiliari matutinis horis ſuum cuique in-
ſtillatum in pedem. Stercus humanum in medicamenta obſtorcorum ra- H
rilline admittunt. Inter omnes tamen cōuenire uideo, humanum ſtercus,
non aliter atque caninum gutturi impoſitû anginas auxiliari. Capillus pue-
ro, qui primum deciuſus eſt, podagra impetus dicitur lenare circumligatus,
& in totum impubium impoſitus uirorum quoque capillus cinis morſi-
bus medetur ex aceto. Ex capiti uulneribus ex oleo aut uinco combuſtis
æque capillus carcinomati. Capilli uulneris ſi cremantur, odore ſerpentes
fugare proſunt eodem odore, uulnæ morbo ſtrangulæ reſpuræ. Ci-
nere eo quædam, ſi in teſta ſunt cremari, uel cum ſpuma argenti ſcabentes
oculorum ac prurigines emendant: item verrucas & infantum ulcera cum
melle. Capitis quoque uulnera, & caninum ulcerum ſinus, ſimul addito
melle

Plin.

*Idem, contra
aurium poro.*

Idem.

Plin.

A melle & thure, panos podagras tum adipe, fimo & sacrum ignem, sanguinemque sisti flaco, & formationes corporum. Pueri qui primus ceciderunt dens, ut tertiam non attingat, inclusus in armillam, & assidue in brachio habitus, muliebrium locorum dolores prohibere traditur. Ossa humana ossa combusta, ut quibusdam placet, uim habent maxime omnium ossium digerentem exsiccatemque. De homine satis dictū habeo. Nunc ad reliqua transeamus animalium genera, primūque terrestria.

DE ANIMALIVM DIF-

FERENTIIS LIBER V.

De quadrupedibus uisiparis, & eorum partibus
exterioribus. Cap. LXVIII.



Omnis proximum genus quadrupedum est. Inter uniuersa namque animalium genera, homini simillimae sunt quadrupedes: cum ossibus ipsis (quae maxime totius corporis figuram constituunt, item reliquis etiam partibus omnibus, cum uero totius corporis forma. Quae in genere quadrupedum non penitus continentur, sanguine quidem omnia praedicta sunt: sed alia animal patiuntur, & uisipara dicuntur, (quae & perfectiora sunt) alia eorum edunt, & ouipara uocantur. Quadrupedes quae animal generant, caput, collum, & omnes partes corporis sortiuntur: (nam & rursus modo quodam oculos habere dixerim) uerum ipsae singulae partes inter se differunt. Sunt quadrupedum alia cornigera, alia mutila: & quae cornuta sunt, eadem omnino quadrupeda esse certum est: nisi quid per similitudinem & transmutationem cornu habere dicatur, quemadmodum Aegypti de anguibz Thebanis perhibent, quasi aliquid illis ueluti uestigium cornus extuberet. Nec

D alibi quā in cornibus maior natura laetitia: ipsae hae in ramos, ut ceruorum: alus simplicia tribuit, ut in eodem genere subulcoribus ex argumento dictis aliorum sunt in palmas, dignosque emittit ex iis, unde plerocortas uocant. Dedit ramosa capreis, sed parua, nec se cit decidua: conuoluta in anserothum arietum generis rupicapris in dorsum adunca: damis in aduersum. Erecta autem rugarumque ambitu conuoluta, & in leue fastigium exarata strepitatori: mobilia eadem ut aures, Phrygiæ armenisque Troglodytarum in reeram directā, quae de causa obliqua ceruice pascuntur. Alias lingua dedit omnia in mucrone migrantia. Quae cornua gerant, bisulca magna ex parte per naturam sunt: & bisulcorum magna pars cornua gerit: ut bos, cornus, capra. Quod autem idem & sedipes & bicornis sit, nullum est,

quod nos adhuc nouimus, inquit Aristoteles at solipes adēque unicornes, & quanquā rarum, ut asinus Indicus: unicornis uero idēque bulucius oryx est. Gerunt sine medio sui capitis corna fixum ea quæ unū habent, aut certe paribus. Sunt nōnulla quæ simul basileæ sunt, & ubam habeant, & cornua bina orbem inferius mutuo colligentia gerant, ut bonafus. Conigenam nullum admodum paruum esse nouimus: omnū enim quæ explorata habemus minimum doreas est. Tenuiora formus plerumque sunt cornua, ut in pecore: multis osium nulla: nec ceruarum ulla. Quæ pedes multifidos habent, cornu omnia carenti: & quæ superne priores habent dentes. Cornua parit plerumque caua sunt ab radice, quatenus ossium quoddā solidum ambientia inuicem in tamen solidum exsunt, & simplici parte extrema cōstant. Pars caua ex cute potius oritur: at solidum illud ossē enascens sub implicteque totum, quomodo cornua boium consistere uideamus. Ceruino generi ex cornigeris unū, tota solida & sparsa in ramos: & omnibus annis decidua, nisi caltreneut, cum ex cæteris cornigeris nulli cornua decidant, sed omnibus perpetua sint, nisi per uim aliquam amittant. Auriculas habent omnia, excepto utulo marino: & eas quidē maxima ex parte uehiti capiti appendas, & propterea mobiles: quas etiam non eodem orbe quo oculos, quæ admodum homines, sed supra oculos sitas habere uidentur: uerumamen non ita est, sed conspectum e mentiumque uoniam bestię non erecto, sed prono sunt corpore. Quadrupedum quæ multifida sunt, ut canes, leo, lupo, uulpes, lupus ceruinus, omnia cæcos generant: post palpebræ deflesunt. Oculi carent palpebræ inferioris quadru pedes sed paulo inferius pili rati nōnullis exsunt. Nates quibus maxilla longæ exsunt in acutum, in rictu appellato continetur: cæteris explanatis magisque discreto ad maxillas iunguntur. at elephanti peculiarem hanc partem præ cæteris formus est animalibus. Maxillæ alius rotundæ, ut simus. Iumentorum omnium ea par paruum est: in axilla longæ. Oris etiam magnitudine discrimen existere in animalibus planam est: alius enim os magno hiatu reuissum est, ut canis, leoni: denique omnibus quibus dentes serrati: alius medioere est, ut generi suum. Linguam habet quadrupes duram, crassam & minime absolutam: indēque sit, ut uocem parum ex planare possint. Habet dentes omnia quæ quadrupeda & uisipara sunt, sed uarietate sunt etiam alia utrinque, denata: alia altero de utrumque ordine carent. Quæ enim coruiæ gerunt, hæc nō dentata utrinque sunt: quippe quæ primoribus maxillæ superioris careant dentibus: quanquam sunt nonnulla. quæ & coribus uacit, & utrinque dentata non sint, ut cameli. Item alia dentes habent cæcos (*maxillæ cæcæ* dicuntur) ut aper: alia sine eis sunt. Ex aliis dentes serrati, ut canis, leoni: aliis continui, ut equo, boi. Sunt enim dentibus serratis, (*maxillæ serratæ* uocant) quorum fenes acutorum dentium mutua infertione pectinatim se constipat. Quod autem simul & dētem exertū & cornua habeat, nullum est: nec uero quod simul & serratis dentibus sit, & alterutrum habere illorem, hoc est uel cornua uel dētem exertum. Raro femine, & tamē sine usu sunt dētes exerti: itaque cum apert percutiunt, femine sues mordent. Primores dētes pla-

Cerviculi cornua quibus ad herere, ceruiculi sunt curibus enaso sunt in Plinius.

Maxillæ dētes.

- A**ntea habent acutos, interiores planos. Minoris quadrupedibus primores
 hini utrinque longissimi. Genu autem quod duplicem dentium ordinem
 habeat, nullum nostro in orbe est. Mutantur dentes, ut homini, ita quibus-
 dam alias animi alibus, ut equo, mulo, asino: homini, ut diximus, primores
 mutantur: maxillares autem nullum animal mutat. In collo gula atque
 arteria ut omnibus est, & eodem situ quo homini. Pectus maxima ex parte
 non ut homini latum, sed in us coarctata hæc pars est: unde si ne quadru-
 pedes eo loco habeant mammas. Ipsas autem mammas habent uarie certū
 effinam & inter seipsæ quadrupedēs & ab homine mammarum differunt
 ratione: elephæto enim māmæ parte priore hoc est in pectore, aut iuxta pec-
 tus sub artibus sunt binæ, binisq; papillis: ursæ māmās habet quaternas. A-
- B**his mammae inter femina binæ: quibus enim solida ungula, aut cornua &
 parius numero pauciores, hæc māmās inter femora habet, cæque binas. Et
 inter hæc alius papillæ binæ, ut omnibus: alius papillæ quaternæ, ut uaccis.
 Quibusdam nec in pectore nec in femoribus mammae, sed in uentre ha-
 bentur, & quidem plures etiam non omnes partes: quæ namque numero-
 so partu & pede multifido sunt, hæc aut plures per uentrem duplici ordine
 utroque de latere gerunt, ut foes, ut canes: aut binas tantum medio uentre,
 ut leo: pantheræ quaternas in medio uentre gerunt. Camelus quoque in
 uentre mammas duas cum papillis quatuor habet ut boæ. Genitale manū
 aut ante habetur, ut equo & aliis multis: aut retro. Testes autem omnibus
 esse conspicuos natura uoluit, præter elephætum & erinaceum. & ius quæ
- C**genitale ante gerunt, aut penis & testes absoluti pendente aut alio uel loco
 cuiuspiam illi proximo adherent, & aut plus aut minus absoluuntur: non e-
 nim pariter apro & equo membrum hoc absolutum est, testes namq; apro
 non pendente absoluti aut tremuli, sed hærent annexi retro. Ossea sunt geni-
 talia, lupis, uulpibus, mustelis, uiuetæ: urso quoque simul ut expiraue-
 rit, cornescere aiunt: elephæto testes non foris conspicuos, ut diximus,
 sed intus conditos habet. Quadrupedes feminae omnes in auctum mun-
 gunt: matres uero per pauci ita in auctum mingunt, ut lynx, leo, camelus, le-
 pus: solus pes nullum sic mingit. Magna item quadrupedum pars caudam
 habet. Cauda quibusdam proluxior dependet, nonnullis uero per exigua est:
 & quibusdam tam exigua, ut uix dignosci à sensu possit: aliquid tamē pro-
 minet quod caudam describere possit: quibus etiam corpus admodum pi-
 losum natura cōdiderat, caudam iis dimittit: quod in ursis perspicuū est.
- D**Quinetiam caudas proluxiores pilis natura ornat: alias longis, quibus tenor
 caudæ breuis, ut equus: alias breuibibus, quibus tenor longus, ut bubus. *Timor, pudor.*
 Habent quadrupedes, quæ animal generant, omnes uice brachiorū crura
 priora: non tamē omniū crura priora cubitis maribusq; proportionē respo-
 dent, sed quæ multitudine sunt: hæ præcipue manibus suo digitato pede re-
 spondent: hoc enim non sustentandi tantum corporis causa, sed ad plura e-
 tiam quasi manu ueniunt: quippe quæ & capiant prioribus cruribus & re-
 pagnent, quod solidi pedes posterioribus faciunt: atque ob id nonnulla ex
 iis quorum pedes in digitos fiunt, ut, pedes priores quinque distinctos digi-

DE DIFFERENTIIS

tus habent posteriores quaternis, ut leones, canes, atque etiam lupi & pan-
theræ. Sed quæ parua inter digitata sunt, posteriores etiam quinque digi-
tos obtinent. Sunt è quadrupedibus quæ sanguine constant, eademque a-
nimal generant talia multifida, quales hominis manus pedetque habentur:
sunt enim quæ multiplices pedum fissura dignentur, ut canis, leo: alia bifidæ
sunt, quæ æquæ, ad est forcipem pro ungula habeant, ut oves, capre, cerus:
alia infido sunt pede, ut quæ solipedes nominantur, ut equus, mulus. Ge-
nus sane suillum ambiguum est nam quibusdam in locis fies solipedes gi-
gnuntur, ut in terra Illyriorum & Perona, & quibusdam aliis locis. Bifida
igitur huius fissuris utrinque, ad est à parte priorè & posteriore diducuntur.
Solipeda eam partem continentem ex toto habent. Omnibus autem ungu-
le in senectâ maiores redduntur. Per multa ex bifalcorum numero talum
habent solipeda eo carent omnia, excepto asino Indico. Multifidum item
nullum adhuc talum habere cognitum est, sed lynxi senutalo quiddam si-
mile: leoni autem tortuosum in anfractum est. Omnia uero quibus datus
est talus, et uribus eum non prioribus, sed posterioribus continent in cruris
articulo. Talus autem, ut qui ueluti clauus est, tanquam alienus artus duo-
bus illis inseritur qui articulum ipsum constituunt. Quedam ut mani-
bus utuntur priorum ministerio pedum, ut dictum est, sed etque ad os illis
ad mouenda cibos, ut sciunt. Quibus ex rapina uictus quadrupedum, quin
digni in prioribus pedibus, reliquis quaternis leones, lupi, canes, & panthe-
ræ in posterioribus quinos ungues habent, uno iuxta cruris articulum de-
pendente. Sed quæ parua inter digitata sunt, posteriores etiam quinque di-
gitos habent, ut modo diximus, quoniam seipere solent scilicet ut unguibus
numeratioribus facilius obrepant ad superiora. Mirum pardos, pantheras,
leones, & similia, còdino in corporis uaginas unguum mucrone, ne refrin-
gantur hebetenturque ingredi auctisque falcibus currere, nec nisi ap peten-
do præterdere. Quadrupedibus contrâ quàm homini, in prima ætate in-
ferior pars maxima est, tum processu temporis superior crescit, quæ scilicet
ea est quæ ab ano ad caput potrecta est. Partes quas homo habet priores,
quadrupedes infra habent supinas: quas autem ille posteriores, hæc pronas.
Et motus omnium quadrupedum per diametrum agitur, quo modo etiâ
subsistere solent. Flectunt autem quadrupedes inuicem crura priora con-
trâ atque posteriora: & è contrario quàm homo membra inflectat, excepto
elephanto. Priores enim pedes ante se flectunt, posteriores uero in auctum
aduersûque inter se habent conuexa curuaturæ crurum suorum. Partem
corporis leuiam minus quàm homo absolutam habent & agilem, excep-
pto elephanto.

Interiorum quarundam partium discrimina in quadrupedi-
bus suis paria.

Cap. LXIX.

In hoc genere fel quibusdam deesse notatum est ut ceruo & illi qui pro-
uocatur, equo, mulo, asino, uiculo marino, & martum nonnullis. Sunt e-
tiam quæ partem habeant, partem nò habeant uel in eodem genere, ut mu-
res

- A** res quod idem & homines accidere diximus: aliqui enim fel in iecore habere uisuntur, aliqui carent. Hoc idem omnibus etiam caprisque euenit. Hæc Aristoteles. Galenus uero, quæ secur habent, inquit, ut meatus quidam insunt, qui bilem recipientes etiam uelicam, quæ amarâ bilem colligit, non omnibus concessit natura. Lienem bafuka & cornigera habent rotundum, ut capra, oues, & reliqua omnia: nisi aliqua pro sua magnitudine auctiorem in longitudinem habeant, ut boves: ac multisidus prolixus omnibus est ut murei, canis: solidipedibus autem medium tenet, & promiscuus est parum enim latus est, partum angustus, ut equo, mulo, asino. Renes atque uelicam, omnes quæ animal generant, quadrupedes possident. In his, quæ seuo pinguescunt, magis quàm quæ adipe, in renibus opimandis luxuriant.
- B** ac omnium præcipue oues: quippe quæ renibus pingui undisque obductis, quandoque intereunt. Ventris in us dissimilitudo est: quæ enim cornigera sunt, altera maxilla dentata, quaternos habent ventris sinus: (quæ quidem & ruminare dicuntur:) gula enim incipiens ab ore, deorsum tendit ad pulmonem seprimque transuersum: hanc se ad uentrem applicat maiorem: quæ parte interiore asper intercepitque, est, ac prope gulæ commissuram, sinum sibi adnectum habet, quem ex argumenco *καρπίσκος*, id est reticulum uocit. Est enim uentri extrinsecus similis, intus reticulis capilli mulierum impletis, magnitudine multo quàm uenter minor: hunc excipit omalum, parte interiore asperum, cancellatum, crustatum, magnitudine reticuli. Abomacum, uenter ab eo alius iungitur, magnitudine amphioromaco, forma oblongior: cancellis intus & crustis multis magnis & leuibus inornatus, mox inestinum sequitur. Cornigera altera maxilla dentata omnia ad hunc modum suum habere ventrem certum est: sed differant inter se magnitudine & figura atque etiam quod gula uel in medium ventris tendat, uel in latus uergat. At uero omnia dentata maxilla utraque, ventres singulos habent, ut canis, sus, ursus, leo, lupus. his igitur omnibus simplex uentriculus est, quæ excipet inestinum uerum alius amphior, ut sui, ut utrosque archior, nec multo amphior intestino, ut canis, leoni. Cæterorum etiam formæ omnium respectu eorum quos modo numeravi, distinguuntur: alius enim uenter fuido similis, alius canino, tam in maiore quàm in minore animalium genere. Sed discrimen in us quoque, magnitudine, figura, corpulentia, exilitateque ostendit atque etiam siti gultu, quo meatum ad uentrem ducat, & conuiuio iungat foramina. Intestinorum etiam natura utique illi animalium generi, hoc est utrinque dentato, & altera maxilla dentato, sibi differat magnitudine, crassitudine, replicamentis. Sunt certe maiora omnia intestina non utrinque dentata, nec innumerotam ipsa ita dentata omnia sunt maiora: pauca enim parua in eo genere habentur, admodum namque paucum inter cornigera nullum est. Rectum autem inestinum nulla est cui non utraque parte dētæ. Quibusdā & appēdices intestinorū, sicuti & aubus nōnullis. Ostendit omentū atque dependet superiore sui parte, in us quæ utraq; parte dentata sunt, à medio uētre, quā ueluti quardā lunata ducunt. Nec secus in us quæ altero dentum ordine carent, à maiore uentre dependet.

*Retiſculus, & huiusmodi
edentis animalibus
quodque uocatur.
Omolum, huiusmodi
ut. Abomacum, huiusmodi.*

salvæ pueri.

Omnia fere quadrupeda eademque unipara sunt pilosa, nec hominis modo leuia esse nouimus. partes etiam pronæ, couræ à quàm hominis, pilosiores sunt lupinæ aut glabræ omniino, aut minus pilosæ habentur. Ciliæ etiam, ut diximus, non ut homo habent in utraque palpebræque, pubem, aut alas oppletas pilis. Ipsorum aut quadrupedum pelis intersectorum, alius corpus totum est hirtum, alius collum hirtius pari undique modo, ut quæ ioham habent quales est leoni marialis prona tantum colli parte à capite ad artros usque, ut quæ ioham habent, quàm ualde dicuntur quales est equo & mulo. Quadrupedum uilli lanæque senectute prolixius augentur: quanquam rarefcit hiansque pauciores. Quadrupedibus pilum cadere atque subnatiui annuum est: quæ molles suapte natura pilos habere solent, hæc per usum pabuli melioris, duriores incipiunt gerere: contrarij autem molliores paucioresque, quæ duros copiososque habuerunt, eadem illa scilicet ratione. Aquarum diuersarum usum animalia suos immutant coloribus etiam candida, alba nigra redduntur. Sunt etiam aquæ multis in locis, quas cum oues haberint in eisque inierint, nigros generet agnosunt in Assyria de agri Chalcediæ Thraciæ facit amnis quem Pylchrum uocant. Ex in Antandria quoque duo sunt flumines, quorum alter candorem, alter nigritiam pecoribus facit. Scamander etiam amnis flauas reddere oues creditur. Vocæ uariæ matris quadrupedum genus quod animal procreat: neque est quod loqui possit, sed proprium id hominis est. Erectorum omnium uoxin formicæ mutantur.

De coitu partuque, & alijs quæ ad generationem pertinent in quadrupedibus uniparis.

Cap. LXXI.

Commune omnium quadrupedum est, ut cupidine uoluptatque rei ueneret maxime incitentur. Ferociant ferunt à partu, mares tempore coitus iam equi equos mordent, & mutant equum atque insequuntur. Oues quoque feri acerrime sententiam ducunt inter se, mutum in modo armantes se se simili modo & tam efferantur, & arietes, & hirci. Qui enim superiore tempore socij iugi concordia pascuntur, coitus tempore dissident, & alter alterum libidinis rabie inuadit: camelus etiam mas sequit tempore coitus & elephanti quoque ad coitum efferari solent. Idem feris quoque, uenere apertum est. nam ursi, lupi, leones acius per id tempus in eos qui accesserint sequuntur se tamen minus hæc dimittant, quia nullus ex eis gregalis est, quin etiam ursi à suis catulis uolunt ferocunt, ut canes à catellis. Quæ autem non uno tempore, sed septis anno coeunt, ut ea quæ cum homine degunt: tibi gratia canes, fales, ut manus efferatur, facit coitus copia. Omniino fera omnia, aut certe plurima, non ante cū formis ad commune pascuum uenerint, quàm tempus sit coedandi sed cum iam per artem licent, segregantur mares à feminis, seorsimque pascuntur. Plurimæ quadrupedes pedibus inuicendo exercet uenerem, formam scilicet mare superingrediente, ad mortemque parte maris supina ad dorsum feminæ rem peragunt.

- A**gunt. Quæ retro urinam mittunt, aversa iunguntur, ut leones, lepores, lynces. Quadrupedes tempore coitus nonnihil humoris suo genitali, cum mares cum etiam femine emittunt, atque admodum ad generale naribus odorantur: prominet etiam genitale in feminis cum ad coitum stimulantur. Viniparorum quadrupedum alie imperfectum animal pariunt, alie perfectum. Quæ multipeda sunt, secundiora sunt multipara enim ad genus animalia sunt nec tamen partum perficiunt complura: sed tum nanque adhuc recentem alere possunt, auctum iam adeptumque magnitudinē nequeunt: sed cum corpus ad nutriendum non sufficiat, partum emittunt, ut ea quæ vermem pariunt: quædam enim ex his catulos inarticulatos propemodum pariunt, ut vulpes, ursæ, leona, & alia nonnulla, sed omnia fere careos. Sola B inter multipara sua parit perfectos solipedes & bisulcos perfectos edunt. Bisulca pauca generant præterquam lices: singulos enim aut binos magna ex parte edunt fetus. Quæ autem maxima inter animalia sunt, ea singulos pariunt, ut elephas, camelus, equus, & reliquæ solipedes. Quadrupedes in utero gestantur extensis ad longitudinem cruribus & ad alium suam applicatis. Pinguēscunt quadrupedes cum gerunt partum, comeduntque amplius. omnes autem cum lactentur exercuari solent.

De quadrupedum uictu & ætate.

Cap. LXXII.

- P**inguēscunt vero quadrupeda omnia melius, si præfatigata sunt fuerint: & præterea quicquid immotionēque. Quadrupedum quæ animal C generant, quæ sylvestres eademque serratæ dentibus sunt, carnes omnes vescuntur: (nisi quod lupos aiunt terram quandā cum esuriunt odere: hoc igitur peculiare suporum sit.) herbas autē non alio tempore tangunt, nisi cum morbo laborant: quomodo & canes herba ingesta euomunt, atque ita pergantur. Sunt inter quadrupedes feras, quæ uictum ex lacu & fluminis petant: at uero à mari nullum, præterquam utulus marinus: sunt in hoc genere fiber, lichenus, larynum, Iu tris, & latus. Cornigera animalia, tam fera quàm urbana, & quibus dentes serrati non sunt, omnia fruge herbæque vescuntur, nisi uehementer esuriant, sive excepto unam animal digitos habentiu herba alitur lepus. Bibunt quibus dentes serrati sunt animalia libendo: atque etiam nonnulla ex non serratis, ut mures: quibus autem continui sorbendo, D ut equi, ut boues: ursus neque sorbendo, neque libendo, sed morsu. Iamēta pro aquæ quam bebant usu, suo fruuntur pabulo: & quod manus potum aspernatur, ad appetentis pabuli est. In Africa maior pars ferarū ætate non bibunt inopia imbrium. Ætatem dignosci quadrupedum confirmant, qui in eorum cura sunt constituti, si cutis præterita marillis detracta, mox relaxata, ilico in suum redeat locum: hoc enim indicium recedens quadrupedis est: ueteris contra, si diutius rugata maneat cutis. Ætas ueterinorum dentibus indicatur, & dentium brochizate, superciliorum canitie, & circa ea lacunis cum fere xvi annorum exflamantur. Vt uero Columella tradit, decimo anno equis tempora cauari incipiunt, & supercilia nonnunquam canescere, & dentes prominere.

DE DIFFERENTIIS

E

De quadrupedum ruminatone, laticatione, & aliis quibusdam
actionibus affectibusque. Cap. LXXIII.

Ruminant quæ superiorem dentium ordine carent, ut boues, oves, capræ. Ex feris nullum adhuc ruminare constat, præterquam ea quæ aliquando cum hominibus exagunt, ut cervus. lacent potissimum cum ruminant omnia: & hybernas præcipue mensibus solent ruminare septem. fero mensibus hoc faciunt, quæ intra uestigia abantur: gregales minus, boves utq; tempore vernitiam, quoniam foris pascuntur. Sunt etiam ex dentatis utrinque nonnulla quæ ruminant, ut mures pontici, ut lepotes. Ruminantia omnia coagulum habent: etiam inter dentata utrinque lepus. Conducunt nonnulla hyeme, ut hystrices, ut legilites etiam latent in ipsis arboribus: unde in mures pontici. Volucratio solidipedum propria est. Cui cætera nisi novella pascantur inerteant, apertius quæ ætate castrantur non refert. Omnia denique si dum crescant, castrantur, maiora & elegantiora quam incastata evadunt: sed si postea quam adoleverunt, & iam incremento confecti sunt castrati, nihil præterea accedere ad magnitudinē potest. Magnas quadrupedes Epirus gignit, excepto alio: sed præcipue boues & canes, indicio sunt boues quæ Pyrrhææ vocantur. Pusillis bucculas fert regio Phasiana.

Alimenta ex quadrupedibus & eorum partibus usua.

Cap. LXXIII.

Quæ herbis pascuntur inter quadrupedū genera, aut tenellis arborum ramis germinantibus, ea omnia cum hæc abundanti auridiora sunt ac G pinguiora, nobilisque alendis accommodatiora. Ideoque quibus alior herbis pro pabulo est, ea hyeme primoque ac medio vere sunt gracilia macrique, & succum præstant utiosum, ut boues: qui procedente tempore sunt obefiores meliorisque succi: postquam scilicet auridæ fuerint herbe. Quæ vero ex quadrupedibus humiliori herba pasci solent, ut oves, ea primo ac medio vere sunt præstantiores. Capræ ætate prima ac media, cum scilicet plurima fruticibus insunt germinantem his auridissime vescuntur capræ. Cuiusque quadrupedis caro deterior est, cum locis palustribus quam cum editioribus pascit. Et in domesticis ipsis, castratorum caro in suo cuiusque genere præstantissima est, uti ante diximus: pessima vero, tum ad concoctionem, tum nutritionem, tum etiam ad succi bonitatem, senescentium animalium caro. Probantissimum alimentum inter pedestria præstat assilla caro, deinde hordana, mox utulina. Agnina vero præhumida lentaque est & mucosa: succumque gignit pituitosum. A cæteris autem abstinendum suadet, inquit Galenus, is qui probum succum procreare studet. Caro eorum bubula multum quidem præbet alimētū, sed quod sanguine in gignit crassum ac melancholicum: præcipue vero taurina. Onilla caro excrementis abundat, ac succum præstat deteriorem. Caprarum autem caro, præterquam quod succum præbet utiosum, acrimoniam etiam habet & melancholicum gignit succum, præsertim hircina. Leporina caro sanguinem gignit crassiore, sed qui meliorem procreat succum, quam aut bubula aut onilla.

Inter quadrupedes præstantissima prima lepus, inquit Marcellus.

A ouilla. Cervina succum generat vitiosum ac concoctus difficile. Huic proxi-
ma est agrestis asini caro, si minor adhuc ætate fuerit & optimo corporis
habituaria & domesticæ asini caro melancholica succum procreat sicuti
& camelina, vulpina, canina, leporina, & è sue sylvestri caro. Et ceterarum
quadrupedum caro ipsa quanto suavia in alimentis probitate fuerit inferior,
tanto & illarum reliquæ partes quæ extantes sunt, ut pedes, aures, rostra,
suum partibus sunt deteriores. Iecur omnium quadrupedum crassum in ci-
bo præbet succum, tardius permeat & egre concoquitur: verum succum
procreat non omnino malum. Et quæ lactent adhuc, si matris lac probum
fuerit, eorum iecur bona succi est. At quorum depravati humores fuerint,
aut quæ iam consueverint, eorum iecur bonum efficere succum nõ potest.

B In omnibus vero, quod *σπέρμα* vocatur, eo quod animal quod mactatur
caricis sit saginatum, præstantissimum est, tum ad alia, tum vero ad saporis
gratiam: & in his præcipuum suavia est. E reliquis autem viscibus, hen
neque gustui suavis est (habet enim in se acerbitatem perspicuam) & suc-
cum præterea gignit vitiosum ac melancholicum. suillus vero hen non adeo
malus est. Pulmo utroque concoctu facibilis eo est quo rarior: iecinore ta-
men longe minus alit, atque quod ex eo gignitur alimentum, pituitæ ma-
gis naturam habet. Cor ad concoctionem item difficile est: utrum si recte
conferatur alimentum gignat neque exiguum, neque quod malum succum
efficiat. De renibus inter sanguinorum glandulas dicimus. Venter, iecur
& intestina quadrupedum, ipsa carne duriora sunt, adeoque concoctu dasti-

C cilia: quod si rite concoquantur, succum gignunt, qui non omnino in cal-
parus sit, sed frigidior, crudior inque, & qui tempus prolixius desideret,
ut ex eo probus fiat sanguis minus quoque aluit quam caro ipsa. unius
ergo partu melior est quam ediro. Quadrupedum testes concoctu sunt dasti-
ciles malique succi, ut qui virosi quiddam sapore referat. Caudæ duri-
ores sunt, verum ob frequentem earum motum, minimum habent excre-
mentum. Aurium cartilago in uigentibus saltem ætate animalibus, & sicca
est, & minime nutrit. Earum cuius tenuis aridique est: egre item conco-
quitur, & paucissimi nutrimenti est. In quadrupedum lacte non parua re-
peritur differentia: siquidem boum lac, ut Galeno uidentur, crassissimum
est & pinguisimum: caeter butyrique habet plurimum, ualentius nutrit. Mi-

D nime vero pingue camelinum est, liquidissimum quoque & feri multum ha-
bet, imbecillius dat alimentum, & aluum ciet: mox equinum liquidissimum
minimeque pingue est: postea asininum. Caprinum modico uet crassum esto-
nullum crassius illo est. Plinius uero de lacte hæc produxit: maxime alit quod-
cunque humanum, mox caprinum, dulcissimum ab hominis camelinum,
efficacissimum ex asinis, magnorum animalium & corporum facilius red-
ditur. Stomacho accommodatissimum caprinum: bubulum medicatus:
alius enim maxime soluitur bubulo. Ovellum dulcius & magis alit, stoma-
cho minus utile, quoniam est pinguis. Aluum manns tæat lac caprinum,
inquit Dioscorides, quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis fere utitur
& inde quoque stomacho idoneum est. Ovellum uero dulce, crassum & præ-

DE DIFFERENTIIS

pingue, non usque adeo stomacho utile. bubulū alimantūque & equinum E
aliūm eiecit magis. Minus inflat lac quodcūque decoctum: & omnino in-
nocentius est decoctum, præcipue cum calculis marinis. Medicamentose
paritum. & excrementorum vires earūque discrimina, explicata in sin-
guineo animalium genere sunt.

De quadru pedibus uniparis multifidis, & primo
de elephanto. Cap. LXXV.

Generis quadru pedum que animal gignunt, plura quidem genera in-
telliguntur, sed nullis fere notata nominibus, nisi quod singularū spe-
cierū nomina habentur, ut leonīs, equi, cetus, canis, reliquorūque ad hūc
modum. Seorsum igitur eorum naturam singulariū consideremus neces-
sarium est, ut differentiis quæ cuique animalium generi conveniant acci-
piamus, à multifidis exortī. In quadru pedū genere maximum est elephas,
proximūque humanis sensibus, ætēque multifidum. Elephanto oculi
quāvis magna habeātur, minores tamen sunt quā pro corporis magni-
tudinē. Promiscuam pro nare gerit atque hanc partem sortitus est præ cæ-
teris animalibus peculiarem, prolixam adeo, ut ad terram pertingat, & qua-
lidam, gracilem tamen pariter & mollem, aptāque ad flectendum. Eius
vero ulus idem qui manus ea namq; cibos tam siccos quā humidos colligi-
git, capit & in os perinde ac manu admonet solum animalium omnium:
& arbores quoque eadē proferunt. Et quoties immeritis per aquam ingre-
ditur, ea ipsa edita in sublimē refert atque respirat: adiciūscula parte sui po-
strema naris hæc est, ac cartilaginea, & proinde rigidiuscula. Dentes illi utrius
que quatuor intus, quibus conficit cibum atque in farinæ speciem molit.
Duo præterea prominent grandes, quos mares grandiores resinososq; ha-
bent: feminæ minores, & contra quā mares emergūt enim deorsum pro-
niūque deuiant. Statim cum natus est elephans, dentes habet: quanquam
grandes illos non illico perspicuos obtinet: & candore dentium intelligitur
iuuenta. Decidunt elephanto dentes isti grādiōres, & renascuntur quibus-
dam temporum intervalis. Et deciduos casu aliquo uel senectā desodiunt:
hoc solū ebur est: cætero & in iis quoque, quod corpus interit uilitas ossa.
Linguam perquam exiguam habet elephas, atque intus positam quā
in cæteris sit, ita ut uix eam uidere possis. Mammas duas quidē, & papillas H
item duas, utram non in pectore habet, sed paulo citra sub armis: que tam
mari quā formicæ perestigunt sunt, nec pro corporis uastitate, ita ut eas
à latere conspiciere propemodum nequeas. Crura habet priora multo po-
sterioribus longiora: & malleolos posterioribus imis cruribus possidet par-
uos. Pedes habet, ut dictum est, multifidos, & digitos numero quosque in-
diuisos leuiterque discretos: & ungues omnino nō sunt, sed ungulis potius
similes. Flectit hæc suos posteriores poplites modo hominis: ut uero solius
scribit, suffragines flectere nequit. Nequit certe præ nimio pōdere, utrūque
in latus equilibro quodā uergere, sed aut leuo incubat aut dextro: atque eo
ipso habitu requiescit. Genitale habet simile equo, sed parū, nec pro corpo-

Aris magnitudine. Testes itē nō foris cōspicuos, sed inuis cōditos habet: quo circa initum celerius agit. Vt in quadrupedū genere, elephas minime huius est: & ferarū certe, ut inquit Plinius, nullum illi regimētū: ne in cauda quidē prēsidium abegēdo rē dū mofcarum, sed cancellata cutis, & mutans id genus animalium odore. Ergo cum extēri receperit examina, arctans in rēgas repente cancellis, comprehendis enecat. Hoc us pro cauda, pro iuba, pro uillo est. Dorsū dū dorso tergo est, uentri mollis. Viscera illi fūillis proxima, sed maiora: necur enim quadroplo maior bubulo est: & reliqua pari ratione, excepto liene: hic enim minor ex proportione est. Iecur sine selle est: nescio tamē, parte qua sel adherere solet, humor sellis effluit plus minus. Sel ad pectus habere traditur à nōnullis Galenus, Hinc, inquit, iacibilis iecori adheret, magnitudine ad uisceris rationem. Intestinum per amplum est, equino simillimum: ita tamē sinuosum, ut alios habere quatuor uideatur. In hoc etiam cybus recipitur: nullum enim conceptaculum cibi separatū adest. Gratiſsimas in cibatu palmas habent: quanquam & truncos edunt, & lapides deuorant. Elephanti solitudines petant coturi, sed præcipue secus flumina, & quā pasci cōsueuerunt: est enim hoc animal uti mox ex placibimus, sua natura simul terrestre & palustre. Incipit autem coire tam mas quā femina ante annum ætatis uicēsimū. Femina enim incipit coire aut duodecimo cum celestine, aut quintodecimo cum lentil sine. Mas quinque aut sex annos natus superuenit inire uteri: & coire quini, non amplius, in anno dicitur. Coitum triennio interposito (uel uti alijs placet, biennio) repetit mas. Quam gravidam reddidit, eandem præterea tangere nunquam patitur. Ad coitum efferrant solent elephanti, adeo ut pluribus incommotis homines afficiant: mitigari pabuli copia narrantur. Ferendi uteri tempus, alij annum & sex menses, alij biennium, alij triennium statuunt. Causa quam ob rem incertum hoc sit, quōd nō pateat cōtus. Decem annis gestare in utero ualguis existimat: Aristoteles biennio. Partu posterioribus crumbris subſidens inuitēſque, & manifestō cum dolore: parit in uere. Parit autem singulos: uniparum namque est: nec amplius quā semel gignere tradūt Plinius & Solinus. Fortum magnitudine bimēstris aut trimestris uitali editur, ut alijs placet, utuli annaculi, aut porci ætatis integre. Pullus statim cum natus est, cernit & ambulat. Citra nates oti ipso

Duocem eludit spirabundam, quemadmodum cum homo simul & spiritum reddit & loquitur: at per nares simile tubarum rauicanti sonat. Elephante dum in syluis uersatur, ferocissimus est: at manifestatus, omnium ferarū mitissimus & placidissimus euadit. Facillime autem omnium manifestum ac permulta officia & eradatur, & quasi intelligit. Valet sensu acque memoria, & reliqua sagacitate ingenij excellit. Elephanti pugnant inter se uementet, & dentibus alter alterum ferit: qui autem uictus fuerit, adeo animam amittit, ut ne uocem uictoris toleret. Propter ferinas tamen munquam dimittant: nulli enim nocuerant adulteris. Sunt apud Indos in usu rei bellicæ non solum mares, sed etiam femina: uerū feminae pauciores sunt, & longe minores. Differunt inter se elephantes marum in modum robo-

*Ante decimo solinus
& Plinius.*

In quibusdam exemplis huius Plinius hoc non habetur.

Adiunget, Tbe aduocatus dicitur, ut dicit, aduocatus.

DE DIFFERENTIIS

re atque animo. Duo nūque sunt eorū genera. Nobiliores indicat magnitudo dominiores nothos dicunt. Indicos elephantos Mauri timent, & quia parvulus fuit confectus aspernantur ab his videri. Elephantem alij annos ducentos vivere aiunt, alij trecentos: & alij mares annos ducentos vivere, alij centum & viginti aiunt: formam etiam fere totidem, sed florere aetate circa sexagimum narrant. Hyemis ac frigoris impotens hoc animal esse dicitur. Amat annes: & quamquam non flumende sit, tamen riparium dici potest. Incedit etiam in aquas, & eatenus progreditur, quatenus eius promulcis superat: refat enim per eam, & spiritum accipit & reddit. sed natare satis pondere sui corporis non potest. Elephantos ceteris malis immunes esse aiunt: infestatione autem alui acius infestari. Agrotant etiam si comedant terrā, nisi ea frequenter utantur: nam si frequenter, nihil sentiant mali. Lapides etiam interdum deuorant, ut diximus, & truncos necnon fluore tentantur. Odorem muris vel maxime fagiunt: pabula etiam quæ à musculis contacta sunt, recusant. Mortem suam præsentunt, sicuti & dolores. Est elephantis animalium humanis sensibus proximum: quippe intellectus illis sermonis parvi, & imperiorum obediencia, officiorumque quæ didicere memoria, amoris & gloriæ voluptasimo vero, quæ etiam in homine rari, probitas, prudentia & æquitas: religio quoque, ut prodidere auctores, & magna doctitas. Et hæc quidem uestigia morum animi humani in hoc cernuntur animali. Elephantes fert Africa ultra Syrtacas solitudines & in Mauritania. Ferunt etiam Æthiopes & Troglodytæ, sed maximos India. Elephantes Italia in Lucanis primum bello Epatorico vidit: & boues lucas inde dedit. Elephantorum dentibus ingens pretium, iam adstringēdi obtinent: eorum scobe imposito paronychia sanantur. Ita Dioscorides. Plinius vero, Ramensis, inquit, eboris cum melle Ardeco (ut aiunt) subecule in facie, scobe paronychia tolluntur. Elephantis sanguis, præcipue matris, fluxiones omnes, quas rheumatismos vocant, sistit. Proboscidis tactu, capitis dolor leuatur: efficacius si & sternuat. Dextera pars proboscidis cum lennia rubrica adalligata, imperus libidinum stimulat. Sanguis & ichthadici prodest: necurque comitialibus morbis.

1. De dentibus huius, an dentes dicendi sint, an potius cornua, videt Pausanias in Hælicis, & Oppianus De venatione lib. 2. 2. Decimo quoque anno, ut refert Ælianus, quo pabulo dentes etiam defoliant, idem narrat. 3. Iodius & eulēque discerens, ut videt in Æliano de venatione lib. 2. Plinius infirmos dicit. 4. Hinc Plinius necres elephanto quatuor esse dicit. 5. De elephanti pabulo & ponone Aristoteles lib. 8. histor. animalium. 6. Quo pabulo utantur capiuntur elephantes, & quo modo domantur atque manescant, ostendunt Aristoteles lib. 9. histor. animalium, & Scribo lib. 14 & 16, & Solinus. 7. Proboscidas de Appollonio lib. 1. cui prodidit elephantonum generis palatium, montanocem & campellum.

De simiarum generibus.

Cap. LXXVI.

*Simia, vel de
sim.*

*Simiarum
vulgus.*

Corporis figura simiarum genera perfectam hominis simulationē continent, inquit Plinius. Conuersant certe cum homine plurimum sua facie simiarum vulgus. Est enim hoc genus, inter omnia simiarū genera homini simillimum: facies nūque illis rotunda est: & aures, nares, dentesque, tam primores,

A primores, quàm maxillares hominis more habent natura tamen in eis
- nascitur à fronte remissis

Contudit, & rugis perstravit anilibus ora.

Cilium etiam cum ceteris quadrupedes non in utraque palpebra habent,
sinist. habent: quanquam prætenu ac prolixius, potissimum in inferiore.
Collum itè ut homini breue. pectus habet omnium quadrupedum latissi-
mum. In pectore quoque duas mammarum papillas: & brachia hominis
modo, sed hirsuticula, quæ & ipsa & pedes, ut homo inflectit hoc est ita ut
circumferentia membrorum utrorumque obuerse inter se adducatur. Ad
hæc manus, digitus, ungues homini similes: & pollex is quoque & articu-
lit, ut homini: uerum omnia rudiora effatiorisque, - Ut eadem

B Dissimiles homini possent similesque uideri.

Pedibus paulum differunt: sunt enim ut manus prælongi: & digiti ut ma-
nus constant, ite d. longiores: & uestigium palmæ simile faciunt, atq; ius-
dem & ut pedibus & ut manibus utuntur: inflectuntque eisdem perinde
ac manus: & ut pauci d. c. pedes manibus habent similes, & quasi ex ma-
nu pedesque constitutos: & calcis postremum ad pedem, reliquæ autē par-
ticulæ ad manum facile referuntur. Lacertos & femora habet breuia pro-
portione cubitorum & tibiaurum. Umbilicum qui emineat nullum habet
sed durum quiddam continetur loco umbilici. Partem corporis superiorem
multo maiorem habent quàm inferiorem, uidelicet more quadrupedum:

C n. quadrupedū more quàm erecta. Carent naribus, utpote quadrupedes:
priuatæ cauda sunt, utpote bipedes: exiguæ enim cauda omnino inest, qua-
tenus nota solum habeant. Genitale semine, muliens est: mari potius ca-
nus quàm hominis. Partes interiores humanis similes continent. Simia ani-
mal ad omnia imitanda habile est: & omne quod corpore agitur, si doceat-
ur, facile discit, & idipsum actione representat, saltat, tibia canit: denique
adeo uariū natura animal est & multiplex, ut ad omnē actionē scire uerlet.
Apuđ Indos simiarum quoddam genus rasum est, quod in urbes nō addu-
citur: quippe quod ueneris libidine adeo inflāmur, ut ad muliebrem se-
zum furiat. Has itaque si quando deprehendant, statim interficiunt Indi.

Simiarum generi præcipua erga sortum affectio. Gestant catulos, ut quos
D immoderate amant, magnæque ex parte complectendo necant: quo sit ut
catulos facilius amittant, quos impendio diligunt, & anse se gestant: quo-
nam neglecti pone matrem semper hærent: ex huius natiq; quos fore pa-
rem solent, alterum amant, alterū uero negligunt. Pro uoce stridor quidam
is est. Post hominem nullum animal præter simiam *admodum* ueratur:
1 omentum enim illi omnium quadrupedum maximum est. Sunt & alia si-
miarum genera: nempe cercopitheci caudas habent: hæc sola discretio est
2 inter prius dictas. Cercopithecos generat Aethiopia nigris caputibus, pilo
afinino, & dissimiles ceteris uoce. Megalthenes auctor est, cercopithecos
in India apud Prasios gigni maximis canibus maiorem: & totos albos præter
faciem, quæ nigra est (quod aliis contra euenit) caudis longis supra duos cu-

Cercopitheci,

Cephus
Cybus

DE DIFFERENTIIS

Cynocephalus hinos: & præterea miniflunos. caniceps etiam sic enim cynocephalum uo-
ce & numero sumatur, & eadem forma qua summa est sed maior ualeatiorq;
& facie, canina similitior, unde & nomen accepit: adhuc moribus ferocio-
ribus est, & dente robustiore, caninoque proprio. Ad salum uolenti sunt
cynocephali, feri mortui, nunquam ita manent, ut non sint magis rubide-
in Æthiopie paribus frequentissima. Cynocephalorum plura sunt genera.
Sunt & cynocephalus similes quidam, rostro scilicet porrectiore, & qui
dentes caninos, quos *caniniformes* uocamus, habent prominentiores. Hæ uix
bis cruribus erectæ indistant ut alie, cum abesset ita incedere aut cur-
rere possint. Inter simias habentur & sphinges, uillose comis, & pilo fuscis
mammas in pectore prominentes ac profundas, doctiles ac feritatis obliuio-
nem. Æthiopia hæc generat. Códum in thesauros maxillarum cibum sphin-
giorum & facyrorum genus: mor unde sentiam ad mandédum manibus ex-
primunt. Sunt etenim inter simias, & quas uocant facyros facie admodum
grata gesticulatis moribus inquieti. natura his mortissima. Callitriches to-
to pene aspectu à ceteris differunt. In facie barba est. cauda primore parte
lata. Hæ capere non est arduum, sed proferre raram. hoc enim animal ne-
gatur uivere in alio, nisi in Æthiopico quo gignitur celo. Et quemadmo-
dam in terra, sic etiam in mari aliquod est simiarum genus, quod delphino
medicinam in morbo affert. In mari rubro, auunt, simia est, non pelcis qu-
dam illa, sed bestia cartilaginea, & uelut squamarum exerts: eaque ipsa nō
magna, colore & aspectu terrena simia: non pelceo tegmine, sed uelut tes-
tudinis cortice uestita. Eadem similitè atq; terrestris pelima est: reliquū
corpus instar torpedinis latū est, ut dicas aem esse alas & explicantem. Cum
natat, uolare uidetur: anaculis quibdam distinguatur.

2. Simiarum genera. Tria etiam genera nota: *Oppianus*, *Aicus* & *Anthroci*. 3. *Anthroci*, cepus est apud *Anthroci*, simia genere caudam. Inter monstra *Ethiopia* con-
fetur cepus apud *Solium* : & cepus apud *Plinium*, quem *Pompei Magi* ludii pri-
mum ostenderunt *Roma ex Ethiopia* : cuius pedes posteriores pedibus humanis &
conibus, priores manibus fere similes. Hoc animal *pecca Roma* non vidi. Cepum
etiam refert *Aelianus* nostri formae *syncephalo similem*, magnitudine canis *Ery-
thraei* sit, colore perquam vario. Sunt apud *Indos*, inquit *Plinius*, simia toto corpore
candore. 4. In hoc fecilian genere est qui *apertus* ab *Anthroci* vocatur, id est
simia porcina, cui rostrum simile habet chameleon. 5. Quibus aribus capiantur
simia, explicat *Plinius*, *Solinus*, *Diodorus* & *Strabo*, aliqui nonnulli.

De carabus.

Cap. LXXVII.

Copyright © 2008

EX iis quoq; nobiscum degant canes sunt, atq; hominibus fidelissimi. Soli domum mouere: & agnoscunt quoque si reperire ueniat intelligunt soli nomina sua, soli uocem domesticam agnoscunt. Itineris quantum longa meminerant: uel ulli prater hominem memoria maior. In uenatu sagaces & solertia precipua est. Plurima alia in his quotidia uitae inueniunt. Dentes canibus serrati sunt, ut quibus qui canum uocantur, decidunt secuti & homines, adq; quanto citius morde: & prater caninos illos nulli mutantur. unde fit, ut due res sit authorum sententia: alij enim cum hos mutari uiderent, ceptos quoque paulo ratione mutari existimant alij, quod duos canes modo mu-

tant

Arant, negant omnino ullos mutari, cum eos paucos reperire difficile sit. verum hoc propterea latet, quia non ante decidant, quam alij intus enascantur. Iuvenibus dentes candidi & acutiores proinde nigriores atque obtusiorandque fit, ut aetas utriusque, recensiorumque canis dentibus iudicetur. Maximas gerit canis, nec in pectore, ut homo, nec in feminibus, ut ovis, sed in uentre. caudam sub alium flethunt, qui degeneres sunt. Pedes priores quoniam distinctos digitis habet canes, posteriores quatuor. ungues canibus recti, præter eum, qui à crure plerumque dependet. Venter cani parvus, & qui non multo amplior sit quam intestinum, sed quasi intestino similis, annus levis. Inferior intestini pars arbor effunditque uehementi roxu, nec sine cruciatu eam partem leuat incrementis. Atas canum, ut in modo di-

Bximus, dentibus indicatur, sed & senescentibus uox grauior redditur. Coeunt canes aliorum more retro mungentium: diutiusque in coitu ligati cohabitent, etiam iuui. Canes tam mares quam feminæ annuli magna quidem ex parte coeunt, sed nonnunquam mense octauo, quod magis feminæ euenit quam mari: nonnulli canes & semetres coitum patiuntur. Inuicem in feminis in mamillis apparet, cum aetatem coeundi iam habent sit enim peninde ac in hominibus tumor in papillis mammillarū, & ueluti cartilago quidā consistit: sed difficile id perciperis, nisi habeas usum rei: carē enim hæc indicia magnitudine. hoc igitur feminæ euenire certū est: mari nihil eiusmodi accidit. Tēpus quo toto femina libidine tenetur, diebus quatuordecim magna ex parte describitur: uerū nonnulli etiā ad sextidecimum

Cperunt. Canes non per totū coeunt aetate, sed usque ad quendā aetatis uigorem: ad annos enim duodecim magna ex parte & coeunt & implentur. uerum iam aliquibus tum feminis tum maribus uel annū octauū & decimū, atque etiam uigesimali natis, facultas nō desinit prolifici coitus. Laconice coeunt quandiu uiuunt & mates & feminæ. Hæc Aristoteles. Columella uero, Nates, inquit, in uillatico & pastorali canum genere iuueniunt usque in annos decem progenerant. Post id tempus in euendis feminis nō uidentur habiles: quoniam seniorum pugra soboles existit. Feminæ concipiunt usque in annos nouem: nec sunt uiales post decimum. Canes etiam cum alienigenis coire aptum est. In Cyrenensi agro, (uel apud Gallos, ut Plinius refert) lupi cum canibus coeunt, & Laconici canes ex uulpe & cane generantur. Im-

Dpletur canis uno inatu, quod in furticis maxime constat: inestibus: implent etiam qui semel inierint. Gerit uerū diebus scire sexaginta & uno aut duobus, aut ad summū tribus: nec minus quam sexaginta diebus. Quod si quid celerius prodiere, educari ac pethici nequit. Cū peperit, nulum sexto post mense, nec citius, coitu impletur. Catulos parit articulos quidem, sed cecos: nec ante duodecimum diem usum recipiunt. Quæ ante iustum tempus concepere, diutius cecos habet canulos: nec omnes totidē diebus. Sane quæ duobus & septuaginta diebus uterum serant, quarum catelli quatuordecim diebus hoc carent. Quidam tradunt, si unus gignatur, nono die cernere: si gemini, decimo eodēque in singulos adici, totidēque esse tarditatis ad lucem dies. Quò largiore alitur lacte, eò tardiore in usum acci-

*Etiam uicem
sem inuicem
Alexander
pluribus in
problematis
lib. primo.*

*Pregnans si
semel inuicem
inquit Varro,
tertio mense.*

DE DIFFERENTIIS

Canis, inquit
Piero, dicitur
ingente uolere
inopant,

punt: non tamen unquam ultra uicesimum primum diem, nec ante septi-
mum. Optatus in seruo qui nouissimus cernere incipit: aut quem primum
fert in cubile ferat. Primos mares parit: canisculum ceteris alternant. Ca-
nes feruntur à canulorum partu uolenter ferocunt, & canire tam dicun-
tur, quod Graeci *κύνω* & uocant. Et tamendecum etiam temporis canire putan-
tur dum canelli luce carent. Parit canis duodecim cum plurimum, sed ma-
gna ex parte quinque aut sex: unum etiam aliquam peperisse certum est,
quod tamen prodigium putant, sicut omnes mares aut omnes feminas ge-
gni: Laconica magna ex parte octo parit. Lac ante diebus quinque q
parit, feruntque habent magna ex parte ueterum nonnulli etiam septē die-
bus anticipat. Genus canum Laconici post coitum diebus triginta habere
lac incipit: uile statim ut pepererint, est. Crassum inter initia omnium est: F
deinde processu temporis tenuius redditur: crassius canum quàm cetero-
rum animalium lac est, excepto scrofae & leporis. Crus mares tollentes
mangunt, magna ex parte quidem sexto mense aetatis: sed nonnulli uel se-
ptimo, octauo scilicet mense id faciunt: atque etià maturius quàm sextos idē
signum est cōsummati uirum roboris. Quod autem simpliciter dixerim,
cum coire incipiunt, tollunt. Feminae omnes confidentes mangunt: uerum
in hoc etiam sexu nonnulli crure elato mimorunt. Viuit canes maxima
quidem ex parte ad annos quatuordecim: sed nonnulli uel ad uiginti pro-
trahunt uiram. Viuit Laconici, inquit Plinius, annis denis, feminae duode-
nis: cetera genera quindecim annos, aliquando uiginti. Canes tribus prae-
cipue laborant uitis, rabie, angina, podagra. Facit rabies furorem: intereū G
canes hoc morbo, & quae moria sunt omnia: solus homo non absque mor-
tis quoque periculo euadit. Angina etiam interimit. Et podagra etiam pau-
ci euadere possunt. Rabies canum Syrio ardente homini pessima: ita mor-
sis lethalis a qua metus. Quapropter obuiam itur per triginta eos dies gal-
linaceo maxime fimo mixto canū cibis: aut si praecenerit morbus, ueratro.
Canum plura sunt genera, quibus nomina sere regiones dederit, ut Laco-
nicum, Salentinum, Molossicum, Arcadicum, Indicum, Britannicum, Me-
litense. Quamquam & aliqui à nutritoribus appellantur, ut Castorij, Me-
nelindes. Laconici canellis nates porrecte longius: idēque olfactu ualent.
Coit Laconicum genus mense suae aetatis octauo: & crus iam circa id tem-
pus attollentes nonnulli uiram reddunt. Gerunt Laconice uterum sexa-
genis diebus, aut uno uel altero plus minusue, uti modo diximus: & post
coitum diebus triginta habere lac incipiunt. Magna ex parte octo parit:
coeunt quandiu uiuunt & mares & feminae. Sūt ex his quae ex cane & uul-
pe procreantur, *Alopécides* dictae. Et peculiare generis Laconici est, ut cum
laborant, coire melius quàm per otium possint. Viuit in hoc genere mas
ad annos decem, femina ad duodecim: maxime enim in hoc genere, quia
munus laborant quàm mares, uiuaciores maribus sunt. In hoc quoque ge-
nere feminas sagaciores esse quàm mares apertum est. In canum generi-
bus triplex ratio est: namque unum genus aduersus hominum infidias eli-
gitur: & ad illam quaeque uincta sunt uille custodit: illa tici appellamus.
At alterum

Alia, rabies.

*Laconici can-
is.*

Alopécides.

*Sagaciores, di-
cuntur, quia
canes uelut
dumftrus.*

- A** Arctærum propellendis uariis hominum ac ferarum: & ad obsequia domus tabulum, foris pecora pascenna, pascorale uocamus & pecuatum. Ter-
 num uenandi gratia comparatur. Villaticus eligendus est amplissimi cor-
 poris, uasa latrans canonicque, ut prius auditu maleficum, deinde etiam cō-
 spectu terreat. Niger potius eligendus quàm albus aut uariositate enim la-
 ce clara sur aduenienti, terribilior niger conspicitur, siue nocte, ne conspici-
 tur quidem propter umbræ similitudinē. Probarur quadratus potius quàm
 longus aut breuis, capite tam magno ut corporis uideatur pars maxima,
 deiectis & propendentibus auribus nigris uel glaucis oculis acn humane ra-
 dianibus amplo uulsoque pectore, latis armis, cruribus crassis & hirtis:
 cauda breui, aciliorum articulis & unguibus amplissimis. Hæc erit uilla-
 tici canis stans præcipue laudandus. Mores autem neque mitissimi, neque
 rufus inuices: quod illi furem quoque adulantur, hæc etiam domesticos inua-
 dunt. Satis est leueros esse nec blandos, ut non nunquam etiam conseruos
 iræpius atqueantur: semper excandescant in externos. Maxime autem debet
 in custodia uigilare conspici, nec erronei, sed assidui & circumspici magis
 quàm temerarij. Nam illi nisi quod certum compererunt, non indicit:
 hæc uano strepitu & falsa suspitione concitantur. Nec multum refert an uil-
 latici corporibus graues & parū ueloces sint: plus enim cominus & in gra-
 du, quàm eminus & in spatio cursu facere debent. Nam semper circa se-
 pta & intra ædificium consistere, imo ne longius quidem recedere debent.
 Satisque pulchre funguntur officio, si & aduenientem sagaciter adorsitur,
 & latrans conuenient uel si constanter appropinquantem uolenter inua-
 dunt. Atque hæc de domesticis custodiendis de pastoribus. Pecuarij
 canis neque tam stringosus aut pertus debet esse, quàm qui damas ceruolq;
 & uelocissima sectatur animalia, nec tam obesus aut grauis quàm uille hor-
 relique custodit & robustus nihilominus, & aliquatenus præptus ac stre-
 nuus: quoniam & ad rixam & ad pugnam, nec minus ad cursum compa-
 ratum: cum & lupi repellere insidias, & raptores feram consequi fugientē,
 prædāque excutere atque auferre debeat. Quare stans eius longior pro-
 ductiorque ad hos casus magis habilis est, quàm breuis aut etiam quadra-
 tus: quoniam, ut dixi, non nunquam necessitas exigit celeritate bestiam cō-
 sectandam. Ceteri artus similes uillanæ canis atque probantur. Colore eli-
 gatur albus potius quàm niger aut uarius: quoniam hæc est fere dissimi-
 lis, magnoque opus interdum discrimine est in propulsandis lupis subob-
 scuro manere, uel etiam crepusculo: ne si non sit albo colore conspicuus, pro
 lupo canem feriat pastor. Huic quadrupedi neque formine neque mari, ni-
 si post annum, permittenda uenus est: quæ si teneris conceditur, carpit &
 corpus & uires, animosque degenerat. Hæc Columellæ sententia est. Duo
 canum genera M. Varro producit, unum uenaticum, & pertinet ad feræ be-
 stias ac iynocitæ alterum quod custodit causa paratur, & pertinet ad pa-
 storæ. Hi facie debent esse formosi, magnitudine ampla, oculi magnan-
 tes aut tuis, naribus congruentibus, labris subnigris aut rubicundis, neque
 refinis superioribus, neque pendulis subnasamento suppressis, & ex eo ena-

*Pastorale,
Pecuarij,
Villaticum.*

*Canis pecu-
arij,
Pastorale.*

*Canis uenati-
ci,
Pastorale.*

DE DIFFERENTIIS

tis duobus dentibus dextra & sinistra paulo eminentius superioribus, directis E potius quàm brochus, & acutus, quos habent labro rectos: capitis & auriculis magnis ac flaccis, crassis ceruicibus ac collo, internodiis articularum longis, cruribus rectis, ac potius nanis quàm uacuis, pedibus magnis & altis, qui ingrediendi ei dispendantur: digitis discretis, angustibus duris ac curvatis. talo nec ut corneo nec marmoreo duro, sed ut fermentato ac molli: à feminibus summas corpore suppresso: spina neq. eminentia neq. curua, cauda crassa, latratu graui, heatu magno, colore potissimum albo: præterea feminas uolunt esse mammosas, æqualibus papillis. Venatici eamum generis nõ eadẽ est omnium species, uideamus morested ut præclare coecinit Grætius,

Mille canum patitur, doctique ab origine mores

Cuique sua. - Sive indomatos uehementior hostis

Nudo Marte premas, seu bellum ex arte ministras.

F

- Magna indocilis dat prælia Medus.

Bladi canis.

Geloni canes.

Perseus canis.

Seræ canes.

Lycæones.

Britanni canes.

Arbama canis.

Acyrus.

Phæra.

Acarnan.

Arctica.

Sicambri.

Perroni.

Vulber.

Canis hircus.

Indicus.

Arma negant contrà, Martemque odere Geloni,

Sed natura sagax, Perseus in utroque paratus.

Sunt qui Seras alant genus intractabilis iræ.

At contrà faciles magnique Lycæones armis.

Britannici non specie tantum & decore, quantum uiribus pollent, & taciturnia solertia. Arbama canis, Acyrus, Phæra, Acarnan, uersutur omnes,

- Ex quæ subire pericula furto.

Arctica multo clangore feras insequitur. Sicambri uelocitate præstantiuta & Petronij, & præterea inuestigandarum serarum sagacitate: sed quæ cum G multo fiat latratu. Canis Vulber naris quidẽ sagacitate ualet, sed imbellis est. At Hircani (quos & Indicos uocant) ex paterno semine ferocissimi: Indicos enim canes ex tigride & cane gigni confirmant: uerum non statim, sed ex tertio coitu natos educant Indi: primo enim & secundo sensu beluinos adhuc canulos procreari aiunt. Alligantur canes locis desertis: & nisi belua incensa libidine sit, serpe lacerantur. Forma quoque differunt uenatici canes: est enim ex his genus quoddam

Seu Lacedæmoniarum natum, seu rure molosso

Elegens, promptum ac strenuum: & qui sit

- Cursu facilis, facilisque recursus:

corpore longo ac robusto, capite leui, pulchris oculis, ceruleis, splendens: Hibus, rostro porrectiore, dentibus eminentius, acutis auribus paruis mollibusque, tenuibus & uelut membranis collo loto, pectore amplo robustoque, cruribus: gracilibus, altis, nigris coxis diuictis, prioribus pedibus minoribus: latius armis, costarum ordine in obliquum magis tendente, &

Qui sensum rursus seca se colligit aluce

lumbas amplius & bene carnosas, sed maname obelis, cauda gracili, prælonga. In hoc uenatorum eamum genere sunt, quibus ceruos, dorcadæ, leporesque prole quæmur: ut qui Perroni uocantur, & Sicambri, & quæ Verrahâ uocant.

Hanc elegantissimo carmine depinxit Grætius poeta.

- Te leue si quæ

Tangit opus, pauidolque inuat compellere dortas,

Perroni canis.

Sicambri.

Verrahæ.

Aut

A Aut uersuta sequi leporis uestigia parui,
 Petronidos sic fama canes uolucresque Sicambros,
 Et pectus macula uertraham deluge falsâ:
 Ocyor affectu mentis punnâque cucurrit:
 Sed premat inuentas, non inueniunt a laetibus
 Illa feras, quæ petronais bene gloria constat.

Hæc Grævus. E uenaticis autem canibus quibus tauros uenamus,
 suisque syluestres atque ad genus ferocia animalium corpus robustius est,
 & palis hirsutus, nares sinæ magis, aspectus trunculætiôr, fronte & super-
 cilis prominentibus, oculis acti lumine radiantibus, dorsum amplum nec
 sane uelox hoc genus est. Tertium uenaticorum genus, Britannii agalæum *Agalæum*
 uocant: tremuus generosusque hoc est, uenam prædictis longe minor: ma-
 gnetudine potius ignobilioribus hæc canibus, qui sub mæsis in aribus no-
 stris aluntur: æqualis, gibbus, strigosus, hirsutus, aspectu oculorum ignauo,
 ungibus duris rigidisque, dentibus iis qui canini uocantur, magnis, naris
 sagacitate in peruestigandis ferarum uestigiis ceteros omnes facile supe-
 rat. Tuscos canes uocat Augellus,

Tuscos canes

Forma quibus licet obsita uillo,
 Dissimilesque habeant canibus uelocibus artus,
 Haud tamén inuocunda dabunt tibi munera præda.

Nanque & odorato noscant uestigia præto:

Atque etiam leporum secreta cubila monstrant.

C Gracius glympticum nominat & metagonta,

Quem primam celsa foram ceruice ferentem

In syluis egit Beotius Hagnon.

Hæc

Vnas prædictum, atque o perit spes magna petito

Assumptus metagon, lustrat per nota ferarum

Pascua, per fontes, per quas trivere latebras

Præter lucis opus æum signa uapore sereno

Interemerata legens, si qua est qua fallitur ens

Turba loci, maiora ferat spatia cetera gyro:

Atque hæc egressu iam tunc sine fraude reperto,

Incubuit spatius.

Sed ne quæ ex nimio redeat in chæra furore,

Lex dicta officij neu uoce laceraret hostem,

Nunc leuem prædam aut propolis pignora lucri

Amplexus, primos nequequam offenderet actus.

Iam uero unpendum melior fortuna laborem

Cum sequitur, iuxta domus qua sita ferarum

Vt sciat, occultos & signis arguat hostes:

Aut effecta leui testantur gaudia canda,

Aut ipsa infodiens uncis uestigia plantis

Mandat humum, celsas uel apprehendat nantibus aures.

Et hæc quidè uenaticorum canum genera à ueteribus celebrata inueniuntur.

DE DIFFERENTIIS

*Atalantia
canis.
Petrarius.*

*Mela¹ canis.
Atalantia.*

*Quemodo
hunc debet
canis capere
fidei Plin.*

mus. Sunt autē & in eodem genere canum, alij uenatici, alij pecuarij: ut in E genere molotico. Cum enim moloticum genus uenaticum nihilo à carteris discrepat, quòd scilicet feruntur moribus sint mollioribus quàm mares, pecuarium tamen magnitudine & animositate contra beluas præstantissimè uero & animo & industria, qui ex utroque, moloticus dico & lacomicus, prodeunt. Sunt præter hæc nobilia canum genera, imbelles quidam paruque, & prope dixerim inutiles, qui in domibus nostris oberrant, & sub mensis aluntur: ex quibus paucos admodum ab authoribus celebratos meminimus: in quibus est qui catalus Melæus à Melia insula dictus à Callimacho est parous hic est, quàm sit uiuerra maior. Hi stomachi dolore sedant applicati seipsum transireque morbos, à gritudine corū intelligunt, ple runque & morte. Præcordia uocamus uno nomine extra in homine: quò- F rum in dolore cuiuscunque partis, si catalus lactēs adinoueant, apprima- tūque his partibus, transire in eum morbus dicitur adq; exenterato perfo- sioque uino deprehendi, uittato uiscere illo quod doluerit hominis: & ob- rui tales religio est. Sunt oculis interaneorum morbi, de quibus item ma- rum proditur. Si catali priuquam uideant applicentur triduo, stomacho maxime ac præcordi, & ex ore egri factum lactis accipere, transire uim mor- bi: postremo exanimari, diffectisque palli fieri egri causas: mori & humari debere eos obruta terra. Canis rabidi iecur si assum edatur, pro remedio us qui ab ipso fuerint morsu à nonnullis proditum est. Audius autem quoddā, inquit Galenus, cum illi soli remedio fidem habuissent, postea statim mor- tuos. Multo tamen utilissime (ut tradit Plinius) iecur eius qui in rabie mor- G morderit, datur, si possit fieri, crudum mandendū di manus, quoquo modo coctum: aut ius moctis catubus, quin & necetū catula statim in aqua ad sexū eius qui momorderit, ut iecur crudum deuoretur ex eis. Hæc Plinius. Utantur quoque ad arcendos aque pauores (ut author est Dioscorides) ca- nino dente eius, qui momorderit canis, folliculo includētes quem brachio pro amuleto adnectunt. In canis rabidi morsu uacut à pauore aque capi- tis canini eius illitus uulnere idem in potione proficit: quidam ob id esle- dum dederūt aliqui & uermem à ea dante canino adalligare. Est limus saluæ sub lingua rabiosi canis, qui datus in potu fieri hydrophobos non pa- titur. Saluantur & carnes eorum qui rabidi fuerunt, ad eadem remedia in cibo dande. Sanguine canino cōtra toxica nihil præstantius putatur: & ad H scabiem ante omnia ualeat sanguis caninus. Ossibus fractis caninum cere- brum linteculo illito superpositus lanis quæ subinde suffundunt, fere xiiii diebus solidat. Lentes tolluntur adipe canino: aurium grauatatem sedat a- deps cum abstinæo & oleo uetere: caninūque lactis instillatio sedat aurii dolorem. Stercus caninum anginis modetū, & dysenteriam necnon ulceri- bus, præcipue malignis.

1 Canes & c. Alios etiam canum morbos ostendit res rustice auctores sed quibus facilius remedia adhiberi possunt Col. lib. 7. Griens de uocatione. 2 Meliades. Petro nō à petronibus dixi presentūque uetres rusticos appellatur. 3 Ossacu ualens. Interpres Arabicus leueranum hunc uocat.

Delaps.

A

De lupis.

Cap. LXXVIII.

- C**anum pecuario magno simillima corporis figura lupus est. Collū illi u- *Lupus, canis.*
 nico osse perpetuo rigadum: cauda crassa, uillosa. Genitale ossis naturā
 sequitur. pedes habet paucos quatuor distinctos digitis, ut canes. Aucti co-
 cunt lupi eodem modo quo canes, sed uno tempore tantum: & dies quibus
 cocunt toto anno non amplius duodecim. Fert etiam uerum lupa, & parit
 ut canes, tam tempore, cum fortis numero. Canes etiam generat canes mo-
 do parit inuente aitare. Animal est uisidiosum & ferociter tamen hos
 paruōque Africa & Aegyptus gignunt: alperos tractūque frigidior plaga.
 Visu præditus est lupus acutissimo, ut qui nocte in tempesta & tenebrosa, lu-
 ce tamen perfruitur: noctu itaque uagatur & pecora deuorat. Quin & tau-
 ros quoque inuadit & asinos, atque etiam uulpes. Lupi hominem illi po-
 tius uocandū petunt, quā *asinos, uulpes.* id est uniparū aut solitariū sunt, quā
 qui uenatores, *asinos, uulpes.* uocant. Lupos etiam aut ut terram quandam cum
 elurient edere. Quinetiam apud paludem Mæotidem, lupos esse piscatorū *Lupi piscato-*
 familiares, eorumque societate piscari aiunt: & nisi partem suam eorum *res.*
 quos capiunt piscium à piscatoribus acceperint, rema cum in terra expansa
 relinquantur, lacerare. In Italia creditur luporum usus esse noxiis: uocemq;
 humana quæ in priorem conspicietur, adire ad præfens. Lupa uocur tri-
 tum hepaticis datur, is qui febris sunt expertes cum uino nigro calido: fe-
 brientibus uero cum aqua calida. Osse sunt lupos genitalia, uni dixerunt, &
 is caleulo humano præcipua remedia. Plura sunt luporum genera: pri-
 mam *res, uulpes.* uocant, quasi uolutorem sagittarum: uoc dixeris, toto cor- *res, uulpes.*
 pore sulco benique. Caput habet lōge manus quā pro corporis ratione:
 uenerem uelut canine multa albicantem, cursu pernici, horrendo ululatu,
 aspectu truculento, capite fere nutante. Alterum genus circum appellat, *Circus, uulpes.*
 & *asinos,* id est raporem, priore manus, corpore oblongo, colore & in late *asinos.*
 ribus & cauda candido, uelocitate ceteros lupos omnes facile superat. mul-
 to cum strepitu prima aurora & in ipso crepusculo ad prædum proficiscen-
 tur. In montibus degit urgente uero acriore hyemis asperitate, urbes pro-
 pius accedit, quo facilius ē gregibus uictum parci. Est in Tauro, Amano,
 & Cilicia montibus, non lupus, sed lupis bestia longe præstantior, prægr- *Asinus lupus.*
 dis atque procera, aureum uocit & *asinos,* à pilorū fulgore, inter feras pul- *asinos.*
Dhritudine ex una insigni oris duritate roboreque, quo ferrum, æs, lapidē
 que uel durissimos emollit atque frangit. Caniculæ ortū sentit hæc bestia
 metuitque: itam nāque in terræ speluncam quamquam abdit sese, donec
 feruor ille solis deseruerit. Duo item sunt alia lporū genera, *Asinus uo-*
 cant: collo breui, dorso lato, cruribus pedibusque uillosis, rostro toto & ocu- *asinos.*
 lis quoque paruis. Horum alter & dorso & uentre est candidior: in oculo-
 rum duntaxat ambitu nigricantibus quidam *Asinus uo-* dicunt: alter uero colo- *Asinus uo-*
 re nigricante insignis, minor prioris est, sed uiribus nihilo inferior. Sciatū *Asinus uo-*
 in modum horrent, undique pilis, lepores frequenter inuadunt. Thos lu- *Asinus uo-*
 pus est Æthiopius paruis & deformis, ex lupo & panthera progeneris, qui
 utrumque refert partem, facie scilicet genitoris, reliquo corpore matris.

DE DIFFERENTIIS

Corpus illi ad eandem potestatem est, sed minus procerum. Interna omnia lupi similia habet. Implentur ut canes, & carulos etiam cecos generat. Velocitate prestat, saluūque ualet, quoniam crura habeat breviora: mollis enim & agilis est, profiliūque longius ob eam rem potest. uenatus uinum hominē diligit, quem neque offendit neque metuit ualde. pugnat cum canibus & leonibus, uno leones ipsos superat: quōd si ne in eodem loco sint thoes & leones. Huius alij duo genera statuunt, alij tria, sed plura esse non uidentur: sed ut piscium, aurum, quod adrupedum genera aliqua, ita thoes quoque per tempora immutantur, & colorem diuersum hyeme astatue trahunt: atque

*Nudi, sicut for
sunt leues, ad
aerem.
Lapae ceruicem
runt.*

Lycum.

Lycum, sicut.

*Virgil. Quod
lyncus Bactro
morat*

*Lyncurium.
De lyncem
placit apud Pl
mon lib. 17
cap. 1.*

*Languis.
Languis
Langa
prodis
Lap. canis.*

*Chana
Thaphus.*

ritate nudi, hyeme hirti redduntur: itaque habitum, nō colorem mutant, inquit Plinius. Lupus certatus (eodem esse arbitrantur nonnulli, qui thoes alij chaum dici malunt,) insatiabilis est, ut cui à uentre protinus recto intestino transeunt cibi. Hic tamen, quibus post longa ieiunia, repetas agere carnes si mandere ceperit tibi quid casu respiciat, obliuiscitur: & immemor presentis copiae, abiit quiescentem quam reliquerat satietatem. Micuit Aethiopia & lyaconem & India quoque. lupus est ceruice uabatus, & tot modis uariis, ut nullum illi colorem dicant aesse. In hoc animalium genere numerantur à quibusdam & lynces. Duo eorum generis animal utriusque paruum est, forma utriusque similes, oculi splendentes, facies fœ morsa, erigunt caput, auricule erigunt. Differunt magnitudine & colore: maior enim generis color rufus: maior ad croceū uergit. Genus hoc maior: ceruos orygalisq; magna cum agilitate inuadit. Animal peregrinū lync est, clarissime omnia quadrupedum cernit. In crinibus posterioribus simile quid sematalo habet. In aetherum coniungunt lynces, aetherque coeunt canum more. Harum urinas coire in geminas catibunculi similes & igneo colore fulgentes, fatentur, qui naturas lapidum exquisitis sunt persecuti: lyncurium uocatur (& maribus solum & igneamū feminis languidus atque candidum.) Istud etiam ipsum lynces persensere hoc documento probatur: quod egestū liquorē illis atenarum cumulis quantum ualent, coequeunt, iustitia scilicet ne talis egeries transeat in usum nostrum, ut Theophrastus perhibet. Hoc non sola tantum & stramenta ad serapere, sed aris etiam atque ferri laminae contendunt: quod Diocles quidem & Theophrastus credidit: ego falsum id totum arbitror (inquit Plinius) nec uisam in aro nostro geminā ullam ea appellatione. Et quod de medicina simul proditur, calculos uesicę eo potio elidi, & morbo regio occurrat, si ex uino bibatur aut si ponatur. Vngues earum omnes cum corio exuri efficacissime in Carpatho insula tradunt hoc cinere epoto, proopadia uirore, eiusdem aspersa, scemangum libidines inhihet. Utera prius corpus, urina, stillicidia uesicę: itaque eam protinus terra pedibus aggesta, obruere traditur. Eadem sanem & uigulorum dolori monstratur in remedio. Alij dixere languinū, & esse in Italia bestias languinas Zenoni mus ligas uocat eadem, & circa Padum insuetam affirmat. *prodis* lupum canarium uocauerunt quidam: animal est aspe-
ctu pulchrum, sed uinum expert & imbellis. Carulos parit cecos laporum rura. Chaum galli thaphum uocabant, effigie lupi, pardorem maculis.

- A 1 Apud palatū Mior. Secundū Mioridis palatū Conopis nuncupatū lupi, quos
mimē à domesticis canibus differe dicat, cum piscatoribus statiose versantur.
 2 Bœon, *βῆων*, id est mēbrorū compage prope rotunda. 3 Reliquo cor-
 pore, *πρὸς*, id est ergo, ut ut Gillo placet, pelli uarietur. 4 Igneo colore *fulgē-*
tes, Effe autem quāsi in igneo succinis colorem, & alpique ceteri Plinius. 5 *πα-*
λῆξ, Pollux *παλῆξ* inter maiora nūmerat animalia. 6 Chaum eundē esse cum
 lupo, ceruano effet Hermolaius & ex *chaos* conceptis canes *chaonidas* nominantur
 si Iulius Pollux alioquin de his fabulam excensat.

De hyæna & crocuta.

Cap. LXXIX.

- V T lupo non dissimilis, ita nec omnino similis hyæna est, quam nōnul-
 ligianum dicunt: dorsum illi medium gibbum est. colore lupi pro-
 p*er*, sed hirsutior, latere utrinque fusca distincto nulla. & inham habet ut e-
 quis, sed quæ per totum dorsum porrecta est, & seta durior: longiorēque.
 Varietas multiplex inest oculis, ut qui in mille colores transeat subinde, in
 quorum pupilla lapis inuenitur, hęc enim dictum, prædictum illa potestate,
 ut cuius hominū fuerit linguæ subditus, prædicat futura. Spina illi riget, &
 collum continua unitate, & ceterique neque, nisi toto corpore circūfecto. Cor-
 pus illi non minus quā lupi est, longum & gracile: & cauda quoque lon-
 ga gracilisque, sed hirsuta. Quod autem de ea fertur, genitale simul & ma-
 ris & femine eandem habere, itaque inire & pari alternis annis comestiti-
 tium est: sed uirile simuliter atque in lupis & canibus habetur. Quod uero
 femineum esse uidentur, tam in mari quā in femina sub cauda positam, est
 C linea quædam similis genitali femurino, sed sine ulla meatu: sub hoc me-
 tus excrementorum est, atque sub eo genitale uirum in femina continet-
 ur. Quæ quidem nota quāuis utrique sexui communis sit, tamen in ma-
 ribus potius cernitur: quia mares quā feminae magis capiuntur, quod his
 ingenua est callidior astutia. Iam inter undecim numero, unam tæcum co-
 pille uenator renuit quidam. Nocte grassatur, ut quæ noctu melius cernat.
 Melius hæc insidias hominū, sequiturque stibula pastorem, & audiu affi-
 duo adduxit uocem, quod exprimere possit imitatione uocis humanæ,
 ut in hominem astu accitū nocte feruat. Vomeris quoque homines men-
 titur, falsisque singulis sollicitos sic canes deuorat. Sepulchra quoque
 effodit humanæ uidæ carnis, ac eruit. Præcipue pantheris esse in metu hęc
 nae dicuntur, ut ne conentur quidem resistere, & aliquid de cornu earum ha-
 bere in, non appeti. Mirūque dictū, si pelles utriusque contraxit suspen-
 dantur, decidere pilos pantheræ. Cum fugiunt uenantem, declinant ad dex-
 tram, ut prægressi hominis uestigia occupent. Quod si successerit, alienari
 mente, ac uel ex equo hominem decidere: arti in laeum detorse, deficiē-
 tis argumentum esse, celerēque capturam. Hyæne plurius gignuntur in
 Africa. Hyæna quemadmodum & uulpes in oko elixa oleum efficit dis-
 cussorum, articulari morbo utilissimum: usus omnino idem quem de uul-
 pino docebamur. Hyæne fel tantino efficacius est: suffusionem oculorum
 per mēna digere, aciemque eorum eracuit. Lippitudinē fel illatum fronti-
 bus prodesse dicitur: aut ne lippatur decoctum cum mellis Artici cyathis

Hyæna,
Glossæ.Alia hyæna,
ex oculis hyæ-
na, inquit Plin-
nius.

DE DIFFERENTIIS

ribus & croci una illaunific & caligines defcunt & fuffufiones. Clarita- E
tem excitari melius mueterato medicamento : afferuant autem in Cypria
pyrde. Eodem fanari argema, fibiritias, extrefcena in oculis item cicatri-
ces. glaucomata uero acinens recentis maflati fanie cum difpofato mel-
le inanctis. Dentes etia denfium doloribus tactu prodeffe: (fi credimus) uel
alligatos ordine humeros, humerorum & laceratorum doloribus. Pulmo-
nes in cibo fumpfos celiacis: uferaculis, cinerem cum oleo illitum neruis,
medullas è dorlo cum oleo uetere ac felle. Febribus quartanas, iecur degu-
ftatum ante accelfiones: lumborum doloribus, carnes è lumbis odendas, al-
linendâsq; cum oleo : uenterem ftimulari, genitali ad fenus fuos in melle
fumpto, etiam fi uiri mulierum coitus oderint. Hyena, quodcunque ani-
mal ter luftrauerit, mouere fe non poffe, fed in ueftigio hærere traditur. F
quapropter magicam fcientiam inefle ei protunftauerunt, quam & magi
ex omnibus animalibus in maxima admiratione pofuerunt. In Æthio-
pia parte coit cum leona, unde nascitur monftum, cui crocota nomē efti
uoces hominum pecorumque & ipfa pariter affectat. Nunquam conuuet
ociem orbium, fed in obertum fine nectatione cõtendit. In ore gingiua nul-
la, dens unus atque perpetuus: qui ut nunquam contrario curfu heberetur,
naturaliter capfularum modo clauditur. Crocotas etiam generat Æthio-
pia ex cane lupôque conceptos, omnia dentibus frangentes, pronunîque
deuorata conficientes uentre.

1 Genitale, Nec minus fultis, inquit Anftoteles, magnôque erant trochum. He-
redotus Hercleota ferbit duplex genitale habere, mas ac feminasque trochum G
& ipfam uire.

De leonibus.

Cap. LXXX.

alias Leo.

Leo rarum genus animalis eft, nec multis nascitur locis. In Europa po-
tius quàm in Asia inueniantur leones: & in Europæ ea parte quæ inter
Acheloum tantum & Nefum amnes eft: & ij uiribus longe præftantiores
funt illis, quos Africa aut Syria gignant. Qui uero prope Iftrum Europæ a-
nuntent, quique in Armenia aut Parthia procreantur, non adeo uiribus pol-
lent. Leones ita depinxit Ouidius, - His leuia faluz

*Leones folui
funt unius,
immo deſtra-
ctus, uis ipſi.*

Colla iube uelant, digni curuantur in ungues:
Pròque humeris armi funt, in pectora toram
Pondus abut, ſanctat cauda uerrantur arenæ:
Iram uultus habet, pro uerbis murmura reddunt.
Pro thalamis celebrant fylas.

Verum pro regionum, in quibus gignantur uarietas, eorum quoque for-
ma diuerſa eft. In Parthia nanque & Armenia naſcuntur colore fuluo, craſ-
ſo collo, capite magno, oculis ipſe dolore radiantibus, ſupercilij extantibus,
& fere ad nares utque propendens, collo ſimul & mento, plurimo pilo
laxuriantibus. Qui in Erubis gignitur, collo quoque & pectore nò minus
rubati ſunt, & oculis item ſplendore fulgentibus: uerum ex his pauci, uel in
regione ampla reperiuntur, & ſupra modum pugnaces: in Africa autē plu-
res,

H

A res æterum non ita hirsuti pilosius: sed neque oculis adeo radiantibus, aspe-
ctu tamen terribili. Totius corporis color nigricis, his fulcissus, ac si nigri
coruleo permixtus corporis robur eximium. Ex Æthiopia migrant non-
nunquã leones, cetero nigricantes, solo rictu fulvo colore rufescentes, plu-
rima iuba, capite grandiore, oculis nigricantibus: ut uero Plinius scribit co-
lor leonum tantum in Syria niger. Abundat Æthiopia & leonibus qui
æthiopiæ uocantur, id est formicæ: sunt enĩ in arenosis Indis desertis. Habet
autem hoc genus genitale auresum, colorem autem, glabriores hi sunt
quàm Arabes. Ipsis, inquit Plinius, color felium, magnitudo Ægypti lupo-
rum, uel ut Solino placet, ad formam canis maximæ: ut uero Herodoto quĩ
sit canum magnitudo minor, uulpiũ uero maior, pernecitate miranda ue-

*nigerrimus,
formica ter-
reus.*

*Arabi, ipsi ex
hor faciem.*

B nato uiuunt, pedibus quos leoninos habent, arenas aureas ex cauernis ege-
runt certe, uulparũ more, quas diligentissime custodiunt, ne quis auferat: ca-
pitantẽque ad necem persequuntur: in cauernis aestu conduntur. Nearchus
uidisse se scribit formicarum serarum pelles pãtherarum pellibus similes.
Herodotus corporis specie formicis Græcis similes esse tradit: eodẽque
modo arenã ab illis effodi. Plinius, Indicæ formicæ cornua, inquit, Erythris
in æde Herculis fixa, miraculo sacre. Dentes leonibus omnibus serrati: &
ex his eos tantũmodo mutant, qui canini uocantur quatuor, duos superius,
totidẽque inferius: idq; sexto ætatis mense fit. Lingua leonibus imbrica-
ta asperitatis est, & huius similis, attenuatũque lambendo cutem hominis:
occuli ossẽ uno rigida cõstare, nec uentribus ullis iungitur. Iuba caret leona:

C canis enim hæc propria est, ut scilicet pili in armis largi depẽdeant: at quos
pari generare, semper insigni hoc carent. Binas tantum gerit mammas
in medio uentre: quæ etiã in formicis paruo abundat lacte. In cruribus
posterioribus talum gerunt in anfractum tortuosum: pedes priores quinque
distinctos digitos habent, posteriores quattuor: ungues his adunci, quorum
mucrones cum ingrediantur, uaginis corporũ claudunt, ne acumina attri-
ta retundantur: nec nisi appetendo prætenduntur. Pedatum moedit leo, hoc
est ut similis pes non transeat dextram, sed subsequatur. Cauda leoni, infima
parte ut bubus lurtæ. Leonis ossa exigua admodum, & perobscurata
habent uedullam, cãmq; solis in femoribus & brachiis: eius ossa adeo
dura sunt, ut ex his concussis, ignis quasi ex silice excutiat. Ventrem ha-

D bet leo ut canis æstiuorem: & interiora item omnia canibus similia conti-
net. Leo auresus coit, annũque retro reddit. Coit & partũ nõ omni tempo-
re: singulis tamẽ annis uere parit, & magna ex parte geminos: sed cum plu-
rimum sex catulos: nonnunquam etiam unum. partem autem catulos infor-
mes inarticulatosq;, in mano magnitudine mustellarum, & cæcos: sed qui
uident protinus atque nascuntur, soli in eo genere quod dentes habet ferra-
tos. Sunt uero cum in lucem edantur adeo parui, ut semestres uix ingredi
possint, nec nisi bimestres moueri. Leones terræ Syriæ quinquies uita pa-
riunt: primum quinq;que, post uno subinde pauciores: anno enim secundo
quatuor, mox tres: deinde pari modo per annos singulos minus uno, postre-
mo nullam: atque ita leona partus multitudine descendit. Semel in uita

DE DIFFERENTIIS

leonem parere scribit Herodotus, unâque cum fortu uterû emitteat, quod E fabulosum esse asserit Aristoteles. Vescitur quidem carne leonina: ceterorum sylvestrium ferrariorumque cibo incontinenter admodum utitur, multâque denotat sobria, sine ullo disiectu. Mox nihil balio, aut certe triduo edit: ferre enim in diem potest, ut qui iam ad multam satietatem repleretur est. Parum bibit: excrementum vero emitit tertio die: uel utcumque accidit egerit, idq; durum, aridum, & simile ut canis. Flatum etiam acerrimum emitit, & urinam grauius olentem. Mingit quare clauo ut canes ad stipites fixam quoque odorem in cibo relinquit ex suo haliu: prociâso namque leone, anteriora grauius olent. Leo quauis in edendo ferocissimus sit, tamen palus & fame iam uicans, facilis mitisq; maiorem in modum est. Clemente in us indicia multa sunt: prostratis parçit in uiros potius quàm F in ferinas leuare: infantes non nisi magna fame perimât. Animos leonum frontis & cauda indicant: dicit motus equini de auribus intelligatur: immota enim cauda est placido, clementis blanchentiq; similis, quod rarum est: crebrior enim iracundia eius. In principio terra uerberatur: incremento erga se quodam incensameto flagellantur. Vis summa leoni in pectore est, firmitas in capite præcipua. Infirmitas parte illam est cetera ictus: sed reliquo corpore multas patitur plagas. Leonem genus infans scinditur: nam brunniores & uisus erumpi, plerumque ignari sunt & imbelles: longiores & cona simplici, generosi acresque magis ac potentes. Leoni præcipua generositas tunc, cum colla armâque uelint iube: id enim ætate cõtingit è leone conceptus: hi quos creant parâ, in plebe remanent iubarum inopes. G Adulterius eum cõsibus degenerantur quandoque partus leonatum: & leones quidem procreantur, sed ignobiles. Leones cum premuntur à canibus aut uenâtrû multitudine, cõtempni in recedunt sensim pedatimq; subsistensque interdum ac respicientes dissimulant timorem. Idq; agunt, si in campis patentibus ac nudis urgeantur: nam sylvestribus opacisque locis, quanta possunt se fuga subrahunt. Cum insequuntur nulum saltu aduerti: & ubi iam præde appropinquarint, insiliunt: cum fugiunt, non possunt salire, sed curfus eorum continens, ut canum intõditur: fugiunt nonnunquã leones demissa inter crura cauda, ut canes. Iam uisus est leo, qui cum suum aggredereur, ut sens horrenum aspectu, fugeret. Ignem præcipue formidant, & canes gallinæcorum, & rotarum strepitus: sed ignes magis. Leo H nus adeps ceteros & caliditate exuperat, & partium tenuitate: ac proinde digerendi facultatem habet maiorem. Leonis adeps cum rosaceo eum in facie custodit à utiis, candoremque seruat, & sanat adusta niuis, arumque tumores. Fel aqua addita, claritate oculis inunctis facit: & cum adipe eundẽ comales morbos discurt leui gultu, sicut proximi qui sumptis e cursu id digerant. Cor in cibo sumptum, quartanis mœdetur: adeps cû rosaceo quotidianis febribus. Leonophones uocari accepimus bestias modicas, nec aliubi nascentes, quàm ubi leo gignitur: quarum una aspersa leoni erialis est: que & capta exuruntur, ut earum uires pollux iactetq; per comperta concurrentium feminarum leones necet, si quantulum-

*Perre lionem,
de aliâ mē
uila.*

Leonophoni.

A canque ex illis sum pſerunt. Propterea leones naturali eis ptemunt odio: atque ubi facultas data eſt, morſu quidē abſtinent, ſed dilaniatam exanimat pedum niſibus. Illa contra utinā ſpargit prudens, hanc quoq; leoni eximā.

De tigrade.

Cap. LXXXI.

Tigris Hircani & Indi ſerua. Hoc beſtiarum genus inſignes maculis *tigris*, notæ & pernicious meiorabile reddiderunt. Aſpectus pulchritudine reliquis omnes quadrupedes non minus ſuperat tigris, quā pauo alites, corporis magnitudine, oculorum intuium, ſupercilii prominentibus, cauda longitudine, toto denique corporis habitu, præterquam coloris uarietate. Leq; ſimillima tigris formata eſt, (nam mas cani ſimilior extat.) Pulchritudo corpus: hoc ſolum nigrantibus ſegmentis interundarum, uarietate apte time decet. Velocitatis tremenda ſunt tigris: nihil enim tam longum quod non breui penetrent: niſil adeo antecedit, quod nō theo aſſequantur: at maxime potentia eorum probetur, cum materis curis incitantur, cum canalorum inſiſtant raptoribus. Succeedant ſibi equites licet, & aſtu quāto libet amoliri prædā uelint, niſi in præſidio manū faciant, fruſtra eſt auſum omne. Tonus tamen eius fortis, qui numerofus eſt, ab inſidante rapitur, quo quā maxime pernicious atque in nocentem ſubinde transferatur: at ubi uacuam cubile reperit ſeta (manibus enim cura non eſt ſobolis, ſed nec eos alijs temere conſpexeris) ſertur præceps odore ueſtigans. Raptor appropinquante fremitu, abucit unū ex catulis: tollit illa morſu, & pondere etiā *C*occyor acta, remeant iterū conſequatur, & ſubinde, donec in nauim regreſſo, utina ſentis ſquit in litore. Notantur enim frequentiffime, ſi quando raptiores, ſus aſportatis catulis, tentauigātes uident, in litore irrita rabie ſe dare præcipites, uelut propriam tarditatem uoluntaria caſtigantes ruina. Tigres apud Præſios maximas gigno Megalibenes author eſt: quippe quæ leones magnitudine dupla ſere ſuperant. Tigres Arrianus (qui Alexandri res geſtas conſcripſit) magnitudine equam maximum æquare, ceteras uero quas uulguſ tigris nominat, non tigres, ſed theas eſſe maiores prædicit.

De panthera pardo & cepo.

Cap. LXXXII.

Panthera & tigris macularū uarietate prope ſolæ beſtiarum ſpectātur. *Panthera, pardo & cepo.* Feror animal pãthera eſt, & in homines ſquit. Macularum, ut diximus, uarietate ſpectabilis eſt, & minutis orbiculis pãta, ita ut oculatis ex ſuluo aut nigro circulis, uel cerulea, uel alba diſtinguatur terga ſupellex. Sunt qui tradant in anno ius ſimilem lunę eſſe maculam creſcentem in orbem, & cauſam pari modo cornua. Duplex pantherarum genus, alterum maius, quod & doſſum latius habet, alterum minus quidem, & corpore gracilior, at uiribus nihilo inferius. Similes ſunt utraq; præterquam quod caudis diſſentiant: minor enim maior eſt cauda, maiori uero minor. Corpus utriq; oblongum maculisque uariis, at modo dimmiſ. Oculi ſplendore radiantes habent ſertatos: mammaſ in medio uentris quaternas, cruſa cõpãta firmæque pedes priores quinas digitus diſtinctos, poſteriores quater-

nas. Ingrediuntur leonum more, cōdito scilicet in corporis uaginis unguit̃ E mucrone, nec nisi appetendo preterdunt. cor habent pro corporis ratione magnam. Animalium nullum odoratum, inquit Plinius, nisi si de pantheris quod dictum est credimus. Tradunt odore carum, & contemplatione armenta mire affici: atque ubi eas perfensificant, preparato conuenire: nec terreti, nisi sola oris toruitate. quam ob causam pantheræ absconditis ca- 2 pitibus, quæ corporis reliqua sunt, spectanda præbent, ut pecuarios greges stupidos in obtutu populentur secuta uastatione. Pantheræ in Europa nullæ sunt: in Hircania numerosæ. uno plurimū delectantur. Capiuntur ma- 3 xime, non agno aut herdo, sed canicula palo alligata: uerum Hircaniam, ut hominibus intentatum nihil est, frequentius eas ueneno quàm ferro necant: aconito carnes illinunt, atque ita per compita spargunt seminaturn: F quæ ubi esse sunt, fauces earum angine obsidentur, ideo & græcè *ἰσχυρὴ* appellauerunt: sed pantheræ aduersus hoc uirus, excrementa humana deorant, & sompne ingenio, pesti resistunt. Quocirca uenatores stercus in uasculo suspendunt ex arbore aliqua, ne procul beluæ abeat petēs suum medicamentum, idq; alius quàm ut queat salu contingere. itaque insidens ibidem, & spe capienti persequens, in se effertenda emittitur. In pantherarum genere feminam anamiosotem esse quàm marem apertum est. Nunc & uarias, & pardos qui mares sunt, appellant, an eo omni genere, crebet rimo in Africa Syriæque. Quidam ab his pantheras solo candore discernunt, nec adhuc aliam differentiam inueni, inquit Plinius. Insidunt in 4 Africa pardi cōdensa arbore: occultatque eas ramas, an prætereuntem desi- G luunt, atque è uolucrū sede grassantur. Est in Æthiopia cepus, reliquo quidē 5 corpore pantheræ similis, sed facie leonina, in agnitudine dorcadis.

Vena.
Pardi.

Cepus, *ἀντι*,
οὐκ *ἔστι*.

1 Pantheræ in candido breues macularum oculi, inquit Plinius. Ceteros uel alba dicit Solinus, quod Oppianus *ἰσχυρὰς* *ἰσχυρὰς*. 2 Quo modo pantheræ similes capiunt, ostendit Gellius, ut ait, ex Æliano: item basulos, dorcadia, capras sylvestres, in quæ alia eisdemodi animalia. 3 Quo pacto capiuntur ostendit Oppianus lib. 4. De uenatore, & 3. De pisci. 4 Solinus. In his sylvestribus & pardi sunt, secundum à pantheræ genus, non sciam quocum adulterius coitus degenerare: parus leonarum & leones quidem præcreantur, sed ignobiles. 5 Cepum, *ἀντι* uolunt Babyloniq; qui sunt iuxta Memphim, faciem habet syro similes, cetera sicut canem & ursum nascitur in Æthiopia.

De urso.

Cap. LXXXIII.

H

Vrsus.
Vrsus.
Vrsus.

VRSUS animal est aspectu hominū, corpore latiore, hirsuto uillo, & Ora illi lato deformas recta. -Vox iracunda minaxque, Plenaque terroris rauco de gutture fertur.

Dentes illi ferrati, naris nagra, manibus quaternas, & pedes hominis manibus pedibusque similes. Cauda urso tam exigua ut uix dignoscā à sensu possit. urso simul ut exparauerit genitale cornescere aiunt. Ventrem intrus amplum habet. ueneris mirum in modum nocte diuque appetens est: & feminas sēpissime mares ad coitum incitant: quæ & dum utero gerunt, in libidinem exardescunt: & statim post editos fetus, simul & rei uenere dant

Adant operam & catulis alienis: & de fœdetrum venenis etiam hyems susci-
tat. Cocunt non vulgari quadrupedum more, sed amplectus mutuis, am-
bobus cubantibus, velut humanis coniugum onibus copulantur: deinde se-
cessus in specus separatim: specus si non habuere, ramorum fruticūque
congenie ædificant impenetrabiles ambibus, mollique fronde constitutos.
Secreti honore reuerentur mares gravidas, & in usum licet fœtus, parti-
tis tamen per serotes fecundationibus diadūtur. In us specubus pariant ur-
sis (nec enim quæquam hominu carnis, quàm parientes in videre ursum.) tri-
cesimo die, tum unum, tum enī duos: sed cum plurimū quinque. Hi sunt
caudida informisq; caro, paulo muribus maior, sine oculis, sine pallo: un-
garum tantum lineamenta prominent. Hanc lambendo paulatim figurat,
& interdum ad pectora fouet, non alio incubitu quàm ova volucres: ut af-
siduo incubatu calfacta, animalem trahant spiritum. Mares quadragenis
diebus latent: femine enixæ, quaternis mensibus. Et sane diebus primis
quatuordecima tam graui somno premūtur, ut fertur, ut ne vulnerebus ex-
citari queant: tum matrum in modum uterino pinguescunt. Cibi tunc nul-
la argumenta: nec nisi humoris minimum in alio inuenti aut: sanguinis
exiguus circa corda tantum guttas, reliquo corpori nihil inesse. Procedunt
utro, sed mares propingues. Oculi eorum hebetantur crebro, quia maxime
sauios causâ expectant, ut conuulseratam ab apibus os, leuet sanguine gra-
uodinem illam. Inualidissimum urso caput: ideo urgente ut, precipitaturi
se ex aliqua rupe, maribus ro aperto uacūtur: ac sepe in arena colaphis in-
fractis exanimantur. us maxima in brachijs & lambis: unde interdum po-
sticis pedibus insiliunt. Vrsus animal onniuosum est, quippe qui & fru-
ctus arborum edat, & legumina, & mel perfingens alueos, & canctos, &
formicas. carne etiam uescitur: muribus enim suis confidens, inuadit non so-
lum cetuos, sed etiam fœces feros, si clam repenti que potuerit agere. Taurōs
aperto matre aggrediuntur ursi, quos ex ore cornubūque eorum pedibus
omnibus suspenti, ponde re fatigant. Vrsi cum fugiunt, suos catulos ante
se compellunt, susceptōsque portant: cum ab insectante iam occupantur,
insiliunt in arbores. Vrsinus adeps alopecias curat, pernaonibus subuenit.
Ab hyberno somno mirum in modū pinguescunt ursi, ut diximus: illi sunt
adipes medicaminibus apti, contrāque defluuium capilla tenaces. Pulmo
utrinus, atrox qui à calciamentis sunt, ab inflammatione ueretur. Cere-
bro ueneficium esse Hispani credunt: occisorūque in spectaculis capta
cremant, cessato, quoniam potam, in ursum rabiem agit.

*Conuulseratam
apibus, Plin.
lib. 8.*

*Vrsi domesticis
cum cetuo de-
scribitur de a-
ristotele lib. 8.
de hist. animal.
lib. 8.*

De hystrice, erinaceo, & scyoto.

Cap. LXXXIII.

Hystrix etiam latet, nondēmque diebus fert utero, & reliqua facit per-
inde ut ursi. Hystrix in Aethiopia frequentissima: eam generat & In-
dia & Africa. Est autem ex erinaceorum genere, & erinaceus similis: spinis
tergum hispida, (aculeos namque pilorum uice gerit, ut erinacti, sed lon-
giore) quas plerumque cum inuolat cutem, laxatas in culatione emittit uo-
luntaria, ut assiduus aculeorum numbus carnes ualnetet ingruentes. Magna-

Hystric.

Erinaceus.
Hemiacrus.
Erinaceus cap.
Erinaceus.
Erinaceus.
Erinaceus.

Erinaceus per-
gredi cū serpente
describit Opp.
lib. 2. de pest.
Alia autem
aspiciat.
in p. 2. c. 10. p. 10.
in p. 2. c. 10. p. 10.
in p. 2. c. 10. p. 10.
in p. 2. c. 10. p. 10.

Alia p. 10.

Scorpius.

Vulpes.
Arctomys.

tudine paulo minor lupo est, quæ haud facile inter feras aspectu magis hor-
 ribilem inuenias ullam. Quæ uero de medicinis produntur, quæcunque de
 erinaceis dicuntur, omnia tanto magis ualebunt in hystrice. Aculeos quo-
 que pilorum uice gerunt erinacei: uentris parte omni inferiore rarâ & in-
 notuam habent lussuriam. Erinaceorum alij maiores sunt (inquit Oppia-
 nus) & maioribus aculeis horrentes alij minores, spinis minoribus munif-
 que nocuis armati. Testes erinaceo non qui foris pendeant, sed intus lam-
 bus adhaereant. Dum coeunt erinacei, non superueniunt tergis more qua-
 drupedum, propter aculeos: sed stantes ambo inter se complexi coniungun-
 tur partibus superioribus hærentibus sibi aduersis. Pugnant cum serpentibus e-
 rinacei. Preparant hyemæ & erinacei cibos, ac uolutati super iacentia por-
 tina affixa spinas, unum non amplius tenentes ore, portant in cauis arbores. **P**
 litem mutatione aquilonis in austrum, condentes se in cubile, prælagunt.
 Et qui in caveris sunt, commutant sua cubilia aequilonum & austrorum:
 qui autem intra rectum alimur, ad parietes discedunt: quod ita fieri cum
 Bizanti) quidam animaduertissent, cōsecutus exustimationem est, ut tem-
 pus futurum posset præfigere. Vbi uero sentire uenientem erinacei, contra-
 cto ore pedibusque ac parte omni inferiore, conduntur in formam pilæ, ne
 quid comprehendi possit præter aculeos. in desperatione uero urinam ex
 se reddunt. Erinacei tetrestribus combusti cinis uiam habet extergentem di-
 gredientemque: quo fit ut eo nonnulli ad ulcera fordida carnemque in ulce-
 ribus excrecentem sine uli. cinis itaque cinis cum melle, aut corium com-
 bustum cum poco liquida alopecias emendat. Caput quidē eius usum per **G**
 se etiam cicatricibus pelos reddit: alopecias autem in ea curatione præpa-
 rare oportet nouacula & linapi: quidam ex aceto uti maluerunt. Caro eri-
 nacei inueterata adferuatque cum aceto mulso epota, renum uino labo-
 rantibus (nephreticos uocant) auxilio est: aquam intercutem habentibus,
 conuulsionibus, elephantie, malo corporis habiui affectis: fluxiones quibus
 uiscera obnoxa sunt, exsiccat. Eiusdem reus testa solibus excocta arefactū
 ad eodem usus datur. Hæc ex Dioscoride. Alij erinacei carnem munda-
 esse aiunt, si capite percusso uno ictu interficiantur, priusquam in se urinam
 reddat: eos qui carnem ederint, stringitur morbum contrahere minime
 posse. Hæc caro ad hunc modum occisa, stillicidia uelice emoliat: item sus-
 citus ex eodem. Quod si urinam in se reddiderint, eos qui carnem ederint, **H**
 stringitur morbum contrahere traditur. Pilos in palpebris incommodos
 euulsos renasci non patitur fel erinacei. Præuidens tempestatem & securi:
 obscuratque qua spiraturus est uentus cauernas, & alia parte aperunt fo-
 res. Scirus animalculum est pilosum, cui uillosior cauda pro tegumento
 est: nam in solis præserum æstu cauda se obteggit. Manibus utitur priorum
 ministerio pedum, sed etque ad os illis admoueat cibos.

De uulpe & leporibus.

Cap. LXXV.

Vulpes quoque non aliter quàm ursa catulos parit, cecos atque infor-
 mes inarticulatosque: quos cum ediderit, lingua lambendo resouet & **C**
 concou-

neq. est.
Plinius.
in vena hepatis.
in vena hepatis.
in vena hepatis.
in vena hepatis.

A concoquit atque figurat caudam genit uillosam, mas generale offeum habet. Cocunt uulpes, ut Plinius refert, in lacera proreclis, marisq.ue formosa amplexa: ut uero Aristoteles, uulpes superueniens coit. Parturient ita fecerit, ut raro grunda capiatur. parit cum plurimos quatuor. Animal albitu uulpes est & maleficum: insidiatur plurimū aubus acque leporibus. Fouē in colit altam, & que multos habeat exitus procul inter se distantes, ne uno in loco insidius à uenatoribus locatis, facile cōprehēdatur. Vulpū carnibus autumno uenatores in Asia uelut unius eo nanq. tēpore uariū cibo pinguescunt. Est autem eius caro (quantū comicere licet, inquit Galenus) eiusdem cū leporina facultatis & animal ipsam tēperatura siccū ut & canis. Vulpes & uiua & mortua in oleo elixata, digestētem facultatem addit oleo, facitq.

B ut ad corporis extremam superficiem euocet: quæ in albo dolorem excitet: quo sit, ut articulari morbo laborantes, si sepe atq. diutius in eo infederint, in principio quidem à morbo liberentur: leuamen quoq. in diuturnis morbis sentiant. Pulmo uulpinus si in puluerem redactus bibatur, asthmaticos iuuat. Adeps liquefactus insusūque, auris dolorem sedat. Offea uulpibus, uti modo diximus, genitalia, & us calculo humano remedia præcipua.

Sunt in leporum genere, quæ & in specubus degunt subterraneis, ut mox explicabimus. Est uero lepus animalculi pilosum, auribus longis, cruribus breuibus & minime æqualibus: priora enī in postlatis breuiora sunt. Color non omnibus idem est: lepori uni pili & in bucca intus, & sub pedibus sunt, inquit Aristoteles cum cætera animalia nec intra os habeāt pilos, nec par-

C te pedum resupina, sed prona. ut uero Plinius scribit, pili dactyloidi & in buccis intus & in pedibusque: utraque Trogus & in lepore tradit. Cor habet lepus pro corporis ratione magnum. Lecur cuidam leporum generi & locis quibuscumq. ita fissum est, ut hinc esse iocinera credideris: nam cuticulorū exta in Betica gemina sepe reperiuntur. Sanguis leporum non concreuit, coitū scilicet firmiore: sed aliquantulum spissatur eo modo quo lac quod iniecto coagulo coaruerit, non pinguescere lepores tradit Plinius.

Horū in leporum genere, quæ & in specubus degunt subterraneis, ut mox explicabimus. Est uero lepus animalculi pilosum, auribus longis, cruribus breuibus & minime æqualibus: priora enī in postlatis breuiora sunt. Color non omnibus idem est: lepori uni pili & in bucca intus, & sub pedibus sunt, inquit Aristoteles cum cætera animalia nec intra os habeāt pilos, nec par-

D leporum numero nanque euenit ut fortis alios imperfectos gestent, alios pefse hos tam edant. Partū autē (ut maior sibi pedum pars) crecū edit. Habet femina lac priusq. pariat: & statim à partu repetit coitū: & lactans adhuc cōci pot ferum. lac uulso simile sua crassitudine est. Coagulū habet lepus inter ea quæ unicū habet uentrē. Et unū animal digitos habentū, herba aliter le-

pus rummare quoque illi in more est. patiēbus oculis dormiunt lepores. Horū genera, ut quibuscumq. placet, duo sunt, maior scilicet & minor. M. Varro tria distinguit genera: autum italicum pedibus primis hamilibus, posterioribus alnis, superiore parte pulla, uentrē albo, auribus longis, qui lepus dicitur, cum ptegrans sit tamen concipere. In Gallia transalpina & Macedonia sunt permagis in Hispania & in Italia mediocres. Alterius generis

Lepus.
auribus longis.
auribus longis.
auribus longis.
auribus longis.

Lepus.
auribus longis.
auribus longis.

Lepus.
auribus longis.
auribus longis.

Lepus.

DE DIFFERENTIIS

est, quod in Gallia nascitur ad Alpesque hoc forte mutant, quòd toto cadi-
da sunt, quibus hybernis montibus, pro cibatu nuem credant esse: certe li-
quescente ea tunc scuntur annis omnibus: & est alioqui animal intoleraudi
frigoris alumnatum. Tertijs generis est, quod in Hispania nascitur, simile no-
stro lepori ex quadam parte, sed humile, quem cuniculi appellant. & lon-
gus quidem prospiciens parvulus videtur esse leporeus si manibus contre-
ctaveris, non parvam ostendit differentiam. Et maxima ex parte in subter-
raneis specubus degit animal forciditatis innumere: quatuor enim si in-
tromissus in leporarium, brevis solet repleri: ut olim in Aslypaltea insula,
cum prius non esset ex duobus tantum in insula immassus, in eam etenisse
multitudinem feruntur, ut uno anno supra sex milia venatione caperetur.
Leporum fortis uentris excreto, uel ubi natus ablatos non repurgatis inte-
rancis, gratissimo in cibatu habent: lauricos vocat. Leporum ipsorum caro
sanguinem gignit crassiorem: meliorem tamẽ procreat succum quàm aut
bubula aut ouilla: estq; nonnunquam ad siccam usq; rationem idonea.
Sanguis leporinus ceteris praefertur omnibus, ut qui suauissimus est: quem
& nonnulli cum iecunore, alij una cum reliquis quoque uisceribus coctum
edunt. Sanguine massas dysenterias, & coeliaca profluvia sistit: in urino
potus contra toxica efficax est: si tepidus illinatur, uena cuius in facie, quæ
ipsa dicitur, & lentigines emendat. Cerebrũ leporis (caput scilicet to-
to elixo) & atrium & cornu mansum pueris dentuentibus uile est: non ta-
men eximia uis eius est, sed similis mellis & butyro atq; id genus alius. qui-
dam etiam aduersum motum uulueri edi ceterũ hoc prodidit. Asiatum
nonnulla cerebrum exhibent, edendũ aduersus tremores, qui ex mala affe-
ctione corporis sunt contracti. Caput leporis uisum cum adipe urino alo-
pecus nonnulli imposuere. Coagulum leporis ad hac sanguinem disseca-
dum quod in uentre concretum est, ceteris praefertur omnibus. Comitia-
lem quoque morbum, si cum aceto bibatur, & praeterea profluum muliebre sanare traditur.

1 Quibus artibus uolucres decipiat vulpes, explicat Oppianus lib. 1. De pisc. quo-
modo lepores capiat, ostendit Gallus ex. Albius lib. 7. uerum quæ refert Gallus, ag-
gno cani magis propria uidetur. 2 Villo si sumus animalis lepus est, inquit Plinius.

3 Dasyodes omni mense pariat, inquit Plinius, & superestant sicut lepores.
4 Cuniculum nonnunquam Theodorus pro *Asiatis* uocat, ut dasyus quĩ do-
que speciem significet: sed confunduntur hæc nomina lepori & dasyus, ut utrunque
& pro genere & pro specie quandoque accipitur. *Asiatis* scire genus est. Cuniculos Seta-
bo *Asiatis* dicitur: quibusdam appellatur etiam qui & *Asiatis* *Asiatis*, id est lepori ab Asio-
res ab ipso cognominantur, & *Asiatis*. Chelidoniam uocant Diphidam etiam leporei
genus quoddam.

De ueneris, mustelarum generibus, & de felle. Cap. LXXXVI.

Magna propter uenatum cuniculo nati uiueris gratia est. Inasciunt eas
in specus, qui sunt multifores in terris, nonnũquam & funiculis li-
gatas: at ille quos deprehendunt, aut ungibus extrahunt, aut in apertum
egredi cogunt: atque ita electos superne capiunt uenatores. Ossa sunt ui-
ueris

A ueris gentibus: & eis calculo humano remedia præcipua. Iocinerum doloribus modetur uicerra porcelli modo inasura. Sunt qui eas *icēre* uocant: est uero ictus in mustelarum syluestrium genere: sunt enim mustelarū genera duoculterum domesticum, alperum syluestre. Hæc autem quæ in domibus nostris oberrat, & canulos ore suo susceptos (ut auctor est Cæcer) quondam tranfert, in utrumq. sedem, atque hanc eas oie parte nonnulli putant: hæc inquam & serpentes prosequitur, & aues quoque uenatur & mures. Mustelæ syluestres magnitudine distant. Cuius habet multula pro corporis ratione magnum. Osca sunt mustelis genitalia, & his quoque calculo humano remedia præcipua. Ex mustela ipsa inueterata sale denarij pōdas, ut Plinius docet, in uini cyathis tribus datur à serpēte percussis: uero Dio

B scorides, mustela flammis de pilata, & inde exēterata, saleque inueterata, in umbra siccat. Ea binis drachmis in uino pota præsentaneo est remediū aduersum omnia reptilia uenenæ: & ad toxocū quoque similiter datur. Eius uentriculus cortandro factus inueterasūsq. serpentum morsus & comitiali morbo in potu auxiliatur: & canulus mustele etia efficax. Mustelæ cinetem cum aceto illitum sunt qui tradunt podagricos arthriticōsq. que uicare: & cum melle aut cerebuthina, aut butyro imposuim, strumas discutiunt: quod uehementem digerendi uim possideat. Cinere mustelæ uel felis diluto & semine sparso, mures à legibus abigim: uel decoctam aqua: sed redoler uirus anamallum eorum etiam in pane. Sanguis mustelæ strumis ueliter illinitur: qui & cornelalibus prodest. Iocinerum doloribus

C modetur mustela syluestris in cibo sumpta, uel iocineratius. Ex hoc genere icēis est, ad est mustela rustica, magnitudine quàm paruus catellus Meli-

conis minor: sed pilo, forma, albedine partis inferioris, & morum alacritas mustelæ domesticæ similis. Manifeste mirum in modum: efficit alacribus: illis enim auda est: uires etiam petit ut feles. Genitale quoq. osseum habet ictus. Fel ictidis contra aspides dicitur efficax, ætero uenenum. Fel ea

3 primum (ait Plinius) ueneficis ex mustela rustica factis contrarium est. Illa solertia in metu melibus, suscitata cure distenat: ictus hominum, & mortis canum arcent: de porcis plurimū insidiantur. Lecur melis ex aqua oris granitatem sanat. Feles quoque & leporibus insidias moluntur, & aulibus, ac nouissimū muribus. Quo uero lentio, quàm lenibus uestigis obrepit Daubus, quàm occulto speculati in muscalos exilium: uelle ab his animal & ignobile. Excrementa sua effossa obruant in terra, aut ligentes odorem illum indicem suū esse. Nocturnam animal felis est, & in tenebris illi fulgent radiarūque oculi. Felem marē Egyptij dicunt papillas ad solis ratiocinem uariare: cum enim exortitur sol, tum longe sunt: in meridie rotundæ uidentur: ad uesperam autem in obcurantur. Lingua feli imbricatæ asperitatis & limæ similis, attenuansque cutem hominis. In coitu felis non parte posteriore se coniungit: sed mas itat erectus, femina subiacet. Sunt porro in eo genere femina: ipsæ libidinose & salacerrimæ: mares ad coitū ipse frequenter alliciunt, inuitant, cogūt: ponunt oīs nati partant. Felis rōt mero pōnunt, quos canes uelocitū: rōq. effēma & felium reliqua ut canum:

DE DIFFERENTIIS

Vivunt circiter annos sex. Duplex earū genus: nam sunt & ex illis sylvestres & quædā, sicut & alie quæ in domibus versantur. Spiritū aliūdiū quid faucibus adherēs, felis extrinsecus sinit perficatis, aut reddi, aut de libe tradit.

Viverra.
Felis icypia.
Carni sylvestri.

Murex.
Mur.

1 Viverram Sarabæ *ῥαῖα ἀπὸς* vocat: at Theodorus apud Anflorem, *ῥαῖα ἀπὸς*, æreum syriacorum verit. 2 Theodorus etiam univariam interpretatur lib. 9 habet animal. 3 M. Varro lib. 3 De re rustica admonet, oportere leporari septa testorio esse testā, ne mures aut felis intrare possit muscelæ genus quoddam procul duobus intelligent: sicut & aliud genus, mures aut mure vocatur, de quo Marialis Venerat capta mane superbus adeſt.

De mure, & murium generibus.

Cap. LXXXVII.

Mur.
Mur.

Sunt & in murium genere quidam domus incolæ, qui nec foræ sunt dici possunt, nec placidi, sed medix inter utrumque mutant: plane tamen indociles sunt. Dentes habent mures continuos, & bibunt lambendo, ut canes in Africa tamen mures cum bibere ruit moriuntur. Cor habet mures pro corporis ratione magnum: & nonnulli fel inesse, aliis vero de esse notatum est. In murium ioculculus fibre ad numerum lunæ dierum in mense congruere dicuntur, eosdēq; murenici, quoniam lumen eius sit propterea bruma incrementum. Salacissimum animal mus est: & feminam murem maiore generis rabe flagrare dicunt. Murium generatio mirabilis præter cetera animalia maiorem in modum estiam enim sex mensa prægnante in vase mulario occupat, paulo post reſerato vase, musculi numero viginti & centū reperti sunt. Murum etiam percipimus ortum redundantis agrestis muris: generis: (ſonices vocant & *ἀσπυγίαι* etc) locis enim compluribus agri frumentarii, tam inaudito modo orti solent, ut parum ex universo frumenti relinquatur, tam cito absumitur, ut nonnulli mediocres agricole cum pridie metendum statuerint, post die mane cum messoribus accedentes ad segetem, absumptam inveniunt totam. Terræ Persicæ parte quadā, mure femina reſcissa, ſetus feminis prægnantes compenari traduntur. Sunt qui vehementer confundunt, mures si ſalem lambant, impleri sine coitu. Proventus eorum ſiccitatibus tradunt, verum illud adhuc latet, quoniam modo illa multitudo repente occidat, nam nec exanimis repertiunt, neq; extat, qui murem hyeme in agro effoderit: paucis tamē diebus omnino abolentur. Nō aliud quicquam omnium superare copiam & celeritatem proventus valet nisi imbres: his enim quā primum intereunt. Deturget ab inundatione Nilo, musculi repertiuntur inchoato opere genitalis: aquæ terræque, iam parte corporis viventes, novissima effigie etiamnum terrena, ut cecinit Ovidius.

Murex.
De re rustica.
Murex sylvestris.
Murex agrestis.

Murex Nilotus.

Altera pars vivit, rudis est pars altera tellus. Muribus iam obitus uti murem in capite gigna tradit. Ex panibus multis & uanis simul positis optimum quæque ſoligentes: mure circumrodere mures: quare optimi panis indicium in us exultatur esse. Mures in insula Faro ferrum excedere & conficere dicuntur: Amyntas in Tenedone Babyloica scribit eodem cibo uti. Pericula nobis imminencia perimone musculorumis mananentibus præmigrant. Mures à ſegentibus abigunt cinere muscelæ

Murex.

A mustela: uel felis diluto & semine sparso, uel decoctarum aqua. Sorices fugari autem si unus castratus emittatur. Dorcibus pilosae sunt aures: soricum si bras respondere numero lunae exquisiuit diligenter: sorices & ipsius condi author est Nigidius: sorices & ardeole inuicem fortibus inficiantur. Pulmonum uicinis medentur mures, & maxime Africani: detracta cute, in oleo & sale decocti, atque in cibo sumpti. eadem res & purulentis uel cruentis excretionibus medetur. Muribus elixis in cibo datus urina infansu cohibetur. Murem domesticum dissectum scorpionum sctibus utilissime imponi tradunt. affatos si infantes ederint, oris saluam exsiccare. Si mus araneus uimenta momorderit, mus recens cum sale imponitur. murum cinis cum melle instillatus, aut cum rosaceo decoctus aurium dolores sedat. Si

aliquid animal in aurem intrauerit, praecipuum remedium est murum sel aceto dilutum. Oribus fractis, cinis syluestris iuris cum melle, aut cum uermium utrenorum cinere linteolo illito, superpositis lanis quae subinde suffunduntur, fere xiiii diebus solidat. Arūdines & tela quaeque alia extrahenda sunt corpori, enocat mus dissectus: impositus, alopecias cinis ē murium capitis: caudisque & totius muris emendat: praecipue si ueneficio acciderit haec iunura. Murum nam simum (quod item muscerdas uocant) aceto tritum atque illitum alopecitis medetur. Subditi infansibus muscerdas, alui deuotionem moluntur. In Cyrene tum colore tum forma diuersa murium genera nasci ferunt: & quosdam ipsorum quemadmodum feles, ita lata facie effusilius uiperæ specie gerentes, acutas habere spinas: quos indigenae echenatas uocant.

Sunt ē muribus qui erecti bipedes ambulant, eorum Alpini habent enim crura posteriora magna, priora parua. Cōduntur etiam Alpini, quibus magnitudo media est: sed pabulo ante in specus consuecto: cum quidam narrent alternos, marem ac feminam, supra se complexo salce herbae, supinos cauda mordicus apprehensis inuicem deuiare ad specum: adeoque illo tempore detricto esse dorso. Sunt his pares & in Aegypto, quibus praedurus fere ut erinaceis palus est: similiter resident in clumes, & binis pedibus gradiuntur, prioribusque ut manibus utuntur, & ornas horum quoque numerosus est. Condūt hyeme & Pontici muris, hi diutaxat albi. Dentes utrinque habet mus Ponticus, & tamen ruminare solet. Sunt uel alia genera murium plura: nam & in Cyrenaica regio-

De ne alij lata sunt fronte, alij acuta, alij erinaceorum genere pungentibus pilis. In Africa quoque tria sunt murium genera, quorum alij bipedes uocantur, alij egeries Pumica lingua, quos graeci *βίβη* dixeris, alij *σύν*. Conditi & glires tota hyeme cubant in arboribus cōquam mortui, nihilque edunt: pinguescunt tamen per id tempus uehementer: rursus aestate iuuenescunt: semiserui & ipsum animal paruum, molle & imbecillum. In uiuariis seruantur, ubi non aqua, sed maseera locus sepatur. In his arbutulas esse oportet, quae ferant glandem: quae cum fructum non ferunt, intra macerant iacere oportet glandem & castaneam, unde satuti fiant. aquam oportet esse tenuem, quod ea non utuntur multam, & aridū locum quaerunt. In his notatam, non congregari nisi populares eiusdem sylae: & si miscerantur alie-

Ataforda:

"Purasse hie
posuere hie
dam erat eche-
natibus erina-
ci & echenat-
es.Echenat-
es.

Mus Alpina.

Aegypti mu-
res.

Mus Pontici.

Mus Africa-
nus.

Zegries.

Pumica.

βίβη.

σύν.

βίβη.

βίβη.

βίβη.

A De quadrupedibus aquaticis, ut de fisco, lutra, & quibusdam aliis.

Cap. LXXXVIII.

Sunt inter quadrupedes ferisque, quæ usitatum ex lacu & fluminis petant. Sin hoc genere sunt fisco, lathærum, scyrus, lutra, & lura. Per universum Pontum fisco plurimus est, quæ in alio vocabulo dicuntur castorea. Curæ fluminis etiam Hispaniæ frequenter inueniuntur fiscoerum & ex castoreum quod vocant, non eandem habet cū Pontico uim. Ambigit fisco terra & aqua: sed maxima ex parte in aquis usitū quæritur ex piscibus & cancriis. Animal est horrendi morfus: quippe quod hominis parte cōpre hensa, non antequam fracta cōcrepuerint ossa morfu resoluit. Cauda huius piscis, cetera lutræ similis: utrique mollior pluma pilus. Enomat castor fel suum

Scyrus.
Abis, Suberi
Scyrus.
Fisco.
Castor.

B ad multa medicamenta utilem coagulum ad committiles morbos, ob ea se peti prudens. Pontici castoris testiculi postissimum appetuntur in usum medelarum (castoreum uocant medici: & efficacissimum è Pontio Galatia, mor Africæ) idcirco cum urgeri se intelligit, eas partes sibi amputare se: nam ob hoc quoque se peti gnarus. utrum amputari hos ab ipsis cum capiantur, negat Sestius diligentissimus medicus: qui nimo paruos esse substrictosque & adherentes spinæ, nec adimā sine uita animalis posse. Adulterari autem rebus eiusdem, quæ sint grādes, cum ueri testes parui admodum reperiuntur. Præterea ne uelocitas quidem esse cū sint gemina, quod nulli animalium: itaque inter probationes falsi, esse folliculos geminos ex uno nervo dependentes: si enim non possit ut gemini folliculi uelice ne

Castoreum.
Abis, Suberi
Scyrus.
Abis, Scyrus.

C in una membrana coniuncti reperiuntur. Dioscorides quoque frustra hæc erodi prodictum posse enim sibi testes ore contingere, cum adeo natiui adhererent aporum more. Ad medicamenta eligi debent testes cōnexi, ex uno ortu dependentes, liquore unus cerosus: uel (ut Plinius scribit) liquore ueluti mellis cetodi, odoris grāuis uirosiq; gustu amaro & acri mordacique, ac friabiles, asservitur sale. Dissecta cute (inquit Galenus) melleus liquor unā cum membrana ambiente examinatur, siccatūq; ac potui datur. Calidum est & siccum castoreum, parubisq; cōstat admodum tenuibus, & ob hoc in unuersum uarios obtinet usus: siquidem mētes ac partus ciet, secundasque eueit cum pulegio aut calamanthæ. Contra inflationes, tormina & singultus, qui à frigidorum crassiorūque humorum multitudine oriuntur, ex aceto mulso bibitur. Lethargicos & utunque ueterinosos, colla capitisque irrigatione cum aceto & rosaceo extirnat, aut odoris (suffitu): tremulis quoque & conuulsionibus ac ubi partem quampiam sensu motūque priuatam esse contigerit, aut agere sentire mouerius, & omnibus nervorum uitiis prodest, & eponum & alitum. Nec sane febrientibus nocet, ubi febris lenta medio-cilue conuenerit, qualis cathaphora & lethargum commutari solet. Ac multo certe castoreum exhibemus, inquit Galenus, cum pipere albo, utrumque cochlearij mensura, ex aqua mulsa: nec quispiam inde ullam sensu noxam. Sternutamentum ossa cū mouet, somnum conciliat cum rosaceo & perordano peruncto capite: uel uatum exanationes uel subdum extirpat. Medetur & dentibus infusum, cum oleo tri-

DE DIFFERENTIIS

tum in aurem à cuius parte dolent: aurium doloribus melius si cū meco-
nionelantatē uisus facit cum melle Artico imunctum acipitis doloribus uti-
liter illinatur cum pencedano & rosaceo. Sufpurioſis caſtoreum cū ammo-
niaci exigua portione ex aceto mulſo ſciunus utiſſime potatur: eadem po-
tio ſpaſmos ſtomachi ſedat ex aceto mulſo calido. Illeos & inflationes pellit
caſtoreum cum danci ſemine & petroſelino, quantum ternis digitis ſuma-
tur ex mulſi calidi cyathis quatuor ſnormana uero cū aceto uino mixto. Co-
mittiales morbos pellit caſtoreum in aceti mulſi cyathis tribus ſciunus da-
tum: uero qui ſæpius corripuntur, elythere infulum mirifice prodeſt: ca-
ſtorei drachmæ dux eſſe debebunt, mellis & olei ſextarius, & aquæ rannun-
dem: ad præſens uero correptis, olfactu ſubuenit cum aceto. Caſtoreum ex
mulſo potum, mulierum purgationibus prodeſt: cōterique uſum olfactū
cum aceto & pice, aut ſubditiū paſtillis. Ad ſecundas etiam un codē pro-
deſt cū panace in quatuor cyathis uini & à frigore laborantibus ternis obo-
lis. Lutra, quæ & *λυτρά* græce dicitur, & è fibronem genere eſt, caſtori præ-
terquam cauda ſimilis eſt, & utriusque mollior pluma pilis nunquam. Inari
im̄mergitur lutra. Hæc & hominē mordet, nec deſiſtit, ut ferunt, niſi fracta
oſſis crepitum ſenſerit. Latax quoq; dēus habet robuſtos & noctū plerūq;
egrediens, uingula ſtans proxima, ſuis dēibus ut ferro præcidit. Hæc, in-
quā, lutra latior eſt: pilum habet durum, ſpecie inter pilum uſuali marini &
cerui. Ichneumon in ripis & arundinetis uiſitatur, animal parū, forma mu-
ſcle ſcithi proxima, cauda oblonga. Iſdē uelutur quibus canes & tot nu-
mero pariunt ichneumones quos canes & corū reliqua ut canam. Vivant G
circiter annos ſex. Pugnat cum aſpide & crocodilo, & utrumque interficit.
Ichneumon Aegypti cum aſpide pugnaturus, flumē ingreſſus mergit ſe li-
mo ſæpius ſiccaturque ſole: mox ubi pluribus eodem modo ſe corus lorica-
uit, in dimicationem pergit: in ea caudam attollēs, ætus irritos auerſus ex-
cipit. Sūr uero qui tradunt enhydrum albertum ichneumonum genus eſſe,
qui crocodilum interminat. Sunt & fluuiantes canucula, tercitiū canum
parulorum ſimiles: pilola his cauda. Horū ſanguis aqua, & aceto mixtus,
inrumefcentes hominum neruos lenire exiſtimatur: neq; ex pelle ipſorum
calcei conficiuntur, qui neruis ſalutares eſſe dicuntur.

Lutra.
Lutra.
lytrophile.

Latax.

Ichneumon.

Enhydrus.
canis fluuiatilis.

Lutra.

1 Sathoron. Sathoron legit Hermolaus. 2 Quæ aly partim lutæ, partim
lataxi, ea Plinius ſibris tribuit: nempe quoddam ſit animal horrendi morſus arborem
intra flumina, ut ferro egſit. hominis parte comprehenſa non antequam fracta con-
ſequatur oſſis morſus reſoluat. Quod idem & Varro quoque ſicere in lytra uide-
tur: qui lutram partem eam quæm lytram uult dici quoniam ſuccidat dūſolūque in
ripis arborem radice, ut non longe diuerſa uideantur hæc animalia. 3 Hæc ma-
re (quoddam marinum ſpeciem ſimilem ichneumonemque gerit) uulgo marem Indicum uocant.
Hæc Gillius, ex autore quoſpiam, ſed incerto. 4 Ichneumonum pugnam cum aſpi-
de & crocodillo pulcherrime deſcribit Oppianus, Plinius & Strabo.

De uiculo marino.

Cap. LXXXIX.

*Viculus mari-
nus, & laron.*

QVæ à mari uicūm perat, nulla fera quadrupes eſt, præterquā uitalus
marinus. Hæc uero generis ambigui eſt: nam & in mari degit, quan-
quam humorem non recipit, ſed ſpirat ac dormit, & egreſſus in
ſttram

A terram parit in liore ut terreſtris: ſed quoniam plus temporis mai quàm terra immanetur, cibumque ex humore petat, adeoque inter aquatica ſere numeratur. Auricula non habet, ſed meatus continet maniſeſtos qua audit. Oculi in malle colores tranſeunt ſubinde. Dentes habet ſerratos, acutiſque, ut generi piſcium aſſitus: linguam autem biſulcam. Cruribus ſiqui anſeſa imperſeſſa que quadrupes eſt: quippe quæ continuo à ſcapulis pedes habeat manibus ſimiles modo uſum quinos enim ſinditur dignos, qui ſingula ternis articulis ſeſtantur, & unguibus mumentur non naugis. Pedes quoque poſterioriores quinis diſcretos digitis habet, & curuata & unguibus cum prioribus conuenientes, utrum forma proximos piſcium caudas aut pinus: has in mari, ut pinus utitur & humi quoque uice pedu ſerpet.

B Caudam habet uitulus exigua. genitale maribus grande eſt: ſemina ſimile ſunt eſt aut mulieris. Fel non habet uulnus marinus: ſed renes ſolidiſſimos, & forma bubulis ſimiles. cartilagine non oſſa. Cocum uituli marini modo animaliu retro nuigentium & du ligati in coitu coherent. Animal non ouum ſtatim intra ſe concepit, & parit ſemina, & hæc reddit modo pecudum. parit ſingulos aut geminos, & cum plurimum treis. Matris quas geminas habet, educat ſectam ritu quadrupedum parit ut homo omni tempore, ſed maxime cum primis capris. Prole circa duodecimum diem à partu deducit in mare, ſubinde aſſectans: illa præcipitè fertur, nec ambulat cum nodum annati ſuis pedibus ualeat. Colligere ſe ipſe uitulus, & contrahere poteſti: carne enim abundat molliſque eſt, atque oſſibus

C cartilaginosis conſtat, ut modo diximus. Interſectur diſſicultet, niſi elis temporibus capris corpus enim totum carnoſum eſt. Mugitus ei ſono bovi ſimilis eſt unde nomen uituli accepit. nullu animal grauiore ſomno premittur. Canas rabidi morſu potum enſeueſcentibus, faciem perungunt adipe uituli marini: efficacius ſi modula hyenæ, & oleum è lentisco & cera niſceatur. lichenas & lepras tollit adeps uituli marini: & inſallatur igni naribus intermortuari uuluit uitio: & cū coagulo eiſde in uellere imponitur. Vitula marini coagulum tradidere quidam uiribus ſimile eſſe caſtoris ac proinde comitialibus morbis uulueq, ſtrangulationi conuenare epotu excipitur autem catulis, ut præcipit Dioſcorides, qui nondum natæ poſſunt. Coagulum uituli marini bibet cum lacte equino alimdoe, aut cum

D punici ſucco: quidam ex aceto muſſo necnon aliqui per ſe pilulas deuorant. In lethargum uergentibus, coagulo uituli marini ad oſſacham utuntur: & lethargicos coagulum uituli adiuuat in uino potum oboli pondere.

De talpa & uerpilione.

Cap. XC.

Mrilum animal & talpa eſt: quippe qui omnino quidem nec uideat, nec perſpectus habeat oculos: ſed excutis perpetuè animal eſt terræque obrutum, & tenebris etiamnum deſoſſum, ſepulchrisque ſimile: uerum ſi quis prætentata membranam detraherit, locus oculorum apparet, & pars nigra corandæ: ſitus denique & deſcriptio eadè, quam legitimam conſpectus oculi obinent: ac ſi obdocta cute oculi preſſi, conſuſi, obliſque

*Nonnulli quoniam
ex inter terro
ſſos, ut lib i
hæſer animal.*

*Terriſſimo
de, ut uis Op
pauit.*

*Talpa, in
hæſ.*

essent dum crearentur. In tanta hac tamen cecitate, liquidus audiant tal- E
 pe uel in terra, tam denso atque sin do naturæ elemento. Talpe cinere stru-
 mas illuminant ex mellealy occur eiusdem contritum inter manus illudū, &
 triduo nō abluunt. Dextrum quoque pedem eius remedio esse strumis af-
 firmant; alij precidunt caput, & cum terra à talpis excavata eusum, digerūt
 in passillos peride stannea, & utuntur ad omnia quæ innumescunt, & quæ
 apostemata uocant, quæque in cervice sunt. Ambigunt & uespertilionem
 cum uolucris & pedestribusquemadmodum in usu maris cum aqua-
 tilibus & terrestribus. Et quadrupes est uespertilio, sed miscet sit ad qua-
 drupedes cōparata, uolucris ad uoces uero, quadrupes. Cauda tam quadru-
 pedis quàm uolucris caret, uolat, sed cunctis prius in cōbeandis. Horum quoq;
 alij articulos habent & uolucrum animal parit uespertilio tantum. Dentes
 habet ut quadrupes, & lacte fortum nutrit, ad mouens ubera quæ in pecto-
 re gestat. geminos uoluit amplecti infantes, secūmque deportat. Noctu ui-
 dum sibi querunt: & in cibari culices gratissimū.

- Minutim pro corpore uocem

Emittunt, peraguntque leui stridore quæclas.

Testique non syluas celebrant, lucemque petose

Nocte uolant, serasque tenent à uespere nomen.

In Assyria circa Borsippam gignantur prægrandes: quæ sunt apud incolas
 in usu cibario. Cor uespertilionis solitugis contrarium est hominibūque for-
 mis & saluandis resistit. Somnū arcet uespertilionis caput aridum ad-
 alligatum. In paludibus circaque paludes Arabæ, in quibus nascitur casia, G
 degunt ferè alate uespertilionibus simillimas, stridore diro, & uiribus exi-
 mas: quas ægre ab oculis arcentes Arabes casiam colligunt. Est & quod
 cunctis pennis uolat aliud animal: *ak-mef* à Græcis uocatur.

*Vespertilio
Arabia.*

*Ak-mef, uol-
penna.*

De monstrosis quibusdam aliis animalibus in India aut Æthio-
 pia procreant.

Cap. XC I.

*Fluxus in Æ-
thiopia.
Ananchoras.*

A Pod Indos (si Ctesie credendum est) belua gignitur, cui nomen man-
 Anchoræ: dentes triplici utrinque ordine: magnitudo & aurium hiri-
 tudo, & pedes leonis facies & aures hominis, oculi cæsi, color rubicg. Cau-
 da, scorponis modo terrestris, aculeo armata, spiculæque adnata iaculans.
 Vox tam sibilat, ut imitetur fistularum modulos, tubarumque concentum: H
 cursus nō minoris perniciosus, quàm ceruis. humanas carnes audissime af-
 fectat. hominū sermones imitari & manchoram in Æthiopia author est
 luba. In India quoque fera traditur nomine axis, hamuli pelle, pluribus
 candidioribūque maculis. Sed atrocissimum mono-ceros monstrum est,
 quem & cartazonon uocant, reliquo corpore e quo simile, capite ceruino,
 pedibus elephantis, digitis scilicet induratis, cauda apto, mugitu horrendo
 cornu unum nigrum è media eius fronte protenditur cubitosum duūm,
 splendore murtheo, ita acutum, ut quicquid impetat, facile illa emisso
 feratur: nec loquidem hoc, sed uersuras quasdam naturales habet. Hanc
 feram usum negant capi: quippe quæ in intimis Indiæ & desertissimis re-
 gionibus

*Axis.
Ananchoras.
Cartazonon.*

*Ad legimato-
nem pelli que
trior. Salomon.*

A gionibus degit. Apud Hesperios Æthiopus fons est Nigris, ut plerique existimauere, Nilh caput: innotu hunc catoblepa nascitur, modica & mens bestia, caput pregrauè agere ferens, idque deorsum semper in terram, aspectu hominibus pestilenti, omnibus qui in oculos eius offenderint, cõfessum expirantibus. De onocentauro Pythagoram hæc narrasse testatur Crates Pergamensis hominè ipsam ore & promissa barba simalè esse, simul & colulum & pedus humanam speciem similitudinè quæ gerere: mammas distantes ex pectore pendere: humeros, brachia humanam figuram habere: dorsum, uentrem, posteriores pedes alino perfimiles esse: & quemadmodum asinum, sic cinereo colore esse animum uentrò leuiter exalbescere. Diphocem usum ei manus prestare: nam celeritate ubi sit opus, pedum loco illis utitur.

B rur ex quo fit ut ceterarum quadrupedum cursu non superetur: ac ubi rursus necesse fuerit uel cibum capere, uel aliud quiddam tollere, qui antea pedes erant, manus efficiuntur. Animal est graui animi acerbitate: nam si capiatur, non ferens seruitutem, libertatis desiderio ab omni cibo abhoret, & fame cibi mortem conficit. Hactenus de multisidus dixisse abunde est.

Catoblepa.

Phonix, canis.
dus qui oculos
eius uidet.
Quocentauri.

1 Quæ in hoc capite continentur animalia, an multisida sint omnia, nondum satis constat. 2 Color rubricus, & alius non ut dicitur Plinius & Solinus colore sanguineo. 3 Pedibus sic uiget, inquit Solinus, salu sic potest, ut morari tam nec exarsit siua sparsa possint, nec obstacula lanissima.

De quadrupedibus bisulcis, & primò de boue & boum generibus.

Cap. XCII.

C Proximum est ut de bisulcis doceamus, quæ unguium loco & ungularum chelas forcipemur habere, eademque fere cornigera esse diximus. Inter hæc primas partes iure boui tribuere maiores: cuius tanta fuit apud antiquos ueneratio, ut tam capitale esset bouem necasse, quàm euem. De hoc igitur genere primum dicemus, cuius potissimum usus nostri laboris est particeps, & quod laboriosissimus sit bos hominis socius in agricultura.

Bos. & bœ.

Primum in bubulo genere ætatis gradus dicantur quatuor: prima, uenitulum: secunda, iuuenecio: tertia, boum nouellarum: quarta, uetulorù. Distinguntur in prima, vitulus & vitula: in secunda, iuuenecus & iuueneca: in tertia & quarta, taurus & uacca. Quæ sterilis est uacca, taura appellatur.

Vitul⁹, vitul⁹.

Iuuenecus, iu-

ueneca.

Taurig⁹, taur⁹.

Vacca.

Taura.

D quæ prægnans, borda fordiæ. Boves pro regionibus calique statu, & habitum corporis, & ingenium animi, & pili colorem gerunt. Aliæ formæ sunt Asiaticæ, aliæ Gallicæ, Eptonicæ aliæ. Circa paludem Mæotim boues sunt sine cornibus: & apud Mysios quoque bubus Indiciæ camelonarum altitudo traditur, cornua in latitudinem quatuor pedum. Sunt & Indici boues unicornes tricornesque, solidis ungulis nec bubus. Aconij quoque boues solidipedes sunt, singulæque habent cornua, & hæc medio capite. In Hercynia sylua est bos cerus figura, cuius à media fronte inter aures unum cornu erigitur excelsius magisque duratum us, quæ nobis nota sunt cornibus. Ab eius summo sicut palma ramique laci diffunduntur. Eadè est formæ masculique natura: eadem forma magnitudoque cornuum. Armeniis, bina

Tauræ.

Borda.

Borda.

Mæotid⁹ boues.

Indici boues.

Boues unicornes.

Boues tricornes.

Boues cerus.

Armenis boues.

Hercynia sylua.

Bina.

DE DIFFERENTIIS

Aegyptius bou. quidem cornua, sed in antroclata convoluta. *Aegyptus* boues pignat can- E
Aegyptius bou. didos maramotique & mires Phrygia vero saluos & rufos, quibus prolata
Phrygiae bou. à ceruice dependent palearia. Cornua quoque in capiti nequaquam affixa, a
Syriaci bou. sed ut aures mobilia. Syriaci Pellaeque nigri, robusti, feroces, fronte lata, a- 3
Pellae bou. speclata horrendaeque natura neque obeli minimum neque strigosi: ac pro-
Syriaci bou. inde & ad pugnam & ad cursum idonei. Scythici, quorum in dorso gibber
est, & procerissimum, & ex omni parte cædidi, perparuis cornubus sunt, & mi-
nime acutis: similesque ut cameli emanenti dorso exsunt: simul & cum
dorso chitellæ imponuntur, perinde ut cameli genua flectunt: rursusque su-
scipito onere surgunt, ab hominibus numquam edocti. Syriaci non pro pen-
dent palearia, sed in dorso gibber est. Canes quoque in parte Asiae serdi ut-
sa, tubere super artros à crucibus emanente, laxatis cornubus, excellentes F
in opere narrantur: ceteri nigri coloris candidius ad liborem dantur.
Bullones. Bullones iuba usû horrenda à ceruice utrinque & pectore leonum in mo- 4
rem dependente insignes, cornua habent peracuta, & nequaquam aliorum
more in aduersum sese spectantia, sed supina & plane recta. Lingua his an-
gusta, sed asperitima, & quæ linctu sanguine elicitur. In Pæonia boues sunt,
inquit Pausanias, toto quidē corpore pilu hirsutū, sed pectore maxime &
circa maxillas. Troglodytarum bouum cornua in terram directā sunt: qua
de causa obliqua ceruice pascuntur. Feruntur & in Africa boues, qui retro
ambulantes pascuntur, indeque in insinuantia: nec enim aliter ob cornua
pasci possunt, quæ illis antroclata & in terrā directā sunt: uerū hoc fabulo-
sum arbitratur Vlpianus. Phœniciū libri testantur indigenas uaccas ea esse G
magnitudine, ut uel procerissimū pastores cū mulgunt, stare, atque adeo in
scabellū ascendere habeant necesse, ubera ut possint pertingere. In nostro or-
be Epioroticis laus magna: ac Pyrrhi (ut ferunt) iam inde regis cura pregran-
des fuere, hodiēque reliquæ stirpis durant. Epioroticæ uaccæ præ sua præ-
cipua magnitudine amphoras singulas singulæ implēt lactis: in cūq; eius
dimidium mammae duabus præstant. Erectus stat qui mulget, aut paululū
se inclinatur: quoniam sedendo ubera contingere nequeat. Nec tantū diuer-
sas provinciarum, sed eadē quoque regio, ut Italia ipsa partibus suis dis-
crepat. Campana plerumque boues progereat albos & exiles: Umbria ua-
stos & albos, eadēq; rubros, nec minus probabiles animis q̃ corporibus:
Hætruria & Latium compactos & ad opera fortes: Apenninus durissimos, H
omnēsq; difficultatem tolerantes, nec ab aspectu decoros. Alimæ uaccæ,
Alimæ uaccæ. quas eius regionis incolæ ceuas appellant, humilis sunt statura, lactis abū-
Cruæ. dantes. In bouum genere cornua fere habent tam mares quàm feminae: sed
uaccarum cornua & taurorum inter se dissident: tauris enim munita sunt
cornua tenuioraque. Dentes habet bos, ut & reliqua cornigera: continuos:
humisq; dentes amittit, non tamen uniuersos. Bouum caudas longissimas
caulis, atque in una parte hirtus. Hinc tantum animal omnino quibus pro-
cerior cauda, non statim nato, consummatæ ut cæteris mēsuræ crederet uni,
donec ad uelligia ima perueniat. Renes bouum quasi ex multis exiguis rem-
bus cōstituti. Taurorum sanguis ubi è uena effluxerit, crassissimus est & ni-
gerimus

Agerimus: celerissime omnium coit durefcitque, adeoque peflufer potu. Coire cum marefctum formidat anno ætatis primo peractò incipiūt, ita ut etiā nonnunquam gererent: uerum quod magna ex parte fit, uel anniculis, uel naſci octauum mensem uenerem adeunt. Iuuenta recentior quàm annicula non patitur uenerem, niſi oſtento: iam etiam uel quarto ætatis mēſe coſſe perfectū eſſe id enim quod maxime conſellum habemus, himatu generare: ſed tauri generationem quadrum implent. Et qui quadrum minores ſunt, pro habentur admiſſura: ſicut & qui maiores quàm duodecim annorum: illi quoniam quali puerili ætate ſemmandi armentis parum habentur idonei, hi quia ſenao ſunt eſſecti. Et tauris ſingulis ſemurq; deniq; eodem anno traduntur: uel (ut aliis placet) unus mas quindecim uaccis ſufficit.

Apod Magonem duo tauri in ſeptuaginta matribus ſunt. Maxime idoneum tempus ad concipiendum, à delphici exortu (ad quantum ſcilicet idus Iunij) uſque ad dies triginta, ut ſenat Plinius: uel X L, ſut paulo plus ut Varro. Que enim ita conceperint, temperatiſſimo anni tempore, & adultis iam pabulis pariūt. uerum Ariſtoteles initium coitus plurtimis quidem mēſe Aprili & Maio prodidit: ſed nonnullæ uaccæ etiam ad autumnum uſque tempus coeundi deducunt. Et genibus quidem quæ lacte uiuunt, ita diſpenſantur, ut omni tēpore anni ſuperſit id alimentum. Bos uno iñiu implet, agſque uehementer, ita ut ſemina uis tolerans ſuccumbat. Et quidem uaccæ tauros in coitu non patiuntur niſi raro, propter rigorem genitaliſque cauſa gradiuntur in coitu, cluiſibq; ſubductis ſemen recipiūt.

Cogenicale. Si forte conceptio pererrauerit, uicſimo poſt die marem ſemina repetit. Seniores tauri nec ſæpius quidem ſeminam eandem eodem ſu perueniunt die, niſi fortaiſſe ex intervallo: & nō ſæpius quàm bis die ineūt: ac uero iuniores & eandem ſæpius cogunt, & plures petunt ac ſuperſeniſcunt uigore ſue ætatis. Salax minime inter mares tauris eſt: ac ex ſeminis ineodummar libidine, poſt equas, potiſſimum uaccæ: tempore etiam coitus libidine quondosque adeo inciduntur, ut bubalci eas tenere aut capere nequeant: ad hæc uaccæ tauros ſuperueniunt, & ſequuntur ſedulo, & aſſiſtant. Ferunt utrum uaccæ mēſes nouem decimo pariunt. ſunt qui decem totos mēſes, exceptis paucis diebus, iterum geſtare aſſerunt. Quod autem in lucem præcurret hæc tēpora, ad abortiuum eſt, uitaloque minime, etiam

D ſi paulo maturauerit partum: primo illi nanque imperfectiq; ungula prodit. Boves grauidas negant, poſterquam in dextro uulue ſinu ſerre, etiam cum geminos ferant. Pariunt ſingulos, geminos raro. Lac à partu uile eſt: ante partum lac non habet bos. Et primo ſemper à partu coloftra ſunt: cui admulſceatur aqua, in pu macis modum coeunt diutius: uel perinde ut lapis dureſcit, ut Ariſtoteles placet. Quandiu uiuunt, & coire ſolent & parere. Viuunt magna ex parte ſexuaginta annos, quindecim, atque etiam mares exciſi. Nonnullis ætas uel ad uiginti annos, atq; etiā plures, ſi corpore bene habito ſint: nam & exciſi plus temporis quàm ceteri uiuunt, aſu exercitij & copia pabuli. Vigēt quinquennoes maxime, domitura bouum in trimato, antè præmatura. Boves & paſcunt per ſocietates atque cōſuetudines: & ſi unus ab-

coloftra.

*Plu ſeminiſ
(Pluſ antho
re) XV annis
longiſſime ui
uit X L.*

DE DIFFERENTIIS

errauerit, reliqui sequuntur: quapropter boarii, nisi praeuenerint, totum ar-
mentum requirant necesse est. Boues & fruge & herba uescuntur: pascu-
tur etiam commodissime in nemoribus, ubi uirgulta & frons multa. Pin-
guescunt ut quae flamma creant, ut eruo & faba frefis, atque etiam fabarum
herba. Lauatione quoque calidae aquae traduntur pinguescere. Boues ani-
malium soli, & retro ambulantes pascuntur: & sunt in Africa qui ita perpe-
tuo pasci seruant, neque aliter quam recedendo in auersum pasci solere. Bi-
bunt boues sorbendo, & claram bibere gestiunt adeo ut nisi aqua sit clara,
frigida & lymphada, libenter bibere noliunt. Augemus inuenire amplius, cum
plus temporis expertis ueneris degunt: quapropter terrae Ipani incolae bo-
ues quas Pythicas uocant, annis nouem inactas uenire seruati. Laborant
armata uehe mensius prima sollicitata quam nunc. Boues gregales morbis P
duobus tentantur, podagra & struma (στρῦμα) Graeci dicunt: facit podagra,
ut pedibus intra metant, & quantum non inirent, tamen ungulas amittit.
Euenit in ἀσπῆς, ut calidius sit quæ tuusque spiritus. Quod deniq; in homi-
ne febris, idem in boue est ἀσπῆς (febrem uocat Columella): indicium mor-
bi, ut aures flaccuant, & ut comedere nequeant, sed breui moriuntur. Boues
caelum olfactantes, sique lambentes contra pilum, hyemem praesagiunt.
Qui gregem armentorum emere uult, haec quasi communia & certa in e-
mendis bobus praecipua sequi debet. Parandi sunt boues nouelli, quadrati,
grandibus mœori, cornibus proceris, ac nigritibus & robustis, ac line cur-
uaturae prauitae lunatis, fronte lata & crispâ, magnus & hirtis auribus, ocu-
lis & labus nigris, naribus rectis patulisque, ceruice torosa & cōpacta, po-
leantibus amplis & pene ad genna promissis, potiore magno, annis ualidis, G
uentre non paruo, sed capaci & tanquam implente utero, lateribus porre-
ctis, lumbis latis, dorso recto planoque, uel etiam subsidente, clunibus ro-
tundis, emuribus compactis ac rectis, sed breuioribus potius quam longis, &
geniculis emunulis, distantibus inter se, ungulis magnis, caudis longissimis & 7
setosis palosisq; palo totius corporis denso ac breuicolore rubeo uel fusco,
caetu corporis mollissimo, non aspero ac duro. At nero colore, ut Varro
placet, potissimum nigro, deinde rubeo, tertio heluo, quarto albo: molissi-
mus enim hic & durissimus primus de modis duobus, prior quam poste-
rior melior, utriusque pluris, quam nigri & albi. Haec maris forma spectanda
est: neque enim alio distat bonus saurus à castrato, nisi quod taure in aspe- H
ctu generositas: torua fronte, auribus setosis, torosiore ceruice: uentre pau-
lo subtrahiore, cornibus breuioribus & in procipectu dimicanonē poscen-
tibus: sed tota comminatio prioribus in pedibus latius gliscente alternos
replicans, spargensque in alrum arenam, & solus animalium eo stimulo ar-
descens. Vaccae probantur altissimae formae longaeque, maximis uteris,
frontibus latissimis, oculis nigris & parentibus, cornibus uenosis, & leui-
bus, & nigricantibus, palosis auribus, compressis malis, paleantibus & caudis
amplissimas, ungulis modicis & emuribus. Caetera quoque eadē fore in for-
manis, quæ & in maribus desiderantur. Boues hyeme ac uere primo mediô-
que graciles sunt: prauisq; succo in cibo praebent: procedente uero anni
tempore

Non ante quæ
demonstrat. Pl
nia.

Taurus.

Vacca.

- 9 **A** tempore, obefiores euadunt faciliq; melioris, cum scilicet aucta fuerit herba. Bubula caro plurimum nutrit, sed sanguinem generat, uel qualem stilla crassiorumnam hoc temperamento longe faciliore est quam ius. Scribitur minime, sed nec ulli alij utiles sunt carnes bouili, inquit Galenus. Bubulas carnes additi caules asperitici inagno ligni compêctio percoquunt. Ad eam quæ in uentreulo sit concoctionem, uulnina bouille præstat: mediūque nutrit, ac ruminæ mucosa est, & secundum ordinem optima. Lac bubu-
4 lum purissimum omnium est & crassimum, eoque minus aluum mouet, si Galeno credamus: alijs uero alius maxime soluitur bubula. Casio fertilius est bubulum quam caprinum ex eadem mensura potest altero tanto: & ut casium, ita & butyrum habet plurimum, ualentiūsq; nutrit. Datur
B priuatim iis qui colicæcon habent, aut ci cutam, aut donicium, aut leporem marinum. bubuli lactis serum orthopnoicis prodest ante cætera addito masticæ. Taurinus sanguis recens, inter uenena est, ut modo diximus: cum polenta illius durities emollit ac discutit. Taurinus adeps calore siccariūque stillam longe superat: sed leonino inferior est: ut inter utrumque medium locum tenere uideatur. Non inepte igitur medicamentis admiscetur, & quæ scirrhis medentur affectibus, & quæ phlegmonas concoquunt. Medulla uulnina uerum emollit tum appositum, tum in pesto inditum. Felle taurino priuatim angina cum melle perunguntur. Sedis ulcera sanant, inquit Dioscorides, & ad cicatricem usque perducit. medetur & uertum sibilu ex porri succo instillari. Felle bubulo semina mung
C gli uile putant, quo mures à legentibus abigantur. Taurino felli præcipua potentia etiam in æte pellibūque colore aureo ducendis. In uenerarum secundo uentre, inquit Plinius, reperitur palæ rotunditate nigricans tophus, nullo pondere, singulare (ut putant) remedium ægre parientibus, si celluræ non attigerit. Talum bouis combustum dentes mobiles firmare tradunt: cum melle autem epotum teretes lumbricos expellere: cum orymelite lenem mutare: & uentrem quoque excitare. Foris oris ossa cremata, sanguinis fluxiones epota sistunt, & uentris quoque. Bous armentarij simū, dum uiridi herba pascitur, si recens apponatur, uulnorum inflammationes mitigat: folijs autem inuoluntur, cineroque seruente calidum apponatur. coxendicis dolores fotu compescit. illitum ex aceto durities, strumas, pa-
D uolūque discunt. Eorum uero quæ paleis uescuntur simo oblinuntur aqua intereunte laborantes, ita ut mox in sole reclinantur. Habet enim sterens bouinum uisum etiam attrahentem: qua ratione apum uespærimque uerbis me derur. Priuatim autem suffitu fini, quod à masculo bove collectum est, proci dentes uulsi repellantur: cuiusque sudore colices (*sideris dicti*) surgant. Bœum corus glutinum excoquitur, tauronūq; & id præcipue xylocollam hoc uocant, & turocollam: præstantissimū candidū & translucens: ingrum uero deterius est, & lignosum quoque damnatur. Præstantissimum fit ex auribus taurorum & genitalibus: nec quicquam efficacius prodest ambustis. Ex aqua calida dilutum atque illitum pustulas trumpe-
re non potuit. Sed adulteratur nihil æque quibuscumq; pelibus inueteratis

*Xylocolla
Taurina.*

DE DIFFERENTIIS

calciamentisque etiam decoctis Rhodacum vero fidelissimum, eoque po- E
 etores & medici utuntur. Glutinum in aceto resolutum, impingues cu-
 risque lepras deleti melle & aceto dissolutū vulneribus prodest. In hanc
 generis sunt apud Arachotas boues sylvestres, qui differunt ab urbanis, qui-
 num inter suos urbanos & sylvestres interest. Sunt colore atro, corpore ro-
 busto, nectū leuiter adunco, cornua gerunt respicinatiora. Atrocissimos ha-
 bet Aethiopia tauros sylvestres, maiores aggressibus, uelocitate ante omnes, 10
 colore fuluos, oculis caruleis, pilo in contrarium uerbo, nectū ad aures delu-
 forite iuxta cornua mobilis: tergoris duriciam silectis, omne respicis uul-
 nus, scias omnes uenantur: ipsi non aliter quā sousei capti sentant se m-
 per interire. Bonafus gignitur in terra Piconia mōre Mesapo, qui Pico-
 nia & Mediæ terræ collimitium est, & Monapos à Piconibus appellatur. ma F
 gnitudine tauri, sed corpore quā bos lanorene quaquā enim oblongior,
 sed in latera auctior est. Tergus distentum eius locum septem accubantū
 occupat: cætera forma bouis similis est, nisi quod cervice subata armorum
 tenuis ut equi est: sed pilo molliore quā sit equinus & cōpositione. Color
 pili totius corporis flauus, iuba prolata, & ad oculos usque demissa & fre-
 quens: colore inter cinereum & rufum, non qualis equorum, sed ullo su-
 pra squahidior, subter lanarius. Nigri aut admodum rufi nulli sunt, uocem
 similem boui emittunt. Cornua adunca in se flexa, orbem que inter se colli-
 gentia, & pugæ iustitiam magnitudine dodrantali aut paulo maiora: am- 12
 plitudine non multo arctiore quā ut singula sex sextenos capiant: nigri-
 tie pulchra & splendescant. Ancie (arctipar uocant Græci) ad oculos us- G
 que demisse. caret superiore dentium ordine, ut bos & reliqua cornigera
 omnia. crura hirsuta acque bisulca habet. Caudam maiore quā pro cor-
 poris sui magnitudine similem bubulæ, anteriora omnia bubus similia con-
 tiner. Carnem habet gustu suauem: quamobrem in usu uenandi est. Cum
 percussus sit, fugit, & defangatus consistit: repugnat calcitrans, & prolumi-
 alui, uel ad quatuor passus proiciens: quo praefido facile utitur, & plerun- 13
 que ita adurit, ut pili insectantium canum tanquam ab igne absumantur:
 sed tunc ea uis est in simo cum belua excitatur & mouet: nam si quiescit,
 nihil uisere potest. Tempore pariendi uniuersi simul in montibus emittunt:
 sed prius quā sortem edant, excremento alui circiter eum locum, in quo
 pariant, se quasi uallo circumdant & munium largam enim quandam eius H
 excrementi copiam hac belua gerit. Paucissima Scythia gignit: pauca cō-
 termina illi Germania, insignia tamen bouum ferarū genera subatos bulon-
 tes, excellentique ui & uelocitate uros: quibus imperitum uulguis bubalo- 14
 rum nomen imponit. Sunt uero uti magnitudine paulo infra elephanteos:
 specie, & colore, & figura tauri. Neque homini, neque ferunt: quam con-
 spexere parant. hos il udiōse sousei captos interficiunt. Hoc se labore du-
 rant adolefcentes: atque hoc genere uenationis exercent: & qui plurimos
 ex eis interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quæ sine cessumomo, ma-
 gnā ferunt laudem. Sed affuefere ad homines & mansueti fieri, ne par-
 uali quidem excepti possunt. Amplitudo cornuū & figura & species mul-
 tum no-

Eu. sylvestr.

Taurus Aethiops.

*Taurus Sclæ.
Bonafus.
Piconia.
Monapos.*

*Compositio.
Piconia.*

*Ancie, ar-
ctipar.*

*affines.
Pm.
Bubulæ.*

Aurum nostrorum bouum cornibus differt. Hæc Cæsar. Cornua aut taurina, inquit Solinus, in tantum modum protenduntur, ut dempta, ob insignem capacitatem, inter regias mensas potuum gerula fiant: urnasque bonas capitis unius cornua impleant. Hæc studiose conquisita, ab labris argento circumcluduntur, atque in amplissimis epulis pro poculis utuntur. In Hercynia sylva gignuntur: rhinocerotæ vocant, & tauri Æthiopici. Hinc in capite non sunt cornua: sed in naribus unicum est, & repandum quoties osse durigæ: quod subinde ad saxa limatum in mucronem excitat, eoque adversus elephantos utitur in dimicatione, aliud maxime petens, quam scire esse molliorem: par ipsi prope corporis longitudine, sed cruribus multo brevioribus magnitudo tauri est: forma vero apertior, præterquam quod in fumis naribus, ut iam diximus, cornu est. Color illi buzeus, vel eburneus potius: vel ut Optiano placet, fulvus, raris inspersis maculis nigricantibus. Habet autem duo veluti cingula, figura serpenti flexibus hand dissimilia, quæ à dorsis spina ad ventrem usque pertenduntur: quorum alterum prope uibam oritur, alterum ad lumbos. In hoc genere nullæ conspiciuntur feminae, sed omnes. Author est Iphicrates, in Africa gigni qui rhinos vocantur, rhinocerotæ, sicut phantasi similiores.

*Alibi, unius
hinc capiti
unius cornua
impleant.
Rhinoceros,
Taurus Æthiopicus.*

*Vi Optiano
prodidi, non
multa uideri
quàm erunt.*

*a dypterygi
dypterygi
regum.
Erythraei bo-*

Taurus Indicus.

1. Vinctus, pater, qui adhuc sub mare est & læster, a dypterygi dypterygi, & rhyms, qui necdum coeunt, nec ad usum idonea est. Hæc ex Theophrasto interpretor. 2. Erythraei boves, inquit Albius, mobiles similes cornua ut aures habent. 3. Pellæus bos, à Pella, ut arboret, Macedonia oppido. 4. Bistonæ, à Bistonide Thracie palade & regione. 5. Gibbertisquis lenius semilla. Varro. 6. Cerinthus solida, meruisti ac breuib. Palladius. 7. Pedibus, inquit Varro, non laui, neque ingredientibus, qui dissolvitur, nec omnis ungula duricet, & cuius ungulae sint leues & paræ. 8. Alus, ut Plinius & Dioscoridibus, alinum, & equum magis aluum solutum, & caruissimum. 9. Indicus taurus vocat Solinus. Taurum ferum hunc vocat Gilius ex Optiano, quem apud Trogodytas natus ait. & alii quoque huiusmodi dissimilem habent taurum ferum Æthiopicum. 10. Volucris petimias Solinus. 11. Hircus, etine quod caput Solinus. 12. Dodranæ, a dypterygi, id est, unciarum novem, magnitudine palmari, ut interpretatur Theodorus, ut paulo maiore amplitudine non multo auctiore quam ut singula semisextarii capiam: dypterygi, id est, conchy dimidium, id est, sex sextarii, nisi fortasse mēdosus sit codex. 13. Rhinoceros dypterygi, ad quem ut passus, vel etiam regum longitudine, ut refert Plinius: ut vero hæc coherere possint ostendit Claymondus in scholiis in Plin. 14. Martialis, augebatur eum cum bove, hoc uersa: illi ossis utroque bubalus atque bison. Biso (aut fortius) cervi speciem habet: cuius à media fronte inter aures unum cornu in excelsum magis dirigitur, quàm ea quæ nobis nota sunt cornua. Ab eius summitate palme, sic rami late diffunduntur. Eadem natura femina quæ mas prædies est, eadem etiam forma, ea denique magnitudine cornuum. Hæc Gilius, ex autore quodam, sed incerto. 15. Pustinus vero scribit, in extrema parte unicum esse cornu, & paulo super alicorum, sed quod minus sit.

De omnibus.

Cap. XCIII.

UT boves sumptum hominum excolunt, ita corporum tutela pecori debetur. Itaque post boves cunctis pecoris secunda ratio est: ut quod præci-
pue nos contra frigoris molentiam protegit, corporibusque nostris libera-

*ovis, ibi.
systema.*

DE DIFFERENTIIS

hora præbet uelamina. In hoc quoque genere cornus uel feminis natura E
tribuit, sed ea consoluta in antrastrum arietum generi, seu cælis daret.
Dentes quoque plures maribus quàm feminis dari. Omnis banas gerit inter
femina inanimas. Oulam pars maxima fel habet: & quidem terris quibus
dam adeo large, ut exuperantia prodigij loco habeatur, ut in Naxo: sed aliis
quibusdam locis omnino caret, ut apud Chalcidem Euboeæ parte quadã
agni. In remibus sebo opimandis maxime otanum luxuriant: quippe que
remibus pingui undique obductus intereant, quod ubertate pabuli fit: quo
fit ut quanquam pingues admodum sint, tamen aliquid defici oportet, si nõ
utriusque rem, ut de xtro saltim. Aries ad utrumq. æquinoctiũ cubãda ratione
mutat: quippe qui sex hybernis mensibus in lætuum laus tacens quiescit ca-
pit: contrãque ab æquinoctio uerno in de xtrũ incubans dormit. Oues an- F
nascule coeunt atque uero ferunt: mares quoque eodem illo tempore in-
eunt, sed proles differt, quatenus præstantior ea est, quàm senescentes ma-
res & feminæ procreantur. Neque pari oportet, ut præcipit Varro, mino-
res quàm biuas saluare quod neque natum ex his idoneum est, nec non ipse
sunt etiã deteriores quàm trumq. admissit. Arietes primũ uetustiores femi-
nas incunt: agnos enim fastidiunt. Coitus omnibus ab arcturi occasu, id est
à tertio idus Martis, ad aquilæ occasum, id est xxi Cal. Augusti: quod quæ
postea concipiunt, sunt ne grandes atq. imbecillæ, ut ait Varro. Oves tertio
aut quateruo coitu implentur: & si à coitu imber accessit, abortum infert.
Pariunt maxima ex parte singulos, sed aliquando & binos & ternos & qua-
ternos, pariunt geminos tam pabuli beneficio, tum si pater aut mater uim G
cam geminandi per naturam obtineat. Mares autem aut feminæ genera-
runtur tam aquarum, tam etiam propter admissionis tempus nam & aque
faciunt ut feminae maribus cõcipiantur. Ad hoc aquilonis flatus mares po-
tius concipiuntur, austru feminæ. Vis tanta est aquilonis, ut uel eas quæ
non nisi feminas pariãt, immuret ad prolis masculæ procreationem. Spec-
tare ad aquilonẽ oportet cum coeant feminae. De xtro teste maribus præ-
ligato, feminas generari auit, Iquo, mares. Ferunt uterum quinquæ mensi-
bus (diebus C. l. inquit Plinius) & cordos aut chordos uocabãt antiqui post
ad tempus natos agnos. Itaque fit ut partus exilis autumnali sit: contingit
tamen ut locis nonnullis, quibus celi clementia & pabuli copia est, his pa-
riant. Pariant iuniores pauciores, quàm uetustiores. Oves parere usque ad H
annum octauum possunt: & si bene curentur, uel in undecimũ facultas pa-
riendi protrahitur. Et quidem fieri potest, ut etiam per totam feræ uitã co-
eant tam mares quàm feminæ. Multi hybernos agnos præferunt uernis
quoniam magis inestit ante solstitium quàm ante brumã, firmos esse: so-
lumque hoc animal utiliter bruma nasci: castrari agnos, nisi quinque me-
stres, præmaturum existimant. Vita ouibus ad decem annos sed magna ex
parte ad pauciores: duces pecoris tamen, uel ad quindenos protrahunt ui-
ram. Singulis ouibus singuli mares duces constituuntur. Oves Æthiopiz
uel ad duodecim & tredecim annos uitã agunt quæ mane iuri solent, ma-
rem si sero diei admiseris, non patiuntur. Candidi nigri se efficiuntur ferus,
si sub

Et cæpi in-
nasci. Plinius.

cordi.
Chord.

A si sub lingua ariens uenæ nigrae aut candidae habeantur: cuius etiam coloris sunt uenæ, eiusdem & uellus est: uarium etiam, si plures uenarum colores sint: & rufum, si uenæ rubrae fuerint. Si palato in quoq; nigrum fuerit, aut in aculo sum uel lingua ipsa, pulla, uel etiam uarta nascitur proles. Quædā admissura sit, eadem aqua uti oportet quod cōmutatio & sanam facit uariam, & uterum corrumpit. Oues herba uestiuntur: & pascere sedulae atque stabiles solent. Pinguescunt potissimum ex potu quam obrem estate saltem dare due quinto soliti sunt, singulis centenis singulos modios, ut secundæ plus sique hauriant: sic erum pecus incolumè atque pinguis redditur. Opumit pecus olea, oleaster, aphaca, palea, herba: quæ omnia efficaciora sunt ex salugine resperâ. Oues si grandæ glandem copiosius edunt, abortum

B faciunt. Homines usu periti conde fere morbis ouem infestari, quot hominem referunt: & frequentius quàm ullum aliud animal infestatur scabie. Mollissimū pecus est: & quamuis ex omnibus animalibus sit uestitissimū, frigoris tamen impatientissimū est, nec minus aestui uaporis. Genus ouile amens est, moribusque (ut dici solet) inter omnia animalia stultissimas. Repit in desertâ sine causa: & hyeme obstante ipsam saepe egreditur stabulo: occupatum à nuce, nisi pastor compulerit, abire non uult: sed petit desiliens, nisi mares à pastore ducantur: ita enim reliquis grex consequitur, adeo ut etiam quâ timuere ingredi, unum cornu rapit sequantur. Pecora exultantia & indecora lasciuia ludentia pluriam præstigiunt. Pro loci natura differunt oues, non magnitudine solū, sed & alius discriminebus. Pinguis & cæpestris sitas, proceras oues tolerat: gracilis & collinus, quadratus: syluestris & mōcolus, exiguae: pratis planisque non alibus tectum pecus commodissime pascitur: alij nō solum generibus, sed etiam coloribus plurimum refert. Magnæ oues circa Meotum paludem gignuntur: generis eximij Milesias, Calabrias, Apuliasque nostri existimabant, inquit Columella, earūq; optimas Tarēnnas: nunc Gallicæ pretiosiores habentur: earūque præcipue Almatenses: item quæ circa Patnam & Mutinam matris stabulantur cæpis. Color albus quamuis sit optimus, sunt tamen suapte natura pretio cōmendabiles pulli atque fasci: quos præbent in Italia, Pollentia: in Betica, Cordubæ: nec minus Asia rufillos quos uocant *ἐπὶ πρῶς*. Sed & alias uarietates

De uall. mor-
bus Columella
lib. 7. & Por-
phy. Georg.

de p. 294. uen.

C ac feroc arietes masculi: hos rectis ouibus quæpiam admisisset, ex primum hære, sed parenti coloris agnos ediderunt: qui & ipsi deinde Tarēnnis ouibus impoliti, tenuioris uelleris arietes progenerauerūt. Ex his rursus quicquid conceptum est, matrem molliuam, patremque & auitum retulit colorem: itaque oues quas pascimus, ortæ sunt ab ouibus feris. Ouium alia sunt uillatæ, alia in salibus pascuntur: itaque ouium summa genera duo, tectum & colonicum: uel uti Columella nominat molle, & durum: illud mollius, hoc in pascuo elegantius. Mollissimum genus ouium quod Græcū pecus, & pleneque Tarēnnium uocant, nisi cum domant præsentia est, uix expedire habet: siquidem & curam & cibum maiorem desiderat: nec ullam domum aut magistrorum inertiam sustinet, multoque minus auaritiæ nec

Ovis asilensis.
Ovis arctæ.
Ovis calonica.
Ovis mollis.
Ovis hirsuta.
Ovis præta.
Tarēnnia ouis.

DE DIFFERENTIIS

ailus nec fragoris patiens. Raro foris, plerumque domi alitur: & est audaci. E-
num cibum si de trahitur fraude uillici, clades sequitur gregi. Plures autē
in euasmodi gregibus, quā in hortis, masculos euasire oportet: nā prius
quā forminas inire possint mares, castrati cum himaēo expleuerint ene-
cantur: & pelles eorum propter pulchritudinem laet maiore pretio quā

Hispania cara.
Hispania cara.
Colonia cara.

alia uellera mercatoribus traduntur. Harum uero ouium genus (quod
colonicam appellamus) in silibus pascuntur, & à rectis abstine longe: &
quod late longēque in diuersis locis pasci solent, idcirco portant secum cra-
tes aut retia pastores, quibus cohortes se praeque secreta in solitudine faciūt.
Ego inquit M. Varro in octogenas hirtas oues singulos pastores constituat
Atrici in centenas. In gregibus ouium magnis, quos milenarios faciūt qui-
dam, facilius de summa hominum detrahere possunt. Pascua ouillo generi P

unia sunt, quae uel in noualibus, uel in pratis siccioribus exstānt: palustria
uero noxia sunt, sylvae istria damnosae lanus. Per hyemem si penuria est, frō
uel palea, uel uicia, uel facilius uictus ulmi seruatis frōdibus praebeatur, aut
straxini. In ouium gregibus comparandis in primis uidendum, ut boni se-
minis pecus habeas: id sere ex duabus rebus potest animaduerti, ex forma
& ex progenie: si uidelicet agnos procreent formosos. de forma, ouem esse
oportet corpore amplo, quae lana multa sit & mollis, uillis alis & densis co-
to corpore, maxime circum ceruicem & collum. uentrem quoque ut ha-
beat pilosum itaque quae id non haberet, maiores nostros aplicas aut apocas

Aprica, alio
Aprica cara.

appellabant ac reiciebāt. Est oportet erubus humilibus. caudas obserua-
re, ut sint alubi, ut in Italia prolixas, in Syria breuibus, ut tradit Varro. at
Plinio, Syriae cubetales ouium caudae, plurimumque in ea parte laeui. Sine

Atrici forma

praeterea uellere candido uariam autem & canam comā improbas. Ari-
etis uero habitus maxime probatur, cum est albus: acque procerus, uentre
promisso atque lauro: cauda longissima. densisq; uelleris atq; candidi: frō-
te lata, testibus amplis, intortis cornibus potius quā surrectis, paralisque
& pronis ad rostrā, raris oculis, auribus amplis, pectore & scapulis & clu-
mibus latis. Aduertendūq; lingua ne nigra aut uaria sit: quod sere qui ta-
lem habent, nigros aut uarios, ut dictum est, procreant agnos. Atq; haec cō-
munia sunt in comparandis ouibus quas pascimus. Prestantissima est ouis

Ouilla cara.

caro primo ac medio uere. Melior item quae est unius anni quā uetis
suor: quae & difficulter concoquitur, & malum procreat succum: nocēque
Hus qui stomacho sunt humido & pituitosis. Est enim caro ipsa ouium frigida
ac humida, excrementosior, & mali succi. Iuuenibus quidē nō omnino
malus est cibus: senibus uero nec ea est commoda: atque etiam hac multo
minus agnina: quippe quae humida, & mucosa, & glutinosa, & pituitosa

Agnina cara.

est. Ouilla caro, praesertim arietina post solstitium elixa, grauius olet: gra-
uius etiam si assetur: quo circa dum coquitur, operculum ole aufferre, a-
quam copiosam iungere, & condimenta quoque addere praecipit Rulius.
Lac ouillum caprino crassius est pinguisque, & dulcius, ac magis alit: sto-
macho tamen minus utile. priuacim tonillas & fauces lactis ouilli garga-
rizatio adiuuat. Dysenterico recreat caseus ouillus uetus. Coagulū agnina
aduersus

Aductus omnia mala medicamēta pollet. Phreneticis prodesse uidetur & le-
thargicis pulmo pecudū calidus circa caput alligatus. Pulmo agnus in tri-
trigines quæ à calciamētis sunt sanate creditur. Dysentericos rectat seu
ouillū decoctum in uino austero hoc & oleo moderat & nassi ueteri. Aures
purgat fel pecudis cum melle. Verberū uulnera & umbones pellibus ouium
rectibus impositis obliuerantur, adq̃ nocte ac die una, ut Galenus producit.
Lana præter cultum & tuteham contra frigora, succida plurima præstant
remedia ex oleo uinōque aut aceto, prout quæque mulctari morderique o-
pus sit, & atringi laxatiue. Succida lana mollis è collo for mimbisq̃ lau-
dantissima habetur. Hæc succos quibus fiant irrigationes facile combibunt &
ob pinguitudinē illam, quam celypum uocant, emolliēdi uim habet.

Bruis imponitur & quoquo modo percussis luxatis membris dolentibsq̃
que netuis ac ossibus fractis inter inania crebrisq̃ suffunditur, ex oleo ui-
nōque aut aceto. Facit & ad capitis, stomachi, aliarūque omnium par-
tium dolores cum aceto & rosaceo imposita. Succida lana imposita subdi-
ritque mortuos partus euocat. Eadem nitro, sulphure, oleo, aceto, pice liqui-
da seruientibus cinēta, quā calidissima imposita bis die lumborum dolo-
res sedat. Cum uero lota fuerit lana, nec amplius celypum in se habeat, suc-
cis ad irrigationes eripiendis, adoncum habetur. Arteris uellera loca frigi-
daque ex oleo madefacta in muliebribus malis inflammationes uulue se-
dant & si procedant, suffus reprimunt. Cremate lane cinis uim habet cali-
dam & acrem: crustas ulceribus obducit, excrescencias in carne coheret, &

Cicatrices inducit. Illinunt attritis, uulneratis, ambutis & in oculorum
medicamenta additur, in fistulas autēque suppuratis. Vis eius septica est,
inquit Plinius, efficacissimēque genus purgat. Quin & ipse sordes pecu-
dum sudorūque fortissimum & alarum adhaerētes lanis (celypum uocant) in-
numeros prope usus habet. In Acteis omnibus genato palma. excoctis, ex-
plet ulcera & emollit præsertim quæ circa sedem aut uulua. contingunt
cum meliloto & beryro. Menses & fertum euocat cum lana induram. ulcer-
ibus aurium genitaliumque atque oris etiam imponitur cū ansetino adi-
pe. Contra erosos oculorum angulos scabiososq̃, & palpebras quæ calli
contraxere, & ciliorum defluuia efficax est. Ocelypum cum melle. Corfico,
quod asperitum est, nauculas in facie extenuat: item scobem cutis in fa-
cie cum rosaceo impositum uellere: quidam & beryrum adlunt. Sordes
quoque caudarum cōcretæ in pilulas, ac siccatae per se, rosæque in farinam,
& illitæ, dentibus mire profunt etiam labentibus, gingualisq̃ si carcinoma
serpat. Iam uero pura uellera aut per se imposita citius doloribus, aut acce-
pto sulphure & cinis eorum genitalium utrius tantūque pollent, ut medi-
camentis quoque superponantur. Medentur ante omnia & pecori ipsi, si sa-
studio non pascatur. Cauda enim quā archissime præligata, euulsa inde la-
na, statim uescuntur: traduntque quod extra nodum sit: è cauda præmori.
Epinyctelas sanat & clauos, thymos, uerrucas peniles: & ambutia igni ro-
saceo cerato exceptum finim. Pecudam finim cinis illitus ex aceto contra
omnium phalangiorum morsus remedium est: alopecias replet cum oleo

*Succida. Dico-
scabiosa, & in-
flammatione
tenu.*

Lana, Spert.

*Quoniam mor-
do tremant de-
bra, dicit Ga-
lenus, Dico-
scabiosa & in-
flam-
matione
tenu.*

*Quibus modis
colligi debeat,
explicat Dio-
scorides & Pli-
nius*

DE DIFFERENTIIS

cyprino & melle lugens nasci, inquit Plinius, & ardens cornibus natis atq; E
delossis sylvestrem asparagum, quem Graeci ornynam aut myacantham
uocant, aliisue nominibus. Oves quas poscimus, primum ortas esse ab o-

Ovis ferus.

Ovis Gortyna-
ensis.

Sabos, arctos.

Musimon, eo-
lus confusius.
Pinos.
Ovis arabicus.

Gorgon, per-
sis.
Sabos, arctos.
Pinos.

Arctos, arctos.
Arctos, arctos.
Pinos, arctos.
Pinos.

Pellae.
Pellae.

uib; feris iam diximus. Sunt autem oves feræ nobis hæc non multo ma-
iores, sed cursu uelociores, atque in dimicando actiores: ut non nunquam
uel apros scibus prosternant cornuum, qui etiam in anfractum consorta
gerunt. Est in Creta Gortyna agro ouium genus, quod cornu gerit quadru-
plex colore fuluo, nullo potius quàm lana duro atque aspero, capriso ma-
gis quàm ouillo simili. Non dissimili hunc colore, fuluo scilicet, conspicitur
& subus: lana tamen non adeo hirsuta, & cornibus binas non quaternas. Na-
tat quandoque hoc animal (ambigit nāque & terra & aqua) ipsūque in-
ter natandum cornicetur plura tum pulsum, tum aliorum aquilium ge- F
nera, cuiusque societate gaudet plurimum: in primis uero phagri, melana-
ri, acus, nulli atque altaci. Est in Hispania & maxime in Corbica non ab-
simile pecori genus musimonum, capriso uillo quàm pecoris uelleri pro-
pius: quorum è genere & ouibus natos, priusci umbros uocauerunt. Sunt in
Arabia duo ouium genera admiratione digna, neque alibi usquam uisita-
rentur: caudam gerit longam adeo, ut non sic tribus cubitis breuiter: alterū
cubitali latitudine caudam habet. Gorgona uocant Nomades Africa (ut
auctor est Alexander Myndus) animal ouis feræ simile uel, ut alius placet, 3
uiculo. caput gerit semper in terram deiectum. à fronte ad oculos usque in-
ba uillisue dependi hæc si quando ab oculis excussa (id quod ægre ob ca-
pitis grauitatem facere potest) hominem quēquam aspexerit, protinus in- G
terficat.

1 Ovis nonnunquam similitudinem significat, ut ardes marem. Agri, arctos.
arctos, arctos, qui à maribus iam separati poscuntur. Verum, arctos castreus. 2 Du-
cuntur agri choedi, inquit Varro, qui post opus nascuntur & remanet opus in uolus
inquit, quæ Graeci uocant opus, à quo choedi appellantur. 3 Testa ouis ideo for-
tasse dicitur, quod pelle imeda aut alio tali uelamine tegumentūque protegitur, & ple-
runque domo alunt. Hæc Varro. 4 Velleta, aliquelamino appellant, lanam post
consecram ademptam & conglobatam. Ex quo anmadueri licet (inquit Varro) petus
lanæ uellaram qualem consecram inuentam. 5 In ipsa oue, inquit Plinius, sunt ge-
nera oleans ostenditur boeotæ: erorum, uentis ostendit. 6 Hæc Galeni est senten-
tia: sed sunt qui carnem ouillam succum melancholicum gigactes produunt. 7 Me-
demi, inquit Plinius, & ualu & inflammatoribus, & sedis rhagadis & condylomatis
cum mellicis ac barbyro. 8 Beshola quidam apud Pellicem legunt, quæ ueloxe- H
sed ne dicunt, quod ferus conuenit.

De capris.

Cap. XCIIII.

Capra.
Capra in capris
non & capris
non & capris
non & capris.

Capra capra.

UT fractum ouis è lana ad uestimentum, sic capra pilos ministrat ad u-
sum nauticum, & ad bellica tormenta, & fabrilia usua. Tondentur ca-
præ, quod magnus uillis sunt, in magna parte Phrygiæ, unde Cilicia ferri so-
lent: sed quod primum ea tonsura in Cilicia sit instituta, non ea id Cilicas
adheuisse dicunt. Neque non quædam nationes harum pelibus sunt uesti-
te, ut in Gerula & Sardinia. Capræ capræ, inquit Altharus, & albusimæ
sunt, cornibus mutile, & ad maximorum equorum magnitudinem acce-
dunt.

Adant. Earum ualla adeo molles, cum Milesius lanis ut mollitudine comparari possint. Capris non omnibus communis sed quibus sunt, in his & industria minorum per incrementa nosorum. Mutilis lactis maior ubertas. Mutilum in utroque sexu utilius, inquit Plinius. Et Coda mella quoque in omni, inquit, regione maritos gregum mutilos esse oportebat: quoniam comuni fere perniciosi sunt propter petulantiam. Et feminam quoque mutilam palatumus queso celi statum: procelloso atque imbrisero, comutam semper. Capræ superiores dentes non sunt, præter primos geminos. Dependent omnia mento uallus, quæ aruncum uocant: hoc si quis apprehensam unam ex grege trahat, cæteræ stupentes spectant. Caprarum linguis non spissatur, inquit Plinius. Capræ herba uescuntur ut oues, sed loca crebro

*arbori, apollo
Caprarum, alia
caprarum, sed
utrumque for-
asse nescio
sunt.*

Permutant, luminaque tantum contingunt. Dameta populus quàm campe-
stre situm desiderat hoc animalis genus: asperisque etiam locis ac sylue-
stribus optime pascitur nam nec tubos auerfatur, nec neputibus offenditur,
& arbusculis fructibusque maxime gaudet, nec manus dignis quæritibus, fru-
tibusque, qui in altitudine non possunt inueniri morsus earum arbori extrai-
lis est. oliuam lambedo quoque sterilem faciunt. Odoratorum uero frum-
tum expectitius hoc animal est: cumque cisthi fronde pascitur, pingue-
dinem barbari crutibusque uillosis adhaerentem reportat, ex qua ladanium
in ossa cogunt pastores. Capras in occasum de clui sole, in pascuis negant
contueri inter sese, sed auertas acerte: reliquis autem horis, inter se aduer-
sas. Tradunt & noctu non minus cernere quàm interdiu: & ideo caprinâ

Zalium.

Cecur, si uescantur, restant uesperinam aciem: ut quos nyctilopos uocant.
Capræ annuicula aliquando coeunt, atque utro ferunt: matres quoque illo eod-
em tempore inuunt. Est autem mas uel mensium septem: fœtus habilis ad
procreandum: quoniam immodicus libidinis, dum adhuc uberibus aluit,
matrem stupro superuenit: & ideo celeriter & ante sex annos consensescit,
quod immatura ueneris cupidine primis pueritæ temporibus exhaustus est.
Itaque quinquennis patrum idoneus habetur feminis implendis. Et tri-
mi quoque minus utiliter generant: & in senecta ultra quadricennium. Ca-
pellæ bimæ, aliquando & annuclæ, ut diximus, partum edunt: sed in trimâ
tutu gregi augendo utiles sunt: neque enim educare nisi tria debet. neque
tamen ultra octo annos matres seruande sunt: quod assiduo partu sangui-

Dne steriles existunt. Parit autem capra, si est generosa proles, frequenter duos,
nonnunquam trigeminos: patris & quaternos, sed raro admodum: ut Agy-
ptus capras quinque parere ferant. Tempus admissuræ per autumnum te-
re ante mensis in Decembrem præcipiantur: propinquantem uere partiat tur-
gescentibus uirgulis: ferant enim quinque mensibus ut oues. Vita earum
longissima, annos in Aethiopia xi, in reliquo orbe plurimum octo. Nun-
quam sanæ degunt capræ: nunquam enim lebei eas carere Archelaus au-
thor est. Alia pecorum genera cum pestilentia uexantur, prius morbo & lan-
guoribus mælescunt: solæ capellæ quamuis optima: atque halates, subito cõ-
cidunt: id accidere maxime solet ubertate pabula. Pinguedine etiam steri-
lescent capræ. Qui caprinum gregem cõstingere uult, an eligendo animad-

*Modestius
se Plin.*

Capr.
Furca.
Turdus.
Alpugna.

Capella.

ueruat oportet. Capræ cui sub maxillis duæ uerruculæ collo dependent, opti-
mas habetur: amplissimi corporis, cruribus crassis, plena & breui ceruice, &
flaccidis & pręgrauantibus auribus longisque, exiguæ capite, quàm maxi-
me sinuas, nido, nigro, densoque atque longissimæ pilos: ut autem Varro-
ni placeret, hircus molliore sit pelo & potissimè albo. Capella præcipue pro-
batur, simillima harco quæ descriptimus: si cui est uberis maxima & lactis
abundantissima. Tondetur capræ, ut dictum est, nisi si glabræ sint: duo enim ge-
nera carū. Capræ tēperamento est longe sicciorē q̃ hircus, minus tamē siccō q̃
bos. Caprina caro ætate prima æt media (cum scilicet fruticum germīna,
quibus capræ audis ueluti solent, sint frequentissima) optima est: sed post
solisimum æstiuum uisus olei, præterum hircorum: tum uero maxime assū.
Quo circa etiam dum eluxatur, ut in ouilla dictum est, olei operculum au-
ferre, copiosamque infundere aquam, & cotidie citra cocturæ addere, præ-
cepit Rufus. Succum præstat caro caprina uiscosam ærēque: sed hircina
omnium est deterrima tum ad concoctionem, tum etiam ad succi probita-
tem: quæ minime quidem pinguis lentius est, sed nocet maxime ob du-
ritiem & in alteridō difficultatem. Hircina caro concoctus facilis est, neq;
mucositas probum generat siccum, & secundū suillam optimum. Inter
cetera lactis genera caprinum medio crassum obtinetur quod nec pingue
admodum nec crassum sit: estque eo bubuli casco fertilius pene altero tan-
to. Stomacho accommodatissimum est lac caprinum, aliūque minus cre-
teris tenet: quoniam pecus hoc astringentibus pabulis maxima ex parte ue-
scitur: nempe fronde magis quàm herba. Caprino lacte liones sanantur, post
bidui inodiam tertia die hordera pastus capris, posito sine alio cibo. Iecoris ca-
prini assū, sunt qui distillantem sinem accipiunt, quæ ad nyctalopas utun-
tur: elixi autem uaporem oculis apertis accipiendi præcipiunt. assū quo-
que si e datur, ad eosdem affectus accommodatum auit: & præterea comi-
talem morbum ostendere. Sanguis hirci antidotis miscetur. Capræ & hirci
sanguis sanguine inelarus, dysenterias & eciliacos fluxus sistit: in uno po-
nus contra toxica efficax est. Sunt qui sanguinem harci arefactum calculo-
sis propinent præsentissimo remedio. Cornu caprinum usum, tum ad dē-
nium candorem, nam ad contrahēdas gingiwas molliorē fluidas unguet ad-
fricatur. Caprarū cornu uel pilis accensis, fugari serpētes dicuntur. Capra-
rum ungulas crematas, morusque aceto persusas alopecias illunt: quid est
itaque cinis hic faculentis extenuantis. Finem caprinum lienas aliarūq;
partium duritiem soluit: usū, tenuius efficitur. alopecias modetur aliisque
quæ absterfione indigent affectionibus, ut lepræ, ploræ, licheni, & hoc ge-
nus aliis. Miscetur & cataplasmatis, quæ parotidas diuturnasque bubo-
nas digerunt. Imponitur in aceto decoctum serpētum moribus, ulceribus
quæ serpunt, & erisipelatuum nanque habet & abstergendi digerendique:
cum azungia serpentinæ is qui podagra tentantur, auxilio est. Ex uno po-
nus caprarum sinum, præsertim in moribus degentium, regium morbum
emendat: in enses etet cum aromatibus haustum, partisque euocarsicoma
uero in farinam tritum, & cum thure in lana inditum, profluuium mulie-
bre

Quomodo præ-
parari debeat
hirci sanguis,
docet Aetius
lib. 21.

Abre siliis ceteras sanguinis flumines ex aceto cohibet. Capre quas alumnus à capris fetis sunt orti, quibus propter Italici caprarum insula est nominata: sunt autè capre sylvestres, his nostris haud multo maiores, sed uelociiores atque in pagna aciores. In Samothrace habentur greges caprarum sylvestrium, quas rotas uocant. Sunt etiam in Italia circa Fissellum & Ternam multe. Capre feræ in plurimas similitudines transfigurantur: sunt capre, sunt rupicapre, sunt ibyces: quæ genera omnia alpes nobis transmittunt sunt & oryges, soli à quibusdam dicti: sunt & damæ & pygargi & strepsicerotes, multæque alia haud dissimilia: sed hæc transformati finis mutant. Ibyces prærupta & inaccessa monti incolunt, perniciousitate metanda: quam onerato capite uassus cornibus, gladiorumque uaginis. In hæc se libitant, ut tormento aliquo roatu, in petras potissimum è monte aliquo in alium transilire cupientes, atque recursum pernici quo libuerit exultant. Capreis ramosa cornua dedit natura, sed parua, nec fecit, ut cernis, decidua. In Africa capre non sunt: rupicapris cornua in dorsum adunca, damis in aduersum: sunt etenim & damæ in caprarum genere, sicuti & qui pygargi dicuntur. Damas mutant transmarini finis: hæc mansuescunt raro, cum feræ intè dici non possint: ita nec placide nec feræ, sed mediæ inter utrumque nature, ut in mari delphum. Transmarini sunt & strepsicerotes, quibus cornua erecta rugarumque ambitu cõtorta sunt, & in leuè fastigium exarsa, addacem Africa appellat. Orygem perperuo siuidem Africa generat, solum à quibusdam dictum, comitatio palo uestiturum, & ad caput uestio. Color illi in facie niger, cetera cædibus cornua nigra, caua, erecta, mucrone acuto & præduro dorsum latum & obesum. Velox animal est & ferax: ut quod neque canem timet, aut sylvestrem apertum tumus, aut pantheram: led neque leonem, nec hominem uenatorem: elephatum unum animalium metuit. Orygem, ut diximus, Africa generat, ex natura loci potius caritatem, cum mirabilis ipso ad remedia sitientem. namque Getuli latrones eo durant auidio, reperiis in corpore eorum saluberrimi liquoris nescius. Orygem appellat Aegyptius feram, quam in canticule exortu contrahere & contuere tradit, & uelut adorare cum sternuerit.

Capra Sylu.
Pera
Fera.

Ante.
Alis fissellu
Phe.

Ibyces

Capra.
Rupicapra
Dama.
Pygargi.

Strepsicerotes.

Adunc.
Oryx.
Solus.

Dux uerrucula. Dux uelut mammillas pendiles appellat Varro & Plinius, si fallor, lactinas binas dependentes sed in fixum modo. 2. Capre mas dicitur usque ad tertium aut quartum mensem, *capre* in genere hermæo usque ad sextum unum anni. Theophrastus. *capre* in genere hermæo usque ad sextum unum anni. Theophrastus.

Ad.
capre.
capre.
capre.

1. Rotæ. Sicut quæ apud Varronem legimus: plaiycesotas: ego uero nusquam memini legisse plaiycesotas esse caprarum genus, sed ceruam. An idem forsitan genus tota est cum ibyde quo mox dicetur. 4. Capreolos uocat hos Columella, opor. lib. 5. 5. Non me latet hunc Plinij locum aliter à quibusdam legentem sciri placet hæc uetus lectio. 6. Alia, Perperuo siuidem Africa generant. 7. Oryx, ut Aristoteli placet, animal est bisulcū & unicornis, quod scilicet medio sin capitis unum cornu fixum habet: an idem sit cum oryge Plinij & Oppiani: consideret studiosus lector. Oryx uero apud Columellam inter eas numeratur feræ, quæ uariis incluse ferantur.

Capreoli.

DE DIFFERENTIIS

De ceruis.

Cap. XCV.

E

Cervus, Lin.
cap.

Inter feras quæ cornua gestant, reliqua facile suspexit certumque genus, si-
ue formæ pulchritudinem, siue cornuum amplitudinem & antioriamque in
idem varietatem species. Hæc animalis nondum nascuntur, nisi quoad
indici gratia sit unum quoddam prætuberans, quod bene laniareq. est.
Bum primùm cornua oriantur simplicia & recta ad subularum similitu-
dinem: quomobrem subulones per id tempus eos vocat. Trinis bifida ex-
cunt, quadrimis trifida: atque deinceps ad hunc modum procedit nume-
rus usque ad annum sextum: ab hoc similia semper procedunt, ita ne sit disio-
scere ætatem ramorum numero: sed senes cognoscimus maxime indicio
duplaci illo, quod scilicet dentes aut nullos aut paucos habent atque adimi-
niculis carent: vocantur adimnicula cerva, qui iuvis cornibus prominent
ante frontem, quibus in pugna utuntur iuniores: senes autem carent. Soli
animalium cerui cornua tota solida habent (cum cæteris corruen somni-
bus caua sint) atque ea omnibus annis ita uti utiis tempore, mense scilicet
Aprilis fere amittunt: quæ cum amiserint, occultant se se interdum velut
mortui: adque asperis opacisque faciunt locis, ut muscarum turbo uasent.
Et quandiu carent, in nocte procedunt ad pascula, donec recipiant cornua:
quæ primùm quasi cute uestita, & molli lanugine hirsuticula emittantur: sed
cum creuerint, soli exponunt, ut excoquantur & siccantur: iam nudi ar-
tenti arborum, cum ea scalpant, indolent, tunc ea relinquunt loca, confisi
habere iam quo repugnare possint, cum res exigit: contra nonnulla enim
animalia quandoque resistunt & cornibus se defendunt, quanquam fero-
ces beluas fugiunt. Sunt etenim & cornuum mucrones hebetiores: & cor-
nua ipsa præ immo excessu fere superuacua sunt: grandis enim illa & mul-
tistida cornuum magnitudo, in pugna sepe obest potius quàm prodest. Fer-
mina in hoc genere cornuum inops multaque est. Cerui si cum per ætate
nondum cornua gerunt castreunt, non edunt cornua: sed si cornu gerit ex-
ciduntur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur. Corpus
cerui obesum est, & maculoso uellere testum, solum aliis: sunt aliquan-
do & candido colore. Collum gerit proceram atque erectam summasque
cacuminat aures. In monte Asia Elapho nomine apud Arginensiam, cerui
omnes scissâ ac uelut diuisa ante funi qua nota uel alibi, si loca mutant, di-
noscuntur: & quidem fetus iam inde à primo octu in utero idem contra-
hur signum. Crura habet cerva gracilia. Dentium ordine superiore caret a-
lorum seu cornigerorum, & ruminat. Nares ita diuisæ apparent, ut qua-
druplices uideantur. Genitale mari neruosum est: tubera se minus quæ ma-
ut uocis. Vermes cerva continere produntur suo in capite plurimos uiuos:
magnitudine haud minores us uermibus quos maximos carnes putres edi-
derint, qui gygi unius sit atque contigui solent sub lingue manare. Cor
habet ceruus, pro ratione magnum, felle uacat: quicquam eius inestum
amarum adeo est, ut ne à cæcibus quidem attingatur, nisi ceruus præpin-
guis sit. Cernis Achaicus cognominatus, sel conuincit in cauda creditur. Est
uero quod ibi continem arum, colore quidem simile selli: sed non ita ut sel
humidum,

Subulones,
Πυρρὸν Λαγ.

Adimnicula,
Ἰμωστίρις.

*Numeri cer-
uorum agniti. Ph-
nari et Arist.*

*Achaicus cer-
uus.*

G

H

A humidum, sed huius simile parte interiore. Sunt, inquit Plinius, qui cervo
 fel in cauda inesse putent, aut intestinis: ideo tantam habet amaritudinem
 ut à canibus non attingitur. in Bystro & Therie quatermi tenes cervus. *Alia Thome.*
 Ceruorum sanguis fibris non habet: quocirca non coactescit, coitu scilicet fir-
 miore, ut ceterorum: sed perinde ut leporum sanguis spissari aliquantulum
 solet, eodem fere modo quo lac, quod incocto coagulo conuenit. Ceruus in
 coctu mares suos non patitur, nisi raro, propter rigorem genitalis: acque
 ea de causa graduatur in coitu, subductisque clunibus semen recipiunt ge-
 nitale. Mas non una femina iungitur adheretue, sed mutat, breuique in-
 terposito tempore aliam atque aliam supergreditur: quo fit, ut ab eodem mul-
 te impleantur. Coitus plurimum & conceptus eorum post arcturi sydis
 B mense Augusto & Septembri. uterum ferunt octo menses. At mares reli-
 cti, rabie feruntur, fodiant scrobes: tunc quoque rostra eorum ingrescunt.
 Partunt feminae magna ex parte unum, & interdum geminos: parere autem
 iuxta uias maxime solent, quò scilicet propter homines belat minus acce-
 dunt. Incrementum humuli celerem. Editos parus studiose oculant, & absco-
 ditos inter profunda fruticum uel herbarum, pedum uerbere castigant ad
 latendum. Cum manerunt ad fugam robur, exercent cursu, & fugam me-
 3 ditari docent: ad peritrota ducit, & per ea salire assuescunt. Vita esse per-
 quam longa hoc animal fertur: quanquam nihil certi eorum quæ narran-
 tur uidemus, inquit Aristoteles. Ad cognoscendam autem eorum utiui-
 tatem Alexander Magnus torquens aureos plurimis ceruis innoxius: qui post
 C annam centesimam caper, adopteris iam cure torquibus, nec dum leni iu-
 diciam per se ferebant. Pinguescunt cerui æstate supra modum: quam ob-
 rem nec currere quidem possunt: secundo aut tertio cursu capiuntur ab his,
 qui pedibus insectantur. Fugunt etiam in aquas propter æsum & ambeli-
 nam: quin & lacubras querunt, ubi se præpingues sentire, latentes incom-
 modum pondus. Caro eorum libidinis tempore uiciatur & fetentem itaque
 mares impleuerint feminas, separantur, ut modo diximus, per se ipsos,
 propter graue olentiam: ferent enim ut hirci: & facies quoque eorum ni-
 grescit ut hircorum. Degunt ita quousque imber accedat: tum pascua repe-
 tunt. Hyeme extenuantur debilitanturque: uere autem uigent maxime ad
 cursum. Cum fugiunt, etiam in fuga acquiescunt: stantisque respiciunt at-
 D que manent, dum qui insequitur appropinquaret: fugæ præsidia repetunt:
 quod ideo facere uidentur, quia interiora laborant: intestinum enim tam
 tenuem imbecillumque habet, ut etiam si leniter percussis, possit iumpere, cure
 adhuc integra. Vocem mares grauiorem quam feminæ mittunt: uox aut
 tem manibus in hoc genere est, cum tempus coeundi est: feminis autem cū
 metuerint, breuis uox feminæ est, maris productior. Fugunt cerui latratu
 canum audito, aura semper secunda, ut odor cum ipsis recedat. Mulcentur fi-
 libulo & cetero uenantium: itaque alter uenantium palam aut sibilat, alter
 clam ferit à tergo, ubi focus tempus iam esse significant. Sed cum crexere
 aures, acerrimi sunt auditus, nec latere insidit possunt: cum remissere, sur-
 di, & facile interimuntur. Animal simplex est, & omnium rerum miracu-

DE DIFFERENTIIS

lo stupens tantum ut equo aut bacula accedente propius, hominem iux-
 ta ueniantem non cernant, arcum ipsum sagittasque mirentur. Serpentibus
 inimicus ceruus est, anhelum namque, si quæ sunt, extractas cauernas, man-
 dat. Febrim morbos non sentit hoc animal, quia & moderatur huius tumori,
 ut fertur: legimus enim pluri mos matutinis diebus ceruam carnem de-
 gustare solitos, sine febris longius fuisse, quod ita domum existimant,
 si uulnere uno fuerint interempti. Quanquam ab hoc succum procreat cer-
 uina caro, uti Galenus prodidit, non minus uiciosum concoctisque diffici-
 lem quam sit bubala aut ouilla: imo asinæ carni proxima esse censetur, ut
 fere nullum, quod ad alimenta rationem ardeat, usum præstet. Ceruus
 sanguis sartagine inassatus dysenterias fluxionēque cæcæas sistit. in ui-
 no potus cōcta toxica efficax est. Aduersus uenena serpentiumque morsus F
 mirum est huiusmodi coagulatum occisi in matris utero. Ceruina modulla ut
 tum emollit, tum in possum etiam extrinsecus imposita. Ceruina modulla
 perunctos uenenata sagunt, inquit Dioscorides. Cornus cerui cum ca-
 dunt in morem clorut, ulceribus oculorum & distillationibus oculis est in-
 fructus dentes expurgat, fundis que ginginas contrahit: huius cochlearis
 epotus prodest dysentericis sanguine excrementibus, cæcæis, morbo regio.
 Datur & in uelut doloribus cum tragacatha in muliebris fluxionibus
 cum liquore quopiam illi rei accommodato. Acceti cornus odore serpen-
 tes fugantur, & comitales morbi deprehenduntur. Cornu in aceto coctum,
 si co gingiue colligantur, dolores ex molantū dentitione factos adimit. Ge-
 nitale cerui tritum & in uino potum, superarum moribus auxiliatur. Cer-
 uini generis sunt, & ceti quoque dicuntur, qui platycerotes & eurycerotes 4
 tes appellantur, à summo cornuam latitudine, que in palmas fixit na-
 tura, digitois que emittit ex his. Corporis forma cerui est, sed tergus omne nõ
 minus quam sit pantherarū uarium: uerum in his albicant macule, que in
 pantheris nigre sunt: & huius quoque sanguis fibris caret, quod circa neque
 spassatur. Bubali penè ad ceruam faciem in Africa procreantur corporis
 magnitudine bubalus eurycerose minor est, at dorcade maior, oculis ipse
 didis, alpectu pulchro atque alaci. Cornuum exortus statim à capite recti,
 superiores uero eorum patres retro ad dorsum flectuntur. Bubalis cornua
 interdum in uiculis sunt, nam exis contra nonnulla sese defendunt, feroces ta-
 men pugnacesque beluas fugant. Cum uero leonē metuat bubalus, caput H
 tantum abscondit, reliquo corpore neglecto: itaque totū corpus latere pu-
 tat. Sanguis quoq; corū fibras non habet: ideo neque concretus. Patri soli
 amantissimū animal est: nam si forsan à uenatoribus capteus, in alienū solū
 quamuis longinquum abdo catur, solutus ad loca consueua reuertetur. Inter
 comigera, omnium que explorata habemus, minimum dorcas est, in cer-
 uino quoque genere numerus idus, ut qui cornua habeat omnibus annis de-
 cidis, que & is quoque interdum in uiculis sunt: nam etiam contra nonnulla
 resistunt, & cornibus se defendunt, tamen feroces pugnacesque beluas fu-
 giunt. Tirudum animal dorcas est, & cursus uelocissimi: nocte neque cer-
 nere, atque interdum credidit. In uenatione interdum, uel in media fuga
 consistat:

*Quamcumque
 de urina cer-
 uina ceruam,
 monstrat Dio-
 scorides.*

*Platycerotes,
 Eurycerotes.*

*Bubalis,
 eubalis, &
 eubalis.*

*Dorcas,
 Dorcas,
 Dorcas,
 &
 Dorcas.*

A confistit: quod si tunc temporis otii detur reddenda urina, adeo recitatur illi ures, ut denovo ad cursum reddatur alacrior. Dorcades in Hispania sunt frequentes: in Lycia non transeunt montes Syriz usque.

Cervus forficatus pro Lycia, ex Claptonio.

Hermolus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

Asiaticus.

1. Hinnulus cerui nâpâ dicitur & aquale: quâquam aquale mondu in progetidatur 10 pascua. Hinc Hermolus. 2. Aristoteles achamas vocat: Graeci genus cerui 10 Echeneas ab oppido cognominant: Hinc ex Hermolus. 3. Virum esse cerui longioris quam elephantis ostendit Paulinus in Atreides. Ex Hesiodo, Ter tina scela hominu transiunt garrula ceruix. Quatuor & peragru cornuâ temporu ceruix. 10

4. *epâs*, quem felle caute sentit Aristoteles, dami interpretantur & Theodorus *epâs* & Hermolus, ceterique quos videlicet memini, recensures omnes. Verû dama, ut antea monstrauimus, in caprarum genere numeratur a Plinio: proca uero, ut eius in facie Hermolus, à ceruo non distinxit Aristoteles. Adde quod eadem infusa quæ Profora à Iulio Caponibus dicitur, à ceruo non distinxit Aristoteles. Adde quod eadem infusa quæ Profora à Iulio Caponibus dicitur, à ceruo non distinxit Aristoteles.

B conuulsus ab animalium eorum copia, eadem & Elaphonessu nominatur: de qua Plinius lib. 7. Proceros paucos repenas auctores, uel nullo potius, qui animal *epâs* meminerint, *epâs* & pleroceros & euryceros. Atque inde conuenimus idem esse animal, quod *epâs* ab Aristotele uocatur, & pleroceros siue euryceros ab alio. 3. Dorcada, capream uocat Theodorus: ac nos Plinium secuti capream in caprarum syluestrium genere locauimus. Dorcus apud Oppianum idem cum dorcade est: Dorsocendi aliquam diuersum enumerat. Dorcades Lybiæ (ut ex *Alhano* natæ Gillius) quamquam uelocitate sunt mirabiles, tamen inferiores sunt in cursu equis Lybiæ. Earum alia nâgus utris distinguitur, reliqui corporis color rubet, & pedes quidam longi sunt. Cornibus caput ornatur, oculi nigri, longissimi: aures habentur, *epâs* a poetis nâcupata (ut aliud sit animal) à dorcade Lybiæ: turbonem instar celestem ferunt: flauis pilo spe

Dorcades Lybiæ.

Elaphus, ceruus.

statuenda est: raris pallorescunt, cum ex albentibus oculi cyaneo colore: nâsi uidentur, autem peractis pilo reserunt: neque modo in terra pedum celestem ostendit, sed etiam cum in fluuij confluem accedunt, angulis pedum remigant, *epâs* perueniunt. & uero in hucibus natæ gaudet, unde sibi uisum cõparat: uides tuncos, & cyperum depascitur.

De tragelapho, tarando, ophio, leucocrota & colo. Cap. XCVI.

E Adem penè cum ceruo specie sunt, quos tragelaphos dicunt, sed non a libi quam circa Phasidem amorem nascuntur. Distat tantum, quod uillosos habent artus, & menta promissis hirta barbis. Tarando magnitudo quæ bouis: caput maius ceruino, nec ab ãmîle, cornua ramosa, ungula bifida, nullus profundus magnitudine uisorum: tergore tanta durtia, ut thoraces ex eo faciant. Hunc tarandũ affirmant haberi menu uertere, & cum delirescat fieri ãsimilem cuiusque rei proximauerit: coloris quoque omnium arborum, fruticum, florum, locorumque reddere mentem in quibus la

Tragelaphus.

Tarandus.

D totidẽ quæ raro capitur, sed cũ libuit sui coloris esse, ãsimo similis. Scythia hunc mittit. Ophion Sardina quondam ferebat, nec alibi nascebatur: animal ceruo manus, sed pilo demum ac dente simile ceruo. Hoc interisse arbitror, inquit Plinius: & ideo medicinas ex eo omitto. Cruribus ceruini & ungula quoque bifida apud *Arthiops* leucocrota est perniciosissima fera, ãsimi fere magnitudine, collo, cauda, pectore leonis, capite melium, ore ad aures usque resisso, dentium locis ossæ perpetuo. hanc ferã tradunt humanas uoces imitari. Gignatur apud Scythas quæ circa Meodiam palodẽ sunt Colos, candido colore, magnitudine inter ceruum & arietem, sed qui uelocitate utrũque facile superat. Potat nâribus ad caput usque immersis: cõque potu diebus pluribus consentur, siccioribus locis pascitur.

Colos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

Arctos, arctos.

DE DIFFERENTIIS

De hippelapho, hippardio, hippagro, hippopotamo, & eale.

Cap. XC VII.

Hippelaphus.
Hippardium.

Magnitudo hippelaphi cerue comparatur cornua dorcade similia. ut i
bam summus continet arvas. nec non & fera quæ hippardium no-
minata est, parte etiam eadem: sed utrumque hoc genus tenuissimo tubæ
ordine à capite ad summos arvos erigunt. Gerit corvæ utriusque, cetera
forma hippelapho, & pedes habet bifidos. Proprium hippelapho villus
qui ab eius gortare modo barbe dependet. Gignitur apud Arachotas. Vin-
gulas quoque bifidas habet hippagros, ceruini similes. dentes exertos
binos. spina tota ad caudam usque perpulebra ornatur tuba. Vivit in præ-
ruptis Æthiopis Indiarque locis. feruitutem non tolerat: nam si forte ca-
pus feruetur, fame sese cruciat, sponteque moritur. Bifidum animal & F

Hippagrus.
Equus silve-
stris.

Hippopotamus
Equus fluvio-
rius.

hippopotamus est, sed quod ambigat terre, mari, atque amni commune: na-
tura enim hippopotami ita constat, ut vivere nisi in huiusmodi non pos-
sit. Hunc gignit Ægyptus, malum hominibus non minus infestum quàm
sit crocodilus. Plurimi sunt super Saiticam, inter Ægypti præfecturas. Iuba
alli equina, ungula qualis bubus, rostrum refimum, dentes cotti & apertissimi
more adunci, sed leuiter & minus noxi. Cauda etiam apri, tortuosa. Talis
quoque inest bifidæ cornu modo: magnitudo asini, huiusmodi equi. Tergus
ad scuta galeæque impenetrabilis, præterquam si humore mædeat. Inter-
iora omnia equi & asini similia. Noctibus leges deposcitur, ad quas per-
git uertitur alio doloso, ut fallente uestigio, reuertenti nullæ ei insidæ præ-
parentur. Carnem habet hippopotamus durissimam, & concoctu difficil-
limam. Hippopotami testes exsecati ac triti, contra serpentium morsus bi-
buntur. Cuius cori cum aqua illicus panos sanat adeps, frigidas febres. item
sinum sufficit. Pellis eius è sinistra parte frontis in inguina adalligata uenæ-
tem inhaeret eiusdem cuius alopecias explet. Est apud Æthiops Indolose-
eale, alius ut equus fluuiarilis, cauda uero elephanti, colore nigro uel fuluo,
maxillis apertis, maiora cubitalibus cornua habet mobilia, & ad obsequi-
um uel motus accommodatur: quæ enim riget, sed deflectuntur, ut u-
sus erigit præliandi: quorum alterum cum pugnat protendit, alterum re-
plicat, ut si ictu aliquo alterius acumen obtutum fuerit, acies succedat altè-
rius. Hippopotamus comparatur, & ipsa sane aquis fluminum gaudet.

Perigoneus.
alio hoc ex-
pliat Gallus,
ut uidetur ex
Artemio.
Plus. Testes
drachma ex a-
qua clera ser-
pentis bibunt.
Eale.

Episcopus.

1 Hippelaphum Theodorus equoceras uocat, à forma equi & ceru quam ha-
bet, compositum nomen accepit. 2 Cauda, ut refert Herodotus, equina & magni-
tudo eius est bouis maximi. 3 Tergos: crassitudo tamquam Herodotus, ut ex
eo cum aridum fuerit, scabula fiant: & ut Plinius refert, huiusmodi.

De camelo, & camelo pardali.

Cap. XC VIII.

Camelus, ad-
indus.

Incet quadrupedes quæ animal generant, post elephatum maxima mole
camelus est, idemque bifidum cornu tamen uacat. Bactri camelos for-
tissimos mittunt, licet Arabia plurimos gignat, inde duo camelorum gene-
ra, Bactrianum atque Arabicum. Differunt, quod illi bina habent tubera in
dorso, hu singula: camelus enim proprium inter ceteras quadrupedes habet
indor-

- A** in dorso, quod tuber appellant. Sûr & omnibus camelis singula parte una: in pectore scilicet, quale in dorso tubera, quibus incumbat reliquû corpus, & firmetur quoties in genua inclinantur. Dentium superiore ordine ut boves carent in utroque genere. Caudam habent alino similem. Genitale manibus nullo ita cõstat, ut vel ex eo cõfici possit, quo arcus fidelissime intendatur: idemque in anserum mingunt: genitale enim inter crura posteriora caudam versus spectat. Feminae in ventre mammas binas cû papillis quaternas habent, ut boves. Clunes habet camelus proportionem magnitudinis paruos. Camelo tali similes bubalis, sed minores paulo: est enim basileum ut modo diximus, sed basileum sic est, ut pes parte posteriore scissus paululum sit ad flexum digiti secundum: parte autem priore summa, quadrupartito fundatur discrimine paruo, quantum scilicet ad primum digiti inflexum. Et inter fissuras quoddam perinde ut in anserum pedibus continetur: eõq; sit ut alij minime basileum animal esse uoluerint. Pes uestigio est carnosus uris modo: qua de causa in longiore itinere sine calciatu fatiscunt. Pedatim incedit camelus, hoc est, ut sinister pes non transeat dextrum, sed subsequatur. Ventres habet camelus plures: & ruminat quemadmodû cor niger. Fel non nisi aliquo discretum, sed uentulus quibuscum conclusum habet. Coeunt cameli sedente femina, nec aucti, ut sentit Aristoteles: (quanquam auctis, inquit Plinius, camelis coitus) sed compescit nec mare, ut ceteræ quadrupedes agunt, & coitum toto die exercent. Perunt recessus foliades cum libet coeant aliquis eõ potest tuto accedere, præterquã
- C** pastor armentum: sicut enim mas tempore coitus, siue homo accedat, siue camelus nam odium aduersus equos gerunt naturale. Tẽpus coeundi in terra Arabia mense Septembri, fert ventrem menses duodecim, uel ut alius uidetur, menses decem, parit singulos: unipartum tanque est. Incipit & mas de forma coire in trimatu: forma post partû uno interposito anno coit. Cameli, matres nunquam sepe reueniunt suas: sed etiã si quis cogat, ipsi non patiuntur. Camelus lac suum usque eõ seruat, quõ iam cõceperit atque eo tempore, tum lac, tum caro cameli suauissima omnia est. Prolem à parente separant anniculam. Vivunt cameli magna quidem ex parte annos triginta: sed nonnulli quinquagens annis: quidam & centenas, utcumque & rabiem quandoque sentiunt. Castrandi genus etiam feminas quæ bello
- D** præparentur, inuentum est: castrare nanque auctiores & fortiores sunt, coitu negato. Habentur in duplex ministerium: sunt alij oneri serendo ac com modati: alij leues ad pernecitatem ac locitas enim illis inter equos, sed sua cuique mensura sicut uires: nec ultra assuetum procedit spatium, nec plus instituto onere recipit. Satim quadriduo tolerant: uerum cum occasio bibendi data est, tantum implentur, quantum satiet desideria præterita, & in futurum diu profit. Intolerant aquas captant, putas refugiunt: denique nisi ceterior liquor fuerit, ipsi assidua conculcatione litum excitant, ut turbetur. Cameli tum caro, ut modo diximus, tum lac ab hominis dulcissimum est: suauissimum autem hoc existimatur, ad unam mensuram duobus aut tribus aquæ additis. Cameli cerebrum arefactum potumque ex aceto

DE DIFFERENTIIS

cominabilibus moribus autem mederi: item fel cū melle potū: hoc & angina. E
 canda arfacta solus alium. Lima cinere crispum capillum cum oko. Et dy-
 senkeris prodest illius cinis, ponisque quantum tribus digitis caput, e-
 riam cominabilibus morbis. Vinum sullonibus utilissimam esse tradunt;
 inēque ulceribus manantibus. Barbaros eam seruare quinquennio, & he-
 minus potam cūre aluam. Camelino capite est quā nābim. Arthopos
 uocant, nos camelopardalam dicimus. Collo equis similis, pedibus & cra-
 nibus boui, colore rutilo, candidis maculis in humulorū motem superpar-
 sa. Posteriora corporis anterioribus humiliaiora: adeo ut uis partibus humi
 sedere uideatur, quā bouis altitudinem non superant: cum partes priores
 camelorum crura proceritate æquant, simul & quæ circa artus sunt, atque
 pectus ipsa proceriora uideantur, quā pro reliqua corporis ratione: ut F
 uero Heliodorus prodidit, caput cameli simile, maius duplo aut paulo am-
 plius quā Libya struthycollium, ut oloris longum. Animal aspectu ma-
 gis quā feritate conspicuum: nullam enim pre se fert feritiam, tracta-
 tūque tam facile, ut funiculo eius capiti allegato, abuis ducatur à pfecto:
 ut non inter feras, sed inter pecora potius numerari debeat: quare etiam o-
 uis fere nomen inuenit, Aethiopia hanc gignit. Nullam habet cum parda-
 le similitudinem.

Nabim.
Cameloparda-
lam.

Ovis ferit.

Dromedus.
Dromedarj.
Ovis fere.

1 Cærent cameli, inquit Aristoteles, ceteris quā equi Nissani. Veloces illos
 camelos dromadas uocant Laus Decade quarta. & dromedarios Eliax, ut arbitror,
 incipit Lausus. 2 Ovis fere, alias ouifera.

De suis.

Cap. XCIX.

G

Sus, f.

Suillum genus cum sit aliis basileum, in Illyrico quibusdam locis &
 Præonia, atque nonnullis aliis regionibus, solidas habent ungulas: sues
 quo sit ut ex utroque genere existimetur, solipedum scilicet & basileo-
 rum. Denrem nullum muris fusi: & mas plures habet dentes quā femi-
 na. Mas item dentes habet exertos, quibus femina uiscat. Rostrum habet
 fus repandam, collum crassum, & fetis horret. Testes maribus harent se-
 tro, nec ternali pendunt. Mammas gerit sexuina, nec in pectore nec in fir-
 mibus, sed in uentre, generosa duodenas, vulgaris binas minus. Genitale
 uero ea continet parte quæ pecotis ubera habentur: & cum per libidinem
 turget ac prurit ad coitum, sinum ranteper hoc retrahitur, uentrique so- H
 ras, ut inde mari coitus sit facilius. Cauda sui inuoluta: id enim noxum, sa-
 cilus tacere in dextrum quā leuam inuolutam. Lienem habet angustum
 & oblongum, uentrem ampliorem, in quo rugæ cingellæ (quas uicæ uo-
 cant) insunt nonnullæ leuæ hunc inuolutum excipit longissimam & mul-
 tis conuolutorum anfractibus. Vulua porcina anfractuosa sinuosaque est:
 quandoquidem animal multiparum fus est, & in sinibus sexum gerit.
 Suam ossa medullæ parum in se continent. aptotum sanguis non pilla-
 tur. Coire incipiunt sues tam mares quā feminae mense lux ætatis o-
 ctavo: quanquam mas antequam sit anniculus prolem generat uniolam:
 femina annicula patit: sed non omnibus locis eadem ætatis ratio est.

A iam enim sues nonnulquā tam mares quā mares quāro coeunt mente : sexto tamen ita ut uel prognerare & educare possint . Nonnulquam apri mense decimo uirē incipiunt . Valent q̄ contra ad triennium . uetustioribus proles deterior gignitur : nullas enim profectus accedit , nulla uirum recreatio . Pauca solum edis suis prima partione , uirgē sētūda nec senescens copia fetus deficiat , quāquam lenius coit . Vt autem Varro produidit , suis ad ferturam quā sit fecunda , animaduertunt fere ex primo partu , quod non male si reliquis iudicat . Sunt ē scro fis alie statim proles fecundit laudabilis alie increscentes melius genetant . Vbi uero quātūdecimū annū nata scrofa est , non praterca genera : aliquibus tamen uita prope ad uicēnos annos : plurimis uero ad quīdecim . Si pinguet ocyus , & iuuenis , & senescens mouetur ad coitum : si grauida admodum sanguescat , efficiunt ut fēta minus habeat lactis . Sues circūres his parunt anno : natura enim diuisus est suis annus bisariam : quaternis mēribus fert uentre mēibis nutrit . Parere tot pote st scrofa quot māmās habet : si minus pariat , fructuaria non erit idonea . Numerus partus plurimum ad uicēnos : si tamen multos pepererint , educare omnes nō queunt . Nutricare octonos porcos paruulos primo possunt , ut Varro . placet incrementū factū , ā perius dimidia pars remoueri solet , quod neq̄ , mares sola potest sufficere lac , neq̄ cōgenerati alefcendo roborari . Maia uero utilius probatur experto , inquit Palladius , porcam cui pabula suppetant , ut plurimum sex nutrire debere : quia licet plurēs possit educare , tamen frequētiore numero sēta deficiet . Porci qui nati

*Vbi ne ad quatuor
tum annos,
Varro i. Plin.
non alios triennium.*

C sunt hyeme , sunt exiles propter frigora , & quod matres aspernantur propter exiguitatem lactis . Cum scrofa peperit , primam mammam porco , qui primus in lacem prodit prabet : & suam nouit : quisque in fetu quo genitus est ordine , & aque alitur , nec alia . Detrahit illa alantio suo , sterile scrofilico ac resilit : uno uero ex omni turba relicto , sola . mulifex , quæ genito fuerat attributa , descendit . penuriam lactis præpingues sentiunt . qui in utero lesus minimusque fuerit fetus , metachætos dicitur . Omnem potto sētū ruris pecus hoc usarparnam & montibus & campis cōmōde pascitur : melius tamen palustribus agris quā sitientibus . Nemora sunt conuenientissima , quæ glandium pomorumque syluestrium feracia sunt : at ubi penuria est arborum , terrenum pabulum cōstitabimur : & sicco limosum præ-

*Varro, Suet.
Alia. Lacti
in triginta porcos
peperit, sed
paruos erant.
Porca.*

D feremus , ut paludem rimentur , effodiātque lumbricos , atque in luto uosa tentant , quod est huic pecori gratissimum . Herba fragilisne minime appetens est : imo uindicta pabula suisbus plerumque nocēt : sed radicū maxime ex omnibus animalibus : ubique aptissimo ad id negotij est . Facillime etiā omnium ad quoduis pabulum affuescit : & celeritudo quoque in pinguedinem proficit , pro sui corporis magnitudine sexaginta etiam diebus pingue-

*Metachætos;
sētū ruri.*

scit : quantam autem profecerit , cognoscūt quibus ea res cure est . Alitur hoc pecus pinguescitque maxime glāde : deinde faba , & horden , & cætero frumento : quæ res non modo pinguedinem efficit , sed etiā carnis iucundam saporem : sed maxime pecus hoc , ut etiam cætera quibus uenericulus optime concoquit , quæte immortioneque pinguescit : magis autem media

Alia. sētū ruri.

figinatione orsa. Ceterum sues pinguiorcs redduntur etiam cum in luto E
 se volutant. Sues ex omnibus pecudibus impancentissimæ famus sunt, ita ut
 aliquando si indigeant pabula, non tantum alienam (si liceat) sobolem, sed
 etiam suam consumant. Sues tantum coitu spumam ore fundere inue-
 nimus. uertem subantis audita uoce, nisi admittitur, cibum non capere ul-
 que ad maciem. In Africa suillum genus non uiuit. Apud Indos quoque
 nullum suem neque serum neq; cicurem nasci Cresias Cnideus ait. In Ma-
 cedonia sues muni esse dicuntur. Agatharides ait sues in Æthiopia cornua
 habere. Cum cetera animalia, nisi nouella castrantur, intereant, aper unus
 qua ætate castratur non refert. Postquam enim salire desierit, ita ut id recte
 facere possit, castratur. figinantque, quoad perueniat ad lanium: uerum
 castrantur uerres commodissime anniculi, utique ac minores quàm seme- F
 stres quo si dicto nomen mutant, atque è uerribus dicuntur maiales. Castrā-
 tur & sitiminz post bidui in ediam suspensæ pernis posterionibus, ualua re- 3
 scissa, celerius ita pinguescunt. Variis morbotum generibus laborant sues, 4
 ut rauceidine, inguinæ, struma, febribus: & unum ex omnibus que nomi-
 mus animalibus, suis grandinæ concipit. Grandinosi autem sunt sues, quo-
 rum crura, & collum, & armi carne consistant humidior: quibus paribus
 uel grandines plurimæ inuascuntur. Caro dulcior est si grandines habet pau-
 cas, sed si multas, humida ualde & insipida est. Facile qui grandem conce-
 pere cognoscuntur: parte enim lingue inferiore grandines habentur: & si
 letas dorso euellas, sanguinolente in radice uidentur. pedibus etiam poste-
 rioribus consistere non possunt qui grandent: & caput obliquum in incessu G
 est, grandinem uero non habent cum adhuc solum latent. Suem oculo a-
 mulo putant cito exingui. Porci alienos sibi manipulos faciri lacerantes,
 pluuiam præfagiunt. Qui suum gregem uult habere idoneum, eligere o-
 porteret tum bona ætate, tum bona etiam forma. Verres itaque legedi sunt,
 uetus quidem corporis amplitudine eximius, sed quadrans potius quàm qui
 longi aut rotundi sunt, uentre promisso, clunibus uastis, cruribus uero & un-
 gulis haud perinde proceris, rostris breuibus & resupinis, amplex & glan-
 dulo se etnicis: maximèq; quod ad rem pertinet, quàm salacissimos oporteret
 esse uerres: qui & ab annicula ætate comode progenerant dum qua-
 drimarum agant. Scrofae probantur longissimi status, & quibus ad sustinē-
 dum sæturæ onus, magnus se uenter effundat: cetera uerribus similes. Fer- H
 mina suis habetur ad partus edendos idonea fere usque in annos septem, ut
 dictum est. Annicula non improbe concipit. Si regio frigida & pruinosā
 est, quàm durissimæ densæque & nigre sætæ dux eligendus est. Si reperta
 atque a price, glabram pecus, aut qualescūque prouenerit, potest pasci. Sues
 sætæ semel anno gignunt: principio hyemis coeunt, uere pariunt, potentes
 maxime in uia, prærupta, angusta & opaca loca. Mas cum feminis dies tri-
 ginta magna ex parte conuersari solet. maribus non nisi anniculis genera-
 tio est. In coitu plurima asperitas: tunc inter se dimicant indurantes attri-
 ta arborum costas, iurōq; se rectorantes. Pugnant adeo acri certamine, gre-
 ge relicto, ut sæpenumero mortem uterque aduersarius obeat. Feminae in

Verres.
 Maiales.

Insipida, inge-
 nis.

Sui ferra.
 Scrofae in.
 Scrofae.
 Scrofae inu-
 nis.

A partu asperiores, quæ & nonnunquam cum libidine exsultantur, uel homines aggrediuntur, uel quæ candida maxime uel se indutos. Numetus partus & tempus ferendi, idem atque in urbanis suis est: uox etiã similis: sed forma uocalior est, mas raro uocem emittit. Mares castrati, maiores seriorisque euadunt: castrantur autem, quod iunioribus adhuc morbus pruriens incumbit in testes: quo fit ut anteantes eam partem ad arbores, testes extringant. Inter omnia edulia, suilla caro ualentissime nutrit, & ex quadrupedibus facillime concoquitur: & si in uentriculo & in iecinore probe concoquitur, optimum procreat succum, sed qui glutinosi nonnihil in se habeat: quo fit ut iecur obstruat, & renes us quibus hæc à natura meatus habent angustiores: atque uberior frequentiôrque eius usus in his membris

uel grauitatem uel dolorem nonnunquã creat: eoque senibus inutilis est. Optimum autem succum gignit totum caro qui ætate sunt mediocri: nã porcellorum recens natorum caro mucosa est, & excrementis abundat. Viscera suilla omnia, ceterorum quadrupedum uisceribus sua natura multo sunt suauiora: quæ tamen etiam seipfis meliora euadunt, cum animal ipsum caricas abunde comedetur. Adhibetur & ars iecori seminarum sicut anserum. Neq; alio ex animali numerosior materia gignit: quinquaginta prope sapores, anquit Plinius, cum ceteris singuli. Vulus, ut diximus, electio partu melior quàm edno: electina uocatur illa, hæc porcaria primiparæ suis optima: contra effertis. A partu, præterquam eodem die suis occidit, liuida ac macra. Nec nouellarum suum præterquam primipararum proban

cur: postuq; ueterum necdum efficiturum, & biduo ante partum, aut post partum, aut quo ceciderunt die, proxima electio est occidit uno die post partum. Huius & fumen optimum, si modo fetus non hauserit: electio de retinuum, antiqui abdomen uocabant. Præpinguium suū cutis, ubi probe elixa sit, glutinosum quidem pinguemque succum gignit, sed non admodum crassum: nec tam facile concoctione admittit quàm extenuæ partes, (crura inquam ac labra): neque succum præstat tam bonum, sed qui excrementis magis abundet. Pulmo suillus intertrigines, quæ à calciamen-
tus sunt, ab inflammatione tueri sanaræq; creditur. Aprinum iecur recens si atelactum teratur, ex uino potu contra serpentiu morsus auxilio est. Suillâ hæc sunt qui arbatentur utilissimû tenalimo, dysenteriaz, necnon phthysicis.

D Adipem suillum (axungia Græci appellare) antiqui maxime artibus ueh-
culorum perungendis ad faciliorem circûactam rotarû utebantur: unde & nomen: sic quoq; unli medicina cû illa ferrugine rotarû ad sedis ustia urit-
hatifque. Adeps suillus omnium liquidissimus est, unli atq; olei dissiluit: emol-
lit atq; concoquit magis q̃ oleû: idèq; caraplatinis quæ ad phlegmonas
imponitur, apte cõmiseri solet. Humorû acrimoniam impolitus maxime
obtundit, ac proinde medicamentis uletra cutibus miscetur: quale est quod
parygon uocant. Et per se axungia medici antiqui maxime probabit sen-
ibus detractâ: & exiptis uenis aqua celesti fricabit crebro, decoquebântq;
sichlanouo sepius, tum demum assensues. Synoceta axungia modetur igne
ambustus uel nuc: pernaombus autem cum hordei cinere: & galla pari mo

Palas electio
Palas porcari-
na.

Suilla
Abdomen

Axungia
#p14, 100

DE DIFFERENTIIS

do. Ad tussim ueterē recens decoquunt quadratis pondere in uini cyathis tribus, addito melle: uetus etiā phlegmā in pilulis sumpta sanat, quæ sine sale inueterata est: communis enim nō nisi ad ea quæ purgata sunt, aut quæ non sint exulcerata, salia recipiunt. Quidam quadrates acungiz & mulsi in uini cyathis tribus decoquunt contra tussim, quinto die picem liquidam in uisum sumi iubent, circumligatis lateribus & pectoribus, & scapulis eorū qui phlegmā sentiunt: tantique est uis, ut genibus etiam adalligata, redeat in os sapor, cūque expatere uideantur. E hoc quæ nō peperit, apertissime uincitur ad cutem mulieres contra scabiem uero quauis, admixto mimentorum seuo, pro parte tertia & picis, pariter quæ subseruet scabiem. Medecorum aliqui admixto asineris adipe taurorūq; seuo & oryso, ad podagras uti iubent: si uero permanet dolor, cum cera, myrto, resina, picis. Vt utur acungiz ad mollendam, excalfaciendam, discutiedā, purgandāque. Inueteratur autē duobus modis: aut cum sale aut syncetaz tanto utilior, quanto sit uenustior: conuenitque salfam magis emollire, excalfacere, discutere: utiliorēque esse uino lotam. Elota uino pleuritis prodest: cinere aut calce excepta, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Talum suillā uisum atq; epotum, quidam colli inflammationes atque cornuina disturna sanare produnt. Atque hæc de bisulcorum genere satis præcepimus.

Abis contra phlegmā

Quomodo cutem firmariq; debeat, monstrat Dioscori de lib. 4.

Sac, Sc. dēno. Perom, xij. q. Delos. Sacro. Nefrendes. Scrofa. Perom. Apoc, regitior. Eia, xij. q.

1. Sacro olim dēno. Porcus, ut Varro tradit, Græcum nomen est antiquum, sed obsecurum, quod nunc cum uocant xēper. Cum porci depulsi sunt à māmā, à quibusdam delos appellantur: neque iam lactentes dicuntur: quā parum decimo die, uel (ut alij) die quinto habetur puer, ab eo appellantur sacro: quod cū ad sacrificia idonei dicuntur primum. Amisso nomine lactentis dicuntur nefrendes, ab eo quod nondum fabam frondere possint, id est frangere. Sac fermina, scrofa mas, uerres dicunt, & nōnunquam aper, quæ uerres quamquā aper fere pro syluestri accipitur, qui Græci *elephas* appellantur. 2. Quomodo agnoscantur sues, docet Aristot. lib. 8. hist. anim. 3. Acistioniles. Peris posterioribus, recisa cū inter femina, quā manibus testis maxime contemplantur. Sec. ubi Plinius, peris prioribus habet: quæm & Theodorus feceris est. 4. De suum morbis, & eorum curatione Aristoteles lib. 8. hist. & Columel. lib. 7. 5. Sumen interpretatur stillas cum lacte suo densato mammas, ut Marcell. lib. 19. Esse pueri nondum sumens ubere largo Effluit, & uisio lactis papillarum est.

De quadrupedibus solipedibus.

Cap. C.

Solipedi, Solipedes, Solipeds.

Reliquum iam est solipedum genus: earum scilicet quadrupedum, quæ Rungulas in pedibus gerunt solidas. Porro solidas habent ungulas tere, que non sunt cornigera, igitur pro his, telum ungula est illis: nec talos habent eadem. Solipedū crura statim iusta nascuntur mensura: postea exporrigentia se uerius quām crescant: itaque in infanscia scabunt aures posterioribus, quod addita ætate non querunt: quia longitudo superficiem corporum solum ampliat. Hæc de causa inter initia pasci, nisi submissis genibus non possunt, nec usque dum cervice ad iusta incrementa peruenerit.

De equo.

Cap. C.I.

Equus, dēno.

I N hoc genere primas partes iure uendicabit equus: hominū enim fidelissimi ante omnia, quæ uel in consortiū operum nobis paramus, sunt equi:

- 3 A & omnium quoque generosissima. Iudicium quoque ac voluptatem, affectusque alios nonnullos humanis similes in ipsis esse, præstantissimo solum eorum generi, in exemplis habetur. Cùm ceteris fere animalibus in suo singulari genere oculorum color sit idem, equus, secundum hominem, omnium ceterorum animalium maxime uersicolor est : & aliqui etiam altero oculo nascuntur, quod nulli fere ex ceteris bestiis euenit manifeste. Cervix iuba ornatur : & pili in iuba largi. Dentes habet equus continuos numero quadraginta : quorum primores quatuor mense tricesimo amittit, hosos utriusque, supra dico & subter. Tum ubi præterea annum compleuerit, incipiuntque quartum agere annum quatuor item eodem modo mutantur, duo superius, totidemque inferius : & incipiunt nasci quos uocant columellares.
- B Rursus anno altero perfecto, quinto scilicet anno incipiente, & omnino intra sextum annum, simili modo quatuor alij cadunt. Quibus iam perfectis annis quatuor & mensibus sex, nullus præterea mittitur : quanquam euicisse in aliquo certum est, ut cum primis omnes amitteretur atque etiam in alio, ut cum ultimis omnes : sed raro. Sexto deinde anno quos primos mutauit, exequat. Septimo omnes expleantur æqualiter, & ex eo cananos gerit. Nec postea quot annorum sit ex dentium mutatione comprehendi potest : sed prosectoribus, decimo anno (ut nonnullis placet : ut uero aliis sexto decimo) tempora canari incipiunt, & supercilia nonnumquam canescere, & dentes prominere. Agitur certe in equis conera atque ceteris animalibus cum enim ceteris senectute dentes nigrescant, equo candidiores red C duntur. Equus in pedibus solidas gerit ungulas. felle omnino caret. Salacissimus omnium tum formicarum tum marium equus est, excepto homine. Coire incipit biuius tam mas quam scemina : sed hoc in paucis sit, pullique eorum minores imbecillioresque sunt. Quod autem plurimum, trimatu tam mares quam sceminae coeunt, & proficiunt subinde in generando, ut proles præstantior ad annos usque uiginti procreetur. Iuniorum coitus præter artem contingit, pabuli bonitate & copia. Seniores equi steriliores sunt tam mares quam sceminae : quo fit ut à circo post uicesimum annum mutantur equi ad sobolem reparandam. Matrem autem post decennium non esse utilem iudicant Columella & Palladius : quod ex annosa matre tarda sit atque iners proles. Coeunt mares ad annos tricenos tertiosque D minus ad quadragenos : ita ut per totam fere uitam coeant equis seruari et uenari uiuit enim magna ex parte mas annos circiter quinque & triginta, scemina plus quam quadraginta. iam & quinque & sexaginta annos uixisse equum proditum est. Scemina quinquennio finem crescendi capit, mas anno addito. Ad generandum paucis animalium minor fertilitas : qua de causa per interualla admittantur datur. Equæ tricenæ, anquit Aristoteles, aut paulo plures singulis dantur admittantur. Neque tamè æqualem numerum omnibus debemus adhibere, sed æstimatis uiribus uniuscuiusque admittantur, submittenda sunt pauca uel numerosa coniugia. Iuueni equo & uiribus formæque constanti (ut Palladius præcipit) non amplius quam duodecim uel quindecim debemus admittere : ceteris pro qualitate uirium suarum.

*Caninos bonos
ait Columella
& Palladius.
Columellares
dentes.*

Equus.

Nec unus admissarius, ut Plinius auctor est, quoddecima mensis ejusdem anni
 valet tolerare: quanquam (ut Columella placet) nec minus quàm quinde-
 cum, nec rursus plures quàm viginti unus debet implere. Equus non certo
 dictum numero implet, sed aliquando uno aut duobus tribusve, aliquan-
 do pluribus: scit certe quàm aliqvis equam superueniens implet. Coitus
 verno fit æquinoctio: atque hoc tẽpore horum fortitur inanius admissio-
 nis facere oportet ad solstitium, ut partus idoneo tempore fiat: duodecimo
 enim mense, die decimo aiunt nasci. Qui vero post solstitium partus edun-
 rar, utiosi & mutiles existunt, ut Aplyrtus docuit. Equos autem petulosos,
 reliquo tempore anna removere oportet à feminis, ne aut cum volent in-
 rant, aut si id facere prohibeantur, cupidine sollicitati noxam contrahant.
 Equas autem dominas L X diebus equire ante quàm gregales invenimus. F
 Coitus tempore equi equos mordent, & prosternunt equitatem quoque. In-
 cendantur libidine formandarum equar potissimum, uti diximus: quæ tem-
 pore coitus colligunt sese, & societate magis quàm antea gaudent. Caudæ
 mouent crebrius, uocemque immutant. mungunt etiam plures, atque in-
 ter se ludunt. Nec dubium, quin aliquot regionibus tanto flagrent ardore
 coeundi formæ, ut etiam si marem non habeant, assidua & nimia cupi-
 ditate figurantes sibi ipse uenerem (cohortabam more æuium) uenro con-
 equant. Fert uterum equa menses undecum: parit duodecimo mense, ut di-
 ctum est. Partum equar magna ex parte singulos: sed gemellos quoque ali-
 quando, cum plurimum, procreant. Abortum etiam facit equa odore sen-
 tiens ellychnij lucernæ extinctæ, quod & mulierum nonnullis accidit. In hoc G
 genere grauida stans parit: præterque ceteras sortum diligit. Quod hippo-
 3 manes uocant, ueluti caruncula est, & heret quidem fronti nascentis pulli,
 ut narratur, caricæ magnitudine, colore nigro: sed equar petulantes ab-
 tergentesque id abrodunt: alioqui partum ad ubera non admittunt. Non
 statim à partu equa impleri debet, sed intermisso tempore: & melius quar-
 to aut quinto anno interposito procreat, ut Aristoteli uisum est. Omnino
 si nihil plus deui, unum tamen interponere annum, & quasi nouale face-
 re necesse est. Alternis, inquit Varro, qui admittunt, datur miores equos &
 meliores pullos fieri dicunt: itaque ut resistibiles segetes essent exuctiores, sic
 quotannis quæ prægnans fiat. Et Columella, uulgarè inquit, formæ solen-
 ne est omniobus annis parere: generosam conuenit ætatis continere, quo H
 firmior pullus lacte materno laboribus certaminum præparetur: mammas
 namque pullis equar anno prope toto præbeat. Fruge herbæque ueloscitur
 equi, sed maxime potui pinguescunt: ut alia etiam uimenta, ita & equi pro
 aquæ quam habunt usu, suo fruuntur pabulo: & qui minus potum asperna-
 tur, is appetentior pabuli est. Gaudent præs & paludibus. Aquam quoque
 turbulentam & crassam suauius bibunt: quod si clara est, pede eam inur-
 bant. Bibunt autem equi sorbendo: & quo quis acrior, in bibendo profun-
 dius nares mergit. Equos castrare quibusdam in more est, ut Scythiacis Sar-
 maticisque gentibus: quibus equi parui sunt, acrisq; ualde, neque adeo tra-
 ctabiles: demptis enim testiculis, hunc quietiores: & canterij appellantur,
 ut in

Hippomanes.

Caterij.

Aut in fribus,maiales,& in gallas gallinaceis,capi. Equorum gregales morbo immunes sunt,excepta podagra: hoc enim uno laborant, & pterunque ob id ungues amittunt: sed amassis alij statim renascuntur: sit enim ut altero subnascens ungue,alter amittatur.

Gregales, q. n. p. d. h. a.

At utro equi domesticis morbis plurimis obnoxij sunt: adeo ut homines usq. periti tandem esse morbos equis infectari, quos hominem referant. Equinam pecus tripartito dividitur, uti Columella prodidit: est enim generosa materica, quæ circo fieri q; cer taminibus equos præbet: est mularis, quæ pretio ferus suis comparatur generoso: est & vulgaris, quæ mediocres feminas marisq; progenerat. At Varro ita distinguit: equi, quod alij sunt idonei ad rem militarem, alij ad ucturam, alij ad admassuram, alij ad cursuram, alij ad prædam: itaque peritus belli alios eligit, atque aliter ac docet: aliter quoadrigatus ac defulsor: neque idem qui uctarios facere uult, neque eodem modo parantur ad ephippium ut ad prædam: quo ut ad rem militarem, quod ibi ad castra habere uolunt acres sic contra in uis habere malunt placidos: propter quod discriminē, maxime institutum, ut castrantur equi. Quales autem equos maxime legi oporteat, his percipue signis intelligitur. Cum natus est pullus, confectum licet indolem æstimas, si hilaris, si intrepidus, si neque conspectu, nouæq; rei auditu terreat, si ante gregem procurret, si lasciuia & alacritate, interdum & cursu certans, quales exuperat, si solam sine cunctatione trahit, potētiq; flumēque transcendit. Hæc erunt honesti animi documenta. Corporis uero forma constabit exiguo capite, nigris oculis, naribus patulis, breuib; auriculis & apertis, cervice molli: latique nec longa: præterea quæ non portecta sit, ut suis, sed intro flectatur: gallinaceorum more, denda uba & per dextram partem profusa, lato & masculorum toris nune roso pectore, grandibus armis & rectis, lateribus proceris & ad uentris inflexis: spina duplici, uentre substricto, testibus paribus & exiguis, latis lumbis & deorsum uersum pressis, cauda longa & lætola: crispisq; mollibus atque altis rectisque cruribus, tereti genū paruoq; neque introfusus spectanti, rotundis clunibus, feminibus torosis, tibus excavatis, duris ungulis, & alais, & concavis rotundisq; quibus coronæ mediocres superpositæ sunt. Sic uniuersum corpus compositum, ut sit grāde, sublime, erectum, ab aspectu quoque agile, & ex longo, quantum figura permittit, rotundum, & toto corpore uenas habent, apq; animaduerti possint: quod qui huiusmodi sit, & cum est æger, ad incedendam est appositus. Quod ad colores attinet, hæc tradit Vergilius,

Honesti
Spadices glaucique color deterimus albis
Ergiluo.

*De colorib; in equis
plura legi de
pod. Palladii.*

Hæc eadem in equis consideranda sunt: & maxime, ut sint longi & magni uentris & corporis. De stirpe magni interest, qua sint: quod geneta sunt multa. Itaque ad hoc nobiles à regionibus dicuntur, ut in Græcia Thes salici equi, in Italia, Apuli. Sed Cappadocia ante alias alitrix equorum, & procerum equino accommodatissima est. In Hispania Galetica gens est, & Asturica. Equini generis hic sunt, quos thieldones uocamus. minori for-

Thieldonen

*Abies, cumori
fama.*

*Astarcus,
Equi Celiber-
na.*

*Paro cinere-
re, rian. Aqro
Equi Maestri.
Equi Dacici.*

Equi Lybici.

Hippocri-

*Equi felle
maius curere
trahit. Anglo.
Equi fere.*

Perphagus.

Alces.

Atachla.

ma appellatos astarcos gignant, quibus non vulgatis in cursu gradus, E
sed mollius alterno crustu explicata glomerano: unde equis totum capite
incurfus traditur arte. Celiberorum equi corporis agilitate pernicitati-
que reliquos facile superant, Parthorum maxime similes. Hi in Celibertia
quidem colore spectantur vario cinerebue: in alieno uero solo colore ma-
tare solent, ut Possidonius author est. Circa Maronem paludem pusilli gi-
gnuntur equi sunt enim loca hæc impende frigida. Apud Indos Phyllos ane-
ribus non maiores equi gignuntur. Terram quoque Indæ equos uno cor-
nu præditos procreare ferunt: quorum è cornibus pocula conficiuntur, in
quæ mortiferum uenenum coniectu si quis bibent, nihil graue, quodd cor-
nu repellat malum, perpetuetur. De Lybiciis equis hæc feruntur: equorum
uolocissimos esse, nullo laboris sensu affici, ex habetis gracilitate maculen-
E
tos esse, totosque ex sese aptos ad fortissime sustinendam dominorum ne-
gigentiam: pabulum enim dominos eis nec largiri, nec eos cum laboraue-
runt strigile perfricare, nec eis cubilia subternere, nec ungulas expurgare:
sed simul atque iter institutum confecerunt, ex equis dissiuentes, hos ad pa-
thones dimittere. Lac equinum, cum à camelino discesseris, liquidissimu
omnium est, manamque ut se pingue habet. Caseum equinu, hippacem
uocant alij: Sextius eodẽ effectus equino, quos bubulo tradit. Hippacẽ a-
lij coagulam equinum dicere: hæc dysentericis ceruicisq; prodesse scri-
psere nonnulli. Lichenis uocantur in equorum gembis & prope ungulas
indurati calli, in earum partium flexu nati: hi triti & ex aceto epoti comi-
tialibus morbis mederi traduntur. Sane qui eos & ad curas fete mor-
G
sum exhiberi cõsulant. Darnatur equinum fel inter uenena, ut Plinius re-
fert. Quin & sanguis eorum septuaginta uim habere traditur: item equarum
preterquam uirginu, erodere, emarginare ulcera. De equis feris pauca
scilicet Græci, quoniam terræ illæ non gignebat Hispania multos. Ad Hip-
panima fluuium sunt equi fete candidi. In Aethiopu terris ultimis & deuus,
ferorum equorum non parua natio duobus dentibus acutis & uenenatis
prædita uersatur: quibus non perpetua pedum ungula, sed similiter ut cer-
uorum bifida est. suba per mediam spinam ad extremam usque caudã per-
tinet. Ac si quando eos positis laqueorum insidiis Indi cõprehensos in fer-
uitate in redigere uelint, abstinent se cibo & potione, quodd feruendi indi-
gnitate acerbissime ferant. Dimidio quàm equus maior perphagus est, ani-
mal Indicũ, passissima cauda & nigermina: humani pili subuitatẽ eius fete
uuncunt. Ad bina cubita singule ipsius fete longitudine procedunt: ex una
radice triginta simul exoriuntur. Omnium animalium timidissimus est per-
phagus. Septentrio fert & equorum greges ferorum pergetea alcem in mõe-
to similem, in proceritas aurũ & ceruicis distinguat: quibus in rebus mu-
lo comparanda est: adeo propenso labro superiore, ut nisi recedens in poste-
riora uestigia pedum non queat, ne in priora tendens labrũ reuoluatur. Scan-
dmania insula è regione Germaniæ mittit animal quale alces, in hoc orbe
nunquam usum, multis tamen narratum, machlin nomine. Hinc suffragi-
nes ut elephans flecti nequeunt: propterea non cubat cum dormiendana
est:

Aestivamē somnolentū arbor sustinet, quæ prope casura secatur, ut fera, dum affluens fulcimenens instat, faciat ruinam: ante capere, alioquin difficile est eam manu capi: nam in illo rigore poplitum, incomprehensibili fuga pollet. Sane in Hercynia sylva, ut Cæsar auctor est, quæ appellantur alocs. Harum est confusius capris figura, & varietas pellum: sed magnitudine paulo antecedunt: mutileque sunt cornibus: & crura sine nodis articularisq; habent. Neque quicquid easus procumbunt: neque si quo afflicto casu cœderint, erigere sese aut sublevari possunt. His sunt arbores pro cubilibus: ad eas se applicant: atque ita paulum modo reclinatæ quietem capiunt: quarum ex vestigiis cum est animadvertum à venatoribus, quò se recipere consueverint, omnes eo loco aut ab radicibus subruunt, aut incidunt arbores, etiam ut summa species earum stantium relinquatur. hoc cum se consuetudine reclinant, infirmas arbores pondere affligunt, atque unâ ipsæ cœdunt. Equos pennatos & cornibus armatos, quos pegalos vocant, Æthiopas generat. ut vero alij referunt, ales est pegalus: & hæc ales equinum nihil præter aures habet.

*Alocæ.
Arbores sicut
est mactib, an
durese.*

Pegasus

1. Intra sextum annum molares superiores cadunt, inquit Columella: Aristoteles vero, Maxillares pullos animal morat. 2. Vivunt equi, inquit Plinius, annis quidem quinquagenis: firmiora minoræ spatio. 3. Ut Theophrastus scribit, *ἵπποις ἔτη τὸν τοῦ ἀνθρώπου αἰὶν ὡς τὸν αἰὶν τῶν ἀνθρώπων, καὶ οὐδὲν ἴσους ἔχειν τοῖς ἀνθρώποις* ut vero Crætenas, triduum sunt plures sicut similes, sed nigriorem, solum papaveris, sed spicosum. Sed *quæ* scribitur dicit Theophrastus quasi *quæ*, id est tuberculo quod in pullo frons nascitur, uti dicitur etiam Aristoteles. 4. Morborum signa & curationum genera à medicis veteris ætatis scriptoribus perquirenda sunt: nonnulla quædā ab Aristotele: plura vero à Columella, Vegetio & aliis qui medicinam tradidere veteris ætatis. 5. Quæ sunt in equo maxime memoranda docet Pollux lib. 1. ubi & nomina etiam habentur generis equi. 6. Regiones in quibus nobilissimi procedunt equi, ostendunt præcipue ab Oppiano De venatione lib. 1. & Græco atque Strabone. 7. Equos pennatos. Monstro simile, vel monstrum populi hoc vocant Plinius & fabulosum arbitrat. Apuleius lib. 8 De asino. Meus ipse repotabam pegasum inclytum, illū motu magis volaticum fuisse, ac per hoc merito pennarum prodium, dum in altum & adorsus cælum subtilis ac resistit, formidat ut scilicet ignoscere motum chamæreæ.

De asino.

Cap. CII.

Vilem vulgarēque asellum rus omne tanquam maxime necessarium desiderat: nec sine iniuria: nam etiam coire quod pascuo caret, contineri potest, exiguo & qualicumque pabulo contentus: quippe cum non fruge solum & herba vescatur, sed vel solis spinisq; vel periclis salignis alitur, vel obiecto fæce farmentorum: paleis vero, quibus pene omnes regiones abundant, etiam gliscit, sed potu maxime: tum improlentis custodas negligētiam fortissime sustinet, plagarum & penuriae tolerantissimæ: laboris etiam & famis maxime patiens, raro morbis afficitur. Huius animalis tam exigua tutela, plurima & necessaria opera supra portionē respondent: cum & facilem terram leuib; aratris possindat, & nō timido pedere vehicula trahat: & plenaque utensilia & vehere in urbem, & reportare collo vel docto commode possit. Iam vero molarum & conficiendi frumenti pē-

*Asinus.
Asellus, inquit.*

ne solennis est huius pecoris labor. Frigidum animal alinus est, inquit At-
 E
 stoteles quamobrem locis frigidis gigna non potest, utpote sua natura ma-
 xime impatiens frigoris: quapropter Pontica & Scythica terra alinis caret.
 Dentis priores, ut equus, tricesimo mense amittit alinus: proximis autem
 sexto postea mense, atque etiam tertios quartisque eodem modo. In alini
 cauda, caulis longior est quam in equo. Cor habet pro corporis ratione ma-
 gnum: & selle caret: sanguinem habet nigerrimum & crassissimū. Alinus
 tam mas quam femina tricesimo mense coire incipit, sed magna ex parte

*Est à bimatu
 & fuisse tro-
 da Argente-
 la.*

nequeunt generare. Partus tamen à trimatu legitimus est: quamquam iam
 uel anniculam uentrem gessisse astellam auit, ita ut quod pepererat educari
 ac perfici potuerat. Multis tamē procreandis minor trimo, aut maior deceni
 non debet admitti. Reicit semen à coitu, nisi si interpellatur alina: quōb-

F
 rem ne id faciat, statim post coitum uerberant insectanturq. Totidem pa-
 riunt quot eque, & eisdem mensibus, & simili modo. Partit namque alina
 duodecimo mense: & singularē magna ex parte gignit prolem, nonnunquā
 etiā, sed raro, gemellos edat. Parturita lucē fugit, & tenebras querit, ne cōspi-
 ciatur ab homine. Cum uel equus cū alina uel alinus cū equa coeierit, multo
 magis abortus cōsequuntur, q̄ cū iugene inter se iūgūt uerbi gratia, equa
 cum equo, aut alina cum alino. Euenit etiam tempus gerendi uteri maris
 normandū est ut quanto spatio temporis mas perficiatur suo in genere, tanto
 etiam fortius, quē ipse procreat absoluatur. At magnitudine, corporis spe-
 cie & uiribus magis feminae quam mari simile euadit quod nascitur. Si

G
 frequenter coeant, neque ullo interposito tempore cessent, quae ita iungun-
 tur, breui femina steriles citatiorque uero parere tota quita potest alina. uita
 autem alinis amplior annis triginta: & femina uisaciore mare est. Alinae
 praegnae, continuo lactescunt. Pullis earum, ubi pingue pabulū, badoo
 à partu maternum hac gustasse, lethale est: genus mali uocatur colostrario.
 Mammarum alinis à fortu dolent: ideo sexto mense arcere partus, cum eque
 anno prope toto praebant. Partus charitas summa, sed aequatum triduum
 magis. Per ignes ad fortus tendunt: eadem si riuus minimus interfit, hor-
 rent, ita ut pedes omnino caueant tingere: nec tū affictos petant fontes,
 qui sunt in pecuariis atque ita ut siccō tramite ad potum eant: nec pontes
 transeant, per raritatem earum translucentibus fluitis. Mirumq; dictū, si-

*Alina, crum-
 randa est fort.
 Minor alinus*

*Admissarius
 asellus.*

ti-
 tiunt: & si immutentur ut aquae, ut bibant cogende eorandē ue sunt. Minor H
 asellus maxime agro necessarius est, qui & laborem tolerat, (ut modo dixi-
 mus) & custodis negligentiam propter odum non recusat. In hoc fere mu-
 rinus color vulgaris est. Admissarius uero alinus & qui mularum generi
 2
 feminando destinatur, speciosior esse debet: ut scilicet amplioris sit corpo-
 ris, ceruice ualida, robustis ac latis costis, pectore musculofo & ualido, fer-
 minabus lacertosis, cruribus cōpactis, coloris nigri uel maculosis: nā muti-
 nus non optime respōdet in mula, ut Columella uidetur: uetum Palladius
 admissarium nigri uel merini maxime coloris aut tubae uult: qui tamen si
 discolores pilos in palpebris aut auribus geret, colorem sobolis plerumque
 uariabit. Sunt qui alinorum, ubi iam senuerint, carnibus uescantur: quae

lucum

A succum procreant deterrimum. concoctu sunt difficillima, stomachoque
neque, & gustui quoque insuaves. Lac asinum feroci humoris plus ha-
bet quam ex seofisellisque consilientia tenuit: & secundum camelinum equi-
mumque liquidissimum ac minime pingue. In ventre maxime omnium
coagulatur, & quoquo uersus oxyfime in corpus digeritur: & proinde sic-
ca uentriculi totiusque corporis intemperie laborantibus utile est. & baba-
tur ab imbecillitate uires colligentibus, quos atrophos vocat: & ut nonnullas
placet, in febris etiam, quæ careat dolore capitis. Pueris ante cibum lactis a-
sinini heminam dant, aut si in exitu cibi rosiones sentiant, atque in anca-
nis habuerunt: si hoc non esset, haberunt è caprino. Asinino lacte pote uen-
ena restringuntur, peculiariter si hyoscyanum potum sit, aut lepus mari-
nus, aut opocarpalum, aut pharicon, aut dorycnium: & si coagulatum ali-
cui nocuerit: nam id quoque uenenum est in prima lactis coagulatione.

Sunt inter exempla qui lac asinum bibendo liberati sunt podagra chita-
græ. Sed meminissem oportebit recens utendum, aut nõ multo postea re-
pescito: nullum enim celerius euasisset. gargarizatur quoque: facibus & ex-
uletratis utilissime. dentes collutos & gingiuas firmat. Cutem in facie cru-
gari & tenerescere lacte asinino putant. Conferre aliquid & candori in mu-
lierum cute existimatur. Poppeæ, certe Domitij Neronis cõiunx quingentas
per omnia secum fœras trahens, balnearum etiam folio totum corpus illo
lacte inacerabat, extendi quoque cutem credens. Asinosecur affum comi-
tialibus prodest: etiam autem edendum est. Ovis asini contracta & deco-

Ccta cõtra leporis marini uenenum dantur. Asinorum ungulas combustas,
sunt qui comitiales curant morbum dicant, si assidue huius cochlearis be-
bantur: si oleo masticantur, strumas discutere: & ipsum cinerem aridum in-
spersum permiones sanare. Quæ ex asinis utilia esse diximus, eadẽ omnia
onagrus efficacior: asinorum enim genera duo: unum mansuetum, ut sunt
optima ex Arcadia, & in Italia ex agro Reatino: alterum ferum quos vocat
onagros. In Phrygia & Lycæonia, in Asia quoque & Africa sunt greges mul-
ti: nam similitudine quadam nomen urbanorum accepere. Est uero ona-
ger corpore ampliore, pulchriori specie, colore albicante, auribus proce-
ris, nigra linea ueluti uitta per mediam spinam protensa. animal cursus ue-
locissimi: quod tamen ferocioribus beluis præda esse solet. Mares in hoc ge-

Dnere singuli feminarum gregibus imperitant: quos & sua sponte sequun-
tur ad pascua, ad fontes, densque quocumque duxerint. Timent mares libi-
dinis: a mulos: & ideo gravidas custodiunt, & ferum si femina sit fouent,
morisque natos mares castrant. Contrà gravidæ latebras petunt, & parere
furto capiunt, gaudentque copia libidinis. Onagri nõ transeunt montem,
qui Cappadociam à Cilicia diuidit. Onagri in Phrygia & Lycæonia præci-
pui: pullis eorum, ceu præstibus sapore, Africa gloriatur, quos laliones
appellant. Asinorum lyloestium caro (quod ad alimentum bonitatem atti-
net) bouillæ, caprinæ & ouillæ comparatur, si ætate sint adhuc mediocres,
ac bono corporis habitis. In solidipedum genere, ut corne asinus tantum

*Asia, ferus-
culus, ad Pa-
thia.*

*Onagrus.
Onagrus.
Onagrus.
Onagrus.
Onagrus.*

*Asinus gl-
astus.*

Laliones.

*Asinus lali-
cus, laliones.*

4 Indicus est. gerit sane medio sui capitis cornu fixum, quo iuuior mori

generosissime pugnat: & tales quoque unus solipedū habet. Ex huius cornu pocula conficere Indos auint nec ullis morbis eo die affici, quo ex huius generis poculo hauserunt, neque ullis venenis laedi, quaecunque nocendi gratia in potu dantur. Syluestrem asinum hunc vocat Philostratus, quem in Hyphalidis flum paludibus degere refert: alij vero syluestres asinos, equos magnitudine nihilo inferiores apud Indos in locis desertissimis nasci degerēque referunt, eosque reliquo corpore albos, caput vero purpureo, oculisque nigris esse cornūque in fronte gerere, cuius superius puticē, inferius album, mediū vero nigrum sit: atque non omnes quidem Indos, sed potentiores, cum tiquam armillis quibusdā brachijs, sic cornua auro certis spariis ornarunt, ex his ipsos bibere solere. Ex hoc cornu bibentem ab insaniabilibus morbis tutum sicutneque cum convulsionibus corripi, neque si Ecro morbo teneri, neque venenis ullis ferari: quin etiam si quid pestilens prius habuerit, tum id evomere, tumque ad sanitatem redire. Asinos Indicos corrigeros Cresias inquit, tales praeditos esse, quos si quis confregit, interiora quoque nigra deprehensuram esse. Horum formae postquam pepererunt, patres circa pullos a partu recētes summa custodia versantur. Cum à venaribus Indus inuaduntur, pullos suos ad hoc aetate infirmos à tergo suo pascētes habent, atque pro eis pugnant: ac contra equites audirē venire, eosque ferire. Tanto sane hi robore existunt, nihil ut obdistere queat, quin statim & concidat & perdat: equorumque incursum laesa disceperit ac lacerant, & viscera disrumpunt: quo fit ut ad eos equi appropinquare valde metuant. Carnes eorum, quod amarissimae sint, haudquaquā cicutenae. G

1 Minor asellus, Hunc de generē & vulgarem asellum vocat Columella: diffusam asellum Varro. 2 Quae forma maxime probida est in asino, qui ad malarum procreationem destinatur, ostendit Apſyrus in lib. acornario. 3 Crassissimum, inquit Plinius, hoc asinae est, ut coaguli nec mirur. 4 An id sit eum eo, qui Aconia hoc dictus est, aut hoc Indicus: hunc Aethiopia, ut fallor, etiam equum Indicum vocat.

Equus Indicus.

De mulis.

Cap. CIII.

*Mula.
Mulier.
Mulier.
Ovis.*

Muli nō suopte genere ab radicibus, sed bigeneri & institui sunt creatur enim ex equa & asino, vel onagro & equa. Neque ullū est in hoc pecore aut a natio aut forma praestitutum, quā quod seminatur asinus: quāquam possit huic aliquatenus cōparari, quod progenerat onager: nisi quod indomitum & feruens conrumax sylue sibi more, sanguinem partis proferret habitum: generantur enim ex equa & onagris mansueti factis, multo ut loces in cursu, duritia eximiae pedum, uetum strigoso corpore, indomito animo, sed generoso. Utiles etiam admissarij nascuntur ex onagro & asino, & qui reliquos omnes antecellit. nam ubi asina & onagro natus, admittitur equi per gradus infracta senectate, quicquid ex eo progeniat, paternam formam & modestiam, fortitudinem celeritatemque suam refert. Ad mulorum generationem equas neque quādrimas maiores, neque decēribus maiores legunt. Mulorum genus totum sterile est, neque omnino secundum, sed insecundum ad perfectam fortificationem. Concipere uero aliquando mula potest (quod iam factū est) sed enutrire atque in finem perducere non potest: H

A potestmas generare interdum potest: quod autē procreare ginuus est, quodd
 1 scilicet mulus oblatilis est: (nam ex equo & ex asino ginui proveniunt, cum
 conceptus in utero agrotant): est enim ginuus idem quod metachortus in
 porcis, aut in homine pomilio. Mulus superuenire cōtīque incipit, nullis
 2 primam dentibus: sed septennas implere potest: & cum equa coniunctus
 ginnuum procreant: post deinde superuenire non solet. Mula quoque iam
 grāvida facta est, ut modo diximus: sed non quoad perficeret atque ederet
 prolem. Quidam uero non dissimulido authores, ut M. Varro, & ante eum
 Dionysius & Mago prodiderunt mularum fortis regionibus Africæ: adeo
 non prodigiosos haberi, ut tam familiares sint incolis parrus earum, quā
 sint nobis equarum. Theophrastus quoque uulgo parere mulas in Cappa-
 3 docia tradit: sed esse id animal sui generis. Vita mulis ad annos multos. Li-
 quidam Athenis uel octogesium annum egerat. & serius fortuna sene-
 scit quā mas. Gignitur autem mula & ex equo & ex asina: sed effrenis & tar-
 4 ditatis indomitate. Qui ex equo & asina concepti generantur, mares, hinni
 uocantur & hinnuli. Est autem Hinnus matris quidem per omnia simi-
 lior, minor quā mulus corpore, plerumque rubicundior. Inbarn & caudam
 habet similem asini, aures tamen gerit equinas. Item in uentre est (ut equus)
 menses duodecim. Flores item ut equulos & educant & alunt: & etatem
 eorum ex denibus cognoscunt. Ungularum muli uel mulæ cinis ex oleo
 myrteo alopecius replet. Mulæ quas terra Syria fert, similitudine quadam
 nomen accipere: quanquā non eadem qua mulæ specie cōmentur. Coeſe
 5 enim & munda generatione progenierant, & celeritate mulis præstant. In
 India equarum & asinorum greges sunt: & asinos equæ facillime admie-
 runt, & rufos malos parunt, ad currendum præstantissimos: quos pedibus
 captos ad Prasiotum regem adducunt. Ex his, qui buni capiuntur, domari
 possunt: contra uetuli ab immanissimis & carnuosis feris nihil differunt.
 Hæc de uniuerso quadrupedum uniparorum genere facta sunt.

- 1 Hinnum hocce vocat Plinius, id est paruum mulum, nisi deprauatus sit codex. *Hinnus.*
- 2 Bardones etiam à nonnullis vocari hos scribit Hermolaus. *Bardanus.*

*Ginuus.**Mulus, Equus.**Mula, & Asinus.**Mula, & Asinus.**Mula, Cappadocia.**Hinnus.**Hinnulus.**Mula, Syria.**Mula, India.*

DE ANIMALIVM DIFF- E FERENTIIS LIBER VI

Continet ea quæ cortice integuntur, *καλυπτοι* à Græcis dicta, quadrupedes scilicet ouiparas & serpentes.

De quadrupedibus ouiparis.

Cap. CIIII.

*Ovipara, de-
picta.*



Quadrupedes quæ sanguinem habent, eodēna-
que ova pariunt, (unde & ouiparae dictæ
sunt) omnes caput, collum, dorsum, prona &
atque supina corporis possident: cuncta etiam
priora posteriorique, & quod posteriori pro-
portionetur, modo ouipari generis. Sed cru-
ra illis ex obliquo habentur antica, & humi
extensæ utroque flectuntur tum priora tum
posteriora, paulo in laus uergentia. Et pedes
hæc omnia in plures digitos habent discre-
tos. Caudam quoque habent longiorem, exceptis paucis. Ad hæc omnibus
his sensus nonidem quot ceteris quadrupedibus sunt. Oculos habent, &
conuolunt palpebra inferiore (nam superiorem non mouent) quemadmo-
dum & aues: quasquam non more uiuum nictantur: sunt enim oculis du- G
rioribus quàm aues. auriculis tamen hæc omnia carent, meatūsque tantū
habent audiendi. Foramina item ita ante os sunt, sed non ita explanata, ut
nares appellari possint, nisi spirandi officio. Et lingua quoque omnibus cō-
spiciua data est, (excepto quædam Ægyptus sicut crocodilo) sed quæ in parte
maiorē adheret, & dura est atque inuulsi ad uocis officium: quanquam ad
saporam gustatam usui illis sit. Lacertis inter hæc lingua bifida est, sicuti
serpentibus. Dentibus etiam serratis sunt omnia more piscium. Lingulam,
quam *ἀδαντή* Græci uocant, superimpositam asperæ arteriæ non habēt,
sed dum alimentum in gulam admittunt, in catum ipsam conuulsi ingunt:
atque ita efficitur, ut in pulmonem nihil delabatur. Mānus carent hæc nec
genitale aut testes foris obtinēt manifestos, sed intus conditos habent: nec H
pilo, sed cortice, prope dixerim omnia, testæ sunt: sed alia perduto & testæ-
ceo, alia molliori. Pulmo in his exiguus quidem & singulus, & tamen hu-
paratus est: & pars altera multam ab altera discussa est, ita ut hanc habere
pulmones uideantur atque à singulari arteria partes in utrumque pulmo-
nis laus duæ dependent, quemadmodum & in auiibus conspiciuntur. Qua-
drupodum ouiparorum iocuniora pallidiuscula sunt: nonnullorū etiam ui-
tiata omnino, ut corpora quoque eorum prauum tēperamentum fortunantur,
ut rubet, & testudinis, & similibus. Lien in exiguus, ut propemodum
solum effugiat: rigidus quoque est & reni similis. Felle etiam habent aut
plus aut minus omnia. Renes autem & uesicam eorum nulli possidet, præ-
ter te-

ter te-

- A**ter testudinem. Testes usque ad lumbos, non tamen qui foras pendeant, ut mododiximus, sed qui unus adhæreant lumbis, (quomodo etiam aribus habetur) uentris admodum renibus circumdant. Meatus de singulis singulis pertinent, eodemque coeunt supra ossium excrementa, sicut & in alius ouiparis omnibus. usque meatus qui ex eorum ambobus conficitur, genitale est. Vetus ratio in his eadem que in aribus est, nempe uero ceruix una in imo & caruiulentiore est. fissura autem & oua proxima septo transuerfo continentur. Veneris interfloriorumque eadem ratio est, que in ouiparis quadrupedibus utrinque dentatis: simplicem enim unumque habent uentrem aut canino aut fullo similem. Os aut saltem spinam pro se magna studius modo fortissima rimata enim ossis naturam potius obtinet: maiora spina potius in ossis uicem fulciuntur. Quadrupedes que oua patiunt eodem coeunt modo, quo ea que animal generant, mare scilicet superueniente, ut testudo tam aquatilis quam terrestris. habent uero in quod meatus illi genitales contingant, & quo per coitum adhæreant quibus autem uesica deest, (carent autem uesica preter testudinem omnes, ut dictum est) his idem meatus siccio excremento, qui & semini pertinet foris: intusque iuxta alter habetur. Atque hæc quidem similiter tam in feminis eorum quam in maribus sunt. Feminae in his (sicut in ceteris ouiparis) maribus sunt maiores. Ortus usque uero quidem tempore agitur, sed coitus non tempore eodem: talia enim uere, alia aestate, alia circa autumnum coeunt, utranque singulis tempus sequens ad prolem commodius est. Oua edunt, maxima ex parte perfecta: que ut feruari possint, duro iam consensu putamine opottet: sunt enim oua quando in creseunt molliora. Eodem igitur modo sunt quadrupedum oua fere, quo aru, crusta dura intacta, & bicolora: & supra iuxta circum confidunt ut auis: & reliqua eadem tum intus tum extra eue niant. Sed quadrupedum oua, ut ualidiora, tempore cōcoquantur: auis imbecilliora sunt, atque ob eam rem parentem incubantem desiderant, cū quadrupedum oua uel sine parentis incubitu tepore terre cōcoquantur ac perficiantur: (hæc nanque fere omnia in terra pariunt.) nam si que quadrupedes ouipata frequentantes fouent, que ediderint oua, custodiat gratia potius id faciunt. Huius generis omnia & parit in terra, & dormiunt uel in terra, uel si in aqua, rostrum ex humore extollentia spotandi causa.
- D** Vocem quidem emittunt, sed alia exilem & imbecilem, alia perexiguam sibilum. Ratus sua uox quidam est. Omnino hoc genus estinam & carnem edit & herbam. Conducuntur hæc hyeme fere, & mensibus quatuor frigidissimis latent, nec per id tempus quicquam comedant. Ex his uero que cortice molliori (non prædaro & testaceo, qualis est testudinum) intacta sunt, senectutem exiunt secessus sui tempore. Vasa horum genera: in his maximum est crocodilus.

De crocodilis & scinco.

Cap. C V.

Crocodilus fluuiatilis (duo enim genera eorum) maximum animal ex parua origine euadit: ouum enim non maius quam andris, & se-

*Crocodil' apud
alios
gigas.*

tus inde exclusus proportione est. Accrescit deinde, & magnitudine exce- E
dit duodeviginti cubita. Sunt qui eam tandem augeri quando unat con- 1
firmant: uisus autem diuinitas habet terra & aënisque communem. Oculi
sunt illi suis, & uisus in aqua hebes, extra acerrimus. Vnum hoc animal su-
periori mobili maxilla imprimis morsum, (inferiorem enim habet im-
mobilem) alijs terribile, pestuagium sapiente se dentium serie. Sunt pre-
terea dentes exerti magnique pro corporis ratione. Lingua tota inferiori
annectitur maxillæ, quæ uix sentiri potest, parua adeo, ut non linguam, sed
locum tantammodo linguæ habere putaueris. Crura habet à latere adun-
cta, & in summa humo expansa: pedes admodum paruos, atque ad capien-
dum retinendūque inuiles. unguibus armatur robustis. cutis in tergo
corricea contra omnes ictus inuicta, in uentre mollis tenuisque est. Pars F
oua, quanta asnes, candida, circiter sexaginta, quæ terre gremio commit-
tit, & sexaginta diebus incubat. Dies in terra aquæ, noctes aqua, teporis u-
trunque ratione quatuorque menses hyemis, inedia semper transmittit in
specuanti uero alij narrant, sexaginta dies uentrem gerunt crocodili, sexa-
ginta oua totidem diebus pariunt: totidemque dies hæc fouent. Sexaginta
uenteras in spina habent, quam totidem neruis alligatam esse ferunt. Cu-
ratio partus ab eisdem sexaginta diebus peragitur. Annos uiuit sexaginta:
totidem dentes possident, totidem quotannis dies sine ullo cibo in lambulis
quiescant. Alij uero crocodilos dicunt cum in terra partum ediderint, ob-
ruere oua, deinde discedere ita per se nascuntur & educantur. Crocodilum
habens Nalus & Indus, quadrupes malum & humani corporis audissimū. G
Terribilis hæc contra fugaces belua est, fugax contra infelices. Croco-
dilis in litore somno datus acque hiantibus, trochili aues inuolantes repur-
gant dentes, & intus fauces quoque quo munere & ipsi aluntur, & croco-
dilus sentiens secum commode agi, nihil nocet sed cum egredi autem uult,
ceruices mouet ne comprimat. In hac quoque uoluptate nonnumquam cro-
codilum somno pressum conspiciat ichneumō, per easdem fauces ut telū
aliquid immassum, erodit aluum. Fluxu alium crocodilorum duo genera
Ganges fluius generat: horum alteri nihil nocent, alteri inexorabili atque
inimiseruicordi in quilibet uoragine carnisori sunt: in eorum summo ro-
stro quiddam tanquam cornu erinet. Crocodilus alter priori illi similis
est, multum infra magnitudinem (qua chameleonti æquatur) in terra tan- H
tum, odoratissimisque floribus uiuat: ob id insectina eius diligenter exqui-
runtur iucundo odore facta, crocodileam uocant: alij terrestres crocodili
simam crocodileam appellant. Crocodilum terrestrem sola fert Africa, ut
author est Pausanias, qui & bicubitalem habet magnitudinem. Herodo-
tus uero apud Ionas nasci crocodilos in sepibus mariæ, à quorum simi-
litudine Niloticos illos crocodilos nominari quos & halitus odoratus mul-
tos uariolq. edere prodidit. Crocodilea oculorū uitis utilissima fertur cū
pomi succo inuncta, & cōtra suffusiones & caligines. illita quoque ex oleo
cyprino molestias in facie enascentes tollit: ex aqua uero morbos omnes
quorum natura serpsit in facie, nitorēque reddit. Lentiginē tollit ac uar-
ros,

*Crocodilus ter-
restis.*

Crocodile.

A ros, omnique maculas. & cetera conitiales morbos bibique ex aceto melleo huius obolis apposita menfes citat. Optima est, quæ candidissima, & friabilis, & amyli modo maxime ponderosa, in humore fixata ebulliens: cū teratur inter dignos, odore fermentescens. Pelle inictus oculus ut melle, cōtra suffusiones nihil utilis prædicat. Inestus & reliquo corpore eius suffiri uulsa laborantes, salutare tradit. Cornu uisq; crocodili cinis ex aceto illitus us partibus quas secari opus sit, aut nidor cremari, sensum omnem scalpelli aufert. Sanguis utriusque claritatem uisus mundis donat, & cicatrices oculorū emendat. Corpus ipsum excepto capite pedibusque elixum manditur aschradocis. tussim ueterem emendat, præcipue in pueritiam lūborum dolores. Et adipem habent, quo tactus palus defluit: hac perunctos

*Quibus modis
medicatur,
explicans &
Desferens
& Plenus.*

B à crocodilis tucitur, nullū autemque moribus. Ex eadē similitudine est scincus, quem quidam terrestrem crocodilum sui generis esse dixerunt, candidior autem & tenuiore cute præcipua tamen differentia dinoscitur à crocodilo aquanco, squamarum lecta à cauda ad caput uersa. Apud Nilum gignitur in Indiisque, & ad mare rubrum, atque in Lybie quoq; Mauritania. Maximus Indicus, deinde Arabicus: assertur nulli. Minor ichneumone est in Nilo natus scincus contra uenena præcipuum antidotum: item ad inflāmandam utrorum uenerem: nam quæ circa renes sunt partes, ad pudendi erectionem bibantur: ueneremque accendere ferunt, si drachmæ pondere ex uino bibantur. Et rostrum quoque eius & pedes in uino albo pon, cupiditates ueneris accendant, utriusque cum satyrio & eruce semine singulis

*Scincus, cuius
est.*

*Sole a diffin-
tione na-
sterni. Drago
vel.*

C drachmas omnium, ac pipere duabus admixtis: ita ut passilli singularum drachmarum bibantur. per se laterum carnes obolis binis, cum myrrha & pipere pari modo potæ, efficaciores ad idem creduntur. Prodest & contra sagittas uenenatas, ut Apelles tradit, postea sumpus an antidota quoq; nobilia additur. Silius plusquam drachmæ pondere in uino hemina potum, perniciem afficere tradit: præterea eiusdem decoctum cum melle sumpum uenerem inhibere. Apelles author est, si ex melle uenenato sincero saltidū crudiusque, quæ sit grauissima, incidat, scincum circumcisus pedibus, capite, cauda, decoctum, antidotū esse. Apud Indos nascitur bestia crocodili terrestri specie, magnitudine Melitensis canis: cuius pellis squamis adeo aspersa scatur, ut more feræ res dissecet, & ferrum erodat atque conficiat:

*Alia, prodest
& contra si-
gittarū uene-
na uero & po-
tæ sumpum.*

D Indi phatragen uocant.

Phatragen.

1 Aristoteles & Herodotus, Accersit ad decem & septem cubita mel ut alij legunt apud Aristotelem, ad quindecim cubita. 2 Crocodilum. Herodot. Apud Nomadas Africae tūm cubitorum magnitudine lateris similitum.

De testudinum generibus.

Cap. CVI.

Germanus similiter uictus in aquis terrisque & testudinum. Sunt autem testudinum genera, terrestres, marina, lutaria, & quæ in dulci aqua uiuūt. Aristoteles tria prodidit genera: marina terrestre & hamyda, quam Plinius (opinion) lutariam uocat & mutem marinum. Testudinum genera omnia à lacte adiuncta habent, eadēque in obliquum flectū, quem ad-

*Testudo, ha-
mion.*

Q

DE DIFFERENTIIS

modum crocodili & lacertæ, & corrice integuntur duro rigidoque, & qui E
 esse firmior sit. Testudinis secur omnino nuda est, & totū corpus pti- 3
 uum temperamentum fortuit, quemadmodum & rana rubetur. Testudi-
 nis marinx lingua nulla manifesta nec dentes, sed rostri acie comminuit
 omnia. Sunt enim rostri margines acuti, superna parte inferiorem claudē-
 te pyramidam modo: & os habent robustissimum: quicquid namque in os ce-
 perunt, siue lapidem siue quoduis aliud, perfringunt ac deuorant. Pulmonē 4
 habet testudo marina carnosum & sanguineum, similem bubulo, sed mi-
 norem quàm sit testudinis terrestris pro corporis ratione: at contrā, uesciā
 amphorem. Renes etiam habet similes bubulis. Corde eius exempto, mo-
 uetur tamen. In mari uiuunt conchiliis habet enim os robustissimum, uti
 dictum est. Exeunt in terram, & pascunt herbam, & in herba perant oua p
 autum corticalium ouis similia, ad centena numero: eaque defossa extra a-
 quas & cooperta terra, ac pauca peccore & complanata incubat noctibus:
 & educant tertius annuo spatio: quidam oculis spectando quoq; oua foue-
 ri ab ip̃s putant. Formæ cotum fugiunt, ob rigore asperitatemq; genitalis
 masculi: quocirca non aliter coire creduntur, quàm coactæ, & pagna à
 maribus superate. Testudines tunc magnitudinis Indicū mare emittre
 fertur, ut singularem superficies habitabiles easas integant, & numerosam
 familiam non arcte receperint, ut Solinus testatur, atque inter insulas rubri
 maris his nauigēt cymbis. Troglodyte comigetas habet, ut in lyra annexis
 cornibus latis, sed immobilibus quorū in natando remigio se adiuvant: cel-
 lunt genus id uocatur, eximit testudinis, sed rare. Testudinis marinx san- 5
 guis cum uino & lepore coagulo euminoque cōtra serpentum morsus,
 & hausta rubere uenena utiliter bibitur. Sanguine, alopeciarum inanitas,
 & porrigo, omniāque capitis ulcera curantur: inarescere autem eum opor-
 tet, lentēque abluī. Instillatur & dolori aurium cum lacte mulierum: co-
 munalibus instillatur ori, diductis labris, iis qui modice corripiantur: spe-
 cimo cum castoreo elythere infunditur. Quod si dētes per annum colluunt-
 ur testudinum sanguine, immunes à dolore fiunt. Marinx testudinis sel
 oculorum suffusionibus, albuginibus, & hebetudini medetur, dati tatēq;
 ocalorum facit, & cicatrices extenuat. Oculorum quoque uicia omnia sel
 inunctam cum melle emendat: ocellas sodat, & anginas, & omnia oris ui-
 tia: priuatim nomas ibi: item ardentiam testium. naribus illitum corni- 6
 tales erigit attollitque. Marinarum testudinum carnes admixte ranarum
 carnibus, contra salamandras preclare auxiliantur: neq; est testudine aliud
 salamandre aduersus. Terrestris testudo pulmonē habet pro corporis ra-
 tione maiorem quàm marina: uesciam autem admodum exigua: adeo
 ut urinum exant (quæ ad remedia nonnunquā perquiritur) aliter quàm in
 uescia dissectarum inuenire difficile sit. Oua durioris testē & bicolora edat,
 quale ouum animum est: eaque defossa & cooperta terra & cōplanata supra
 incubat, crebrius repetens: sic tūque se quente anno excludit. Sunt testu-
 dines terrestres, quæ ob id in opetibus chersina uocantur, in Africæ deser-
 tus plurimæ, qua parte maxime samentibus arenis squalent, roscido, ut cre-
 ditur,

Testudo ma-
rina.
Xaltes Sa-
maris.

Testudines
Indicæ.

Testudines
corripitæ.
Albi, celi,
vel celestium,
vel, ut Plinius
has placet ce-
lestium.

Testudo ter-
restis.
Moles as-
picio.

Chersina.

A datur, humore uenientesque ibi aliud animal prouenit. Testudinum pul-
tamina fecare in laminas, lechisq. & repositoria his melle Carbalus Pol-
lio instituit. Terrestrium testudinum carnes suffusionibus proprie, &
contra uenena salutare produntur. Testadinus terrestris sanguinem epo-
tum comualibus prodesse tradunt, plurimum in Africa uti modo diximus.

6 Hic ibi amputato capite pedibdsque pro antidoto dari dicuntur: & ex rure
in cibo sumptis strumas discutere, ac lites tollere: item comuales mor-
bos. Sanguis earum claritatem visus facit, suffusionisque oculorum tollit:
et contra serpentium omnium & araneorum, & similitum, & ranarum ue-
nena auxiliatur, sanguine seruat, & in farina pilulis factis, & cum opus sit
in urino datur. Pelle testudinum cum Atrico melle glaucomata inungi pro-

dest: & scorponum plage instillari. Tegumentis eius uino & oleo subactis
pedum rimas ulceraque sanat. Squamæ à summa parte derasæ, & in postu
dant, uenentem cohibent: eo magis hoc mirum, quoniam totius tegumenti
sarina accedere traditur libedinem. Qua durata illinuntur strumas & ulce-
ribus frigore aut adustione factis: forbentur in stomachi doloribus. Aliqui
sanguinem testudinum lethargicis illinunt, hydropicis molerunt. Testudo,
decisis pedibus, capite, cauda, & inessibus exemptis reliqua carne ita cōdi-
ta, ut circa solidum sumi possit. Testudinum est tertium genus in cetno
& paludibus inuentum, latrarium uocant: latrudo his in dorso pectori si-
milis, nec conuexo incurua calice, ingrata uiso. Ex hac quoque aliqua con-
tingunt auxilia: tres namque in succentis fermenta coniecta diuidentibus se-

C tegumentis, capiuntur: tum emulsi carnes earum coquantur in aquæ con-
gio, sale modice addito: ita decoctarū ad tertias partes succus paralyticis, &
articulares morbos sentientibus bibitur. Detrahit item fel pituitas, sangui-
nemque uitiatum: sufficit ab eo remedio alius aquæ frigide pocu. Aristoteli
adipis uocat, Plinius murem marinum. Hæc cortice (licet durissimū)
molliorem tamen habet quàm marina aut terrestris testudo: uelica & re-
nubus uacat. Egressa hæc in terram, scrobo effossa dolij forma, parit ouas, quæ
defecit oborta terra, die tricesimo repetit: scissis breui excludit, & etiam q;
continuò ducit in aquam. Cutis replet in alopecis mutis marina cinis cum
oleo. Quartum testudinum genus est earum, quæ sunt in amnibus: has qui-
dam è Græcis hatmydas appellant, longiusculas in India trium cubitorum.

D Harum diuulsarum pingua cum azoo herba tusa, admixto unguento &
semine lily ante accessiones perungantur: ægrum præter caput: rhox. cōvolu-
tu, calidam aquam bibant, quartanis liberari dicuntur. Hanc testudinem
quintadecima luna capi oportere, ut plus pinguium reperiantur, uerum æ-
grum sextadecima luna perungi tradit. Ex eodem genere testudinum san-
guis instillatus crebro capitis dolores sedat, item strumas. Sunt qui testu-
dinum sanguinem cultro æreo supinarum capitibus præcis ex ipsi nouo si-
ctili iubeant: ignem sacrum coactis: aque generis testudinum sanguine il-
lina: item capitis ulcera manantia, & uerrucas. Idem promittunt testu-
dinum omnium simo paxos discuti.

t Arianus in rubri maris navigatione aliter enumerat quatuor testudinum ge-

*Testudinis
struma. An
hæc de altera
testudinis ge-
nere dicantur.
Testudo laca-
ris.*

*Alia maxime
à uic.
Alia aquati-
lis.*

*Testudo fla-
uula,
maxima quæ
pala.
Elonga.*

*Testudines.
Alia, cretan*

uena, *Abasteria* (hinc opus est manifeste intelligi, *terrestre* albi & montani, quæ maxima est, & conice crassissimo. 1. *Hemysa, uide*: Aristoteles nãquã, quod meminerim, nomine testudinis appellat, quòd parum distinguit, *uide* & *uol* *uol* *uol* (sed fere cum ipis connumerat. 2. Hoc forsitan uerò est de testudine marina, nã *terrestri* eam ad remedia mĩdditur. Testudinis etenim nomen apud Latinos, sicut & *uol* apud Græcos, ab ipso addito, quidẽq; mutũq; uideq; *terrestre* significatur apud Plin. lib. 12. cap. 67. & Aristoteli lib. 3. hist. animal. cap. 25. 4. *Pinus* (modo ab ipso *uol*) inquit Testudo palmonem quãdam prægerit nãq; & sub toto tegumento habet, sine sanguine tamen habet: ut uero de *terrestri* testudine intelligamus (ut mihi quãdẽ uidetur) nõ parum conuenit. 5. Virũq; generis testudinũ putamina in laminas secant ad opera, ut ad pocula ab ipse uasũ, perspicuum est. ex Marone in Apophoreis, de Gustatione, Formicis nobis Cherson si credis intellẽ. Decipiens apud mĩscula præda sanus. Sunt apud Arrianũ in rubi maris navigatione (que ut opinor ad huiusmodi opera exquiruntur) testudines quardam quæ ab ipso decantur, maioribus cornibus & aut nã, quæ reliquas facile superant. Sunt & *ipso*, id est montane testudines prægrandes & conice crassissimo, cuius pars infera, quæ & subrua est, sectionem uix patitur. 6. Hæc ab ipso Plinio Si ex melle syncrota fidum crudiusq; que sit pũssima, incidat, testudinem circũscis pedibus, capite, cauda, decolli, anodon esse, aut hoc est Pelops

*Testudines
alba.*

*Arrea.
cipit.
Arreana.*

De ranarum generibus.

Cap. CVII.

*Rana.
Rana.*

*Alba, in
Arrea.*

Cyreni.

*Rana fluuiatilis.
Rana aquatica.
Rana lacustris.
Rana fluuiatilis.
Rana fluuiatilis.
Rana fluuiatilis.*

RANARUM genus ne uiuere quidem diu potest exclusum ab aquæ natura. Quadrupes est ex ouiparorum genere. Lingua ranas sui generis est: pars enim prior, quæ ceteris absoluta est, ut coheret eo modo quo piscium: intima uero absoluta ad guttur applicatur, qua suam uocem solent emittere. Et quidem genus illud uulgaris, quam ologinem nominant, mares intra aquam rediunt, ut cietat ad coitum feminas: & flagrant tantisper G oculi modo lucernæ, cum uociferantur. Coitum uero noctu magna ex parte agere uisuntur. Coitu superueniunt ranæ, prioribus pedibus alas ferant: nam mare apprehendente, posterioribus elanes. scotum emittunt suam continuo filo sibi coherentem. Partunt minimas ueluti carnes nigras, quas grynos uocant: oculi tamen & cauda insignes: mox pedes figurantur, cauda findente se in posteriores. Mirũque, semelstri uita resoluuntur in limum nullo cernentes: & rursus uernis aquis renascuntur. Cyrenis mutæ sunt ranæ, illas è continente uocabbus. durat genus earum. Mutæ sunt etiã nunc in Seripho insula: eadem aliò translate canunt: quod & accidere in lacu Thessaliæ Secundo tradunt. Ranarum uana sunt genera. Rana fluuiatilis a circa stagna riuosq; uersatur. hæc sunt quæ apibus, ubi aquarum accessu H rint, insidiantur, & eas rapiunt. Iubent aliqui nascetur in aqua ranarum, quibus adhuc cauda est, in calice nouo combustarum cinerem, si per nares fluat sanguis, iniciendum. Contra omnium repulsum uenena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ carnes eatum edantur, uisue decoctarum sorbeantur: profunt & contra inueteratos tendinũ rigotes. Hydropticis quoque medentur ranæ aquaticæ in uisio uetere & salte decoctæ, ac pro cibo sumptæ: ignes sacros resingunt ranarum uiuentium uentres impositi: pedibusque posterioribus adaligari iubent, ut crebriore anhelitu profint. Ranæ uero in riuo decoctæ oleo, abiectis carnibus perunctos liberant quartanis. Decoquantur ranæ singulæ in aceti hemanas, uedẽes eo colluuntur,

Accolluntur, contineanturque in ore succus, dentium dolores sedat. Si falsidium oblatre, suspendebat pedibus posticioribus eas Salustius Dionysius, ut ex ore uras deluaret in acenam foruens, adque è pluribus ramis. Fortunibus stomachus ex ure edendas dabat: maxillaresq; ita sanant dentes præcipue putant: moles vero superaddito aceto stabiliari. Ad hæc quidam ranarum corpora binarum præcis pedibus, in uini hemina macerant & ita collui dentes labentes subentialiqui totas adalligari maxillas alij denas in aceto sextarius tribus decoctum ad ternas partes, ut mobiles dentium stabiliarent: alij secus ranæ decoctum de tritico cum melle impoluerunt denibus. Si canosi & fortida sunt, et uiam in furno arefieri per noctem præcipiunt: postea tanquidem salis addi atque fricari. Pioras tollit rana decocta in heminis quinque aquæ maritæ: et coqui debet donec sit crassitudo mellis. Ranarum decoctum ex aceto succus anginas illius abolet: hic & contra tonsillas prodest. Inspectus earum cines profluens sanguinis impetum sistere fertur: cum liquida pice illius sanare alopecias. Tullius sanare dicuntur piscium modo in iure decoctæ in patinis ranæ. Suspensis autem pedibus, cū distillauerit in patinam saliva earum, exenterari iubentur, abiectionisque intereant eodem. Vernes ulceribus innati, ranarum felle tolluntur. Lecit ranæ geminum esse dicunt, obuique formicis oportere: eam partem quam appetant contra omnia uenena esse pro antidoto. Ranarum adeps instillata, statim dolores aurium tollit. *Quæ æῖς ἀγρὸς δὲ ἡ Γραικὸς vocatur, & ἡ ἀνδρὶς ἀγρὸς (quasi ranam palustrem dixeris) quibusdam aut idē cum phryno aut certe non dissimilis uidetur: atque ex utriusque ueneno eadem procreant symptomata feruntur: nempe corporis tumor cum colore admodū pallido, ut buteo similis appareat: spiritus angustia, oris sessor, singultus: nō nunquam & sua sponte immo & effluit semen. facile autem sanatur quā post uomitionem in meraci uini plurimum ingesserit. Nicander uero & Ἀέσιος hæc omnia scire ranæ morte tribuunt. At ῥέξ ἀγρὸς ἰσὶς lumencibus, appetit deiectionem, oris nimiam humiditatem, nauisamque & frequentem uomitionem, ac præterea affectionem quam ῥέξ ἀγρὸς uocant: curari uero, ingesta uini copia uinā cum aliis quæ uehemētius calidant. Phrynos, ut Aelius prodidit, ranarum genus est, quod cum palustris nitæ conditionem in terrestrem mutauerit, ῥέξ ἀγρὸς appellatur. Magnitudine testudinem parum æquat. Dorsum exasperat inflatq; se iras & inuadescit: adeo proterue audax ut in quodcumque aduersum erit, insulerit & quasi uideret. Raro quidem mordet: uerum adeo uenenosum exussit, ut uel solo anhelu officiat: hoc malum sequitur totius corporis tumor, ut quandoque rūpatur, ac breui inere at lesio. Phrynon Latini ranam rubetam uocant. Ranæ rubetæ, inquit Plinius, quarum & in terra & in humore est uita, plurimas ferunt medicaminibus, deponere ea quotidie ac resumere à pastu dicuntur, uenena tantum sibi seruantes. Sunt quæ in uerbis tantum uiuant, ob id rubetarum nomina, quas Græci phrynos uocant, grandissimæ cunctarum, geminis ueluti cornibus, plene ueneficiorum. Ranæ rubetæ hostis est buteo trionchius: rapit namque eum & exedit. Apes hoc modo in-*

*ῥέξ ἀγρὸς ἡ ἀνδρὶς ἀγρὸς
ῥέξ ἀγρὸς ἡ ἀνδρὶς ἀγρὸς
ῥέξ ἀγρὸς ἡ ἀνδρὶς ἀγρὸς
ῥέξ ἀγρὸς ἡ ἀνδρὶς ἀγρὸς*

ῥέξ ἀγρὸς

*ῥέξ ἀγρὸς
Rana rubetæ*

*Rubetæ
ῥέξ ἀγρὸς*

DE DIFFERENTIIS

veritatis rana rubeta: adrepens nique foribus aluci insufflat, & deinde mo-
lantes observat ac deuorat. Nec sentire ictus apum rane traduntur. Rana
rubeta secur omnino uisitata est, & corpus denaque totum primum for-
tatur temperamentum, uenenosumque est. Ranarum rubetarum uocoris al-
tera fibra à formaci non attingitur, propter uenenum, ut arbitrantur. Ti-
morus & Neocles medici rubetas dicunt bana uocora habere: & alterum qui-
dem occidere, alterum alteri aduersantem salutem afferre. Ex his tamis que
in uepibus tantum uiuunt, ben contra uenena que sunt ex ipsis, auxiliant.
cor uero etiam efficacius est. Mors de his alia certatim tradunt auctores. Est
phryni genus alterum *αφρυνωδής*, id est rubeta muta, sine uoce est. Exirola
hinc, an arundinis roris linetu uidetur: ex qua uenenum quoque appa-
tur. Huic eadem fere tribuunt Nicander & Aërius, que alij rane palustri. F
Est parua rana, inquit Phinius, in arundinis & herbis maxime uiuens, mu-
ta ac sine uoce uiridis, si forte hauriatur, uentres boum distendens. Huius
corporis humorem penicillis detersam claritatem oculis inuictis narrant
asseruntque cancer doloribus o colorum superponunt. Huius rane par-
ua famici efficacissime pilochrum est, si recens illinatur: & ipsa ansecta ac
rufa, mox decocta tribus heminis ad terens, uel in oleo decocta aris uas-
is. Ranarum uiridium sanguine, inquit Dioscorides, palpebre pili auiti
renasci prohibentur. Est rana parua arborem scandens, & ex ea uociferans,
in huius os si quis expuat, apumque dimittat, nulli liberari dicitur. Pilo in-
uiles in palpebris euulsos cohabent, quas dryphytes & calamitas uocant: 10
sanguis etiam cum lachryma uitis si euulso pilo palpebris illinatur. uene- G
rem conciat iecur rane dryophytes & calamitæ ad alligatum.

αφρυνωδής.

Rubeta muta.

Rana uiridis.

*Penicillus, ali-
alis speculis.*

*Rana ex ar-
bore uociferans.
Dryphytes,
Dryophytes,
Calamitas.*

*Geryon,
αφρυνωδής,
αφρυνωδής,
Rana leuiss.*

Bufo.

*αφρυνωδής,
αφρυνωδής,
αφρυνωδής.*

Diopatra.

1 Gyrinos, Gyrinos uocat Nicander in Alexiphar. nisi menda subit. 2 Ra-
na fluitans, *αφρυνωδής* uocat Nicander, que multum uociferatur, uerque ipsum
non aduenire primum denuntiat. 3 *αφρυνωδής* ex mendoso coctis forsan le-
gerat Hermolus, cum miraretur nam leuiss inuenisse diceret apud Dioscoridem.
4 Singulis uino copioso coctis, inquit Nicander. 5 Quod os belliss hu-
more humidum sit refert Nicander de muta rubeta. 6 *αφρυνωδής*, & morsu o-
ris uentri signat, & crebrius uelocemque cordis motum ac uelut palpitacionem
sed ex Nicandro uidetur hoc in loco stomachi affectionem significari. 7 Rubeta-
rum, Bufo (ut opinor) huius est generis de quo Vergil. Inuenitque cecis bufo, hoc
est rubeta terrestris maxima, ut interpretatur Seruus. 8 Nicander, *αφρυνωδής* i
αφρυνωδής & *αφρυνωδής*. 9 Roris linetu inter frusta uiore attribuit Nican-
der alteri rubetarum generi, quod *αφρυνωδής* & *αφρυνωδής* cognominat, quasi uisum
dixerit: & quod colorem corporis uiriditatem inducit, qualis est chapin: corpique i-
psius calore incendit, cum uisum angustia oris que facere quæ dicit Dioscorides &
Paulus, alijs quæ tantum palustrem uocantibus, tribuunt. 10 Si quis. Hoc Diosco-
rid. de rane uiridibus. 11 Dryphytes, Alijs dryophytes diopetra.

De lacertis.

Cap. CVIII.

*Lacerta,
Lacerta,
Lacerta,
Lacerta.*

Quadrupes ouipara lacerta est, & crura genè à latere adhaerentia. Cortice
quoque integitur, sed molliori, serpentum more. Linguam præterea
ut serpentes longam habet & bifidam, & parte extrema, capil-
lamenti tenuitate. Omnia denaque habet membra serpentibus similia, si pe-
des

A des iis denas, longitudo in octa addas. Complexu etiam simili serpētibz coit lacertarum genus: in us marem intelligi dicunt, quōd sub cauda unam caueriam habeat. Lacertā ore parere credunt: vulgo Aristoteles negat. Neque incubant, oblerit quo sint in loco enire: quoniam huic animala nulla memoria. Itaque lacertarum ova sua sponte in terra apertuntur: & canali per se erumpunt. unam eorum annum non complect, sed semestrem finire aiunt. Mensibus certe quatuor frigidissimis latent. Renasci lacertis caudas haud falsum est. Lacerti Arabiz cubitoles: in Lybiæ desertis bandem cubitorum: in India vero in Nisā monte x xiiii in longitudine pedum, colore fului aut punacci aut cerulei. Lacerte combulit cum radice recentis arandinis (que, ut una cremari possit, findenda est): in eaque myrteo oleo permixto cineres, capillorum profluvia continent. Efficacius virides lacerte omnia eadem præstant. Quidam denas virides in x sextariis olei ueteris discoquunt, contenti semel in mēse ungere. Lacerti inueterati in os pēdentiū, addito sale contusi, & ab ictu lētas aures sanant: efficacissimæ autē ferrugineas maculas habentes, lineis etiam per caudā distinctę. Lacertæ caput tritum & appositum prodidere nonnulli specula extrahere: uermicas quoque, quas myrmecyas & acrochordonas dicūt, clausūque tollere. Jecur uero croci dentibus impositum, eos à dolore liberare. Si dissecta apponatur, ictus à serpente prodest.

Lacerta viridis.

Ferrugineas maculas habet lacerta.

1. *Χαρμῖνες* vocat Theophrastus interpret.

Χαρμῖνες

De salamandra & sepe quadrupede.

Cap. CIX.

C Lacerti species (ut Dioscoridi placet) salamandra est: lacerti quidem figura, sed aspera magis atque scabra: animal ignaui, & pondus ueluti scellus uaticogatum: nunquam nisi magnis imbribus proueniens, & serenitate deficiens. Nihil gignit: neque est in iis genus masculinū femininūue, licet neque in anguillis. Huic tantus rigor, ut ignem illæ sus pertransire possit: ignemque tactum, ut aiunt, extinguere, nō alio modo quā glacies. Ex omnino ad certum usque terminum ab igni nihil patitur: uirgatur autem, si longiore spatio igni sit adnota: si nanque diutius in igne immoretur, effluēt absumptūque ex ea mucoso quodam frigido humore, exurit. Eius sanie saluissimæ, quæ laetæ ore uomitur, quacumque parte corporis humani, uel in pede uno contacta, omnis in toto corpore desinit pilos: id quod cōtactum est colorem in uiridinem mutat. Ac si quem salamandra momor derit, dolor uehemēs se quitur, & in uulnere ipso crusta. Inter omnia uenēnata salamandra scelus maximum est: cetera enim singulos feriunt, nec plures pariter intermunt: salamandra populos pariter necare improvidos potest. Nam si arbori irrepleat, omnia poma inficit uenēnos: & eos qui ede rint, necat frigida ui, nihil aconito distans, inquit Plinius: quinimo si contacto ab ea ligno uel pede, crusta panis incoquatur, idem uenēficū est: uel si in puteum cadat: tamen talis ac tanta uis uenēni, à quibusdā anima-bum, ut suisbus, manditur. Venēnum eius extingui primum onanum ab his quæ uescantur illa uerissimū est. Sestius uenēre accendi cibo carum, si de-

Salamandra.

Q. iij

DE DIFFERENTIIS

tractis interaneis & pedibus & capite in melle feruentur, tradit: nequeque E
resanguinem ab his. Vm habet (ut Dioscorides auctor est) calfaciendi,
cuiusmodi & credendumque non aliter arque citharis, in medica-
menta quorum vis est erodere, & lepras abolere. Pios euellat oleo lique-
factu exenterata, detractis pedibus & capite, in melle feruatur ad eundem
usum. Et combustis quoque, saluandæ cinerem nonnulli septicis & lepri-
cis pſoricisque medicamentis admiscunt. Lacertæ quoque paræ similis est
seps, quem alij chalcidem uocant, alij zignada, alij *ναις* *χαλκιδαι*, id est la-
certam chalcidicam.

Seps.

Id.

Chalcid.

Zignad.

ναις χαλκιδαι.

Id.

Lacerta chal-

cidica.

Parua quidem serpens, sed qua non ulla eructe

Tantum mortis habet.

Color illi serpentis quædam *ναις* coci-
lium dicunt. Si e quædam momorderit, aut interimit, aut uehemetentem do-
lorem mouet: si hominem, tumor primum pellucidus ac ueluti splende-
scens, & cum nigritia circa uulnus undique: sequitur postea membri pri-
mum affectu, & totius deinde corporis putrefactio. Lacerta chalcidica in ui-
no epota, mortuus suos sanare traditur.

Chalcid dicta est à uirgula, quæ in dorſo habet uel coloris longitudinem habet
octo palmorum: gignitur in Syria, Lybia & Cypro. Hinc Nicodemus præter uerū quod
de eius longitudine affertur, uerius fortasse est de sepe serpente, de quo infra.

De stellione.

Cap. CX.

Stellio.

Afcalabon.

Afcalabon.

ναις δρον.

Chalcid.

Lacertæ figura & stellio est, quæ in Græcia scabum & afcalabon uo-
cant: alij coloten, alij galeoten.

Combūit os illi maculas: apuſque color

Nomen habet, uariis stellatus corpore guttis

Induc breuem formam, ne sit uis magna nocendi,

Contrahitur: parūque minor mensura lacerta est.

Chameleonū stelliones quodammodo naturam habent, tot tantum u-
uentes, præterquam a ranis: cum quibus pugnat, eosque deuorant. Cubile
habet stellio in locis odiorum fenestrarūque, aut cameris sepulchrisque.
Temporibus statim se condunt stellione cimenſibus enim quatuor frigidis-
simis latet in caerniis. Seneſcentem quoque exuunt, ut angues: eūque proci-
nus deuorant, ut Theophrastus auctor est, præcipientes comuni morbo
remedia. Operæ pretium est scire, quomodo præcipiatur, cum exuunt me-
brana hyberna, aliis deuorant eam: quoniam nullum animal fraudulenti-
us inuidere homini tradant. Obſeruant cubile eius aſtatibus: est autem in lo-
cis ostioꝝ fenestrarūque, aut cameris sepulchrisque, ut dictum est. Ibi a
utem incipientes ſellis arundinibus stratas opponunt caſas, quarum angu-
ſtus etiam gaudet, eo facilius euens circumdantem torporem: se deo dereli-
cto non poteſt remeare. nihil ex remedio in communibus morbis præ-
fertur epoto. Arbores scandit ſtellio, uel reſupinus ingrediens. Coloris ſi-
cuti & lacertis caudas renaſci haud falſum. Coloeꝝ hoſtis aſinus eſt: dormit
enim colota in erus præſept: & narē ſubiens aſinus, ne comedat impedit. In
inſulis Thraciæ uſcitius ſit quens eſt. Peſtiſeros ſerunt ſtelliones in Græciæ:

A ar innocuos in Sicilia: Italice tamen quibusdam locis mortuus eorum exi-
niales sunt. Duo eorum generas: alterum stellionem transmarinam nos-
nant hunc Græci coloten vocant, & ascaloboten, & galoten. In Italia non
nascitur: est enim hic plenus lenigine, & stidoris acerbis, & uestitur: quæ
omnia à nostris stellionibus aliena sunt. Si quem stellio momorderit, lo-
cus affectus cum dolore assiduo hæret. Stellionē dissectum scorpionum
plagis nōnulli impoliuere: & scorpio tritus stellionum ueneno aduersatur:
hic enim & è stellionibus malum medicamentum: nam cum immortuus
est in uino, faciem eorum qui habent lenigine obducit: ob hoc in unguē-
to necant eum infiditiles pellicum format: remedium est oui luteū, & mel
ac nitrum. & scorpionibus contrarius maxime inuicem stellio traditur, ut
B uisu quoque pauorem iis afferat, & torporem singuli sudoris. Itaque in
oleo putrefaciunt eum, & ita uulnera eo perungunt: quidam oleo eo spumā
argenti decoquunt ad emplastri genus, atque illinunt. Hydrocorbeis stel-
liones mite prodesse traditur, capite, pedibus interaneisque demptis: reli-
quam corpus inassatum, in cibo id se potus datur. Comitialibus morbis stel-
lionis trāsmarini cinis potus in aceto prodest: & tunica stellionis, quam,
ut dictum est, eodem modo ut anguis euit, pota: quidam & ipsum arum-
dine exenteratum inueteratūque bibōdum dederunt in cibo in ligneis
ueribus inassatum. Mirum de stellionis cinere (si uerum est) in linamento
involucrum, in sinistra manu uenere in stimulare: si transferatur in dextrā,
inhibere. Fel stellionum tritum in aqua mustelas congregare dicitur.

C De chameleone.

Cap. CXI.

C Hameleo quoque & magnitudine & figura totius corporis hæc tam
plane representat: uel ut alij referunt, similis est magnitudine croco-
dilo terrestri, spinæ tantum acutior curuatura, & cauda amplius adine di-
stans. Lætera deorsum ducta uentri iunguntur, ut piscibus: & spina modo
piscium eminet. Rostrum, ut in paruo sit, hæc ablimile fusillo: uel ut depin-
xit Aristoteles, tostrum simæ porcaræ simillimum. Cauda prælonga in te-
nuitatem desinens, & per uulnus implicata in se orbibus, lori modo. Elanor
à terra est quā hæc ita: inflexus crurum perinde ut lacertæ, sed crura ha-
bet recta. Pedes singuli bipartito locantur: paritèque talem inter se habent
D istum, qualem pollex ad manus reliquam partem obiecit: sed ipsæ etiam
reliquæ partes paulotenus in digitos quosdam finduntur: uidelicet primo-
res triplici fissura interius, duplici extèrius: posteriores interius duplici, ex-
terius triplici. Unguiculi us adunci. Corpus asperum tosum, ut crocodilo, o-
culi in recessu cauo intras recepti, prægrandes, rotandi, cute simili atque re-
liquum corpus obducti, media sui parte per quā exangua deorsū quæ uidet: quæ
uidendi sedes nunquam cute operitur, nec pupillæ motus sed totius o-
culi uersione in orbem, mutationeque quoquē utrius aspicit quæ uelit.
Color uariis, & in momento mutabilis: mutat namque suum colorem in-
flans. Habet autem & nigrum colorem non longe dissimilem crocodilo,
& pallidum, ut lacertæ, & maculis distinctum nigris, ut panshera. Et muta-
tione

Chameleo.
Χαμαιλεων.

Paulotenus
ut Ang.
Salmon.
Elanor
quæ uidet
admonet.

Pallidum,
ut.

DE DIFFERENTIIS

tur color subinde toto in corpore reddiisque semper quemcunque attingit, Et præter rubrum candidumque. Et oculi quoque concolores reliquo corpori redduntur: & eandem eandem colorem accipit, pallens cum moritur: de-functisque eundem colorem seruat. Motus illi piger admodum ut testadi-ni est. Gulam atque arteriam sibi eodem continet, quo laceræ, pulmonem habet portione maximâ. Carnem nusquam nisi in capite & maxillas, & ad commissuram caudæ admodum exiguum possidet. Nec alibi sanguinem quàm in corde & oculis, & loco à corde superiore, & uenulis hinc tenden-tibus: uerû nec in his quidem ulla copia, sed paucissimum habetur sanguinis: & omnium ouiparorum pedestrium maxime inopia sanguinis riget cha-mæleo. Cerebrum paulo superius oculis positum est, & prope his conguâ. Cate autem exteriore detracta oculis, quiddam lucens, ueluti annulus æ-neus tenuis, nullo palo interceptus cingit. Membrane in omnis fere corpo-ris partes multe ac ualide, longæ, firmiores, quàm in cæteris tédunt. Dis-secus hic totus spirare præterea diu potest, mors admodum exigua adhuc circa cordis sedem extante. Et cum omnes corporis partes contrahit, nam uel maxime costas cogere atque adducere potest, hinc conspiciantur nus-quam continet. Subit æuennas & latitas hyeme more lacertorum. Nullum animal pauidius esse existimatur, & ideo uersicoloris esse demonstrationis. Ipse celsus hianti semper ore, solus animalium nec cibo nec potu alitur nec alio quàm aëris alimento. Circa caputificos serus, innoxius alioquin. Cha-mæleontem gignit Africa, quanquam frequentior India: per omnem quoque Asiam plurimus est. Impetibilis est coraci: à quo cum intersectus G est, usitorem suum perimit interemptus. Nam si uel modicum ales ex eo ederit, ilico moritur. Sed corax habet præsidium ad medellam, natura ma-num porrigente. Nam cum afflictum se intelligit, sumpta fronde laurea, re-cuperat sanitatem. Vis eius maxima contra accipitum genus detrahere e-nim supra uolantem ad se traditur: & uoluntarium præbere lacrandû cæ-teris animalibus. Sanguine chamæleontis palpebras nudari pilis credendum est. Hæc de quadrupedibus quarum generatio ex ouo est.

De serpentibus.

Cap. C X I I.

Serpentum quoque genus, omnia fere corporis membra habet lacertus. Proxima, si pedes his demas, longitudinem addas: quippe quod inrectû cortice sit, & prona supinisque perinde ut lacerti habeat. Serpentum itaque genus animal est inrectum, sanguine præditum, quod pedibus ex natura ca-teræ, ademque inrectum cortice est. Terrestrius inquam: nam exigua serpen-tum pars aquaticis est, scilicet fluminum incolæ, & quæ maris indigenæ ser-pentes sunt terrestribus similes. Sensoria omnia si mihi modo hæc atque cæ-tera etiam animalia habent: uerba gratia, nares olfactendi, oculos uidendi, aures, audiendi sensorium: non tamen hæc eminent, quo modo ne aubus quidem, sed foramina tantum habentur. Nec palpebram superiorem mo-uent hæc animalia, ut ne aures quidem, sed inferiorem conuolunt: quanquam non autem more nutantur: sunt enim oculis durioribus quàm aures. De anguib.

*Circa caput-
em ad est. nec
si talis uide-
clausus sibi
hinc Plin.*

*Serpens.
Anguis,
et Serp.*

- A** anguibz Thebanis perhibent *Aegypti*, quod cornua habent extuberare e-
 2 num ueluti uellagium cornus. Lingua set pentum tenuis, longa & attri colo-
 ris estiatque si extrahas, potngi longius potest. Peculiare hoc prater citte-
 rorum linguas, serpentibus & lacertis est, ut eorū lingua bafida fit, sed pre-
 cipue serpentum: quippe quæ tenuiffimus quibufdam quafi capillamentis
 3 difcreta uibretur. Dentes omnibus ferrati fune: fed duo in fuperna parte
 dextera & leuāque longiffimi, tenui fiftula perforati, ut fcorpioni aculei, u e-
 nenum infundentes. Quidam unum effe cum tradunt: & qua fit adunxus,
 relapfari cum momorderit: alique tunc decidere eum, turdūque recte-
 fcere, facilem decuffa, & fine eo effe quos tractari cernamus. Lingulā, quā
 4 *lingua fifta* uocant, arteriz fuperpofitam nō habent: fed meatum ipfam mo-
 B do contrahunt, modo laxant pro fui commodi defiderio: atque ita efficitur
 ne quid ponderis in pulmonem delabatur. Serpens collum proportiona-
 le potius colli uideri potest: liquidem capite & armis humerifque pars hæc
 defcribenda eft. Proprium serpentibus præ cæteris cortice inteftis eft, ut cā
 pat uertere in auerfum reliquo quiefcente corpore ualeant. Angues circa
 Æthiopiam uolare narrantur, pennas habentes cutaneas & fine pedibus.
 Omnia etiam interna fere eadem serpentibus funt, quæ lacertis: uerum o-
 mnia earum uifcera propter longitudinem & anguftiam corporis longa
 arcūque habentur: ita ut inter fe dignofci præ fua figure diftinfimilitudine
 uix queant: arteria nanque longa admodum eft, æque etiam gula longior.
 Arteriz origo ori proxima eft: adeo ut fub ea lingua effe uideatur: & quidē
 C uidetur linguz præminere, quoniam lingua contrahitur, neque eodem lo-
 co ut cæteris animalibus permanet. Speciem quoque uifcerū habent proli-
 xam, & cæteris animalibus diftinfimilem: cor enim arteria poftræmz adhe-
 ret exiguum, fed longam & renem fpeciem referens. Pulmo deinde adhe-
 ctitur fimplex, fibrolis fiftulis diuifus, præ longus, exiguus, fungofus, mul-
 tūmque à corde fepofitus. Iecur item longum & fimplex: fed lien exiguus
 rotundūque ut lacertis. Fel fimiliter atque in pifcibus habetur: nam præ-
 ter nauticem, in omnibus fere inteftino adnexum hæret. Neque ueficam ha-
 bent neque renes, licui neque alia, quæ orum pariunt. Venterculum habet
 ferpentes uelut inteftinum amplius, carano fimilem: tum inteftinum lon-
 gum, tenue, & ad exitum ufque unifor me. Serpētibz ueluti pifcibus re-
 D ftes defunt & penis: fed meatus continent binos, qui de fepto exortu, latus
 fpinæ utrinque perreperunt, coeūntque fupetne iuxta fpinam in unum: atq;
 ita ad oftium extremum fiant. Pleni meatus q̄ humoris fortifici (*ſic* uo-
 cant Græci) redduntur tempore coitus: attrituque in utro femen effluit ge-
 nital: candidum eodem modo quo de pifcibus dicitur. Vulua bafida ferpē-
 tibus omniſibus fere tendit prolixiore, modo corporis, exorta inferius ab uno
 continua in eam, ductūque utrinque in latus fpinæ, quali duplex meatus
 ufque ad feptimam qua oia ordinatim gignantur, & edi inde folēt. At uir-
 peræ uni (quandoquidē animal edit, poſtquam intra fe oia pepererit) uul-
 ua fimilis ut cartilaginea eft. Serpentibus dorſi fpinam pifcium more com-
 pleti apertum eſt: fpinam enim in oftium loco continent. Coſte fingulis ut

*Anguis The-
banus.*

*Arteria fifta
forma habet
quædam.*

DE DIFFERENTIIS

cens. Caeter serpenticibus similiter atque lacertis amputata renascuntur. E Vocem quidem emittit serpentes, sed esilem, & uelut longum sibilum. Megasthenes scribit in India serpētes in tantam magnitudinem adoleſcere, ut solidos hauriant ceruos tamroſque. Nota est in Ponticis bellis ad flumē Bagradam à Regulo imperatore, balastis tormētisque, ut oppidū aliquod, expugnata serpens, c x x pedum longitudinis epellis eius maxillæque usq; ad bellum Numismatum durauere Romæ in templo. Mas serpens femina minor est, uti in cæteris etiam ouiparis. Serpētum coitus complexa inuicem supenarum partium agitat: & quidē serpentes ita conuolūtq; sibi coherēnt, ut unus serpetis buccipitis caput totum esse uideatur. Parturit oua foris, excepta uisera omnes: non singulatim, sed ad monilis muliebris quod collū ambiat similitudinem incubant, quæ pepererint in terra, & sæcū sequen- B te excludunt anno. Anguem ex medulla hominis spinæ gigni acceptum uis à multis, inquit Plinius. Serpentes cum nati, eodem modo natiui quo re- 4 pūnt, hoc est flexuosis impulsibus. Serpentum genus omnium est: nam & carnem edunt & herbam. Serpētes omnium maxime animalium cape- A dunt dedit: sunt sed desiderium in bibendi exiguum, sicuti & reliquis, qui- B bus pulmo fungosus est. Vini incontinentes sunt serpentes: proinde uiseras aliqui uino in fœculibus ualis ad se pes disposito uentrem: ebriæ enim capiū- C tur, cum alioqui exiguis indigeat potu, ut dicimus. eodem minime & pene nullo cibo cū adseruantur inclusi: sed cum serpentes carniores sint, quæ- D quid ceperint, succo exusto uis in uentre (non foris quemadmodum a- E ranæ) reliquam totum per meatum sui fecissas emittunt. Accipit serpens G unde libet quod datur, siue auis siue belua est. oua etiam deuorat: sed cū ac- F cepit, reducit, & usque eo retractat, quoad partem nactus extremam è dure H cto constituat: tam colligit se, an breuēque contrahit, ut quod ori uidetur I supra est, in intum extento corpore facilis deducatur: quod propterea na- J facit, quia gulam angustam habet & longā. Dni etiam serpentes uiuere pos- K sunt sine cibo. Condunt serpentes hyeme sub terra aut saxis aut in arborū L saxorumue cauis: & omnes fecissas tempore, ueneno orbe dormiunt. Se- M necbutem exiunt serpentes, tam uere post labibula cum egrediuntur, tam N etiā autumnio. Cum serpens exuere incipit, ab oculis primum detrahitur, O ita ut obocari uideatur is, qui rem non intelligunt. cū caput exiit: gla- P brum etiam hoc omnium, ante quā reliquum corpus apparet: atq; una sere Q nocte & die senectus tota exiit, à capite orsa ad caudam: tūque quod R exiuit, quod internum erat fit externum. Serpētrum fringon hedera gra- S uissima est, ut mirū sit illi in honore habitā: contrā, fraximus adeo serpens T fugat, ut ne matutinas quidē occidentesque umbras, quāuis sint longissi- U ma, serpens arboris eius attingat. Expertus prodimus, inquit Plinius, si frō- V de ea gyro claudatur ignis & serpens, an ignes potius quā in fraxinum su- X gere serpentem. Serpētes omnes natura frigide sunt: ac proinde in flui- Y dis locis sunt grandiores: ubi & aliquanto magis pestiferæ gignuntur. ac Ita- Z lia frigidiorisque regiones, hac quoque parte saluberrime habet, quod ma- A nus terribiles angues edunt. ac uenorum similiter maxima pars frigore in- B terunt,

A terimus, tam ictu quàm potu. Sunt tamen & uenenata nonnulla, quæ mortu ardo rem inferant. nec aliud uenenum esse quàm fel serpentium diligenter nissim quidam auctores scribunt. Venenum autem anguina magis m^{venenum an-} nissue periculosum ex eorum passu traditur quod maxime manifestu est ^{periculosum.} ex uiperis, quæ in Arabia inter balsami frutices, & ex eundem lachryma uiuunt: morsum namque eorum minime timeant qui balsamum colligunt nullum etenim ueneti periculum affert. Quibusdam in locis serpentes indigenis innoxii sunt, aduenas interimunt. In Syria namque angues circa Euphratis maxime ripas dormientes, Syros non attingant: aut etiam si calcati monordere, non sentiunt maleficia: alios cuiusque gætis infestis aude & eam cruciati exanimantes. In serpentium genere omnia magis exitialia, si **B** suum genus edere, antequam nocant. Illud præterea ignorare non oportet, omnis serpentis ictum, & ieiuni & ieiunio magis nocere: idèoque perniciosissimæ sunt cum incubant: utilissimamque est, ubi ex anguibz mectus est, non ante ingredi, quàm quis aliquid assumpsit. Venenum serpētis (ut quidam item uenatori uenenata quibus Galli præcipue usuntur) nō gustu sed uulnere nocet. nam seps, quæ & lacerta Chalcidica dicitur, in uino pota, morsus suos sanat. Quidam & uiperis utuntur in cibis. Et hominibus contra serpentes inest uenenum: feruntque ictus salua ut serpentis a quoque contactum fugere: quod si in fauces penetraverit, etiā mori: idq; maxime humani ieiuni oris. Nihil autem æque aduersari serpentibus sciunt, quàm caneros: si uelque percussas, hoc pabulo sibi moderi cum sol sit in can **C**erò, torquent serpentes. Anguibz in cibo sumptis anguillarū modo lentes tolluntur: aut uernatione earū quam exauit pota. Anguis inueterati fustius mensura adiungit. Membrana siue senectus anguini uernatione exuta in uino decocta, dolores aurium sanat infusa: & denticul dolores, si colluantur. Additur & in ocularia medicamēta, præsertim uiperina. Senectus serpentium seruente testa uita infillatur, rosaceo admixto contra omnia quidem auriā uita efficit, sed contra graueolentiam præcipue: aut si purulenta sunt, ex aceto: melius cum felle caprino uel bubulo aut testudinis marinæ uel uulbor anno eadem membrana non prodest, nec imbro perfusa, ut aliqui putant. Denticul dolores sedat anguinæ uernationis membrana cum oleo tædæ quæ resina calciscta, & auri alterutri infusa, adiungunt **D** aliqui thus & rosaceum: eadēque causi indita, ut sine molestia cadant, præstat. Phthiriasin à toto corpore pota membrana senectutis anguini in duo habet. Anguini senectus adalligata lumbis faciliore partus si citi protinus à puerperio remouenda. Dant & in uino bibendam cum thuyæ: aliter sumpta abortum facit. ad canis rabidi morsum cum canero masculo erita illinunt: nam etiam per se reposita in arctis armariisq; uineas necat, claritatem oculorum facit, si affricetur. Anguini adeps erugini mixtus, ruptis oculorum partes sanat. Quoddam est ouorum genus in magna Galliarum fama: omassum à Græcis: angues innumeri æstate consoluti salubris faciem, corporūque spumis æstifica complexu glomerantur, anguini appellatur. Vidi equidem ouum, inquit Plinius, mali orbiculati

DE DIFFERENTIIS

modici magnitudine. ad uictorias litium, ac regum aditus mire laudatur. E
à magis.

1 Serpente nomen Latinis (si fallos) nomen quàm significat terreſtre animalia
lum omne, quod ſe non amoluit ingreſſu, ſed hauri reſcit, etiamſi quadripes eſt, ut ſepa,
ſalamandra uel eris mulipes, ut ſcorpia, ſcolopendra: præſertim ſi uti morſu aut ſibi
uicentum iſeriat. Plinius etiam ſalamandram ſerpentem uocat: & ſepa quoque, id eſt
laccernam Chalcedicam. Corneliuſ Celfuſ ſcorpionem, aratrum & phalangium inter
ſerpenteſ numerat: (quanquam, ut Solino placet, ſcorpiones, ſcorpiæ, laccernæque, uer-
micibus, non ſerpentibus adſcribuntur.) Lucanus de ſepe, parua modo ſerpens, dicit.

ſerpens & ſerpens quoque, non caſum quæ ſimpſum more ſepant, ſignificant, ſed
& alia quoque uerba quadrupes parua, quæ apud Anſtoleſem angubus numeroſio-
ribus apprehendendo (quod ſit quibus diſtis, quos in poſterioribus pedibus obſtanti)
faciliſ obrepunt ad ſuperiora. ſerpens ægi & ſerpens diſtingit Galenuſ: nam ſerpens pro-
prie de ſerpentibus dicitur & uermibus, quibus pedes deſunt: improprie etiam de pede-
ſtribus omnibus quæ uasibus reperiuntur. Hæc Theocrituſ interpres. Et diſtus Baſiliuſ ſer-
pentem natiuitate omnia uocari, ut piſceſ, & alia quæ in aquis uiſitant. Serpens nomen
quoque unam ſpeciem ſignificat. Plin. lib. 29. ſerpentia oculoſum dextrum ad aligatum
contra aphoras prodeſſe, ſi ſerpens una dæmonſtat. Nec aliter apud Græcos hæc pro
una ſpecie, ſcilicet uipera accipiunt: ut apud Oppianum de murene & ſerpente cornu.

id eſt imper. Anguiſ generale non minus eſt, quàm ſerpens, ut apud Celfum lib. 4. Ser-
pentium quoque morſus ab hominibus diſtinctiſ rationem deſiderant. quantum in ea
multum antiqui uariarunt, ut in ſingula genera anguſum ſingula inſecta genera præ-
cipue acutæque aliis aliudem illud ignorari non oportet, omnia ſerpentis abum & uer-
um: & uiciniſ magis nocere, uiliſſimæque eſt, ubi ex angubus morſus eſt, non ante
progreſſi, quàm quæ aliquid aſſumpſit. Et aliaſ frequenter anguiſ uerſum etiam ſpeciem
ſignificat, ut apud Plin. lib. 29. cap. 4. 1. Tenuiſſima ſerpentibus lingua, inquit
Pliniuſ, & triſulex, abrum, aut coloris, & diſcriminas, prælonga. 2. Serratiſ anguiſ. G
ſerra, acutiſ interpres acutiſ, diuſi, coniuſti ſecundum ſerram. 4. Anguiſ, Pha-
ſarchuſ in Cleomene & Ouid. lib. 17. metamorphi. ea dem tradunt. Ouid.

Sane qui cum claſſe pueriſſima eſt ſpina ſepulchro,
Mæſari credant humanæ angue medullæ.

De hydro, & aliis quibuſdam ſerpentibus aquatilibus. Cap. CXIII.

Hydra.
Mæſis.
Cherſydræ.

IN orbe terrarum pulcherriſmū anguiſ genus eſt, quod in aqua uiuit
Hydri uocantur, nulliſ ſerpentium inferiores ueneno. Genus hoc nomen
etiam cherſydri compoſitum inde fortitum eſt, quòd primū in aquoſiſ lo-
cis degit, poſtea ſubſidera petiſ quo etiam tempore uenenum illi nocentiuſ
ineſcit quod ſynceriuſ iam uenenum ſit, minuſque alieniſ admaximū ſue
citæ, ac proinde atrocioſ redditur magiſque noxiuſ: utram in humore dum
uiuit, non adeo puram habet uenenum: ex humidiorē namque uicſa alieniſ
temperatur laccis. Calabria cherſydræ frequentiſſima eſt: uti & Vergi-
liuſ explicat:

Eſt etiam ille malus Calabris in ſalubus anguiſ
Squamea conuoluens ſublato pectore terga,
Atque nonis longam maculoſis grandibus aluame
Qui dum amnes ulli rumpuntur fontibus, & dum
Vere madunt udo terra: ac pluuiabilibus uicſis,
Stagna colit: ipſique habitans hæc piſcibus atram

Impto-

A Improbis ingluuiem, rarisque loquacibus explet.
Postquam exhausta palus, terroq; ardore defuit,
Exilic in siccum & flammantia lumina torquens,
Squat agris, asperque sinit, atque æternis æstu.

1 Forma similis est aspidi chersieæ parua, nisi quod cernicem non ita laci habet, quæ in re maxime ab his differre videntur aspides. Huius iecori fel adnexam est, cum in cæteris serpentibus intestino magna ex parte adhaereat. Ex hydri morsu factum ulcus dilatat, huc scintilleque subinde augetur: nigraque ex eo sanies copiosa malæque oleum, seu ex ulcere depascere manat.

Hydri recur seruatiua, aduersus percussos ab his auxilium est: quod & baba iubent ad calculos pellendos. Enhydri vocatur à Grecis coluber in aquis uiuens: est autè serpens masculus albus. De colubro nero ita cecinit Vergil.

Est recto afflictus coluber succedere & umbræ.
Pestis acerba bouum, pectorique aspergere uirus.
Fouet humum: cape laxa manus, cape robora pastor:
Tollentemque manus, & sibila colla tumentem
Deice. iamque fuga nimidum caput addidit alter:
Cum medijs nexu, extremæque agmina caudet
Soluuntur, cardosque trahit linus ultimus orbes.

Coluber, inquit Plinius, est in aqua uiuens. huius adipem & fel habentes qui crocodilos uenentur, mire adiuuari produntur, ubi contra belua audet. Enterocela iecur aquatici colubri illinitur enhydri (qui ut dictū tam est, uocatur Grecis coluber in aquis uiuens.) Huius inquam quatuor dentium superioribus in dolore superiorum ginguas scardiscit, inferiorum inferioribus: alqui canino tantum contenti sunt. Sunt & hydri marini, qui circa insulas quasdam Indiæ egrediuntur in terram, uiceniū cubitorum longitudine. Sed serpentum marinorum genera cōplura sunt, colore numerosè uarietatis. nasci eos non in altissimis gurgitibus certum est. Est serpens marina colore & corpore congruo proxima, sed obscurior & acrior. Hec si timent atque piscatores euadat, in arenam postro quamprimum adacto terebrat subitque tota. Est ore acutiore hæc quam terrestres. Myronē piscem eundē esse cum marino serpente uolūt nonnulli: cuius alteruter oculus erutus pro amuleto gestatur aduersus oculorum uitia, quem oportet uiuum

4 5 Dimittere: alioqui frustra geritur amuletum: atque tū deinde pisci alteruter remanet ocalum loco erui auit. Sunt etiā maris indigenæ serpentes terrestribus similes, nisi quod caput habeant conghi. Inter aquatiles numeratur & serpens quidam paruas, colore atro, oculis sanguineis, cuius caput draconis formam imitatur. circa mare rubrum nascitur, ut refert Arrianus. Hydri quoque nomine à nōnullis appellatur dryinas: ab aliis chelydres. In humidis paludosisq; locis, in quercuum ac fagorū radicibus fere latibula habet: & in pratis ranas uenatur & molaridas, in Hellesponto frequens. Est autem dryinas serpens duorum circiter cubitorum longitudine, corpore obeso, asperissimis squamis undique munito: in quibus latent mulse quædam paruule quæ serpentem conficiunt. colore in tergo subitro est: capi-

*In paludibus,
Necander in
Flor.
Ex Nicand.
Egloga.*

*Enhydri.
Coluber.*

*Atque, sicut
hæc.*

Hydri marini.

*Serpens marina.
Cuius subdola
uita.*

Myron.

*Petrus Aristo-
teles interpres
non habet, Nisi
quod caput draconis
esse asserit atque
dryinam.
Deconon.
Chelydres:
Hydron.*

*Lucan' lib. 9.
Tristitque aut
fumante dra-
cone. Virg.
3. Georg. Agre-
tore graui or-
dore clero-
dru.*

ut minime acutos, sed equaliter lanuiculo, hydro similiter: odore tetro, & E
deo ut feror latentem prodat. Est autem odor, qualens reddere solent præ-
segrina tergorum equinorum humentia, cum à coriariis abrauantur. Est
vero dryinus serpens pernitiosus adeo, ut refert Galenus, ut si quis eam cal-
cauerit, et aiunt, cutis illi à pedibus excoerietur, tota crura maiorem in mo-
dum intumescente: & quod magis mirum est, manus quoque curantium
medicorum excoerietur. Si quis autem aggredietur dryinum interficere,
olfactum adeo illi corrumpi aiunt, ut quemlibet odorem quantis etiam
grauissimè, prauum esse existimet: nec aliud præterea olfactu sentire queat.
Sequuntur dryini mortuum graues dolores: & in ipso mortui loco in-
surgunt pustule: nonnunquam & aquosus effluit humor: cordis dolor,
qui *capitangis* vocatur, atque tormina. In flumine nomine Arcade, quod ad P
Persicam Plistacen est, bicipites serpentes Ctesias narrat binis pedibus ad-
caudam præditas effusa, sedemque capite albas, reliquo corpore nigras: qua-
tuor cubitorum longitudinem habere: & quos percusserint interire: sin-
terdiu eas haud quaquam natare solere, sed noctu uel aquantibus, uel li-
tra luanibus pernuciem inferre.

*Serpentes bi-
cipites.*

Hydra.

1. Poema, huius generis, sed ingenti magnitudine erat: hydra ab Hercule in Letna
conficta, quam primus omnium Peribolus, & hunc secuti poetarum turba monstrum
multo cum caprum effinxerit. Ex Persia. 2. Colobci nomine etiam pro genere
aburæ, et formina colobea dicuntur. 3. Hydri aquantiles sunt & quæ præterea dicuntur
apud Arrianum in rubi maris navigatione. 4. Ophidion Plinio pisciculus est
eegro similis, uel, ut alii habent, lerna, scorbis similis: unguis inconnecti cum lly
radice emendat. 5. Hæc si, Theodoros hæc si capta dimittatur fora, &c. Hæc fere
de dracone marino pisce à Plinio narratur.

*Hydra,
Ophidion.*

De serpentibus terrestribus, & primo de aspidum generibus.

Cap. CXIIII.

Aspis.

Aspis in Africa gignitur: cherhydro non dissimilis est: hoc enim in signe
solum præ illis possident aspidæ, quod ceruicem latam namidamque
habent: similis alioqui cherhydro est aspidi cheræ parum, ut modo dixi-
mus. Est uero aspidum color uariis fuit: alii flauæ aut subarides, alii co-
loris cinerei, alii subarri fuliginosæ. In fronte circa supercilia extant duo

*Subarri fulgi-
nosæ, alii cin-
ereæ.*

ueluti callosa tubercula: cornuum instar, quibus efficitur ut oculi eam ap-
pareant: quos & hebetes huic malo dedit natura: eosque non in fronte, aut H
ex aduerso cernere, sed in temporibus: eosdemque semper fere quasi somno
conuientes: & excitatur sæpius audina quam uisa. Dentes sex minis pro-
manent: quatuor in curui: maribus bini. Sub lingua cuticula inuenitur, quæ
dentes etiam operit. Non obliquo ut cærestes, sed recto incesso serpit. Con-
iuga ferre usantur, nec nisi cum compare uita est. Itaque alterutra inter-
empta, incredulis alteri ultionis cor aspersequitur: interfectorem, uinam-
que cum in quantolibet populi agmine notitia quadam infestat. Perrumpit
omnes difficultates, permeat spatia: nec nisi amibus arceatur, aut præ-
celeri fuga. Longitudo quibusdam orgæ est, id est pedum sexium: magni-
tudo uero, quanta est uenabula, quo ad tauros leonisque consistendos uti
solent.

*Aspis con-
iuga.*

Asolent. Alterum genus (quidam enim duo stantant aspidum genera) *aspidum* *aspidum*, id est dodrantale est. hoc celerius interficit. Verum, ut alius placet, aspidum tres sunt species: quædam chelidonæ vocantur, alia chersæ, id est terrestres, alia pyades. Chelidonæ circa fluminum ripas, præcipue Nil, latecuntur cubiti longitudinem paulo superant, & colorem habent harundinis similem. Chersæ maiores sunt: inveniuntur enim nonnunquam quæ quinque cubitorum longitudinem æquant, colore fere cinereo: quicquam & subaurides aliquando reperiantur. Pyades omnium maximæ sunt, colore & ipsæ cinereo subauridæ, & qui aurum imitentur. omnium perturbatissima pyas est: quæ collo exprorecto, veluti ratione quodam loci intervallum coniectans, venenum caput vel in hominum oculos, & aliorum

B quo rumlibet animalium corpora. Aspidis morsus (signa enim fere communia sunt his qui os aspidis momorderit) nullum affert dolorē, neque phlegmonem excutit: sed animal quodcumque momorderit (uno ichneumone excepto) torpore & somno interficit, omnium serpentium ictu minime sanabili. Mors autem intra tertiam diei partem accidit: ex chersæ quidē morsu, tribus ad summum horis: ex chelidonæ vero ictu, presentissima mors & ad manum est. At his qui à pyade conspuuntur, tardius paulo: præcedit namque utrius hebetudo, faciei tumor, surditas, & deinde sequitur mors.

C Quin & alia sunt aspidum species, utramque dispartis effectus ad nocendum: aliarum urus quoniam modestas facilius admittit, minus famæ meretur. Cunctarum in proferendo ex his remedia, inquit Plinius, nisi M. Varronem scirem: *xxxviii*: utre anno prodidisse, aspidum ictus efficacissime curari hausta à percussis ipsorum urina. Venenum earum, si sanguinem attingit, aut recens vulnus, statim inseruit: tunc iteratum ulcus tardius. De cætero potum, quantalibet copia non nocet: non enim est tabifica uris. Itaque occisa morsu eorum animalia cibis innoxia sunt. Membrana aspidis quam exuerit cum adipe cussilem, iumentorum oculis claritatem inueniens facit.

1 *Egypti aspidem* quatuor cubitorum longitudine nonnunquam apparuisse scribit *Strabo*. **2** *Aspidem formosam*, dicit *Lucanus*. Solus nam aspidis species hoc tribuit, hypodali salicet, quod somno necat, teste etiam *Cleopatra*, emittit ad mortem quamquam *Cleopatra* mors, si alius credimus, pyadi potius debetur: nisi fortasse eadem sit pyas, quæ hypodali aut hypodale genus sit: ad hæc tunc: quod scilicet iudicio relinquimus. **3** *Aspidem angustum*, inquit *Aristoteles*, ex quo medicamentum pacificum illud componitur, in *Africa* gignitur, cuius ictus nullum remedium est.

De vipera, diplade, ceralte, & hammodyte.

Cap. CXXV.

Vipera mas & chis, scemina echidna vocatur: colore est sublaevo, pluribus ornata maculis rotundis, longitudine cubitale: nonnunquam vel trium dodrantum. In Asia certe oritur longitudinem æquant, id est sex pedum. Sunt in India, auctore Serabone, quæ non em cubitis superent. Caudam habet scemina & carnem, & squamis dum usculis asperam, non paulum gracile scemina ut mas, sed simul univertum acutissimum. Caput genitalis scutum, oculos subrufos, collum quàm sit mani angustius, alium

prominulam, meatum ad caudæ extremam propius accedentem. Incessus il- E
li quiescens & tardior. Dentes viperæ gingivæ condantur, sed qui carini vo-
cantur dentes, formati quaterni, & vulnere ex illius morsu inflantur
quaterni. Ac contra mari caput angustius, collum crassius, dentes canini tan-
tum bini, & vulnere ex plaga, bina. Oculi, cum irritantur, rubicundi. paula-
tum huic gracilescit cauda, aliorum more serpentinam, non accurtam, ut in
vipera firmata. Meatus ille, superne magis, & ventri propinquior est. Cor-
pus illi uniuersum tenue, & modo quoddam procerius, & incessus alacrior.
Color idem qui sermone viperæ uulva similes, ut in piscibus catilagineis
est. Cum cetera serpentum omnia genera ova edant in lacem, uipera è ser-
pente una foras animal uiuum in lacem edat, cum intra se quum prius
peperit piscium ouis simile, hoc est unius coloris, nec cortice ullo, sed mol- P
li cuticula opertum, parit inquam catulos, in utero antes exclusos, & parit
eos obuolutos membranis, quæ tertia die rumpantur. Euenit interdum, ut
qui in utero adhuc sunt, abrotas membranis erumpant. Parit autem sigil-
latum uno die plures quam uiginti. Nec nos latrat quoddam de uiperarum
coitu ac paria aliter sentire. Vipera, inquit, mas in coitu caput inserit in
os femine, quod illa abrodit uoluptatis dulcedine: appetente deinde par-
tus tempore, sirtus tarditatis impotentes, erodunt lauera, occidia parente.
Cum ceteræ serpentes cauernas subeant tetræ, uipera tamen sub laxis con-
dantur hyeme. Ita Aristoteles: contra Plinius. Serpentinam uipera sola ter-
ra dicitur condi, ceteræ arborum aut saxorum cauis. Vipera senectutem
exiit (ut alij serpentes) tam nate quam autumnio. Ex uiperæ motu à uul- G
nere sanæ primum effluit subpinguis oleosus, deinde cruenta: insurgit
& pustula, ambo his similes: sequitur postea ulcus quod uicinas omnes par-
tes depascitur, non in summa cute solum, sed altius in carnem descendit.
Sanguis olenz sunt & gingiua: & iecur phlegmone tenetur. Tormina
præterea accedunt, & uomitiones biliosæ. Ad hæc tremor, & sopor, & uri-
næ difficultates, sudor que frigidus: mors postremo intra horas septem im-
minet, aut cum diutissime (in us qui non euadunt) die tertia. Quidam ta- 4
men uiperis utuntur in cibis, ut apud diuinos. Primum omnium occidit
statim talem in os addi iubent, donec liquecat humor quatuor digitorum
mensura (si prægrandis fuerit) utrinque præcisa, exemptisque intercanis
discoquant in aqua, condicantur sicuti anguillas, oleo, sale, anetho, & petro: H
& omnibus aut statim uescuntur, aut pane colligant, ut sepius utantur. Vi-
perarum carnes, inquit Galenus, cum in anguillarum morem cōdantur,
exalfaciunt palam, desiccantque, & corpus totum per cutim euacuant. Vi-
perinæ carnes, ait Dioscorides, si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt
neruotum uetus auolantem crescentes repræmunt strumas. Adiacione nō
nulli longam fore senectutem iis qui eam carne in cibo utuntur. Catni-
bus hisce uescentibus, pediculos procreari tradunt quidā, quod plane à ue-
ritate abhorret, inquit Dioscorides. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed me-
ficacior. Antonius Musa medicus cum incidisset in insanabilia ulcera, ui-
peras edendas dabat, mirisque celerrime persanabat. Viperam unam in si-
cili

*Plac. de à Os
lens referunt
ex Nisibis in
lib. De Theri-
acis ad Pyrol.*

*Videtur milio-
sa sine exple-
re Plinius in
hoc loco.*

*Plac. fere ex
Dioscoride,
Alia ex Pto-
lemy colligitur
& alia.*

A Chili nouo comburere addito feniculi succo ad cyathum unum & thuris
manna una, acque ita suffusione oculorum, & caligines mangere utilissi-
mum elthechion vocatur hoc medicamentum. Fiant & ex uiperæ palli qui *elthechion.*

5 dum affertur arum & combustum,igna sacro medetur, pellum uiperinarum
cinis alopecias celerrime explet. Dipsas (ut quibuslibet placet) species uiperæ *Dipsas.*
est in maximis locis, aut aliis salubiginosis reperta: ut aliis uero, non eius-
dem omnino generis, sed specie similis est uiperæ parue. Est enim quàm
maius uipera, minor, cauda gracili & nigra: ut reliquo corpore albicante, ma-
culas partim tuse fenicibus, partim nigris uariiegato. Er in cauda quoque li-
neas habet duas nigras: magnitudine cubitali, inquit Aënius, ex crassa in te- *Solentus affidis*
B noctu definens, capite quàm uipera angustiore. Morsum eius sequitur in- *hæret esse uide.*

ternarum partium ardor intolerabilis, litus inextinguibile & intericiens: a-
deo ut quantumuis potus exhibeatur, nihil magis sedetur sius: cum ta-
men neque urina aut uomita, aut sudore quicquam externatur: pre-
ster à nonnullis uocatur: ab aliis canfos aut melanurus, aut ammoans, aut *Prester, in qua*
centris dicitur uel centrine. Est uero prester serpens (ut uidetur) alius. *elg, canfos,*
Hæc si quem percusserit, distenditur, enormique corpulentia necatur exten- *melanurus,*
beratus. Cerastes quoque ex agna uipera facile cognoscitur: corpore e- *canosus,*
nim non admodum dissimili est: sed cornua habet (unde illi nomen) bina: *elgus uel can-*
uel, ut alij tradunt, quadrigemina: id est exstantia quadam corniculis simi- *trus.*

7 lia, quæ uiperis defunt. Longe uero illi cubitalis, nonnunquam & cubitorij
canam. Color arenæ similis: cauda squamis hirsutis: squamæ uero & sub alio
in ordinem quendam condite: quo fit ut sonitum libalo non dissimilem
serpendo edat. non recta incedat, sed oblique, & in alterum potius latus in-
clinata, in nauiculæ modum quæ uentri uolentia in alterum latus inclina-
tur. in arena aut rotarum orbitis sere delitescit. Corniculorum illorum osten- *Prester.*
tatione ueluti esca illice, sollicitas aues perimur. Nam reliqua corporis de *Cerastes,*
industria arenæ regit: nec ullum indicium sui præbet, nisi ex ea parte qua *canosus.*

Caudam. Color arenæ similis: cauda squamis hirsutis: squamæ uero & sub alio
in ordinem quendam condite: quo fit ut sonitum libalo non dissimilem
serpendo edat. non recta incedat, sed oblique, & in alterum potius latus in-
clinata, in nauiculæ modum quæ uentri uolentia in alterum latus inclina-
tur. in arena aut rotarum orbitis sere delitescit. Corniculorum illorum osten- *Cauda squamæ*
tatione ueluti esca illice, sollicitas aues perimur. Nam reliqua corporis de *sa ueluti Hæ-*
industria arenæ regit: nec ullum indicium sui præbet, nisi ex ea parte qua *melanurus.*

D mors. Hammodytes uiperæ sere similis est, serpens cubitalis longitudinat,
Color illa non fauiscus, ut uiperæ, sed arenæ concolor est, & maculis qua-
busdam nigris insignatus. Maxillæ item quàm sint uiperæ maiores. Cauda
superiore sui parte fissa & prædura, unde & cercias illi nomen. Serpētis hu-
ius ictum maxima ex parte festina sequitur mors. Qui uero nō itam per-
eunt, as à uulnere sanguis primum effluit: inde sanies, sequitur postea ea
potus grauitas & animi deliquium. Qui autem uehementius ueneno infe-
stantur, triduo moriuntur: quanquam aliqui uel ad diem usque septimum
perdurauertint. Cuius pereunt, quos femina momot dicit. *Sunt & alia si-*
gna quæ Af-
trus.

D mors. Hammodytes uiperæ sere similis est, serpens cubitalis longitudinat,
Color illa non fauiscus, ut uiperæ, sed arenæ concolor est, & maculis qua-
busdam nigris insignatus. Maxillæ item quàm sint uiperæ maiores. Cauda
superiore sui parte fissa & prædura, unde & cercias illi nomen. Serpētis hu-
ius ictum maxima ex parte festina sequitur mors. Qui uero nō itam per-
eunt, as à uulnere sanguis primum effluit: inde sanies, sequitur postea ea
potus grauitas & animi deliquium. Qui autem uehementius ueneno infe-
stantur, triduo moriuntur: quanquam aliqui uel ad diem usque septimum
perdurauertint. Cuius pereunt, quos femina momot dicit. *Hammodytes*
hæreticus.

D mors. Hammodytes uiperæ sere similis est, serpens cubitalis longitudinat,
Color illa non fauiscus, ut uiperæ, sed arenæ concolor est, & maculis qua-
busdam nigris insignatus. Maxillæ item quàm sint uiperæ maiores. Cauda
superiore sui parte fissa & prædura, unde & cercias illi nomen. Serpētis hu-
ius ictum maxima ex parte festina sequitur mors. Qui uero nō itam per-
eunt, as à uulnere sanguis primum effluit: inde sanies, sequitur postea ea
potus grauitas & animi deliquium. Qui autem uehementius ueneno infe-
stantur, triduo moriuntur: quanquam aliqui uel ad diem usque septimum
perdurauertint. Cuius pereunt, quos femina momot dicit. *Cercias.*
Cercias.
Cercias nō est
chrysopygus
esse Hamm-
odus.

1. Hæc Oppianus in feminino quoque genere protulit, aspidem significante: & Hæc
pro femina dicit Aristoteles. 2. Rotunda, hæreticus potius quàm hæreticus legit

DE DIFFERENTIIS

hic Hermolani apud Aetium. 3. Sigillatus, ad est non binos aut ternos, sed ad E post alterum. & si Phias, & illud Scorus Theodorus hunc Aristotelis locum aliter reddant, quod singulos dicitur singulis parit. Ex Leonicensi De serpentibus. 4. Vipera quomodo condantur ad esum, docet Plin. lib. 29, & Galen. lib. 11 de simp. medic. & Dioscorid. lib. 2. 5. Theriaci, Horum composu non modo apud Galenum lib. 2 anidori, & Plin. lib. 29 cap. 4 & 5, & Aetium & Paulum. 6. Nicander serpentis caput latum esse distichum, & colla amplu, Exemplo est Aulus Iuuenis apud Lucanum, quem distichum momorderat. 7. Centris uel centine vocatur, quod testum eius in acutum tendat, ut centro, id est humulo non sit dissimile. Huius exemplum proclaram est apud Lucanum, Naridum à perfere percussus.

De hamorrhoea, sepedone, sepe, cenchri & cenchre. Cap. CXVI.

Hamorrhoea.
Hamorrhoea.

Hamorrhoei quoque color atque similis est, quandoque obscurior non-
nauquam uero splendescens magis. Et incessus cerasse similiter obli-
quus. Longitudo pedalis, crassitudo uero eius à capite ad extremam usque
caudam paulatim in tenuitatem descendit. Caput habet asperum horri-
dumque ioculos similes locustarum generi, quæ mepes dicuntur. Supra o-
culos terna uel uel cornu collum angustum, caudam ab umbilico gracile-
scente in. Measque excrementa mas habet superne ad uentrem : femina in-
ferne ad caudam. corpus uniuersum maculis ornatum, partim candidia,
partim uero nigris. dum serpit, ob squamarum asperitatem strepitum edit
haud magnum, quasi per arundinam acerrum transiret. in petrarum ca-
uernis sepe degit. Hamorrhoeus mas est hamorrhoeis femina. Ab esse tu no-
men habet à ore tum è naribus, tum etiam ex uniuerso corpore. Si qua ue-
ro corporis parte obducta iam olim ciensit aliqua fuerit, sanguis ex ea de-
nuo erumpit. Alui quoque excrementa sanguinolenta egeritur. Quin &
ex pulmone sanguis uelli expuitur, & mors certa cum uomina sequitur.
Hamorrhoea simili forma est sepedon, sed grossu oled iora: neque cornua ha-
bet ulla. Color illi coccineus: caput prægrauè: cauda quamuis sit prolixior, a
breuis tamen apparet, eo quod dum serpit, tætopere per anfractus torquea-
tur. A sepedone percusso, undique desiliunt pilæ, & ex capite & superciliis
palpebrisque. Sequitur deinde per totum corpus uiridigo atque leuce. Sepe
angus longitudinem habet cubitorum binum, caput lato, ore exacuto, to-
to corpore ex crasso in tenuius descendente, multis albis maculis uarieta-
to, incesu recto tardoque. Sepe colorem in eorum quæ contingit similitu-
dine in immutat. Eius tænos quatuor dentes tuniculæ quædam occultant.
Si quem sepe momorderit, ex uulnere (quod manifestu apparet) sanguis
primum excernatur, sanies deinde fortens: intumescit autem locus cum
dolore quodam maiore. Et membrum putrescit iam, & colorem recipit
album: tot denique corpori & color iniesit qualis uiridigine affectus: &
pilæ undique desiliunt: biduoque aut certe triduo sequitur mors. Sepe,
ut Pausanias scribit, angus est minima uiperæ magnitudine equalis: ma-
culus ex interuallis quibusdam uariis, capite lato, ceruice angusta, uentre
maiori, cauda breuis, incessu obliquo, cuncti in morem uel quod illi cum ce-
rasse

*Alia quoque se-
pedone leges a-
pud Aetium.*
Hamorrhoea.

Sepe, 244.
*An illi se sepe-
dome conside-
ra lesit.*

Sepe.

A raste commune est. Ac contrā in obliquum non nisi tardissime mouetur, cum aliis uelocissime:

Sed semper recto lapsurus limite cenchris
Pluribus ille notis uariatam tangitur aluam

Cenchris
Cenchris, uel
Cenchris.

Quā paruis tinctis maculis Thebanus ophites.

Thebanus.

Hunc & leonem uocauere quidam, ferocissimum anguem, & qui sese cauda uerberet, atque ad ferocitatem urinet. Corpus illi longum & crassum: stare modis petri montes, pecorisque insidias tendit, sanguinas madefacit. In insulis Thracie uicinis frequens est. morsum eius sequitur aqua in uentre collectio, & corporis tumor, qualis in hydropse euenire solet: necnō carnis tanta cum dolore putredo, ut uel spōte diffuset. Veterum præterea in-

fert & soporem: atque, ut Erasistratus testis est, acur, uelica, & crassius intestinum in uis corrumpitur, quos cenchris momorderit. Cenchrites, qui & acontias, serpens esse traditur, cubito tum bunū longitudine, corpore toto à crassitudine in exilitate desinente: colore, præsertim circa uentrē, uiridi, ut uideatur nubo (cum adhuc rectis seges est) perisimalis: unde nomē illi cēchrites: quem & fortiorē seipso fieri aiunt, cum mīliam floret. Cēchrites cum se infestum alacri reddere uoluerit, in iaculi gibrari modum inuolat, atque ita ferit. Ab huius morfu grauiora quā ab aliis sequuntur pericula, ut immā & putrescant & deficiant carnes. Iaculum ex arborum ramis uterari uulgatū est, inquit Plinius, & missili uolare tormento. Subeunt enim iaculi arbores, à quibus ut maxima turbinati, petrant animal quodcumq.

Cenchrites
Acontias
Cenchris a-
pus *Strabonē*
aliud gen^o *ser-*
pente est. *de*
quo *hinc*.

Iaculi
Iaculi *ex* *ar-*
borum *ramis*
ut *erari* *u-*
lgarit *est*.

Fortuna obusum fecerit. Adeo ualet salus iaculus, ut uiginti cubitorum spicium transire queat: protinusque ad ea que salu appetit, inhaereat.

1 Longitudo, in Nicāder: Atnus uero hoc modo, Recta & ualde proceps. Longitudo illorum palmarum, uel trium dodrantium: nam utrinque significat *modum*. Sed uide ne sint exēplaria mendosa. 2 Coccineus, Nicāder: Color illi, qualis est huius capitis, id est (ut uult interpret) coccineus.

De basilisco, & aliis quibusdam serpentibus, quorum uenenum remedio caret. Cap. CXVII.

Basiliscum Cyrenaica generat provincia, malum in terris singulare: qui uel conspectus solum, ut uisus, & sibilo auditus, interimit uel ut referunt alij, qui hominem, uel si aspiciat tantum, dicitur interimere. Ex quocumque motu eius occiditur, non depascitur fera, nō atrectat ales: si uero atigerit, statim interit. Alios quoque serpētes oīadu necat: nec hominis tātum, uel aliorum animātium, exinas datur, sed tetræ quoque ipsius, quam polluit & exurit: necat enim frutices arboresque non contactis modo, uerum & assilatis. Extinguit herbas, rumpit saxa: ipsas etiam corrūpit aurās: ita ut in aëra nulla alium impone transuolat infestum spiritus pestilenti. talis uis malo est. Basiliscus parua serpens est trium palmarum longitudine, colore flauo fuluōe, capite acuminato, & candida in eo macula, ut quodam diademate indigni auribus reliquos serpentes longe superet. Nec flexu multiplici, ut ceteræ corpus impellit: sed cum mouetur, media corporis parte serpit, media celsus & erectus incedit. Vulnus ab eius morfu factum

Basiliscus.

Basiliscus
modus.

DE DIFFERENTIIS

(ut inquit Erasistratus) aureo colore obducitur: statimque à uulnere sequi-
tur mors. Sibilum eius etiam serpentes alij perhorrescunt: & cum acce-
perint, fugam quæque quoquò possunt, properant. Hunc tali monstro mu-
tilarum uis exitio est. adeo naturæ nihil placuit esse sine part. interficiunt
eos in cauernis, in quibus delitescunt: uis tamen ne defuncto quidè deest.
Basilisci reliquias amplo sesterio pergameni compararunt: & ut eadem A-
pollinis manu insignem, nec araneæ uire tererè, nec alites inuolarent, cada-
uer eius reticulo aureo suspensum, ibidem locarunt. Sanguinem magi mi-
ris laudibus celebrant eodèntem picis modo, & colore dilatum cinnabari
clariorem fieri: quidam id Saturni sanguinem appellarunt. Est in Indica re-
gione serpens parvus, inquit Aristoteles, cuius unius remedio carent inco-
le. In regionibus ultra Indum fluuium, ut author est Diodorus, serpentum F
uis est, qui haud magni sunt, & corporum uarietate distincti. Aliqui æneis
ungis sunt similes, alij densam & hirsutam cristam gestant. atque omnium
ea est morsus uis, ut mortem crassimā inferant. Est & Indicus serpens por-
phyryus nomine, palmi magnitudine, colore ad purpure similitudinem ac-
cedente, capite albusimo. locus Indiarum calidissimus reperitur. Dentium experti
est: idcirco mordendi potestas illi nulla. At eius uisum, si quod uel homi-
nis, uel alterius animalis attigerit membrum tabescat necesse est.

*Serpentes In-
dici.*

Porphyryus.

1 Basiliscus, Plinius: Duodecim non amplius digitorum magnitudine. Solinus:
Pene ad semipedem longitudinis. 2 Capræda, Solinus. Alia quasi murela breuius
caput. (An igitur in Plinio legendum potius murela pro macula.) Actius. *Capræda*,
id est tubercula una habet: & Galenus ad Pisonem.

G

De dracone, amphibiaena, & aliis quibusdam serpentibus, quo-
rum morsus minus affert periculi. Cap. CXVIII.

*Dracon,
ægyptiacus.
Draconem.*

DRACO nō habet uenena. Porro ueris draconibus ora parua, & ad mor-
sus non desiccantia: sed arte fistulæ, per quas & trahit spiritus, & lin-
guæ exerunt. Proinde neque draconis morsus dolore ullum uehementem
excitat, etiam si pro uiribus maxime notatur morsum infligere: sed qualem
mus mordendo efficiens quippe non in dentibus uim, sed in caudis dracones
habet: & uerbere potius quàm tictu nocent. Spectiosa draconis forma est.
dentes quoque habet utrinque duplici ordine: frontem & supercilia cras-
sa. sub mento ueluti palæstra dependunt sublimia subuindia, quæ barbæ
speciem referunt. Id modo mirum, unde cristatus luba crediderit: draconum
enim cristas qui uidentur, non reperiunt. Non admodum dissimile huic ui-
detur esse genus quoddam draconum, quod sola fert Epidaurus, mansuetum
& colore sublimem, quod Esculapio sacrum erat: author Paulianus. Qui
Esculapio dicatus est, anguis à Plinio uocatur: neque anguis hic uenena-
tus est, nisi per mensem luna instigatus: sed prodest unus comprehensus, &
in aqua conuersus, si foueatur ita morsus. quoniam & melle ei remedia multa
creduntur, & ideo Esculapio dicatur. Atqui anguis Esculapio Epidau-
ro Romam aduectus est, vulgusque pascitur, & in domibus: ac nisi incedus se-
mina exuerentur, non esset fecunditati eorum resistere. Draconum genus
est

*Sublimis sub-
uindia, æ-
gyptiaca.*

*Dracon Epi-
dauro.*

*Anguis Es-
culapius.*

*Anguis Es-
culapius.
Dracon.*

A est magnitudine quinquæ aut decæ cubitorum æperiūtur autem & uiginti
 2 aut triginta cubitorum longitudine: & ut aiunt, nonnulli maiore. Ge-
 nerat Æthiopia dracones Indici partes, uiceniū cubitorum. Artemidorus

draconum in Arabia magnitudine refert triceniū cubitorum, qui tauros
 3 elephantesque perimant: moderatus sane in his: nam Indici ac Lybici dra-
 cones fabulosiores sunt, super quibus herba etiam nasci dicunt. Draconum
 ingens hoc genus squamas tegitur toto corpore asperitissimis. oculis est præ-
 grandibus: superque oculos extantibus quibusdam ceu umbraculis: in mē-
 to uero, quam barbam uocant, ore uasto, lingua longius exposita, denti-
 bus magnis, quales sunt suis sylvestris, quibus mordendo ossa frangunt. Nō

*Ventriculi,
ad mactand.*

enim nisi in locis æstuosis uenenū habet draco: sed morsu uolēto perniciē

B quīdōq; affert. Color illis uariis: sunt enim alij nigrī, alij rufi flauī, alij ci-
 4 nerei coloris. In Phrygia dracones ad magnitudinē quadragenū pedū na-
 sci ferunt: qui quotidie media æstate ex cauernis prodeunt, cauda ad terram

*Asiæ flauis,
nigri.*

admittentes, reliquo erecto corpore, & toto guttore eminentē: & paulatim
 la xato ore hiant, uolacres super uolantes (tamenq; sublimes & perniciē
 ferūt) sua aspiratione ad se pertrahere atque allicere: eas autem ex horum
 spiritus ductibus detractas in illorum uētre in decidere atque illabī: hæc
 quidem maxime ad occidentem solem agere. Spectanda quidē draconum
 ars in deuorandis ouis: aut enim solida hauriunt, si iam fauces capiunt: quæ
 deinde in semet conuoluti frangunt intus, atque ita putamina circumant:
 aut si tenerior est & canis adhuc ætas, orbe apprehēsa sparsa, ita sensim ue-

C hementēque perstringūt, ut amputata parte ceu ferro, reliquam quæ am-
 plesas tenetur, iaceant. Draconis adipe & melle cum oleo uetere incipies
 tes caligines descui. tradunt. draconum quoque adipem uenenata fugiūt.

Draconum magnitudinē fidem faciūt in Italia appellatæ boæ, quas gignit

Bæ.

Calabria. Hunc anguem ad immensam molem ferunt coalescere. capta
 primo greges bubulose & si quæ plurimo lacte rigua boæ est, eius se uberi-
 bus innectit, succūque continuo saginata, longo seculo ita functi fusieta-
 te ulmo extuberatur, ut obſistere magnitudinē eius nulla uis queat. postre-
 mo depopulatis animāmbus, regiones quas obſedit, ob uastitatem cogit.
 Deniq; D. Claudio principe, in loco ubi Vancanus ager est, in aluo occisæ
 boæ spectatus est solidus infans. Amphibæna aut icytale etiam si mor-

*Amphibæna.
Scyda.*

D deant, non enecant: sed horum serpentium morsus & obſcūti sūnt, & in-
 flammationes tantū inferunt, quales fere ex apam uel parimue ichibus cōtin-

guunt: scyales tamē chalcidæ mortum alunt eadē fere sequi symptomata,

Scyda chalcidæ.

ac si quæ uis peramemordet. Animalcula hæc inter se similia sunt, nisi q̃
 magnitudine differunt. Neque ut alij serpentes ex crassiore corpulentia in

caudam tenuem definunt: sed terete corporis figura utrinque æque crassa
 exiunt: ut aspectu discere nescias, utra in parte caput aut caudam esse
 dixeris. Differunt, quōd amphibæna in utranque partem, in caput scilicet

5 & in auctum serpentis: quo fit ut à nōnullis biceps esse dicatur, & à quibusdam

parua serpens, lumbrici terrestris magnitudine, colore terreo maculis par-
 uis distincto: ob maxillarum crassitiem modo quodam circūiens. Solā ser

pentium frigori se committit, prima omnium procedens, & ante cuculicam. Etiam. Amphibotriam mulier pragnans si transcenderit, abortum faciet, mortuum duntaxat, nam vivum habens in pyxide impune transseunt, etiam si mortua sit, atque adseruat: partus faciles praestat vel mortua. Mirum, si non adseruatam transcenderit gravidam, mortuam fieri, si protinus transcedat adseruatam. Scytale grandior est, quippe cunas longitudo ligonis aut securis manubrium aequat. Tanta praefulget scytale tergi varietate, ut notatam gratia videntes retardet: & quoniam reptando pignior est, quos assequi nequit, mureculo sui caput supentes in hoc tamen squamarum nitore, hyemales exuias prima ponit. Phlegmonem quoque excitat, neque

Scytale.

Spathium.

Paros.

Paros, vel

Paros.

Paros, vel

Paros.

Elaps, vel

Elaps.

Pelias.

Pelias.

Typhline.

Typhlops.

Carch.

Sacer serpis.

Serpens in

Scythia.

Aspidurus.

Aspidurus.

Serpis alatus.

Spondale, vel

Spondale.

alii mortis periculum avertit nullam spathium mortis aut paros. Est vero spathium serpens capite lato, & crassitudine in tenuitatem ad caudam usque definit. Nascitur in locis Chalcidum vicinis, muribus vescitur. Paros autem paros anguis est in locis Syriæ proximis natus. In hoc genere alij colore æris simili, alij vero nigro conspiciuntur. Ælianus partian vocat: vel, ut vult Apollodorus, partian igneo colore, & acerrimo oculorum sensu: largo ore, morsu nihil nocet. Sed miris cum sit Æsculapio dicatus est. Elaps vel elaps notat non sunt à veteribus authoribus explicari: sicut neque peliæ: relictæ enim videntur tanquam serpentes nulli non cogniti. Mordent quidem, sed nullo cum periculo mortis: verum elaps mortis tormenta excitat, qualia uolubilis accidit: istis tamen remediis curantur. is vero quos pelias momorderit, dolor circa locum vulneratum cum peredine quadam provenit: sed absque omni mortis periculo: oculorum præterea dolor cum caliginem nimium ex uenem ut ad ipsos pertingere. Typhline, qui & typhlops à Nicandro dicuntur, colore similes sunt Chalcidum regnati. Rami quandam sub imo ventre habent, quæ deluscente aut disrupta, ora pariant: à partu autem uiuunt, & uulnus coalescit. Hæ si etiam caleant non mordeant feruntur. Circa Thebas Ægypti serpentes quidam sunt hominibus minime noxii, idcircoque facti dicti: corpore pusillo, binis corniculis à summo uentrice extantibus. Sacer item appellatur à nonnullis alius serpens quidam murinus, quem serpentes alij permagni fugiunt. Magnitudo huic ad cubitum, species hirsuta: quicquid momorderit, continuo circumter putrefcit. Gagratur in Africa agro, in quo lafer, serpens quidam pusillus, in cuius remedium lapsus est, quem ex sepulchro cuiusdam regis antiqui accipiunt: eoque infuso in uino bibunt. Inocui & alij notantur quidam à Nicandro, ut qui moluri dicuntur, & qui acotit vocantur. Volat serpentis genus quoddam, ut fertur, ære inuente ex Arabia in Ægyptum, forma hyædis simile. Alas autem habet hoc genus non penneas, sed cuteas uel permi- lionibus similes. Genus serpentis est spondale, inquit Plinius. Hæc nullam radicem, quamvis acrem intactam reliquit eorum, quæ diuina siccæ manserint: cum à bestiolis exterius nulla alia radicem aliquam tangit. Hoc ergo naturæ animalis istius deputandum sit. Et de serpentibus aliisque quicumque cortice interiecta sunt, dictum ad hunc modum est. Sequitur natura autum.

A 1. Draconum. Hæc Plinius: Philoſtratus autem, paluſtibus draconibus, inquit, cruſta non eſt: montanis vero, iuuenibus quidem adnatiſſima cruſta mediocriter promi-nens, proſectis vero atræ, grandior. 2. Hæc Epidaurei, ut eſſent Paſſimus, non dracones, ſed angues potius vocari dicunt. 3. Draconem cum elephantis pugnam depinxit egregie Plin. lib. 8. 4. Draco. Lucan. Vos quoq; qui ciliſis innoxia nu-mina terrens Serpens amaro nuda fulgore dracones. Peluſeros ardens ſocii Aſi-cæ. 5. *Ερπυρίδαος, Solin.* Quæ cauſa efficiat, ut caput utriq; ſecus niubido ſtepat ualibus orbiculans. 6. Lucanus, Et ſtythæ ſpartis etiam nunc ſola præmus

*Αερνί, Ζην.**Μαζαρι.*

Exuvias poſtea ſua. 7. Autem cum ſpachuro, aut certe non diſſimilis ſer-pens eſſe uidetur, quæ Nicandro *ἀέχμη* uocatur, *αέχμη* q̄, id eſt pluribus inſignitum coronis lineisq; ut exponit eius interpres. Eſt & Anſiox locus quidam ſerpens, de quo lib. 9. *βαſιον* animal. Serpentem quoque impugnât muſcula, cum præcipue qui mures uenatur: uidetur ea cauſa, quæ ipſi eū mures proſequitur. 8. Pareas apud Lucanū,

B qua cæcæ ſunt. Hermol. Cæci ſerpentes etiam à Plinio uocantur. Cophæ etiam no-men adircæ habet, quod hebetes illi aures ſimiles adeo item dura eſt pelle, ut in tandem ſecari queat. 10. Laſer, Anſioceles, *ἡ δὲ ἀνιόκη*, ad eſt in laſere, uetus interpres habet, in loco qui dicitur ſilphur. 11. Moluri deſi ſunt, quæ cauſa ingredientes. 12. Sphondylæ apud Anſiocelem e genere eſt infeſtorum, quæ & coit morte eorundem. Theodorus uerticilla interpretatur. Et alio loco uerticillos dicit pro *σφονδύλῃ*: uerū apud Theophr. alium nihil aliud reddidit laſææ quàm ſphondylæ. ut uidetur ſentire etiam Theodorus diuerſa hæc eſſe animalia.

Κεῖλ, ὀφίον.
*Cophæ.**Περὶ οὐλῃ.*
Περὶ οὐλῃ.

DE ANIMALIVM DIF-

FERENTIIS LIBER VII

C

DE AVIBVS.

De partibus animæ exterioribus.

Cap. CXIX.



N genere animalium, quod bipes eſt & alige-nam, pennisq; opertum, auem appellamus. In auitibus partes nonnullæ ſimiliter atque in iis quæ expoſui animalibus, habentur: omni-bus enim caput ineſt, & collum, & dorſum: & ſupina corporis pars, & quod pectori pro-portionetur. Crura quoq; bina, hominis mo-do: ſed manibus pedibusque prioribus ca-rent. Auium nonnullis in capite cruſta ad-dita eſt: quam cum ceteræ pennarum emi-nentia quadam extructam gerunt, gallinæus unus peculiarem ſibi forti-tus eſt: ſic enim uiliſſimam, ut nec caro ſit, nec à naturâ carnis omnino alie-na. Oculi omnibus ſicut ceteris animalibus bini, line ciliis, & gratiores pal-pebra inferiore connuente: columbæ autem & ſimilia utraq;: quæ uero ſpeciem nocturæ gerunt (*νυκταλῆες* uocant) ſuperiore etiam palpebra connu-ent. Noctantur omnes ab angulo obeunte membrana. Volucibus uſus cer-

Αὐτῶν, ἄρνη.

D

DE DIFFERENTIIS

nendi ex longinquo est: unde fit, ut quæ unguibus sunt aduncis, clarissime E
 cernantur: eorum de sublimi conspiciendus iis est: & quidem uolare in
 excelsum omnium maxime animi genus id ob eam rem affollet: terrestres
 autem parumque volantes aues, ut gallinæ & similes, nō acie oculorum
 adeo uident. Auriculis carent omnes & naribus, meatūsque odorandi in ro-
 stro continent, audiendi in capite. Foramina bina ante os habent, sed nō ita
 explanata ut nares appellari possent. Os sibi propriū aues possident: non
 enim labra, non dentes, sed pro maxillis rostrum habent (ῥῆγξ: Græci uo-
 cant & ῥάκος,) quod in senectute maius redditur. Rostrū hoc uarie pro ui-
 dius ratione & auxilio datum ambus est: quæ enim adiacs unguibus sunt,
 quoniam carne uiuunt, & nullo fructu uelcuntur, rostrum habent omnia
 aduncum: cæterarum rectum. Sed aliis prædurū est, ut coruino generi. mi-
 nutis ambus laurum subtiliue, ad terræ fruges colligendos, & ad bestiolas
 capiendas idoneum. Quæ autem herbis uiuunt, & quæ ad paludes uidentur,
 (ut palmipedes, & quæ collum habēt longum) partim alio quodam modo
 rostri commoditatem obinēt, (nonnulli enim rostrum longum est ut &
 collum) partim lenitudine rostri sibi sufficiunt: quippe quæ rostro euerso-
 di insodere possint. Quæ etiam aues quæ laeuis habent rostrum, & quæ ra-
 dices esurunt, & reliquæ quarū uictus similes, nonnullæ ferratū rostri extre-
 mum habent: ita enim herbarū carpsus quo uiuant facilius agitur. Lingua
 omnibus est, sed uarietalis enim longa, alius breuis, alius lata, alius angusta.
 Quæ aduncis sunt unguibus, lationem sere linguā habent. Collū ambus por-
 rectum est: sed hoc alius breuius, alius longius quibus etiam longa sunt cru-
 ra, iis collum longum, quibus breuia, contrā, collum breue, præter quā pal-
 mipedibus. Carni uoris uolacribus longitudo colli incommoda est: quam-
 obrem nulli collum longum quibus ungues adunci. Palmipedes uero, &
 quæ diuiliis quidem, sed parum diductis digitis sunt, (ut quæ eodem genere
 cum palmipedibus contineantur) collum longum habēt: tale enim collum
 ad cibum ex humore petēdum commodius est: sed crura nō breuia, ut me-
 lius natare possint. Omnes aues uicē breui sunt collo (uti in modo diximus)
 & lingua lata, aptæque ad uirandū. Pectus in ambus integrum est, & sibi
 continuū carinatumque, & acutum atque carnosum. Et in eis aqua-
 ticiis maxime carinatur. Pectori uenter subiacet ad osium usque extremū
 & suffraginem crurum. Vmbilicus ambus iam adultis delitescit incertūsq;
 est, aneistans enim coalitu consistit non uenarum pars ulla est, ut in uisipa-
 ro genere. Carent autē manibus pedibūque prioribus, ut dictū est: sed pe-
 culiare inter cætera animalia alas possidentia: enim iis pro brachijs & pe-
 dibus prioribus dependent: quamobrem pro scapulis cæteræ alarū dor-
 so adherent. Clunem habent formam similem, longiorē, uentrēque me-
 dio tenus porrectū cohaesione perpetua, ita ut ipsum diuissum formetur esse
 uideatur: sed eum parte alia iunctum nō est. Sūt formosæ sane maxima
 ne ambus, quæ ungues habent aduncos, & pectus quā cæteris robustius.
 Crura a quibus omnibus ut in homine bina, sed in cro floctenda, ut quadrupe-
 dum suffragines, nō ut hominis poplitea foras. Crura quibusdam breuior-

Rostrum.
 Vires.
 Viresque.

Pectus delitescit.
 inopendi ut.

Pectus exple-
 cur hoc lib.
 & best. aures.
 Ala, nō est.
 Propolis.

Araur palmipedibus. Sunt uero quæ longis cruribus inniteantur: harum uita palustris est: nantes tamen non sunt, ideo neq; palmipedes: sed quod in solo pæmollis degunt, hunc digiti illis productiores, & flexus plures in digitis magna ex parte. Multifidæ etiam omnes quodammodo sunt: quippe cum pars maxima digitata sit: & nantes quibus palmipedes, tamē & ipse digitos perfectos distinctosque habeant. His autem natura aut pedum interualla per natus cōpleuit, omninoq; palmipedes reddidit: aut discretos quidem fecit digitos, sed singulis digitis annexa est doctu perpetuo latiuscula cutis, ut pedes etiam ad nandum utiles habeant. Omnibus tam multifido quàm palmipedi generi quaterni digiti dati sunt, (nec fere est quod plures habeat digitos): tertio in priore parte, singuli in posteriore maxima ex parte pro calce:

B hic tamen deest quibusdam longa crura habētibus: paucis quibusdā utrinque binis, ut aulicæ: quam iungem uocant: & qui in calce est digitus, manus est, ut in croce maxime patet. Copia uibus omnibus unguum est: & quibusdam ungues adunci sunt, indōque unguis appellatur: quibusdam uero rethiores. Vnquies omnes difficulter ambolant nec in facis cōsistunt, quoniam saci durities impedimento curuaturæ unguium est. Sunt nonnulla grauiorū aliuū genera, (ex maribus saltem, sed scemina omnino is carent) quibus natura calcar etiam dedit: sed nulli datum hoc est, cui ungues adunci sunt. Cauda tali, qualis data quadrupedibus est, uolucres carentes dē: *ἰσχυρὴ* uropygium hoc est caudam pennis conditam gerunt, breuē quæ longa crura habent, & quæ palmipedes sunt: maiorem autem cum illa, quæ scilicet eandem pusillam gerunt, porroctus in caudam cruribus ferunt, ut porphyrio, ardea, & aquaticæ aues. Vropygium hoc a uibus ad dirigendos uolatus affigitur, sicuti & piscibus sunt *καυδία*, & nauigis gubernacula: quo fit, ut aues quæcūque caudā talem ad hunc usum ineptam habeant, ut pauones & gallinæ, & quæ manime uolaces sunt, haudquaquam directe uolare possint, sed ueluti gubernaculo carens nauigiū agitur feranturque quocūq; fors tulerit: nisi si quæ caudæ loco proceris cruribus uolent modo quo iam dictum est. Aues item hoc propriū habent ad cetera animalia, quod non pilis, non squama, non cortice, sed pennis teguntur. Pennæ omnes caule constant, fissæq; omnibus sunt: nec simili spe-

*Unquies
ἰσχυρὴ*

*Calcar,
ἰσχυρὴ
Cauda, ἰσχυρὴ
ἰσχυρὴ
Vropygium.*

C quæ & contrario constant, quæ etiam contractis ad uentrē pedibus uolant: cum illæ, quæ scilicet eandem pusillam gerunt, porroctus in caudam cruribus ferunt, ut porphyrio, ardea, & aquaticæ aues. Vropygium hoc a uibus ad dirigendos uolatus affigitur, sicuti & piscibus sunt *καυδία*, & nauigis gubernacula: quo fit, ut aues quæcūque caudā talem ad hunc usum ineptam habeant, ut pauones & gallinæ, & quæ manime uolaces sunt, haudquaquam directe uolare possint, sed ueluti gubernaculo carens nauigiū agitur feranturque quocūq; fors tulerit: nisi si quæ caudæ loco proceris cruribus uolent modo quo iam dictum est. Aues item hoc propriū habent ad cetera animalia, quod non pilis, non squama, non cortice, sed pennis teguntur. Pennæ omnes caule constant, fissæq; omnibus sunt: nec simili spe-

Pennæ, ἰσχυρὴ

Dcie sunt atque ea quæ *ἀνίσθη*, id est totipenna à pennæ continuitate appellantur: his enim fissis, illis infissa est penna: & altera excaulis est, altera caulem habet. Pennæ perfectæ non similiter ac ceterorum animalium pili aut ab radice aut superne ab incisura possunt reparari, sed cadant necesse est.

1 ἰσχυρὴ aut fere significat, ἰσχυρὴ, gallinam, sed cōfunduntur nonnunquā. 2 In uibus proprie *ἰσχυρὴ*, in suis *ἰσχυρὴ* dicunt. 3 Latine, *καυδία*, uetus interpret, subcaulas pennis elegantiss & ita uetus Theodorus *καυδία* in purpurarū sinagoge.

De partibus autem interioribus.

Cap. CXX.

Aves uero & inter scipias differre, & à cæteris discrepare animalibus etiam interiorum partium ratione apertum est: lingua enim (quam

DE DIFFERENTIIS

ἀδρυστα vocat) aubus deestheru laringis constrictione idiplum preſiſt, E
 quod lingua in aliudum enim alimentum capunt alia, lingua artetiam
 cooperiunt aues arteriam ipsam contrahunt atque ita claudus, sicut qua-
 drupedes osiparæ & serpentes. Auium pulmo exiguus est, patum habens
 sanguinis, fungosus membræque similis, & aptus ampliari & extumescere
 cum inflatur. Pulmonis partes adeo inter se discretæ sunt, ut hinos habe-
 re pulmones credideris. Auium iecur maxime simile est utriusque: puro
 enim & sanguineo colore exulatur. Magne auium parti bene usque adeo
 exiguus, ut propemodum sensum effugiat, ut in columbis, miluis, accipi-
 tribus, nocturnis experitur. capriceps auis bene omnino caret. Aues omnes
 fel habent, sed alus ventri, alus intestino iungitur, ut colūbe, coruus, cotur-
 nici, harundinis, passerialis locori simul & ventri, ut ea pricipiti: alus iecori
 similiter & intestino, ut accipitri, miluo. Renes vero non habent aues, ne-
 que vesicam: quanquam in nonnullis aubus catuncular quidam sunt la-
 tuissimæ speciei renem ostendentes. Aubus quibusdam ingluuires propo-
 sita uentriculo est, ut gallinæ, palumbæ, columbæ, perdici (ingluuires cu-
 tis in amplum sinuata est, quæ penitus cibum ingessit cōtinetur incoctus
 hæc parte qua iungitur gula angustior est, mox amplior, tum qua desinit
 in uentriculum archior:) alus ingluuires deest, sed eius uice gula pertinet la-
 tior & patentior uel tota, uel quæ propius uentriculo adit, ut monedula, cor-
 uo, cornici, coturnici, capriceps, nocturnæ: at anas, anser, laro, cataraſte, gu-
 la tota ampla & lata est. Multis etiā alus aubus gulæ huiusmodi esse perpe-
 ctum est. Nec desunt quibus uentriculus ipse similis sit ingluui, ut tinam-
 culo. Sunt itē quibus neque gula neq. ingluuires amplior sit, sed uentriculus
 longior, scilicet aucibus omnibus, qualis passer aut hirudo est. Sunt etiam,
 quauis paucæ, quæ neque ingluuiem neque gulam amplam habeant, lon-
 gitudine autem ingluuires admodum prolata utantur: uidelicet quæ longa
 angustique colla habent, ut porphyrio quæ fere omnes excrementum ho-
 midius quam cæteræ solent, reiciunt. Distat ingluuires ab ea gulæ parte
 quæ uentriculo propinqua est multum, magnitudinis proportionem. Ven-
 triculus auium parti plurimæ carnosus callosusque est, cutis intus robusta
 & quæ facile à parte carnosa detrahi potest: sunt tamen, ut modo diximus,
 nonnullæ quibus uentriculus longior sit atque ingluuires similis. intestinu
 quoque parum plurimæ auium tenue est, solutiusque simplex est. Appendi-
 ces paucæ in aubus sunt, non supra & circa uentriculum, ut in piscibus, sed
 intra quæ desinit intestinum. Habent eas non omnes, sed plurimæ, ut galli-
 næ, perdix, olor, anser & alix multe. Minoris etiam generis nonnullæ
 habent, sed perexiguas, ut passer. Aubus testes dati sunt omnibus non ta-
 men qui foris pendeant, sed qui intus adhæreant lumbis: quomodo de san-
 guineis quæ pedes habent osiparis omnibus dictum est. n ptiusquam co-
 re incipiant aues, alus exiguæ, alus omnino obscuri sunt. ar uero cum uene-
 rem exercent, insigni tantisper magnitudine augentur, quod apertissime
 palumbis & perdicibus euenit. Vbi uero ad tēpus præterierit, adeo exiguos
 habent, ut incertum fere an habeant, sicutum tamen eo tempore quo coe-
 getant,

Ingluuires,
 archior.

G

H

Agerant prægrandes: itaque fit ut hybernus menses ne ullos quidem testes in iis haberi nonnulli arbitrentur. Salaciorum autem testes conspectiores sunt, ut gallinaceorum & perdicum temperatiorum minus. Autum uulua iuxta septum annexa est. ceruicem habet carnosam callosamque parte inferiore. ut superne qua septo iungitur, membrana constat, & præteritus adeo est, ut oua extra uulnam esse existimes. Auibas ergo auctioribus membrana conspectior est: & si per ceruicem infletur, extollitur atque sinuatur. ut in minoribus obscuriora hæc omnia habentur. Autum ossa paulo inter se differre uidentur: quibus enim densissima sunt ossa, ut dictum est, & durissima deinde & accipitrum ferocioribus, circo, palambario & similibus: gallinaceo uero, antribus atque anseribus laxa simul ac caua leuissimè ossium est substantia. Semen genitale omnium autum album ut cæterorum animalium est. Partes autum cum exteriores cum interiores ad hunc modum se habere constat.

De coitu autum, & aliis quæ ad earum generationem pertinent.

Cap. CXXI.

Cœtus uero differentias in auibas has annotamus, ut aliæ formina confidente humi, mare superueniente coeant, ut gallinaceum gemas: aliæ non confidente formina, sed stante, ut grues: & quæ ita coeunt rem. quàm celeritè peragunt eas enim supersubens, cito ut passeres perficiat. Cœundi parientis tempus non idem omnibus auibas est, sed parte plurima uere ac ineunte æstate cœnūt & pariunt, excepta halcyone, quæ circa brumam parere solita est. Sunt etiam quæ sæpius generant, ut columbæ & gallinæ. Autum syluestres scilicet magna ex parte coeunt atque pariunt: uerum hîrudo bis parit & menala. ut uero quæ aut urbana sunt, aut traduci possunt ad mores mitiores, hæc sæpius generant, ut columbæ, quæ tota æstate fortant. gallinæ etiam coeunt & pariunt, præterquàm duobus mensibus brumalibus. Autū itaq; aliæ aliæ fecundius pariunt: quod bisariam fit: aut enim quia crebrius, ut colūbæ, aut quia nu merodius, ut gallinæ. Omnes quibus unguis aduncus, minus salaces sunt, & parcius generant, excepto tinniculo, qui plurima in adunco genere parit. Sed quæ graues sunt atque item ueloces, quarum scilicet corpus grandiusculum est, ut colūba & similes, aut graues uo-
Nobis resina
utitur uitt-
pura, inestis qd
necesse.

Duo salaces, quarū corpus grande, ut gallina, coitu superat per fecundatq; sunt: quomodo interdum plantæ minores sunt feraciores. Pariunt cætere in nidis: quæ autem grauiore sunt & minus uolūt, ut perdices, & conuictices, & reliqua generis eiusdem, non nides, sed condensio frutice prolem manant: facta enim in aprico ara (alibi enim nusquàm pariunt) atque materia ut ne-
Nobis resina
utitur uitt-
pura, inestis qd
necesse.

pibus qui busdam cœgestis, quoad accipitrum & aquilarum iniuriam deuolare possint, oua edunt & incubant: mox cum excluderint, protinus pullos educunt, propterea quod nequeunt suo uolenti is cibis administrare. Aquaticæ omnes quæ in lacubus aut paludibus uicitant, iuxta paludes & locis herbarum habentibus nidos faciunt: quem uero Bæotij metropem uocant, hic unus subiens terræ caueñas facit cunabula. Vpupa una in suo genere non

DE DIFFERENTIIS

nificat, sed stupites arborum subiens parit sine ullo collecto stramento in E
 cauis. Oua parit aues omnes, sed quæ unicū parit ouum, excepto cuculo,
 nulla est. Ouum æque omnium uolucrum duro putamine consistit, si modo
 non depræuatur: gallinæ enim nonnulla parit molli, utmo. Bicolor quoq;
 ouum intus et huteum interius, albū exterius membrana hæc inter se discre-
 nuntur. Sunt & quæ *phœnice*, id est grandines dicuntur, utelli initio adhe-
 rentes, quæ nil ad generationem cōferunt: quanquam aliqui ita non existi-
 mant, has duas esse certum est, alteram parti superiori iunctam, alteram in-
 feriori. Umbilicus ouis (inquit Plinius) à cacumine inest, seu gutta emi-
 nentis in putamine. Fiant & oua tota lutea quæ uocant scissa, cum triduo
 incubata colluntur. Differunt oua aquaticarum à terrestribus, quòd multo
 plus lutei quàm albi ex proportionē contineant. Differunt & colore inter P
 se oua auum sunt enim alia cāida, ut columbarum & perdicum: alia pal-
 lida, ut palustrinū: alia punctis distincta, ut phasianarum & meleagridum:
 rubrum tinnūculi est modo minj. Quin & ipsam ouum in se suam habet
 discrimen: quippe quod non plane rotundū sit, sed parte sin acutum, parte
 latius sit: quæ quidem parte latiore exit, cum in lucem editur. Exit autem
 pars ouis acuta postica nāque parte adhaerere, in qua & principum pulli est.
 Itaque fit ut paruas ouorum contra atque animalium euenit: animal enim
 uerum in caput suūque principium nascitur: at ouum quasi in pedes cō-
 uersum exit. Concipit femina cum coierit ouum: superius ad septum trā-
 uersum: quod ouum primo maturum & candidum cernitur, mox rubrum
 cruentumque. Deinde increscens luteum & flauum efficitur totum: ita G
 amplius auctum discernitur, ita ut unus pars lutea sit, foris candida am-
 biat: ubi perfectum est, absoluitur à corpore, & erit putamine dum pari-
 tur molli, sed protinus durascitior, nisi utmo uuluar delecterit. at postea oua
 ipsa aceto macerata in tantum emolluntur, ut per annulos transeant.
 Sunt oua quibusdam gemina, quæ binis constant: utellis. Hi ne inuicem
 confundantur, facit in nonnullis prætenue quoddam septum albuminis
 medium: alius utelli contactu mutuo sine ullo discrimine iunguntur. Gal-
 linas aliquas & anserum quædam expertes adhuc coitus parere oua quæ
subuentanea, id est subuentanea dicuntur, usum scriptis est: sunt hæc sterilia
 & minora, ac minus iucundi saporis, & magis humida quàm ea quæ fer-
 cunda gignuntur, sed plura numero. humor eorum crasse scere incubatio-
 ne auis non potest: sed tam cāida quàm lutea pars similis sibi perseverat.
 Parium genus id oui plures aues, & maxime quæ non uolaces sunt aut ad-
 unce, sed multipart ut gallinæ & perdicæ, colūbæ, pauones, anseres & uul-
 piferes. Redditur uero ouum subuentaneum illud secundum, si prius co-
 eat auis, quæ subuentaneum ouum fert, quàm ouum ipsam à luteo in can-
 didam ambiens partem proficiat. Ita enim fit, ut subuentanea oua fecun-
 da reddantur: at si iam candidū receperunt humore, sien non potest ut sub-
 uentanea in fecunda mutantur. Sunt qui hypernemia illa oua, *sephyria*
 nominant, eo quòd uerno tempore aues flatas illos fecundos ex suo uero
 recipere uideantur. Celeriter magna pars autum, & impletur, & oua sub-
 uentanea

Oua.

Luteum int.
Ti ign.
Verbas.
Xanthas.

Oua scissa.
scissa, alba
scissa.

Oua rōtiol.
pau. subuen-
tanea.

Oua sephyria.

P

G

H

- A uentanea illa concipitur: quod uel in perdice percipi potest, eo quod ad libedi-
nem incitatur répoire. Generatio ex ovo omnibus uolueribus euenit mo-
do quidem eodem: fit enim ut incubante & conuoquente aue, animal ex
parte oui locernatur, ex albumine scilicet: augetur uero ex reliqua parte
& perficitur, nempe uitello: origo namque in albumine est, cibus per um-
bolicum ex luteo petitur. Itaque autum incubitu factum excludi naturæ ra-
tio est: non tamen ita solum ova aperuntur: sed si aut tempus sit bene tem-
peratum, aut locus, in quo ova manent, tepidas, conuoquuntur nonnun-
quam & autum ova, sicut & quadrupedum ouipararum, sine parentis in-
cubitu, répoire terrarum in *Aegypto* ova obruta fumo puluinem procreant.
Nonnunquam uero & cum in uasis quibuslibet tepidis essent coniecta, sponte
B ova pullos prompserit. Oui generatio ab uisita, & pulli rursus ab ovo conco-
cto procreantur, non pari temporis spatio euenit omnibus, sed pro magnitu-
dine generantium interest. Ouum gallinæ consistit à coitu, & perficitur
decem diebus maxima ex parte: columbar paucioribus. Gallinis tertia die
ac nocte postquam cœpere incubare, indicium præstare ova incipiunt. At
maiorum auium generi plus prætereat temporis necesse est: minori autem
1 minus sufficit. Effertur per id tempus luteus humor ad cacumē, à qua prin-
cipium oui est, & eor quasi punctum sanguineum in candido liquore con-
sistit: uel, ut *Plinius* tradidit, in medio uitelli hoc punctum sedit iam & mo-
uetur ut animal. Tendūt ex eo meatus uenales sanguinem duo tortuosi ad
unicam ambientem urranque, dum augetur. Membrana etiam fibris di-
C scincta sanguinea, iam album liquorem per id tempus circumdat, à meatibus
illis uenarum oriēs: paulo autem post, & corpus iam pulli discernitur,
exiguum admodum primum & candidum, conspicuum capite, & maxi-
me oculis inflatis: quo modo diu permanet: sero etiam decreuerunt oculi, &
se ad ratam contrahunt proportionem. pars autem inferior corporis, nullo
membro à superiore distingui inter initia cernitur. Iam meatuum quos ex
corde tendere diximus, alter ad ambientem album liquorem fertur, ex quo
pulli origo est: alter ad luteum uelut umbilicus. Die iam decimo pullus to-
nas perspicuus est, & mēbra omnia patent: caput grādius toto corpore, ocu-
li caput reliquo grandiores herent: quippe qui fatis maiores per id tempus
emineat, nigri notidum cum pupilla: quibus si cutem detrahas, nihil solidi
D uideris, sed humorem candidum frigidūque admodum resurgentem ad
lucem, nec quicquam aliud: ita oculi & caput. Iam uero & uiscera eo tem-
pore patent: & alui intestinorumque natura perspicua est. uicesimo die iam
pullus, si quis putamine secto solliciter, mouet: intrus sese, popitque aliquan-
tulum: & iam ab eodem die plumescit, quoties ultra uicissimum exclusio
protelatur. Iam per id tempus pullum ipsum multum humoris lutei subit,
atque in eius alio aliquid subdidit luteum, quo uidelicet adhuc nutritur.
Excrementum etiam album eodem répoire pullos emittit, & in alio quod-
dam album consistit. Deum uelut paulatim absumitur totus mēborū
haustru, ita ut si pullo decimo die post exclusio rescindas aluium, nō nihil ad-
huc uitelli comparias. Initium namque fuit generationis pullos à candido

DE DIFFERENTIIS

sumit, cibum à lacteo capit & incrementum, ut modo diximus ita enim pul-
lum qui in ovo nascitur, ut lacteo existimandum est, ut ferus in uulpatis,
sua parente vivit quando intra parentem continetur. Incubat aquila tri-
centis diebus: & ceteris quoque magnas alitibus tempus incubandi tantū-
dem à natura statutum est, ut anser & tarda: mediocribus tucens perficiat
incubationem, ut accipiter, malio. Et animum quidem ortus ad hunc modū
ex ovo agitur. Sed evidentiora hæc in auctoribus autibus sunt: nam in mi-
noribus obscura præ sua exiguitate habentur. Excludunt celerius incubā-
tes æstate quā hyemendeo æstate gallinæ duodevigesimo die fœtum ex-
cludunt, hyeme aliquando vigesimo quinto. Discrimen tamen & aviū est,
quod alie magis alius sanguinis officio incubandi possunt. Incubat magna amū
pars, fœminæ mare succedente: alique mares incubandi manus utrisper F
habent, dum fœminæ intermissis incubu cibum quærunt. anseram &
cornucum fœminæ tantum incubant. Quæ in lacubas paludiboscæ uctum
sibi quærunt, omnes iuxta paludes ipsas, & locus herbam habentibus nidos
faciunt, ut dictum est: quo fit ut occupatæ negotio incubandi possint su-
mere cibum, nec omnino media laborent. Sunt quædam, ut in genere gal-
linarum, quæ pariant gemina omniæ ex his quædam duodeviginti peperit,
exclusitque gemina, præterquam si qua esset, ut fit, artisa: sed quæ totus ge-
mini excluduntur, ita prodeunt, ut alter sit maior, alter minor: & tandem 4
in monstrum partus degenerat, qui minor novissime provenit. Depravatur
quādoque ova, & sunt quæ utina & canicularia vocantur, antello cor-
rupto, corpore potius calido, ut æstate. Multiparis hoc accidit frequētius & G
uncungibus quavis parū fœcundas, nihilominus tamen idē evenit, sipe
enim vel alterum ex duobus utinum fit, vel tertium semper fere. Aves ma-
gna ex parte annulæ nequeunt generare. Quibus partus numerosior est,
unū saltem ex pullis sipe nido expellunt. & omnes fere alites quibus unguis
adunci, pullos cum primū provolanda facultas fuerit, nido expellunt, per-
cutiētesq; cogunt discedere: & ceteræ quoq; aves maxima sui parte idē hoc
faciunt: cūque emittierint, nihil præterea adhibent curæ, excepta cornu-
ce, quæ aliquandiu providet. Aves ad hunc modū coeunt, gessit & parunt.

1. Quo pacto perficiantur pulli in ovo, pluribus verbis atque apertius ostendit A-
ristot. lib. 8. hist. animal. 2. Non cor, ut Aristoteles, sed recur primum in anima-
lium generationem format sicut Galeus: id quod in uulpatis & in homine maxime
explicat aperit sed in oviparis minime. 3. Ipsum animal, inquit Plinius, ex albo H
quod omni corporaturus est, cuius ex lacteo. 4. Locus hæc Aristoteles aliter fortasse
reddi poterat, ut infra explicabatur in gallinæo genere. 5. Depravata utinæ, sunt
utina, ut Plinius uult, ova incubatione derelicta.

De nido animum & de loci mutatione eadem. Cap. CXXII.

*Corvus, et
græcus, et ja.*

*Indica, et
ja.*

*Indica, et
ja.*

IN avium genere, quibus unguis aduci, omnes carniore sunt: fruges au-
tem ipsæ etiam si in os indideris, nequeunt deuorare, ut genera a quilarū
omnia, malui, accipiteres: sunt tamen etiam in genere nō adunci, quæ carne
vescuntur, ut hirundines: alique vermiculis partim ex toto, partim magna
ex parte aluntur, ut fringillarum genera: alie spinā appetunt, & inter spinas

DE DIFFÉRENTIIS

De vocis discriminibus & coloris in avibus. Cap. CXXIII. E

Genus avium vocem mittere potest : & pleræq. vocem copiose emittunt : & omnium maxime animalium post hominem conciliende locutionis nonnullis avium generibus datum est, ex his videlicet quibus lingua mediocriter lata vel renuis. Quibus autem latorem habeant linguam quæ unguitus sunt adunca, tamen minores vocales sunt, magisq. garrulæ ac linguaciores : & circa eorum maxime talem fieri unâquaque auctioris est. Et alis in pugna vox, ut coccyzicibus : alis ante pugnam, ut perdicibus, dum suos aduersarios provocantibus cum uicere, ut gallinaceis. Canunt item nonnulli mares : perinde ut luxæ feminæ : sicut in luscinarum genere patet : femina tamen collat cantu, cum incubat, pullosq. educat. Sed in nonnullis generibus canus maribus tantum datus est, ut gallinaceis & coccyzicibus. Vox illa explanata, quam esse quasi locutionem diximus, differt quandoque etiam eorum quæ eodem genere continentur : avicularum enim nonnullæ hanc vocem eandem mittunt quam sui parentes, si præcepta paternæ caruerint educatione, moribusque & cæcis cæterarum avium insueverint. Lingua utuntur autem etiam ad sui sensus mutam interpretationem, sed aliæ aliis amplius, ut in nonnullis uel usus docendi maribus esse uideatur. nam enim luscina modulos suos pullos docere, uersûsque quos imitarentur, tradere uisa est. Immutantur aves nonnullæ per tēpora & colore & voce, ut merula, quæ ex nigra redditur rufa, & vocem mittit diversam : tardus colorem mutat : palumbes hyeme non gemit. Denique tunc maxime plurimæque emittunt voces, cum coeunt. Avium autem penè nullæ per ætates mutantur, ut aliorum animalium, peli, per terquam gruum, quas nigrescere in senecta perspectum est. At uero per affectus temporarios, quoties frigora urgent ætiora, penè uolucrum interdum è nigris aut nigrisfc ulis in albas transmutant corus, passeris, hirundinis. Temporum quoque uicissitudine bona pars avium ita colore immutatur, ut quædam sint lætore possint, nisi rem penitus noueris.

Ex incessu avium & volatu differentia, atque ex ualitudine moribusque. Cap. CXXIII. E

Omnes animalibus reliquis certas & unius modi in suo cuique genere ipseffus est : aves solè uario meatu ferunt, & in terra & in aere. Ambulant aliquæ, ut cornices : saltant aliquæ, ut passeris, merulæ : currunt, H ut perdicæ, rusticolæ : ante se pedes iaciunt, ut ciconis & gruces. Expandunt alas, pandensq. raro intervallo quatunt, aliæ cæcibus, sed & primas duntaxat pennas alæ & tota latera produunt. Quædam uero maiore ex parte compressis volant : percussq. se mel, aliquæ & gemino ictu aëre feruntur, uelut inclusum cum prementes. Iaculantur sese in sublime, in rectum, in prouum. Impingi putes aliquas : aut rursus ab alto cadere has, illas salire. Anates solæ, quæque sunt eiusdem generis, in sublime protinus sese tollunt, atque è uestigio caelum petunt, & hoc etiam ex aqua. Vultur & fete graniores, nisi ex procursu aut alio modo tumulo in massæ non evolant. Sine

*Alis pendit
signat.*

A uoce non uolant multe, aut è contrario semper in uolatu silens, subrecte, prone, oblique, in latera, in ora: quædam & resupine feruntur, ut si pariter cernantur, plura non in eadem natura meare uideantur. Iterum autem alie uolaces, quæ scilicet aliis grandibus atque ualidis sunt, ut quæ ungues *Alie uolaces.* habent aduncos & quæ carne uestiuntur: sed non modo quæ aduncis sunt unguibus, uerum alia quoque uolucrum genera uolatu superant, uidelicet ea quæ pernicitate uolandi sese tuentur, uel loca mutare solent. Sunt quæ non uolaces sed graues sint, quibus uita terrena est, & aut frage uiuunt aut *Alie graues.* natant, & apud aquas immorantur. Quæ longis cruribus insistantur non admodum uolaces fere sunt, & in uolatu porrectis cruribus in aerium uolantificuti & alie omnes quæ eandem pusillam gerunt, ut palmipedes. At *B* alie, quibus scilicet (ex his quæ pedes habent fillos) crura breuia sunt, hæc ad uentrem contractis cruribus uolant. Quæ longo sunt collo, si ad crassius habent, uolant collo porrecto, ut olor, anser: si tenue, collo curuato feruntur, ut ardeola. Calcitræ præ sua grauitate sunt ad uolandum ineptiores. Corpora unguinum exigua sunt exceptis alis contra quæ uolaces non sunt, his corpora euadunt in molem grandiorē: atque ita efficiunt, ut sint grandiores. Magnitudinem tamen auium minimam esse prope dictum, si ad alia respicias animalia, necesse est. Quod uero ad uoletudinem attinet, auiibus profunt squalores, tum ad ceteram sanitatem, tum etiam ad partum, & præcipue palambis: incommodi autem his anni pluuij sunt: quippe cum auium natura sit, ut ne bibere quidem largus possint sine detrimento. Cum *C* aues ægrotant, plumæ indiciunt præ se ferunt: turbantur enim, nec posituram eandem seruant quam habent cum recte ualent. Aduersus improbitatem alicui depascentium semina allium, inquit Plinius, quod in aeris sponte nascitur, (alum hoc uocant) coctum ne renasci possit, abicitur: statimque quæ deuorauerit aues, stupentes manu capiuntur. Mores autem ita habent, ut alie sese in puluere uolulent, alie sese lauent, alie nec puluere neque balneo utantur. Sunt pulueratrices, quæ non aliuole sunt, sed in terra uersantur, ut gallina, perdix, phasianæ, lotrices nonnullæ rectingues, & quæ circa fluuios aut paludes, aut mare uersantur. Aliæ utrumque tum lauare tum puluerare solent, ut columbus, ut passer.

D Eorum quæ in auiibus alimenti medicamentue rationem obtinent, discrimina. Cap. CXXV.

*A*uium genus omne carnem habet, quæ si cum quadrupedibus conferatur, & manus præstat alimenti, & facilius concoquitur: maxime uero perdix, anagenis, columbe & gallinæ. Turdorum autem caro merulinæque & auium minutarum (in quibus sunt quæ *μερίνα* uocantur) durior est: quibus etiam durior, turturæ, palumbæ & anatis caro est. Phasianorum auium, quod ad alimentum rationem attinet, gallinacæ carni similis est: sed suauitate præstat. paui durior, fibrosior, concoctiueque difficilior est. Perdix tamen & turtur, atque aliæ ad genus (si qua illis inest durities) cum uel uno die mortuæ assententur suspensæ, duritiem illam remittunt, fiuntque

fructibiles omnino & sanguinem procreant crassius, tenuitatemque mediocrem. E
 Probum gignit succum autem ferè omnium caro: earum tamen non par-
 ua est illis differentia, quòd in montibus locisque siccis degant: aut in flumi-
 nibus, stagnis, paludibus, lacustribusque locis uicinant: pro locorum namque
 ratione sicciores sunt carnes, extremisque magis uacant, & ad conco-
 ctionem faciliores: aut contra, humide extremosque, & concoctu dif-
 ficiliores. Itaque probum succum faciunt, ut gallinaceum genus, ita & pha-
 siani, perdices, artagones, columbae, merulae, turdi, turtures, atque ausculari
 genera. Excrementosa autem & deteriora earum caro quæ lacustribus pa-
 ludibusque locis ac fluminibus immundis & turbidis degunt. Alarum
 substantia in eis aribus quæ parua sunt & duræ fibrosa duraque est: at pin-
 guum uisumque autem facile concoquuntur, & optima sunt: sicuti P
 anasotum graciliorumque pessima. Viscera autem eandem habent ad
 carnes proportionem, quæ quadrupedibus diximus. Intestina omnium ferè
 ad cibum sunt inepta: at uentriculi & mandantur & corpus nostrum
 abundantius autem crassi durique & concoctu difficiles: qui tamen abunde
 nutrant, si probe fuerint concocti: nonnulli uero ex his sapore sunt suauis,
 ut anserum & altilium gallinarum. Cerebrum ex aribus longe præstantius
 est quam ex quadrupedibus, ut quod succius est, præsertim si montanae a-
 ues fuerint, quæ palustribus longe melius habent cerebrum. Oua cibos
 quor modis uentri nocui est. Nullus est alius cibus, inquit Plinius, quam ex-
 gritudine alarum neque oneretur: uinumque uinum usum & cibi habeat. Oua optima
 sunt gallinarum & phasianarum: anserum uero & struthocamelorum de-
 teriora. Oua quo recentiora eo præstantiora, sicuti quæ uetustissima eadem
 & pessima sunt: quæ uero ætate media sunt, proportionem recessus ab extre-
 mas bonitate aut siccitate prauitate inter se differant. & quæ oblonga sunt oua a
 gratioris saporis putat Horatius Flaccus. Ad concoctionem, digestionem,
 nutritionem, bonique succi generationem præstant, quæ *grauia*, id est tre-
 mula uocantur, quæ scilicet cocta quidam sunt, sed modice: quæ uero *leuia*,
 id est forbalia dicuntur, in aqua dumtaxat excocta, liquida adhuc & mu-
 me coacta densataque, minus quidem nutrant, sed alium magis mouent,
 ac gustus asperitatem, gulæque, nec minus uentriculi intestinorum atque
 uelut lenum stomachum tamen languidum subuertere solent. Quæ au-
 tem diutius cocta duriora euadunt, crassiores in ea procreant succum: diffi-
 cilisque concoquuntur, & tardius permeant: longe his duriora sunt ac tar-
 dius permeant, quæ in seruent cinere uehementer assantur. Omnium deterio-
 ra sunt, quæ in sartagine spissantur: unde & *uinea*, id est fixa appellatur,
 malum namque procreant succum, crassum atque extremosolum modicosumque,
 & qui reliqua quoque cibum in uentriculo corrumpit. Quæ *uinea* uocantur,
 hoc modo parantur: oua ubi oleo, gatto ac uino modico fuerint imbu-
 ta, in duplici uase supra ignem modice crasse scunt. Hæc & clausæ & assis
 meliora sunt, si ad mediocrem crassitatem peruenierint: nam & probum
 generant succum, & facile concoquuntur. Hæc consistunt modus in his em-
 oua seruandus est, quæ superne calidius infundantur: ne scilicet nimiam
 et asscant,

Oua.

*trouantur,
Tremula.
Oua forbalia,
Sic uocantur.*

*Tardius per-
meant, quæ
uinea.
Oua fixa,
uinea.
Oua uinea.*

Acrascent, sed dum adhuc liquida sunt, vas ab igne summouendū. Ovari si edatur in aceto coctū alui fluxiones desiccant: quod si austeri quippiam ovis addideris (quale rhus est, aut galla, aut balaustium, aut ad genus aliud) & super prunas frictis, efficacius sit medicamentū: & ad dysentericos hoc modo ocellis acōs, affectus efficacissime datur. Maceratorum in aceto moliri diximus putamen talibus cum farina in pane subactis, coeliaci recreantur. Quidam ita resoluta in panis torreni utrius putant: quo genere non alios tantum, sed & menses feminarum sustinentur si maior sit impetus, cruda cum farina ex aqua hauriuntur. Et per se lutea ex his decocta rursus in aceto, donec indurecant, iterumque cum trito pipere torrentur ad cohibendas aluos. Fit & dysentericis remediū singulare ovo effuso in fœchili. **B**uo, eiusdemque ovi mensura, ut paria sint omnia, melle, mox aceto, item oleo, confusus crebroque permixtus quo fuerint excellentiora, hoc praesentius remedium erit. Alij eadem mensura pro oleo & aceto resinā adiciunt rubentem, uiniq; & alio modo sperant, olei tantum mensura pari, pinisq; corticis duabus sexagesimis denariorum, unā eius quod rhus dicimus, mellis obolis quinq; simul decoctis, ita ut tribus aliis post quatuor horas sumatur ad poris & sanguinis excretionem ovi crudum cum porri sectius succo parique mensura mellis Graeci calefactū hauriunt. Ovo quoque toto crudo utitur admixto rosaceo ad palpebrarum, aurium mamma-rumque phlegmonas, & quae in partibus nervosis contingant, ut cubitis & digitorum tendinibus, siue in manibus siue pedibus exsint. Et ambulo-ribus, si statim imponatur, prodest, siue cōdidum ovi solum molli lana exceptum, siue etiam cum unello quis imponat: medocriter namque refrigerat ovum, & citra erosionem desiccant. Cōdidum ovi agere conoquitur tēperatura modice frigidam est, & mordacitatis expers atque emplastrum ophthalmiis, sedisq; ac pudendorum ulceribus medicamentum est idoneum: ambulationibus innasce pustulas non sinat, si qua imprimū eo perungantur: faciem à solis uestione tætur: frōti impositum, cum thure fluxiones arceat: inflammationes oculorum lana exceptū, addito rosaceo, melle & uino mitigat. Crudum contra haemorrhoidas serpens mori sumat: pīdū uero ad uestice rosiones resūq; ulcerationes datur: ad asperā quoque arterie scabritiem, sanguinis reiectionem, distillationes, thoracisq; fluxiones. **M**isctur quoque medicamentis sanguinis profluuium ex cerebri membranis quas meningas uocant, supprimentibus & ad ulcera malefica, cum us quae absque erosione exsiccant: qualia sunt pompholyx et metallica. quaedā elota. Vitellus quoque natura simili est: insecturque ceruus immordacibus, & cataplasmati: quae phlegmonas mitiget, ovis uidelicet aut elixis aut assis: sed paulo exsiccantior sit assis: quantumque siccitatis hoc modo habeat, tantum mitigatoris facultatis amittat. Luteum ovi, inquit Dioscorides, oculorum doloribus utile est, assum sedis inflammationibus prodest cum croco & rosaceo: & condylomatis cum meliloto: cum thoe culinaris aut galla in tartarene frigitur, & in cibo aluum sistit: ad idem quoque per se offertur. Prodest tussientibus, inquit Plinius, per se luteum denotatis h-

DE DIFFERENTIIS

quidum, ita ut dentibus nō attingatur thoracis distillationibus & fascium E
 scabrinę. Stomachum dissolutum cōstituit pulli oorum, gallę damodice
 ita ut ne ante duas horas alius cibus sumatur. Dār & dydentericus pullos in
 ipso ovo decoctos, admixta uini autem humana, & pari modo olei polen-
 tięq;. Membrana putaminis detracta siue crudo siue cocto, laborum fissu-
 ris medetur putaminis citus in uino potus, sanguinis eruptionibus. conhu-
 ri siue membrana oportet sic sit & densitatum. Fermentis putaminum tan-
 ta esse traditur, ut nec uin nec pondere ullo frangitur, nec nisi paululum in-
 flexa rotunditate. Et ne quid de sit ouorū grātę, cōdidum ex his admixtum
 calci uinę glutinat utriusque fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignum perfusum
 ouo non ardeat ac ne uestis quidē contacta aduratur. De gallinarum autē
 ouis fere tantum locum sumus, eam & reliquarum alium resane magnę P
 utilitates, sicut suis docemus locis. Adeps autem nonnullarū, ut anserinus
 & gallinaceus, roccis & sine sale cōditus, multę uisui prodest siue inuetera- 6
 tus, & qui temporis durtamitate acrimoniā contraxit, uisui inuicis est.
 Fel autem siccus atque acius est, quā sit quadrupedum.

1 Hos in loco *uagante*, in fallor, passeres uocant Galerus & Onbasier nec sicut
 Accius in Galeris. 2 Horatius, Longa quibus facies ouis est, illa memēto Vt fisci
 melioris, &c. 3 Hęc Diostorides *de aetate*, ad est ouis molliu uocat. 4 *Argenteo*
 qd. hęc uocat Serbus, nisi mendosus sit codex. 5 Gallinarū infundentes, Hęc *lysa* &
 uocat Serbus. 6 Autē adeps quo pacto curari deponi q; debeat, docet Diosc. & Plin.

De uinum generibus quę fillos pedes habent: & primo,
 de gallinaceo genere. Cap. CXXVI.

G

*Amad. de
 Molle.
 Argenteo
 de ly. & de.*

*Filipides.
 Dignata.
 2 uinum de.
 Gallinarum
 generis.
 Galina,
 Dracuncle.
 Gallus, galli-
 naceus.
 Gallinaceus.
 Capon.*

Volucrum prima distinctio pedibus maxime constat, aut enim digitos
 habent fillos, diētiq; fidi pedes, aut in palmipedum genere sunt, ut
 modo diximus. Inter fidi pedes uero, gallinarū plerumque agricolę cura so-
 lennis est. earum genera sunt, uel cohortalium, uel rusticarum, uel Africa- 4
 narum: cohortalis est auis quę uulgo per omnes fere uillas conspicitur: &
 ex tribus hisce generibus, hę proprię appellantur gallinę: mares autē gal- 5
 li, seu mares capi, qui hoc nomine uocantur cum sint castrati libidinis ab-
 olendę causa. Cum ceterę aues cristam gerant pennatū emittēna quadam
 exstructam, gallinaceus unus peculiarem sibi sortitus est cristam: sic enim
 institutam, ut nec caro sit, nec a natura carnis omnino aliena. Inglutit ha-
 bet gallinaceum genus præpositam uentriculo, & appendices quādi pau-
 cas uisā, quā desunt uiscerum. Coeūt & pariunt gallinę omni fere tem-
 pore: toto enim anno præterquam duobus mensibus brumalibus pariu-
 nt. Inhoerescunt a coeū, & se excubant: sepe etiam festuca aliqua sese iustit,
 quod edito ouo inter quum faciunt. Magna est generosarum nonnullis for-
 cunditas: quando oua uel sexaginta edunt ante incubitum; quanquam ge-
 nerositas minus ferunda quā ignobiles uulgarē & sunt. Nonnullę enim
 ē cohortalis his due pariunt. Iam aliquę in tantum copte perucierunt, ut
 effit ut breui morerentur. Hadrianus laus maxima. Hęc paruo quidem sunt
 corpore, sed quondie pariunt: serocuant tamen, & pullos sepe inueniunt:
 color his uariis. Ouum gallinę cōsistit a coeū, & perfcitur decem diebus
 magna

*Ostrea ha-
 druce.*

H

Amagna ex parte. Gallinarum iuvence pariant primæ, sterum uero incunet
& plura quam ueteres, sed minora. Sunt in genere gallinarum quæ pariant
gemina omnia (gemina uoco, quæ bene cõstant uiculis): quædã enim duo-
deuiginti peperit, exclusitq; gemina præterquam si quæ essent (ut sit) irrita.
4 Ceteris itaque geminis fortis prodijt, sed ita gemini excluduntur, ut alter
sit maior, alter minori: & tandem in monstrum degeneret, quæ minor
uicissime prodijt: aliqui negant omnino geminos excludi. Partium autẽ gal-
linæ oua nonnulla inferenda, uel eorũ quæ conceperunt coitum nullus enim
prouenit ex eis fortis, quamuis incubitu foueantur. Oua plena sint atq; uti-
lianæ ne, animaduerti auit posse, si demiseris in aquam: quod inanẽ, na-
tam plenum, desidis. Quæ (ut hoc intelligant) concipiunt, errare: quod in eis
B uicales uenas confundunt: quo fit ut non gignant, cõfusus scilicet uicibus
uenis. In his idẽ auit, cum ad lumen sustuleris: quod perlucet, id esse inanẽ.
Oua quæ incubantur, si habeant in se semen pulli, curator quatri duo post-
quam incubari cõperint, intelligere potest: si enim contra lumen cacami-
ne ouorum apprehenso, purus & unius modi perlucet color, sterilia et illi
manent esse, proque eis alia substitueda. Gallinæ quæ incubare uolũt (glo-
ciantur, *glociantur*) negant plus uiginti quinque oportere oua incubare.
5 Numerus autem ouorum quæ subiciuntur (ut præcipit Columella) impar
obseruatur, nec semper idem: nam primo tempore, id est mense Ianuario
(fere etiam cum primũ partum consummauerint, gallinæ incubare cupiẽs
ab idibus Ianuariis) quindecim, nec unquã plura subici debet. Martio de-
cem & nouem, nec his pauciora, unũ & uiginti Aprilis. Tota deinde æstate
usque in cal. Octobris, totidem postea superueniens est huius rei cura, quod
singulis quæ exclusi pulli plerumque intereant. Plerique tamen etiam ab æstiuo
solstitio non putant bonam pullationem, quod ab eo tempore etiam si
facilem educationem habent, iustum tamen nõ capiunt incrementũ: tan-
tũque minus, quanto serius prouenere: uerum suburbanis locis, ubi à ma-
træ pulli non exigua pretis ueniunt, nec plerũque intereunt, probanda est
æstiuæ educatio. Diebus quibus animantur oua, & in speciem uolucrũ cõ-
formantur, tet sepeotus opus est gallinæo generi. Verũ celerius excludun-
tur calidas diebus: ideo æstate unodeuicesimo die aut duodeuicesimo educũt
fit tum: hyeme uero aliquando uicesimo quinto. In gallinæo genere ma-
D ribus tantũ datur cibus. Hi, ut inquit Plinius, nostri uigiles sunt nocturni,
quos excitandos in opera mortalibus rumpendõque somno natura genuit,
norunt sydera, & ternas distinguunt horas interdum cantu. Cum sole eunt
cubitum, quartæque castrensis uigilia, ad curas laborẽsque reuocãt: neque
solis ortum uicantis patiuntur obrepes exiliũq; uenientem nuntiant can-
tũ ipsam uero cantum plausu latentem. Imperatũ suo generi, & regnum in
qua cunq; sunt domo, exercent: diuicatione patitur hoc quoq; inter ipsos,
nec finis sepe commorientibus. Quod si palma cõtingit, istam in uictoria
cantum, seque ipsi principes testantur: uictus occultatur silenti, ægrẽque ser-
uitutem patitur: nec in pugna aut ante pugnam cantũ, sed cum uicere. Gal-
linæ quoque cum mares uicere, cucurrit: & præterea ex cõplo marium ten-

*id est hora ter-
tia post meridi-
um, sicut in V
lib. 1.*

*Cucurrit, id est
currit.*

DE DIFFERENTIIS

tant superuacua coirectiffa etiam caudâque erigunt: ita ne facile prater-
ea fit an fecminar sint cognoscere: nonnunquam etiam calcaria parua iis e-
naſcuntur. Iam uero & mares uifi nonnulli ſunt, qui cum forte ſecmina in-
ueriffet, ipſi macticis officio ſurgerentur in pullos duſtando, ſouendo, edu-
cando, ita ne de cætero uel cucurire uel coare appererent. Quin & iam inde
â primo ortu nature ita nonnulli mares efformati proueniunt, ut neque

Capi.

ut ſint capi libidinis abolédit cauſa quod duobus ſit modis, humbis aduſtis
cadente ferro, aut unis cruribus, calcariſſimè, mox ulcere, dum conſane-
ſcant, obſito ſigilina creta: facilius ita pingueſcunt. In hoc uſſiano genere,
qui pro cæra corpora & animos ad prælia perſtinaces requirunt, iis præcipue
Tanagricum genus & Rhodium probant: nec minus Chalcidicam & Me-
dicum (quod ab impetuo uulgo litera mutata melicum appellantur) qui ſi-
ne dubio ſunt pulchri, & ad præſtandum inter ſe maxime idonei, ſed ad
partus ſunt ſteriliores: nam Rhodij generis aut Medici propter granita-
rum neque partes nimis ſalaces, nec ſecundæ matres. & Rhodæ aues ne
ſuos quide in ſecus commodè nutruunt, tantum abeſt ut alienos, ceu pa-
uoninos excludant. Tanagrici perunque Rhodius & Medicis amplitudi-
ne pares, non multum moribus â uernaculis diſtant, ſicut & Chalcidici.

*Tanagrici galli.
Rhodij galli.
Chalcidici galli.
Medici galli.
Medici galli.*

*Gallina fa-
cunda.*

At quibus cordi eſt induſtri paruiſſimæ uſe gal in ſuſtere, merari cer-
te nſi ſecundiffimas aues non expedit. Ex ſim rubicundæ uel ſuſcer plumæ,
nigriſque pennis, ac ſi fieri poterit, omnes huius & ab hoc proxima colons
eligantur diſt aliter, currentur albæ, quæ ſere cum ſint molles ac minus ci-
uaces, tum ne ſecundæ quidem reperiuntur atque etiam conſpicue ſunt,
propter quod uſigne candoris ab accipitribus & aquilis ſæpius abſump-
tuntur. Sime ergo matres probi coloris, robuſti corporis, quadratæ, pectoroſæ,
magnis capitibus, roſtris rutiliſque criſtalis, interdum geminis, albis cruri-
bus, ore rubicundo, & ſub hac ſpecie quædam ampliffimæ, nec paribus ungu-
lis: generoſiffimæque creduntur quæ quinos habent digitos, ſed ita ne cru-
ribus emineant tranſuerſa calcaria: nam quæ hoc uſile geſt uſigne, con-
ta max ad concubitu de dignatur admittere marem, carôque ſecunda, e-
nam cum incubat calcis aculeis oua perſtingit.

*Pluma ſuper
quatuor digi-
tis tranſuerſa
ſi uis.*

*Gallinae.
Pinguis ſi-
gi, inquit Var-
ro.*

*Varro. Cauda
magna & ſi
quatuor digi-
tis.*

Gallinaeas mares nſi ſa-
laciſſimos habere non expediatque in his quoque ſicut in ſecminis, idem
color, idem numerus unguis, ſtans alior quentur: ſublimis ſanguineusq;
nec oblique criſta, caudi uel nigricantes oculi, breuia & aduſa roſtra, ma-
xime candiſſimæ quæ aures, palpe ex ruſſo albæcentes, quæ uelut uncanæ
barbæ dependent: iubar deinde uariæ, uel ex auro fluxæ per colla ceruicisq;
in humeros diſfuſæ: nam lata & muſculofa pectora, ſacertos æque ſimiles
brachia, alæ tum proceriffimæ, caudæ duplici ordine, ſingulis utrinque
prominentibus pinnis inſeræ: quæ etiam ualſa ſecmina & frequenter hor-
tentibus plumis hætta, robuſta crura nec longa, ſed inſeſtis uelut ſudibus no-
center armata. Mores autem quauis non ad pugnam neque ad uſtorum
laudem præparentur, maxime tamen generoſi probantur, ut ſint elan, ala-
ces,

G

H

- Acres, vigilantes, & ad sepius canendam prompti, nec qui facile terreamur: nam interdum resistere debent, & protegere consuegalem gregem: quin attollentem minas serpentem, uel aliud noxium animal interficere. Talibus autem maribus quinar singulis formæ comparantur: cum Rhodij generis aut Medici tector singulis mariterant. Tanagræci plerumq. Rhodius & Medici amphitudoines partes non maleum moribus à uernaculis distant, ut dictum est, sicut & Chalcidici: omnium tamen horum generum nobis sunt optima pulli: nam & paternam speciem gerunt, & salacitatem fecunditatemque uernaculum retinent. Purniles autem, uidi quem humilitas earum delebat, nec propter fecunditatem, nec propter alium redditum nimium probo, inquit Columella, tam hercule quam nec pugnacem nec
- B**rixosæ libidinis marem: nam plerumque ceteros infestat, & non parum iniuri feminas, cum ipse pluribus sufficere non queat. Quod ad gallinæci generis morbos attinet, pituita ut nasci solet, quæ alba pellicula Pennis. linguam uestit extremam. Id porro usum maxime nascitur, cum frigore & penuria cibi laborant aues: eam per ætatem consistens in cohibitis aqua potatur: item cum ficus & uua immanata, nec ad sanitatem permilla est. Sub oculis etiam illis grana ipsa procedunt, quæ nasi aculeuiter apertis pelliculis auferantur, exinguunt. Pediculis quoque infestantur & cruditate, & à suo seduntur stercore, quod cum pedibus unctis adhaesit, podagram eruat. Cato gallinacea facile concoquitur, & probè gignit succum, neque crassum, neque tenuem, sed mediocrem: idq. tam ex mare
- C** quam ex femina. Gallinææ carnis usum ut quibus ratione uictus tenui opus est, exercitatus quidem non prohibeo, inquit Galenus, præsertim earum quæ in montibus fuerint educatæ: at qui se non exercent, ut gallinææ carne minus utendum est: aliam tamè gallinarum uel in tenui uictibus ratione uti licet: ut quæquam neque uiscera neque gallinææcorum testes huc dicitur sunt idonei. Uisceribus gallinæ & adhuc calentes appositæ serpentum moribus auxiliantur, quas tamè subinde mutare oportet: ut quoque ex iis potum præparare medetur, & in multis aliis usibus mirabile. datur in stomachi ardoribus. Alium soluit, inquit Plinius, ualidius è uetere gallinæco.
- G**allinarum uentorum ut simplex (ut docet Galenus) ad temperanda humorum uisum datur, sicuti ueterum gallinæcorum alui subducendæ gratia.
- D**Coquere autem eos oportet cum sale durissime: aliqui incoquunt brassicam marinam, mercurialem, enticum aut polypodium: crudos humores, crassos, lentos, melancholicos educit. Prodest longis febribus, asthmæ, articulariis morbis, & stomachi inflammationibus, (addit Plinius) torpèntibus mēbris tremulq., & capitis doloribus, epiphoris, fastidiis, incipienti renasmo, iocineri, ventibus, uetice, uentricus ex mustela syluestri factus cōtraurum est ut gallinææ ueteris large haustum: peculiariter contra aconitum. Gallinarum gallinæcorumque cerebrum in uino bibendum datur ad serpentum morbus. (Pardus gallinæ maluit cerebrum plagis imponeret) sanguine quoque à cerebri membrana profluente sistit. Contra phalangiorum omnium morbus remedium est gallinæum cerebrum cum pipetis exiguo potum

DE DIFFERENTIIS

in posca. Gallinam nam, saltem altitum, ventriculi alimenti bonitate su- E
 uatæque reliquarum aium omnium uentriculos superant, præterquam
 anserum. Quæ in gallinacei manus uentriculi parte anteriore cornu duri-
 tiem habet membrana, eadem inter elixandum separatur. Hæc, inquit Dio-
 scorides, membrana siccat, rpitæque in uino stomachicis bibenda datur.
 Ventrem gallinæ arefactum, inquit Galenus, si bibatur, stomachicos uia-
 re nonnulli prodidere: id quod nos uiam esse compertimus. Gallinaceo-
 rum uentris membrana, ut Plinius docet, inueterata & inspersa potioni, di-
 stillationes pectoris, & humidam tussim uel recens tosta lenit, & membra-
 nam è uentriculo gallinacei aridam, ac, si recens sit, tostam conterî & po-
 tionis inspergi iubent ad calculos pellendos. Gallinaceorum testes & si-
 pore sunt suauis, & optimum gignunt alimentum, eorum saltem, qui sagi- F
 nati fuerint: multoque maxime si ex lacte seroso alimenta illis præbeantur:
 quippe qui & plurimum nutriant, probumque generant succum, & conco-
 ctu faciles sunt. Gallinaceorum testes subinde, si à cœceptu edat mulier, ma-
 res in utero fieri dicuntur. Gallinacei dextrum testem arietina pelle adalli-
 gatum, uentrem concitare: contra, inhiberi uentrem pugnatioris galli testi-
 culis anserino adipe illius adalligatisq; pelle arietina tradunt. Adeps gal-
 linaceus inter fœculum & anserinum in eandem obtinet naturam. recens &
 sine sale conditus utriusq; prodest: sale inueteratus, & qui temporis spa-
 tio acrimoniam contraxit uulgaris itamicus est: conuenit & ad laborem ti-
 mas, & contra aurium dolores. laudant & gallinarum adipem contra pu-
 stulas in papillis: has scilicet eius res gratia saginant. Adunat misticæ & ru- G
 ptas oculorum tuniculas admixtis schisto & amatite lapidibus. Fel ad me-
 dici eius usum præcipuum est gallinarum & perdicum. Gallinacei fel alliga-
 tur ad argemæ & ad albugines ex aqua dilutum: item ad suffusione oculo-
 rum, maxime candidi gallinacei. Laudant & gallinæ fel contra pustulas in
 papillis. Gallinaceum finum ex aceto strumas discurit: carbunculos per tæ-
 put cum melle, huius semine & oleo subachamagni quoque ambustis in oede-
 tur. Gallinaceum finum duntaxat candidum in hyssopo decoctum aut melleo,
 uenena fungorum boletorumque adstringit item inflammationes ac
 strangulas, quod miremur, cum si aliud animal gustauerit ad finum, tor-
 minibus & inflationibus afficiatur. Alopetias celerrime explet gallinarum
 finum recens illitam. Finum quoque gallinaceorum duntaxat rubrum
 lasciosis allinendum monstrant. & finum gallinarum duntaxat candidum
 in oleo uetere cornesque pyridibus adferunt ad papillarum albugines.
 Non præteribo miraculum, inquit Plinius, quoniam ad medicinam non
 pertinet: uel auro liquefacti gallinarum membra misceantur, consumunt
 illud in se, ita hoc uenerum auti est: at gallinaceis ipsis circulo è sui mentis
 addito collo, nō canunt. De uillacis gallinis, quoniam uel nimium dictū,
 breuitate reliqua compensabo.

OEſophi part
 leſionem quod
 Plinius.

diuſiſſima
 diuſiſſima
 diuſiſſima
 diuſiſſima

1 Fidipedes, & ſimiliter: digitata vocat Plinius. 2 Cohortales uillacæ etiam di-
 cuntur à M. Varro. 3 Gallus gallinaceus & aliterque Greci uocant:
 gallinæ uero & aliterque & aliterque Anſtophanes Iudæi in comœ-
 dia

A dia dixit & *ἀδελφοί* utrunque conuenienter inueniunt, & pro manibus *ἀδελφοί* accipiunt. Hæc fere Helmontius. 4. Cæcis itaque ita loci hunc reddidit nobis Theodorius, melagaram Phœg lictis, ut uideretur, securus, quæ ita habet. Et geminos sepe excludunt, ut Cocceius Celsus auctor est, aliterum maioris, alio qui sequitur omnino geminos excludi. Verum quoque Aristoteles interpretes ex Arabico ita uenit ad eundem sensum. Et in quolibet inuenientem gemelli, & unus gemellorum partus est, & aliter magis: & multoties est partus monstruosus. Hæc ille. Græca uero Aristotelis exemplaria (nullam eandem subesse indicemus) ita habent *τὸ αὐτὸ ἐστὶ τὸ πρῶτον, καὶ τὸ αὐτὸ αὐτῶν, & ἡ δεύτερη πρῶτον ἔστι ἀδελφὴ, & ἡ τρίτη αὐτῶν πρῶτον*. In hoc est (ut ego arbitror.) E contra itaque gemina fecunda sunt, nisi quibus hoc contingit, ut alter maior fuerit, alter minor: ut inuenit tandem in monstrum degenerat qui minor nouissime procedit. Vix autem sententia fient tenor, indicabit experientia. Videtur certe Plinius uel ex professo cum Aristotele hac in re minime conuenire: quando Celsum auctorem non Aristotelem citat. Obiter & illud admovent, in quibusdam exemplaribus Plinius habet: (ut recte annotauit Clauindus) non alioqui, sed aliqui negare omnino geminos excludi. 5. Quæ quo pacto galli subicienda sunt & pulli educandi, docent Columella & Varro. 6. Varro adiuuantes calcaria ad infima crura usque dum rumpantur. Nec ad partuntur, inquit Columella, amissis genitribus, sed ferro candente calcantur uisus. 7. Gallinæ Medice, inquit Varro, primo dicebantur, quia ex Media, propter magnitudinem erant allata, quæque ex his generant postea propter similitudinem. 8. Harum affectionum curationes ab utroque inuenerunt, qui de uillariis passionibus scripserunt, ut à Columella & Palladio. 9. Quod Celsus dicit, *ἀδελφοί* & *ἀδελφὴ* Diofcorides, *ἀδελφὸν ἀδελφῆς* & *ἀδελφῆς ἀδελφόν*, alij aliter reddiderunt: adicent lectores, 10. Gallinæ autem quomodo coquendus est, ut insulum efficiat citius alius idoneum, docent Diofcorides & Plinius.

De gallinis ruficis, Africanis, melagrideque & pauone.

Cap. CXXVII.

Rufica gallina uocatur, quæ non dissimilis uillariæ per aucupem decet *Gallina rufica*. 1. *Rufica* estque plurima est in insula quam nauis in Ligustico mari sitam ⁶⁴ producto nomine alius, gallinariam uocitauerunt. Gallinæ ruficæ, inquit Varro, sunt in urbe rare, nec fere mansuetæ sine cauea uidentur. Romæ, similes facie non his uillariis gallinis nostris, sed Africanis aspectu, ac sacre incontaminata. In ornantibus publicis solent poni cum pituitas ac merulis affusæ, item aliis id genus rebus inuitatis. Neque fere in uillis ouis ac pullos ⁶⁵ faciunt, (in seruitute enim non fortant) sed in syluis. Africana est quam plerique Numidicam dicunt, meleagridi similis, ut sentit Columella, nisi *Gallina africana Numidica*. 2. Quod rusticam galeam & cristam capite gerit: quæ utraque sunt in meleagride cærulea. Et gallinarum Numidicarum eadem est fere quæ pauonum educatio. M. autem Varro, Gallinæ, inquit, Africanæ sunt grandes, uariæ, gibberæ, quas meleagrides appellant Græci. Meleagrides in Beroia putant, inquit Plinius, Afriæ, hoc est gallinarum genus gibberum uariis sparsum plumis. Hæ nouissime sunt peregrinarum auium in mensas receptor, propter ingratum uirus: uerum Meleagri tumulus nobiles eas fecit. Et uenerunt propter penariam magno. Porro meleagrides ita describit Cytus Aristoteles discipulus magnitudine ut sint gallinæ generosæ, capite ad portionem corporis paruo ac glabro, in quo crista carnea rotunda & producta, quæ paxilli in mo tem promineat, rostro ligneo. Ad alas *ab ore* ortam ca

runculam habent longam dependentem, rubicundiorē quā in genere E
 gallinaceo. Quod autem in gallinis rostro adhaeret (*rostrum* vocat Græci, La
 tina palcam me unimur) meleagrides non habent. rostrum acutius & ma
 ius quā gallinæ, cervice crassior breviorque & nigra, corpus frequenti-
 bus varium maculis in nigro candidis, maioribus lenticulis: & alæ ipse us-
 ririgæ, serrata specie digestis in quendam versum maculis. crura sine cal-
 caribus, cætero similia gallinaceis. loci gaudere paludosis lacustribusque.
 Feminae matibus adeo similes sunt, ut vix distinguere genera possis. Hæc
 Clynus. Hæstrus tradit meleagrides à nullis viribus quæ aduncæ sunt ungui-
 bus volari. Ova generant meleagrides punctis distincta. pullos suos velut
 perose negligunt. At contrā pavones feminae sua sponte studiosius pul-
 los enutriunt. Hæ sine custode tuto vagantur in aiorēque pabuli partem F
 sibi & pullis acquirunt. Hoc genus autem cum trinasum expleat, optime
 progenerat. siquidem tenerior ætas, aut sterilis aut parum fecunda est. hoc
 tempore & colores penarum varios recipit. comus vere & partus brevis à
 contrā agitur: itaque post admissuræ tempus concessim matricem custodiend-
 æ sunt, ne alibi quā in stabulo fertur edant: maximeq; temporibus quib-
 us parturunt pluribus stramentis exaggerandum præcipiunt aurium,
 quo tuus integri fetus excipiantur. Nam sæpe pavones cum ad nocturnā
 requiem venerunt, periculis insistentes enutuntur ova: quæ quo propius ac
 mollius ce ciderint, alibi ætam servant integritatē. Excludit pavo diebus tri-
 centis aut paulo tardius. semel tantum modo anno parit ova duodecim, aut
 paulo pauciora: nec continuatis diebus, sed binis ternisve interpositis. per- G
 mpare octona maxime edunt. Hæc Aristoteles. Pavo inquit Plinius, parit
 primo anno unum aut alterum ovum, sequenti quaterna quinque, cæteris
 duodena non amplius ætatem, ut alij tradunt, feminae quæ non incubant,
 ter anno sæpe partus edunt: at quæ fecerint ova, totum tempus fecunditatis
 aut excludendis aut etiam educandis pullis consueverunt. Primus est partus
 quinque sæpe ovorum, secundus quatuor, tertius aut triem aut duorum ef-
 se consuevit. Irrita & subventanea illa pavones etiā pariunt. Mas dum fer-
 mina incubat advolans ova frangit, desiderio incubatum: quæ propter no-
 ctu & in laetibus pariunt & eam curatores gallinas subiaciunt incubanda
 ova pavonina. Pullos præterea suos mares persequuntur velut alienigenas
 priusquam illis constiterit nascatur insigni: erunt enim pavoni in capite
 exant arbuticula. Vivit pavo annis viginti quinque. Colores incipit ser- H
 re in trimatu. Amittit penas cum primis arborum frondibus: recipit cum
 germine earundem. Cauda, quæ pavoni magnus est, etiam decidua est, & u-
 teraq; ob causam nullus in volatu usus. Hinc una natura formæ è volu-
 cribus dedit palmamentæ id quidem corporis specie, sed penarum pulchri-
 tudine. Mâculus pavo gallinaceam salacitatem habet: atque ideo quinque
 feminas desiderat. Porro signa sunt extimulæ libidinis, cum semper plūm
 (adverso maxime sole, quia sic fulgentius radus) veluti mirantem, cū de
 gemmantibus pennis protegit, & singularum capita oculata pennarum lo 4
 cis suis erant, cum stridor e procurrent. Id cūda, ut modo diximus, amif-
 ſa cum

Pavo.
 Penas.
 Tada.
 Tada.
 Tada.

Asa cum foliis arborum, donec renascatur iterum cum flore, podibundus ac merens quære larebram. Vicia quæ gallinaceo generi nocere solent, eadem has aues infestant. Sed nec alia remedia traduntur, quàm quæ gallinaceis adhibentur. Pavonina caro dura est fibrosâque, & concoctus difficilis. Pavones suum suum (cuius est ad oculorum vicia usus efficax) resorbere tradunt, insidentes hominum utilitatibus. In India gallinacei nascuntur maximi, qui cristam habent non rubram ut nostri, sed ita variam & floridam, quemadmodum coronam ex floribus cōcictam. Pennas posteriores minime inflexas habent, neque in orbem revolutas, sed laticas, quas cum nō erigunt, ut pavones trahunt, eorum pennæ smaragdi colorem gerunt.

Gallinacei Indici.

B 1 In mari Tusco, inquit Varro, & secundum Italiam contra montes Ligusticos. 2 Numidæ, inquit Plinius, in parte Africæ Numidæ. 3 Corpus frequentibus, Si cui contrigerit emendator Achæni codex, hūc locum legas græce, quem nos ob exfplaria mædosa totidē verbis exprimere non posuimus, comedata nostra continem, una cum Hermodali interpretatione. 4 Hæc facillissime expressit Lucretius lib. 4.

Caudæque pavonis larga cum luce repleta est,
 Consimilimur ratione obversa colores;
 Qui quoniam quodam gignuntur luminis ista,
 Scire licet sine eo fieri non posse putandum.

De columbaceo genere.

Cap. CXXVIII.

Columbarum possessio non abhorret à cura boni rustici: nam fortunatitas quamvis longe minor sit, quàm est gallinarum, maiorem tamen refert quietem: nā & octies anno pullos educat, si est bona matrix, & pretiis eorum domini complent arcam, sicut eximus author M. Varro nobis affirmat. Quæ proprie columba vocatur, (sunt enim columbacei generis species plures) duo continet generatū agreste, ut alij dicūt, saratile, quod habetur in turribus ac columinibus villæ. Hæ propter timorem naturalem summa loca in tectis occupant: & in turres ex agro volant suapte sponte ac remeant. Alterum genus columbarum est elementius, quod cibo domestico contentum, intra limina ianuarum solet pasci. hoc genus maxime est colore alboullad agreste, sine albo, vario: quisquam in India luteas esse columbas sentit. Ex his duabus stirpibus fit miscellam tertium genus fructus cau-

Columba.

Columba.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Columba domestica.

Dicatque incedunt in locum unum, quod aliqui vocant *agreste*, alij *agreste*: in quo uno sepe uel quinque milia sunt inclusæ. Columba utraque palpebra coniunctæ. Lienem habent paruum, adeo ut prope modum frangere effragat. vesica bilis in columbis non rectori adheret, sed aut uentriculo aut intestino. Vētriculum habent calidum columbæ, & facultatem concoquendi maximam. Coenit intra autum columbæ quippe quæ semestres nosse incipiunt uenerē: uel, uti Plinius tradit, quinque mēstres scētificant. Columba proprio ritu osculantur ante coitum & nasi ante mutuo osculēntur, mas non ascendit: sed iunior sit an senior interest: senior enim primum coitum osculo exceditur, sequentem & sine osculo agitur iunior quoties libet coire, toties osculari. Igitur hic ritus columbarum proprius

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

Columba agreste.

DE DIFFERENTIIS

est atque etiam ille, ut feminae saliant, ac supergressu motuo agant, si mas E non sit, & cum osculo ut mares: & quantum nihil altera emittat in alteram, tamen plura sic ova quàm ex maris coitu pariant: uerum nullus ex his enascitur pullus, sed sunt omnia irrita: quanquam & nonnunquam ova infecunda & irrita etiam ex maris coitu cum feminae proveniant. Columbae ovum paucioribus quàm decem diebus à coitu consistat & perficitur: & pariunt, inquit Plinius, à coitu die quinto. Pariunt fere bina ova: ac mare semper & feminam patiunt, priorem marem, posteriorem feminam: etenim cum pepererint primum ovum, uno interposito die secundum pariunt. Pariunt omnibus anni temporibus, pulloque educant, si locum apicem habeant & cibum: sin minus estate tantum ferant. Sed proles periculatissima vere & autumnus est: deterrima æstate & omni tempore calidioris. Facultas F columbis retinendi ovi, etiam tempore parturiendo est: nam si ab aliquo vexetur, aut penna in nido emissa, vel quavis alia te infestet, aut etiam sponte morosus habeat, ovum per tristitiam reuertit, partumque differt. Nihil columbis fortitius: pariunt enim decies anno, nonnullæ undecies. Egyptiæ vero & duodecies. Et æstate quidem interdum binis mensibus verna edunt pariamque decimo octavo die excludunt, statimque concipiunt: quare inter pullos sæpe ova inveniuntur. & alij prouolant, alij erũ- 3 puit: pulli autem cæci procreantur. Diebus circiter quadragenis concipit, & parit, & incubat columba: & hoc fere totum annum faciunt: tantummodo intervallum faciunt à bruma ad æquinoctium æternam. Incubant in hoc genere ambo uicissim, interdum mas, noctu femina. Excludunt uicesimo die, aut citra uicesimum diem ovum quod prius ediderint. Perforant ovum pedie eius diei, quo pullum excludunt: & fouent prolem ambo ad certum tempus, eodem modo quo ova. Quis etiã feminam parturienti mas adest, & cultu omniq. officio fungitur. Sæpe etiam feminam pignus euntem ad nidum propter partes laborem mas percutit, cogisque intrare. Exclusis iam pullis, alimentum illis parat, quod premanducatum, in eorum os inferens suum, ingerit, atque ita præparat ad cibum recipiendum. Pullis primo salivam rectam collectam gutture in ora inspuunt, perparantes tempestiuitatem cibo. Ius magna ex parte columbae mutuo degunt amore, ut neque cum pluribus coire uelint, neque coniugium iam inde à primo ortu initum deserant, nisi carbo aut uidua: sed interdum tamen nonnullæ etiam ex maritatis cum aliis coeunt. Pugnat hoc animal est: alter alterum infestat, audumque alter alterius subit, sed taros nam etsi ex longuquo minas, tamen apud ipsam nidum summo certamine dimicant. Columba acci generis proprium esse uidetur, ne collum cum bibant resupinat, nisi satis hauserint: & ut large bibant in minorum modo. Fragibus uictit: columbae uicinitatem uel ad octauum annum. Fertur à columba quodq. accipitrum genus cognoscere: & cum accipiter prouolat, si sublimi petita est, manent quo confuturine loco: sed si humiliter qui prouolat est, non manent, sed continuo uolant. Cum autem mos sit, ut alie sese in pulvere uoluerint, alie sese lauent, alie nec pulvere nec balneo utantur: columba utroque

tum

*Atque sic ut
Postremo fere
ad, inquit Pl.*

A tum laiare tum puluerare solēt. Multinaga aut columbazellā, aut illis inter se blandiri, & corrumpere alias furtōq; comitiores reserui inducunt, & que alas in culumbarum, si cumino pascantur assidue. Columbarum caro facile concoquitur: succum efficit crassitie tenuitateque modicere. Præstantior autem est earum caro, quæ in turribus deguit quàm domesticarū: ex quibus nō nisi modice degustare expedit us, qui exercitio minime utitur, sicuti nec ē gallinis. aumliarur contra serpentum morsus columbarum caro recens cōcepta. columbae sanguis cruorem ē membranæ cerebri erūpentem cohibet. Columbinum simum quod à colūbis agrestibus redditur, exsalfacit & urit, miscentisq; uice napyos cum semine nasturtij saccū confusum erubescitq; adea quæ rubescit desiderat: quales sunt diuturniores

B affectus, seu cotostictici morbus, hemocrania, uertigines, scotomata, cephalæ, & laterum, scapularum, ceruicis, lumborum inueterati dolores: nephritides & cœliaci dolores, podagræque & anthrudes, quæ nondum poros in articulis contraxerint. Columbinum simum ex aceto strumas discutit: madatur & ad argylopos, & albugines, & cicatrices carbunculos pertrahit cū melle, lina semine & oleo subactumagni quoque ambustus medetur. Simū columbinum cum oleo & uino potum uenerē inhibet: sed si lutea ex ouis quinque columbarum, admixto adipis sulli denarij pondere ex melle socbeantur, uenerem concitare feruntur. columbarum syeistrium simum per uicem contra argenti uini potum ualet. Genera columbarum quinque nū *Columbaros* metantur: quæ proprio nomine columba uocatur, palumbes, cenæ quæ *gymna*.

Cuinago, pelias quæ lina à nonnullis uocatur, & turturan his palumba, turturans & columba sanguine utuntur medici ad recentia oculorum uulnera, ad oculos cruore suffusos atq; lusciosos. In columbas masculi sanguinem efficaciorē putant: uena autem sub ala ad hunc usum inciditur, quoniam suo calore uim est. superimponere oportet splenium ē melle decocto, lanāque succadam ex oleo & uino.

1. *regēne*, nonnunquam à Galeno, a thuror, uocatur & uis *est à regale*. 2. De *comparatione*; *regalis* *regis* = *est d.*

Pluma columbarum quo pectus in sole uidetur

Quæ sita ceruicis circum, collūmque coronat

Nanque alias sit, uti clare sit rubra pyrrope,

Interdum quædam densa sit uti uidetur

D Later ceruleum uirides mactere smaragdos. 3. Columba cum peperit, in-

quit Athenæus, postmodum marem reperit. 4. Colūba extra dies ingens, inquit An-

istoteles, prole expedit superiore patre. 5. Nā si in haurient, *lās ad lās* *ad uis* *ad uis*

Theodorus ueneris interpreti, quouique eis sufficit. Suspecta molu uidentur hoc in loco

exemplum Aristotelis. 6. Hæc Galeni est sententia: Sine ex Arabum schola, qui

tradant corpora pullo tum columborum esse uide digelionem, & longe more in sto-

macho: Rallus uimen, columbus, inquit, leus est cibus, & fabula. Et uerum, est cibus

mirabilis ad caliditatem declinans.

De palumbo, cenade, peliade & turture.

Cap. CXXIX.

Palumbes

I Not columbarum genera maximo corpore est palumbes: quippe quæ *Palumbes*, nonnullis locis gallinacum æquet magnitudine. Colorē habet cinereū: *est d.* *est d.* *est d.*

DE DIFFERENTIIS

caput suboceruleum purpureumque: & nigrum oculi rotundissimum. In-
glutinem habet præpolatam uentriculo. Cantus in hoc genere omnibus si-
milis atque idem ternis conficitur uersis, præterquam in clausula gemitu,
hyeme mutis, uere uocalibus: hyeme namque nõ gemit palumbes, nisi quod
aliquando ex aspectu hyeme, cum placidum tempus succedisset, gemut
utad quod apud petros in admiratione habuim est: ceterũ inuunt uere
gemere incipit. Camposum incolæ palumbes est. Cuius tempore testes pa-
lumbi magnitudine insignes, aliis utro parui & omnino obsecuti, ita ut hy-
bernis me nũbus ne ullos quidem testis in his haberi nonnulli arbitrentur.
Palumbes & turtures rurestres coire fortificatęque aliqui referunt, argu-
mento quod larga eorum copia est. Gerũt utrum decem & quatuor die-
bus, ac totidem aliis incubant: & totidẽ alius fetus ita uoluerit sit atq, perfic-
itur, ut uix possit apprehendi. Bina parit ova palumbes & turtur, & cum
plurimum renasced nunquam plus duobus pullis educunt: nonnunquam
etiam unum tantum inter laqueum eorum semper irritum est. Pariunt autẽ ue-
re, nec plus quã bis: itaque ita si prior fetus corruptus est: pullos procreat
imperfectos. Incubant tempore palumbium femina incubat à postmeri-
diano incipiens, totęque nocte & usque ad tempus senaculi perseverans:
in reliquo tempore munus idem. Mas subit dignoscitur autem mase an fe-
mina sit, haud facile est, nisi interiorum aspectu. Collum cum bibit non re-
supinat palumbes, nisi satis hauserit. Mare uno contenta & turtur & palũ-
bes uix, nec alterum recipit: nidulicũque & palumbes & turtures sem-
per locis eisdem. Secum mares in aliis fere animalibus diuturniores quã
feminae sint, in his matrem prius quã feminam mori nõ ualli. uant. Vi-
uere autem palumbes ad tricesimum annuũ, aliquos ad quadesagesimum
Aristoteles auctor est, uno tamen incommodo unguium, eodem & argu-
mento senescit, qui citra perniciem reciduntur. Pro sunt squalore maxime
palumbis. Horum aliqui latent, aliqui non latent, sed cum hirũdibus ab-
eunt, nec hybernare apud nos patiuntur: aliqui tamẽ semper uisuntur. Vo-
lante gregatim tum palumbes tum turtures cum accedunt, & cum suo tem-
pore abeunt. Palumbium caro durior est, quã sit columborũ, turturum,
rurdorum, metularũ aut patularum auum: estq, concoctu difficilis
excrementosęque. In cõtractione ueruorum caro palumbina in eibis pro-
dest & inueterata in aceto decocta dysentericis & cathacis medetur: e po-
sea uero ileon & tormina sanat. Palumbi sanguine urineue medici ad ocu-
lorum uitia, ut in columbis indicauimus. De palumborum esurita cecinit
Martialis coquus,

Inguina torquati tardant hebetatęque palumbi.

Non edas hanc uoluerem, qui cupit esse salax.

Secũdum magnitudinis locum in columbaceo genere ternas obtinet, id est
uimago, paulo maior quã columbus, minor quã palumbes est. Aurino
potissimum & conspicitur & capitur. Modus maxime capiendi eam, dum
se in aquam bibendo propender, uenium ad noctes loca, cum iam fecerint
prolem. Frugibus quoque uixit ut columba. & bina parit ova. Dixerim
certo

*Pariũt, inquit
Plinius, palũ-
bus post solis-
um.*

*Palumbi
turturum.*

*Circũ, uimago.
Aurino uo-
uũ conspicitur
inquit. Albe-
reant.*

A certe genus à columba peletas est, id est luia; quippe quæ minor quàm columba sit, & minus panens manifestare. luet etiam plumæ & pene nigricant, & pedibus rubidis scabrosisque est, paruaque adeo, ut nemo id genus alere uelit. In ludis luia columbæ uirides pennas habet, ut primo aspectu, si quis in animæ cognitione rudis sit, pitacum nō columbam dicat. Rostri illis & crur. Græciæ perdicibus sunt similia. Discedunt hyeme luia, nec
 2 apud nos hybernare patiuntur: plurimam curæ proli impendūt. Minimum in columbaceo genere turtur est, colore fere cinereo. Frugibus uiuunt turtures, bibunt, coeunt, gerunt uterum ac pariunt, nō aliter atque de palumbis diximus. Degūt æstate locis frigidis, hyeme tepidioribusque æstate tantum apparet turtur hyeme se cōdit aut discedit, nec enim hybernare apud
 B nos pōtuit: nemo enim, prope dixerim, uidisse per hyemem uspiam turturē dicitur. Latere autem incipit præpinguis: & quanquam pennas in latebra dimittit, tamen pinguedinem seruat. Volant gregatim cum accedūt, & cum suo tempore abeūt. Turtur cum nocem reddat, pars nouissima alui uehementer citatur, uentisque nonnunquam crepitus alui. Turnaris caro difficilior quidem concoquitur quàm columbarum, tardorum, merularum aut paruarum autum: succum tamen probum gignit, si recte concoquantur. & temperatura sicca turtur est, præsertim si in locis montanis uideantur. neque recens inactata edōda eius caro est, sed ubi uno, minimum, die adseruata sin sit enim hoc pacto, ut & minime dura euadat, sed firabilis iam, & omnino uicio careat. Turturis sanguine utuntur medici ad recedua
 C oculorum uulnera, ut in columba dictum est: sinum turturis albugines externat. Turtur cum pyrali pugnat, locas enim pascendi uictasque idem eorum tradunt. Turnar quoque & choreus pugnant: & occidunt à choreo turtur.

*Pyralis.
Choreus.
Choreus,
Larus.*

1. Palumbes Italiam autumno relicturæ, quoniam pasto capiuntur, explicat Bōdus in regione Lenna. 2. Plurimum curæ: Vide in hoc intelligat Oppianus de columbis: cum id significat, nōnunquam apud poetas. 3. Turtur uere occiditur, inquit Plinius, gennasque amittit. 4. Turturis quo pasto capitur canis & salutaris, legas apud Ælianum.

De phasianæ, tetræ, erichtræ, onide, & oto. Cap. CXXX.

1 GALLINAM phasianus alimēti bonitate cōcoctionisque facilitate æquat, Phasianæ.
 D suauitate uincit. Auis est minime altiuola, sed terrena & pulueratris. Phasianæ.
 Phasianæ in Colchis geminas ex pluma aures summittunt subrigisque
 2 corniculis similes. Oua pariunt punctis distincta. Phasianum Epænetus ta-
 tyras, Ptolemæus tetarion uocari dicit & tetraona: nam tetraz alia auis
 est, & tetrix itē alia. Tetraz, ut Alexander Myndius author est, auis est ma-
 gnitudine spermologi, colore fighoo, sordidis quibusdam maculis lineosq,
 3 magnis uaria: frugibus uescitur, & quando peperit, quadruplicē emittit
 uocem. Tetraz altera gallinaceum maximum superat magnitudine, specie
 porphyrio similis ab auribus utrinque palex dependit, ut in gallinæco:
 uox illi grauis. Tetrix quam Adhæmensēs iragem uocant, nec tetraz nec ar-

*Tetrax alimēti.
Tetrix,
arion.*

DE DIFFERENTIIS

boni suum nidum committit, sed franci &c non aliter atque alauda nidum E
Erythronas. parere auge capit. Decet Erythronas suus minor, absolutique nigres, in 4
 supercilii cocci rubor. Alterum eorum genus ualcarum magnitudine ex- 5
 codit, quorum & colorem reddit nec ulla ales, excepto struthocamelo, ma-
 ius corpore implens pondus, in tantum ancta, ut in terra quoque immobi-
 lis petebatur. Gignunt eos Alpes & septentrionalis regio. In iuventus sapo-
 rem perdunt morumque contumacia spiritui reuocato. Proxime eis sunt ter-
 tium scilicet genus quas Hispania aues tardas appellat, Græci otidas, dāna-
 ras in cibis emissa cum ossibus modula odoris ædnam exemplo sequitur.
Aus tarda. Otides in Hispania frequētes, inquit Strabo. Otides, ut authores sunt Xeno-
Ota. phon & Plutarchus, carnem habet suauem, & facile capiuntur. Sunt autem
Ota. otides (quos & *otē* uocant) aues parum uolaces, & quæ uolando cito defici- 6
 unt, non aliter atque perdices. Imitatrix hæc aus est, eorum præsertim
 quæ ab homine fieri uiderit, ut eadem quoque facere conetur. Aucupes in
 aduersum earum stantes, pharmaco quoque oculos suos inungunt, un-
 guento alio quod oculorum palpebras obglutinet, haud procul inde in ua-
 sculis apparatus quod aues conspiciant idem facere teneant, medicamento
 ex uasculis accepto utiq; facillime apprehenduntur. Ales magna, ovis otā-
 ne est: & tricenis diebus incubat. Gula eius tota ampla est & latæ angusties
 nulla. appendices habet paucas quasdam infra quæ desinit in cæcū. Fi-
 dipsus tribus insidens digitis, magnitudo dunc gallinæ grandior, colore co-
 namis capite oblongo, oculis amplis, rostro acuto, lingua ossea, gracili col-
 lo. Equis mitem in modum delectari fertur, adeo ut si quis pellem equinā G
 sibi induat, eo pacto quot libuerit capere possit nonnulla *uocatur*. Ut &
 uero alij ones colūba est magnitudine noctuæ similis, nō tamē aus noctur-
 na) pinnulis circiter aures eminentibus præditus, unde & nomen illa, quasi
 aurium dicas nonnulli nyctecoraca eum appellantes quidam latine & alio- 7
 nem uocant. Hominum hic imitator in omnibus est saltatres quoque imi-
 tatur, & capitur haud difficulter, ut noctua, inter salandū intensus ex imi-
 tandi uoluptate in alterum aucupem, altero circumuenit, aut clanculum à
 tergo stant. Ducem se præbet onis cotumicibus aliò migrantibus. *Ota* &
Ota. (quas & *otē* uocari tradit Galenus) caro media est inter gruum carnem
 & anserum, non tam dura scilicet acque fibrosa quàm sit gruum caro. Ex-
 crementosa est, ac proinde uitanda in qui salubri, id est tenui uictus ratio-
 ne uel uolent.

Phasianus : Gallinæ, *Phasianus* quæ uocatur nonnulli Pollux & Ascanus. 1. Marmar. lib. 11:
aus, hircus Argus primum sum transportata carina:
maris. Ante mihi nocum nil nisi phasianus. 2. *Phasianus* in quadri-
 partita. 4. Alij legunt ipse Plinius tetragonus, alij tetraconus, alij straconus.
 5. Alterum genus. Hæc scilicet ovis est Galeno atque Aristotele: eos Athenæi
 de quibus mox dicitur. 6. Otus, Phinus, Bubonemator est, noctua maior. 7.
 Pennatorum animalium, inquit Plinius, bubonematorum & oto plume uel auro.
 8. Videtur ex Aristotele hoc loco quod necesse habeat ungues: suum enim adiun-
 git: Omnes uero aues ungues, &c. Considera.

De coturnice

A De coturnace, perdice, galerita, & aliis id genus quibusdam terrenis grauioribus. Cap. CXXXI.

Coturnices agere uolant, propter sui corporis pondus sunt enim corpore grandiores, quàm ut suis pennis deferre possint, uociferantq; ob eam rem cum uolant, laborant enim quasi oppressi onere. Parua autem coturnix est: cui præ cæteris hæc propria habentur, ut & ingluuiem infra amplam, & gulam prope uentriculum amplam & latam habeat. Fel alius earum ueneri, alius inestimo adheret. Femina coturnix, ut auctor est Alexander Myndus, colli habet gracilissimq; sub mento nigra illa adfunt quæ maribus & si dissecantur, ingluuiem inueniunt non adeo ampla, cor uero magnum, & fel intestinis adnexum. Testes maribus sub rectiore continentur, ut in

Coturnice
Græci.

B gallinæis. Nunquam in arbore, sed humi consistit coturnix, & humi nidulari, sicuti & perdix & reliqua generis eiusdem, quæ scilicet ues grauiiores sunt, & non alte uolant. Nidos autem non faciunt, sed facta in aprico area, atque uestribus quibuslibet & materia huiusmodi cõgestis, quoad accipitrum & aquilarum insuetudinem deuitare possint, oua edunt & incubant. Mox cum excluderint, protinus pullos educunt, propterea quod nequeunt suo uolatu eis cibum administrare. Resouent suos pullos sub seipias ducendo more gallinarum & coturnices & perdices, nec eodem loco & pariunt & incubant, ne quis locum percipiat longioris temporis mora. Mares cum diffugerint femina ut incubet, tam ululant, clamant, pugnamque inter se conferunt (hos autem ~~græci~~ uocant, id est celibes) qui autem uictus fuerit, sequitur uictoris uenerem patiens. uerum hoc non ita fieri semper, sed

Perdix.

In aprico, ut
Adu.

C certo tempore anni planum est, usque adeo tum perdices tum coturnices eopia libidinis gaudent, ut in aucupantes coeuant, & septennumero capitibus eorum residant. Coturnix uel in pugna ipsa garrula est, & ante pugnam mares cantant. Coturnicibus ueratri semen gratissimus cibusequum ob causam eas damnare in mensis, simulq; comitalem propter morbum desputuctum, quem sole animalium sentiunt præter hominem. Adeo tamen palans uidentur græte, ut in auarus pastre pinguesque ueneant care, sicuti & que miliaris dicantur. Discedunt coturnices mense Augusto in calidiora loca, nisi pauci locis apticis remanserint, & pinguioribus per id tempus capiuntur. Et cum ad nos redeunt, aduolant gregatim non sine periculo nauigantium, cum appropinquante terris: quippe uelis sipe insidit, & hoc semper noctu, merguntq; nauigia. Iter est his per hospina certa. Austro nõ uolant, humido scilicet & grauiore uento: aura tamen uelu uolūt, propter pondus corporum uirisque paruas. Aquilone ergo maxime uolant. Cum ad nos ueniunt, aerelestres potius quàm sublimes, & sine ducibus pergunt:

Archieus.

D uiganeum, cum appropinquante terris: quippe uelis sipe insidit, & hoc semper noctu, merguntq; nauigia. Iter est his per hospina certa. Austro nõ uolant, humido scilicet & grauiore uento: aura tamen uelu uolūt, propter pondus corporum uirisque paruas. Aquilone ergo maxime uolant. Cum ad nos ueniunt, aerelestres potius quàm sublimes, & sine ducibus pergunt: ut cum hinc abeunt, ducibus oco & lingulata & ortygometra præbetuntur, atque etiam cenchramo, qui eas noctu hortatur, excitat, admonetque itineris, persuetantiorque scilicet peruenire ad expertas sibi terras. Huius uocem cum senserint aucupes, antelligunt parati discessum. A coturnicibus magnitudine tantum differt lagopus, oco oco tineta, in eibus graulissima. Est & alia lagopus, pedes leporino uillo ei nomen hoc dedere, cætero

Cenchramon.
Cenchramon.
Cenchramon.

Lagopus.
Lagopus alio

DE DIFFERENTIIS

caudidæ columbarum magnitudine. Non extra tertiam in qua nascitur ea E
uolari facile: quando nec uis mellefecit, & corpus occise statim marcescit.
Neque perdix alio sola est, sed terræ propinqua uolat, spatiique breuibus
Nec facit in ramis aliisque cacumine nidos.

Propter humum uolat, ponitque in sepius oua.

Perdix ingluuiem habet præpositam uentriculo, & appendices quasdam pau-
cas infra quâ desinit intestinû. In Paphlagonia bona perdices conda. cot-
tus tempore testes habet perdicæ magnitudine insignes, aliâs uero omnia-
no obscuro: ut ut hybernus mensibus ne illos quidem testes in his haberi
nonnulli arbitrentur. perdicæ non pinguesce te tradant. nudiçia, parunt
& incubant oua semine non aliter ac de conuenticibus diximus. Mares int
libidinis inemperantia similiter tumultuant, clamantque paginâq; inter E
se conferunt. Parunt semine oua nonnunquam quindecim aut sexdecim.

Et bina ouorum receptacula faciunt nonnunquam perdicæ: in altero for-
mina incubat, in altero mas excludit que sua uterque & educat. Nonnun-
quam uero oua mares que competuerint, perturbant & frangunt præ sua
salacitate, ne femina incubet: quod ne accidat fortuna contra emollesce,
clanculo diffugiens partus sed sit sepius, ut præ turgore parturiendi, quolibet
loco edat, & mare præsentu uerum ut oua seruentur, nunquam ad ea subito
accedat. Plerumque uero femine transuchunt partus, ut mares fallant. Et si
quis hominum ubi incubent, propinquabit, egressæ matres uementibus se-
se sponte effertunt: & simulata debilitate uel pedum uel alarum, quasi sta-
tim capâ possint, gressus fingunt tardiores. Hoc mēdacio sollicitant obuios G
& eludent, quoad prosecti lōgius à nidis auocentur. Cottus tempore uo-
lant tam mas quàm femina ore hiant, exertatque lingua: uel, ut Aristote-
les refert, ore hiant exertatque lingua & mares & femine cocunt. Neque
in alio animali par opus libidinis contra mares steterint semine, eo quo
ad libidinem exortantur tempore, aucta ab his flante, prægnantes fiunt. Ple-
rumque etiam uoce manum, utero ingrauescunt, si gestiant ac libidine tur-
gent. Quin & uolatu quoque superne marium effici idem potest: quasi ui-
delicet mas ipse in feminam scēticam spiritum demittat. Pulvere se uo-
lutare solēt perdicæ. Earum uita amplius quàm ad sexdecim annos durare;
existimatur. In Italia alterum est perdicum genus, magnitudine minore,
& uolatu incomposito: rostro minime rufo. Perdix uulnere maior ex India H
ad Casarem missa est. Perdicæ sane cum ubique liberæ sint, ut aues unius
se, in Borota non sunt: nec cum uolant, sui sunt iuris: sed in ipso aere, quas
transire non ualeant, metas habent, ut nec in Atticum solum transirent.

Syroperdix in Antiochia Piliæ, perdice minor est, & niger excepto ro-
stro, quod rufum spectatur. lapides deuorat atque conficit. Non mansue-
fecit, sed semper perieuerat ferus esse. Eius carnes & densiores sunt quàm ce-
terarum, & suauioreni cibi usum præstant. Perdicæ caro facile concoqui-
tur, probumque generat succum: quæ tamen minime recens edēda est, sed
ubi unum, quàm maxime, diem suspensum adseruationis: ita namque eius
durities facile amittitur. Quæ circa Cartham perdicæ inuenerunt, eorum
caro

*Perdix.
Cottus.*

*Perdix for-
tis. Argulus
in locis non si-
ni sibi ostendit
lib. 1. hyst. ani-
mal. 2. 1. 1.*

*De causis ho-
rum polibere
mā ueneris et
stipulanti lib.
1. generat. a-
nimalium.*

Perdix altera.

Syroperdix.

A caro ingrati saporis est, neque edendo sunt. Si sorbeantur oua perdidici, putantur fecunditatem facere, lactis quoque copiam. Perdidici fel atque gallinae ad medicinam usum alius praestat. Fel perdidicum cum mellis e quo pondere, confusis oculis inungitur: per se uero ad claritatem Hippociatis (ut putant) auctoritate adhibetur, quod in argentea pyxide obseruari iubent. Oua perdidicum in uase aereo decocta cum melle, ulceribus oculorum & glaucomatis medentur. Sanguis perdidici oculorum ulceribus recentibus, & oculis cruore suffusis illinitur atque lusciosis. Cursant ut perdidicos rusticuli: de qua Martialis,

Rustica sum perdidicquid refert: si sapor idem est:

Carior est perdidix, sic sapit illa magis.

*Rustici perdidici
Alia, si sapit.*

B Terrena quoque & pulueratrix attagena est, neque uolax multamque corpore quam sit perdidix paulo grandiore, toto dorso punctis maculisue insignis: colore aliàs fuligineo ad subrufum magis tendente. Ob corporis grauitatem alarumque paruitatem, canibus facillime capitur à uenatoribus. Anis malitiosa est attagen, frugibusque nectitur, & pulueratrix est. Quondam existimatus inter raras uices: iam & in Gallia & Hispania capitur, & in Alpibus etiam. Anis uocalis aliàs, caprus uero obmuti uelens, adeo ut nullam edat uocem, tantum abest ut misue fiat. Triduui autem attageneas ad Pylas ex Lycia, (ut Socrates auctor est) coturnicum uocem aliquantulum obdere. Attageneae caro facillime concoquitur, & probum creat foccum. Attagen Ionum maxime celebratur, teste uel Coquo Maruale,

*Attageneae
Attageneae
Attageneae
Attageneae*

C Inter saporis feruor alitum ptimus
Ioniarum gustus attagenarum.

Attagas (tagenatum quoque uocari solet) pennas gestat maculis punctisue uariiegatas. in locis uicinat campestribus atque stagnantibus: idcircoque in Marathone frequens. Humi quoque uersatur, nec unquam in arbore consistit, quae scolopax dicitur uel alkalopax. Per sepes hortorum capitur, magnitudine quanta gallina est, rostro longo, colore attageneae: currit celeriter, & hominem rare diligit. Quae galerita, ab apice quem in capite gestat, quondam appellata est, postea alauda gallico uocabulo dicta est, Graeci corydon & corydalon uocant. Auicula haec non in arbore consistit, sed humi, in uis & seminis ubique nobis occurrens, apicem in capite ueluti cristam ex pilis constantem gestans, pauonis in morem. Haec & pulueratrix est. Alaudarum duo genera, alterum terrenum & cristatum, ut dictum est, galerita à crista appellatum: similis haec est passerculus ancusius, quos pyrenitas uocant, uerum maior est galerita. circa uitas & seminis reperitur, ut diximus, hyemis praesertim tempore alterum gregale, nec singulare more aliter, uerum colore simile, quamquam magnitudine minus, & galero carens, cibo uero idoneum. Còdenso frutice nidificat alauda. Alauda cum auiibus uariis dictis dissident: oua enim in uiscem exedunt: ardeolarum quoque oua diripit alauda. Quae apicem gestat galerita, inquit Galenus, in simplici iure elata, colicos urinat, si unà cum suo rure sepe atque assidue edatur assam scribit Dioscorides ocellacis prodesse. Et Plinius, coli uisum, in-

*Attagas
Scolopax
Alkalopax
Galerita
Alauda
Corydon
Corydalon
Ancusius
Pyrenitas*

DE DIFFERENTIALIS

quit, lasatur ab aue galerita affa in cibo sumptis. Quidā in uase nouo cum E plumas exuui libetis, contrahique in cinerem, bibique ex aqua cochlearibus tenuis per quatridentum: quidam cor eius adalligari formiculis, cocens tepensque adhuc deuorari. Cōfularis Asprenatum domus, inquit Plinius, in qua alter ē fratribus colo liberatus est aue hac in cibo sumptis, & corde eius in armilla aurea incluso. Hic fere suum nadium patere aures cupiunt. Quem uero Berotij meropa uocant, hic unus corporis grauitate prohibitus libidine petere, subiens terræ cauernas, facit cunabula & parit, in specu scilicet sex pedum deorsū altitudine. Et pene huius auis intus pallide sunt, superne curuleę ut halcyonis postrema pinnule rubre habetur. Pars tēx aut se- pretem ætate. Apibus inimica hæc auis est. Sunt qui meropas genitorum se- neclutem educate confirmant, educationis uicem reddere: ut parentes nō E modo senectutem, uerū etiam statum cum iam datur facultas, alantur ope- ra liberorum: nec matrem aut patrem exire, sed in cubila manentes pasci labore eorum.

Address:

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

Cheng, Y. and
Chen, Y. 2000.

Tuesday,
K. 12.45.
K. 12.45.
Friday.

De turdorum merularumque generibus, & aliis quibusdam, quæ
cum eis similitudine quadā coniunguntur. Cap. CXXXII.

In omni certe rure, & intra villarum sepes pascibitur in aenatis & turdi & merula. Turdorum tria sunt genera, unum uiscosorum, quod nisi uisco atque refina non uescitur: & magnitudine parum est: alterum *re-xo*, ad est *pulare*.

A pilare, quod sonat acute, & magnitudine merula est; tertium quod *audet*
audet quidam uocant, alij *audet* illarum lanne non inter dixeris, mitem
 mum inter hæc, minusque rasculis distinctum. Turdidos ex hero, ut h
 , ruidines faciunt in fecellum & cellis arboribus. stragulum subuicunt ex
 uillo & lana, interioraque nodi ex eisdem consternunt. Mutat turdus colo
 rem, namque color circa collum uariis, hyeme eò color uoce tamē co
 dem est. Aliquot diebus hyeme latet, in uicinâque abet, quo hybernâ pab
 ulam petat, itaque in Germania hyeme maxime turdi cernuntur. expet
 tur à turdis & sagittariis. Turdorum caro durior est quam sit gallinarum,
 perdicum, artagenarum, & id genus aliarum auium, uocum tamen, si pro
 be concoquantur, & probum generat & maname excrementosum estq, ut

Turdus pilu
ris
audet, à Doro
Turdus
audet ruides
in cernuntur
in arboribus
Phonæ
Hyeme latet
in Germania
audet
audet
audet

B quit Martialis,

Inter aues turdus, si quis me iudice cerret,

Inter quadrupedes gloria prima lepus.

Turdus inasillus cum myrtil bacis dysentericis medetur: tardos quo
 que edisse cum bacis myrtil prodest urina. Venere in Italiam. Debra
 censibus bellis ciuilibus trans Padum externæ & nouæ auestica enim adhuc
 uocantur, turdorum species, paulatim infra columbas magnitudine, sapore
 gratæ. Merularum duo sunt genera, alterū nigrum & uulgare, & rostrum
 illi rutilum, alterum candidum: magnitudine quidem comparari, & uoce si
 milis dē circa Cyllenam Arcadiæ familiarē, nec usquā alibi nascens. Prius
 illud genus immutatur per tempora & colore & uoce: ex nigro nanque ru
 scescit, & per hyemem strepitat, cum per æstiuam tumultuante cœnet. ro
 strum quoque articulis in ebur transfiguratur, dum taxat manibus. Merula

Aues uoca

Merula
audet
audet

C lescent, & per hyemem strepitat, cum per æstiuam tumultuante cœnet. ro
 strum quoque articulis in ebur transfiguratur, dum taxat manibus. Merula
 postquam sibi nidū fecerit, stragulum subuic ex uillo & lana, interioraq,
 nodi ex eisdem consternunt, turdorum in morem. His parit merula, sed prima
 partus intereunt frigore hybernæ omnis, namque uixit prima hæc pa
 rit: postea partum educat, & feliciter ducit ad finem. Ictendo incedit
 merula. Latet hyeme: hoc est in uicina abet, nō occultatur, quemadmo
 dum & tardus. Eas caro quod ad alimentum rationem attinet, nō aliter at
 que turdorum durior est, sed probum generat succum, ut de tardis dixi
 mus: & merula inasillare caro cum myrtil bacis dysentericis medetur. Est
 & altera auis *audet*, id est merula à comitis uocata, nō cantant, sed muta.

Hyeme latet
in Germania
audet
audet
audet

D E merularum genere est heos auis, merula nigræ similis: sed magnitudine
 paulo minor. acris hanc in saxis & tectis solita est nec rostrum rutilum ut
 merula habet. Merulis affine genus quoddam est uenaticum, colore nigro,
 splendide canoerum, recte ex eo uenaticū appellatum, quod ex aubus mul
 tas sui canas permulsiōne ad se allicit & caput. quod u quādo caput illam
 concluserit in caueam, muta permānet atque elinguis. Quæ caprimulgum
 appellant, auis montana est, magnitudine paulo maior quā merula (ut
 aspectu sit merula grandior,) minor quā cuculus, moribus ignot mol
 liorue. Parit oua duo aut tria cum plurima. inter pastorum stabula, capra
 rumque uberibus aduolat, ductum propter lactis, unde nomē accepit: cum
 suzerit, uber extinguit capræque exequari auit. *Id est capella*, alia auis

Merula alba
Basis, Basis
Vetus inter
pro, ex rutili
canonem
Penetia aui
Penetia
Caprimulgum
Id est heos
Id est heos
Caprimulgum

Id est capella

DE DIFFERENTIIS

est: circa annes enim & lacus uersatur. Fur nocturnus est: parum clare nã. E-
que interdum uidet, sed noctu perspicax est. Sturnus quoque niger est, & 3
merula magnitudine, sed colore uario est. Sturnorum generi proprium
catteruatum uolare, & quodam palæ orbe circumagi, omnibus in medium
agmina tendentibus. Hyeme abeant & sturni simili modo atque merula
in uicina, propter hybernæ pabulum, sed non aliter occultantur. Stur-
norum oryxum solum pascetium sbercus simile est crocodileg, quam uo-
cant, cuiusque loco uenditur. Collurio auicula similis est merula, nisi quod 6
magnitudine sit pardali, mollicepis, atque alarum huiusmodi. Vt in
merularum genere alia nigra tota est, alia uero candida: ita & suam ha-
bent colorem, cæruleus, chlorion, molliceps & pardalus. Cæruleus cya-
noscæ auicula est colore tota cæruleo, quæ maxime in Scyro cohit, laxa a- F
mans, urbanas commoraciones odio prosequitur: his locis ubi magna ho-
minum solitudine est, ut montium iugis, delectatur: magnitudine minor
quàm merula, maior paulo quàm fringilla. pede magno est, scandique
saxa, rostro tenui & longo: erare breui similiter ut pipo est. Chlo non totus 7
est luteus, coloris minime graui hyeme hæc non uidentur, sed æstiuo solistio 8
uenit in conspectu. Discedit exortu æstiuæ syderis: magnitudine turturis
est, docilis & ad uitæ munera ingeniosus notatur: sed male uolat. Molli-
ceps colore totus cinereo, grandi & cartilagineo capite est: magnitudine 9
paulo maior quàm turdus. Ore firmo, paruo, rotundo: ualet pedibus, sed
penin inualens est. Eodem in loco semper sibi stans sedem, atque ibidem
capitur: capitur autem maxime per noctuam. Pardalus auicula est colore G
tota cinereo, magnitudine proxima superioribus: sed peninis ac pedibus bo-
nis: magna ex parte gregatim uolat, nec singularem hanc uident: uocæ fre-
quentem nec grauem emittit. De sidi pedibus quæ grauiores sunt, & quæ
in uianis aut fructus aut panem: cuius pasci solebant, quæque us quoquo
modo cognata sunt, hæc dicta sunt.

1 Quod uero sequitur in Aristotele, *Agallæ & merula dicitur uel hyædus, &c.* ut e-
quidem arbitror, de hirundinibus intelligatur, non de cordicetum à Plinio idem, pe-
ne certum, scilicet hoc ipsum de turda intelligem. 2 Non *hædus* sed *quæ* legæ
Theodorus. 3 In uolto, *Græci dicitur Agallæ, id est in signis.* 4 Est apud Ari-
stotelem & *Agallæ* quod est capite, cui gala inferiore parte lata est lineam uel ha-
bet: sed uero adheret simul & uicini & uicini. 5 Theodorus, Nigra est, alibi di-
uidus macula. 6 Ita ex ueteri uerbo Græco lecto Aldana, & Theodorus, H
ita, Collurio eisdem quibus merula uocatur: magnitudo, &c. 7 Tenui, & uocis
interpret, angustio habet. 8 *Agallæ*, fortasse *Agallæ* erat legendum. 9 Totus luteus,
Theodorus, totus uiridans ex obscuro, *Agallæ* dicitur. Hunc nonnulli marem esse arbi-
trantur in lucetum genere. 9 Et cartilagineo *Agallæ* dicitur: unde ne sit locus hic cor-
ruptus apud Aristotelem certe interpretes non habet, sed solum, caput habet magnum.

De aulis carinoris, & primo de aquilarum generibus.

Cap. CXXXIII.

IN auitum genere quibus unguis adunci, prope dixerim omnes, carinuo-
re sunt, ut dictum est, ut genera aquilarum omnia, milui, accipitres: ue-
l *Aquila, &c.* scuntur tamen & glande in hoc genere potissime nonnullæ. Ex his aquila
maximus

A maximus honos, maxima & us quoque quocumque offa sua nanata tribuit durissima, crassissimisque, quibus & medulle maximum inest. Nidificant a-
quile locis non planis, sed celsis: præcipue quidem arduus saxos & præcipiti-
bus, sed arboribus etiam. Incubant tracentis diebus: ova parturit terna, sed
pullos binos excludunt, ut ex utroque quem ad Muscum referunt aucto-
rem constet.

Excludit binos, edit terna, educat unum.

Sed quantum magna ex parte sic fiat, tamen & tres usi aliquando sunt pul-
liciterum nido in educando expellunt tedio nutriendi: quippe eo tem-
pore ipsi cibum negavit natura, prospiciens ne omnium feturam fœtus ta-
percutur. Ungues quoque earum insecantur diebus his: albescent media
B pennæ, ut metuo suos odentur partus. Sed pullum erectum ossifraga exci-
pît & educat. Genera aquilarum non ita que omnia prolem sustinuit: sed dis-
tinctior in alendo una cui nomen pygargo: benignior quæ nigra est (melan-
ætos dicta.) Alunt aquila suos pullos donec potestas volandi fiat: tum ni-
do eos expellunt, post regione, quam ipsi genitori incolunt, tota extermin-
ant, armulos scilicet expiunt. Et alioqui unum par aquilarum magno ad po-
pulandum tractu ut facietur, indigent: unde fit ne suos pullos ullo pacto vi-
cinos habere patiantur. Prædantur locis non suo nido propinquis, sed lon-
ge distantibus. A meridiano autem tempore operantur & volant: priori-
bus horis diei donec impleantur hominum conuentu fora, ignave sedent.

1 Raptam non protinus ferunt, sed primo deponunt, expertæ quæ pondus, tunc
C denum abeunt. Venantur aquila etiam lepores, hirculos, vulpes & reliqua
quæ vincere valeat. Conduunt referantque aquile suo in nido quantum ci-
bi pullis superfit: quod enim die quaque facultas venandi non datur, fit in-
terdum ne quod portent extinctis habeant. Vivit aquila tempore lon-
go, quod diuturnitate nidi eiusdem declaratur. Senescitibus aquila rostrum
superius accrescit, incurvaturque subinde magis magisque, ut demum sa-
me intercreant, non sermo nec agilitudine. Rhodus aquilam non habet. Aquila-
rum pennæ mixtas reliquarum avium pennas devorare feruntur. Dis-
sident aquila cum dracones: nascitur enim aquila anguibus cum arctola cū
pugnatur quibus enim valens aquila aggreditur arctola autem repugnan-
do emouetur. Sitta & trochilus cum aquila pugnant: sitta enim ovis aquile

D frangitur aquila cum ob eam rem, tum etiam quod carnivora est, aduersatur
omnibus. Cum aquila etiam pugnat ululx & olor: vincitque eam sæpius
olor. Cymindus chalcis cum aquila pugnat a deo acriter, ut sæpius ambo
implexæ deferantur in terram, & unæ a pastoribus capiuntur. Aquilarum
fel acre admodum est, atque corpora exalt: colorque spectatur ænigi-
neo. Hoc, ut fertur, si unâ cum Attico melle iungatur, cui hebescent o-
culi, plane visum recreabit, reddetque oculos acutissimos. Lapis ætates
in aquile repertus nido custodit partem contra omnes abortuum insidias.
Aquilarum plura sunt genera: unam quod pygargus ab albicanæ causa di-
citur, ac si albicallam nomines. Versatur hæc in capris, & lacris, & circa op-
pida, hircularia à nonnullis vocata cognomine est: mores etiam sylvarumque

Pygargus.
Albicallus.
Hircularia.
Sylvarumque.

DE DIFFERENTIALIS

his freta viribus petit. Reliqua genera raro plura & lucos adeunt. Hæc ma-
xime inter aquilas difficilem se præbet in fortis alendo. Alterum genus se-
cundum magnitudine & ui, plangos nomine, *αἰσῶν* etiam cognomi-
natur, id est anataria, & morphinos: Homerus parthenon uocauit. Hinc ui-
ta circa lacus stagnans, & salus quoque & conualles. Phemonoe Apollinis
dicta filia dentes ei esse prodidit, multa alias carenti lingua: eidem nigeri-
mam, prominensiore cauda condensit & Boëthius. Ingenium est ei testudi-
nes raptas frangere & sublimi iaciendo. quæ fors interemit poetam Ælchy-
lum. Aquaticæ aues hæc appetit, mergentes sese subinde, donec soporæ la-
sasque rapiat. Spectanda dimicatio, aue ad perfluga litore tendente, ma-
xime si condensa arundo sit: aquila inde ictu abigente alæ, & cum appetat,
in lacus cadente, umbræque suam nanti sub aqua à litore ostendente: rur-
sus aue in diuersa, & ubi se minime credat spectari emergente. Hæc causa
est gregatim uolubus natandi, quia plures simul nō infestantes, resperfu pe-
ninarum hostem obercantes. Serpe & aquilæ ipsæ nō tolerantes pondus ap-
prehensum unâ merguntur. Tertium genus magnitudine manua, sed ui-
ribus omnium præstantissima hæc est. Colit montes & sylvas *αἰσῶν* à
Græcis dicta, id est pilla aut fulua: & *αἰσῶν*, id est leporaria: eademque, ua-
leria. Sola aquilarum foras suos alæ atque educat: ceteræ fugant. Pernax
est & prompta ac pugna intrepidæque liberalis non inuida est, modesta
etiam nec petulans: quippe quæ non clangat neque marmuret. Quartum
genus percnopterus, capite albicante, corpore maiore quàm ceteræ adhuc
dicæ, sed alis breuioribus, cauda longiore, aulturina specie, *αἰσῶν* co-
gnominatur, id est ciconia montana, & *αἰσῶν* imbecillis & degener est:
quippe quæ à coruo ceterisque id genus alibus uerberetur fugensque gra-
uis est enim & uictu iners, famelica semper est & querulæ murmuratious,
incolit lucos. Nec ceterarum aquilarum uictus caret: & bonorum quæ illæ
obtinere expers est. Sola aquilaram exanima fert corpora: cetera cum oc-
cidere confidunt. Quintum genus quod halietus, hoc est marina aquila uo-
catur, ceruicæ magna & crassa, alis curuantibus, cauda lata. Moratur hæc in
litonibus & oris maritimis: & lacus quoque petit. Clarissima est oculorum
acîe, librans ex alto sese, uisusque in mari pulce præceps in eum ruens, & dis-
cussis pedore aquis capiens. Accidit huic sæpius, ut cum ferre quod cepe-
rit, nequeat, in gurgitem demergatur. Halietus tñum, inquit Plinius, im-
plumes etiamnum pullos suos percutiens subinde cogit aduersos intueri
solis radios: & si conuictum beneque animaduertit, præcipitat è nido,
uelut adulterinum & degenerem: illò cuius acies firma contra steterit, edu-
cat. Halietus, ut Plinius auctor est, fimum genus non habent, sed ex diuerso
aquilarum comu nascuntur: & id quidem quod ex his natum est, an ossifra-
gis genus habet. Mixto huius aquilæ felle cū melle Attico, inunguntur nu-
beculæ suffusionèsque oculorum. Sextum genus *αἰσῶν* appellant, id est ue-
rum ac germanum, uelut solò incorruptæ originis: Alychrysaeton, aly stel-
larcus uocant. Maxima aquilarum omnium hæc est, maior etiam quàm ossi-
fraga sed cæteras aquilas uel sesquialtera proportionè excedit: colore sub-
nigro.

Plagues, and
Plagues, and
Clashes.
In the
-dancers.
Atrophies,
and morphic
Peculiar.

Dr. Lacey, who
is Lacey.

Материалы,
Политический,
Политический,
Материалы,
Политический,
Политический.

Результаты
сравнения
Систем раз-
личия.
Генератор

1. *Abstract*
 2. *Introduction*

[illegible]

A rutilo, rara conspecta. Hoc genus aquularum huiusmodi, lepotes, gruets, aut es cortales uenaturique et tauros inuadit. Ex aquilarum genere una tantum quæ Iouis appellatur carnes non attingit, sed ad uictum illi herba satis est.

13 Quod ex halizetis natum est, in ossifragis genus habet, ut dictum est: de quibus uultures progenerantur minores & ex his magni, qui omnino non generant. Ossifragam Græci *στέας* & *αἰς* dicunt: aquila cognatum genus utriusque carniuorumque: eius magnitudo maior est quam aquilæ: color et cinere albicis. Parum hæc oculis ualeat: subecula etiam oculos habet laesos. Probe & forficat & uiuit: cornigerula & betugna est. Nutricat bene & suos pullos & aquilæ: cum enim aquila suos nido exciderit, hæc recipit eos & educat. Eicit namque suos aquila antequam uolandi tempus sit, adhuc

B patens operam desiderantes, nec uolandi adeptos facultatē. Deiecti pulli uociferantur, sed ossifraga recipit eos benigne, & uenit, & alit dum quantum satis sit adolefcent. Ossifragi uenter paulatim eporus, calculos cum lotio pellere proditur. Vnus est ossifrago intestinum mirabili natura, omnia deuorata conscientia huius partem extremam adalligatam prodesse cōtra colicū constat. Vultures minores ex halizetis progenerantur, uti modo diximus. Vulturum namque duo genera: alterum paruum & albicans, alterum maius & coloris cinerei aut nigri. Vultur ut fere grauior, nisi ex procursu aut alio re tumulo immissum non euolat. Nidificat in excelsumis rupibus: unde fit ut raro nidus & pulli uulturis cernantur: ideo etiam nunc fuere qui putarent illos ex diverso orbe nobis incognito aduolare falsū.

C Quamquam etiam difficile nulum eius altis uideris, tamen uisus aliquando est: neque certe locorum pluriū incola quis hæc est. Edit non plus quam unum ouum, aut duo cum plurimum: & feruas sæpe cernuntur fere bini. Umbrius aruspex auctor est triduo ante aut biduo uolare eos, ubi cadauera futura sunt: & multi exercituum sequētes repente apparent. Cū aquila pugnat uultur: & inimici inter se sunt uultur & falco. Ex uolucris in auxilio contra serpentes primum uultur est. Annocandum quoque minus uirum esse nigris. Pennarū ex his nidore, si uenit, fugari eas dicunt: uultures unguento fugantur, sed alios appetunt odores. Immissum aliqui uulturis pullum arbitrantur: & sanqualem ossifragam: Massurius immissum dicit esse pullum aquilæ priusquam albiat cauda: quidā post Mutium

D augurem uisos non esse Romæ cōfirmare. Ego (quod ueri similis est, inquit Plinius) in delicta rerum omnium non arbitror agnitos. Sunt in Arcadia circa paludem quæ Tantalū dicitur, aquilæ, quæ cyenæ uocantur, colore candido atque atque odores.

1 Plinius: Eiectos ab ipso cognatum genus ossifragi excipiant, & educant cum suis.

2 Hæc ubi Plinius præcipue generi alii, quod chrysaetos & stellans appellatur. Quam caute lepotes uenatur aquila ostendit Aristoteles: quo uero pacto educantur insinuanturque ad uenationem apud Indos, explicat Alianus. 3 Lucis, rō idem.

4 Circa lacum, uetus interpretis in desertis & montanis. 5 Quæ fons, Lege Valer. Max. lib. 9, & Gellium lib. 1, & lib. 7. Hæc de aquila in genere uel de haliaeo dicitur, nisi codex sit mendosus apud Aristotelem. 6 Donec sopitas &c. Aristoteles uia, Doctet uel strangulet in humore, uel per summa corripit. 7 Plinius, sola sine clā-

Iouis aquila.
Ossifraga.
Ossifragus.
στέας.
αἰς.

Vultur.
Nidificans uti.
ossifragus.
pro:

Vultur, p. 1, 1.
ossifragus.

Therophagi.
Progenies non
tenetur.
Immissus
sanqualem.

*Scorpius
sub aquila*

go se sine mummatione. 8 Perenopterus, ab alarum nocturnis, inquit Theodorus, vel E
ab alarum nigritia. 9 *scorpius*, Videtur Theodorus *scorpius* hoc legisse, id est sub-

Hyas

aquila. Aliis maximis, Plinius Corpore maiore, hoc *scorpius* *Hyas*, uetus interpret, Quia
uas eius est, quasi medicinas ab orbibus suspensa fortiter uideri possent. Genera exem-

Barbata

plaria, & legesam esse corpore maxime. 10 Nihil in haliaetum mutatus narratur.
Quid, lib. 1 Metamorph. 11 Quae Plinius hoc in loco de haliaetis narrat, alij ad
alia aquilarum genera referuntur. Ambrosius lib. 5 Hexamer. & Androcles lib. 9 hi-
stor. zoon ab alijs, nisi fortiter totum illud caput de mendosum quod sine suspitione. 12
Quoniam modo taurus inuadit hoc aquilarum genus, leges apud Elianum lib. 14.
13 Genus aquilae quam barbaram vocant, Thula offisragam dedit. Offisragam ab
offisrago distinguunt Hermolani, in Coer.

De accipitrum generibus.

Cap. CXXXIII

F

*Accipiter,
habet*

ET accipitrum quoque generi natura

Oraque adunca dedit, curuos dedit unguibus hamos.

Hi multo inter se magnitudine differunt. Color us maculis distinguitur
ceu lineas. Pel habet accipiter secum simul & intestino adherens. Lien illi us

que adeo exigua, ut propemodum sensum effugiat: & uterculus quoque
seruention: & quantum uorax sit, auisiam tamen quas cepit, cor nunquam

comedit. Nidulantur locis arduis & sacris: & uicenis diebus incubat. Acci-
piteres rurius Massilae humi sanctificat, nec alibi nascuntur illis assueti gen-
tibus. In Thraciae parte homines atque accipitres societate quadam occupa-

tur: ha ex syluis frutetis: & arundinetis excitant uoces: illi superuolantes
deprimunt: rursus capras, aucupes diuidant cum illis. Accipiter Aegyptius

mansuetior est quam sint alij. Accipiter decoctus in rosaceo efficacissimus
ad unctiones omnium oculi uisum putatur: item si in eius cinis cum

Artico melle. Genera non pauciora quam decem esse accipitrum alij
prodiderunt. Plinius accipitrum genera inquit, x v: uicenisque. Differant

autem, quod alij columbarum humi cõdidentem ferunt rapiuntque, uolan-
tem non appetunt: alij super arborem aut tale quid conscendit: uenā-

tur: si in humi est aut uolat, non inuadunt: alij neque humi neque in sublimi
manentem aggrediuntur, sed uolantem capere conantur. Fertur etiam à co-

lumbis quodque accipitrum genus cognoscitur: neque cum accipiter prouolat,
si sublimis peti est, manent quo conditricine loco: sed si humi peti qui prouo-

lat, est, non manent, sed continuo auolant contra naturam eius auxiliantes
sibi. Accipitrum genus primum uisibis: neque ualentissimū uorax à nu-

mero testium non opus: ubi conem hunc appellat Romanus: miluo a quo. Hi
paratur magnitudine, semperque cernitur, uti Aristoteles author est. Buitro

hostis est rana rubet & angustapit enim eos atque exedit. In Balaeribus
in honore mensurum est. Secundum genus a salone Graeci uocant, qui 4

(si Plinio credimus) omni tempore apparet: ceteri hyeme abeunt. A salo &
uulpe inuicem inimici sunt. Et uulpi quoque hostis a salo est: ferit enim,

pelosque eius euellit, occiditque carulos: ut qui uncas habeat ungues: con-
tra coruus (ut qui uulpi amicus est) pugnat cum a salone: unde fit ut uulpi,

cum ab a salone percutitur, auxilietur coruus. Tertium circus, claudum
altero pede: cum cum uulpe quoque inuicetur sunt, & propter communem

uidum

*Triorchis
Buteo**Alsalon
Alsalon**Corvus, uulpe*

Auſtrum: (carne enim utiunt) vulpem intradit & vulnerat. Ex ferociorum accipitrum numero circus eſt: & gallinarum domesticarum quoque pullis indiatur. Et alia accipitrum genera ſunt, aſternus, id eſt ſtellatus, & perneſ, & palumbarius ſive *quatuor oſis quatuor uolans*, qui in ferociorum accipitrum numero cenſetur. Subarctones uel *Arctophaga* appellantur accipitres, qui latiores ſunt: alij peres, & *peres* uel fringillartij alij aduſi, ad eſt ſenes: & *quatuor oſis*, id eſt rubetarghi abunde uiuunt, & propter humum uolant. Chalcidicis raro apparet, rarus etiam in ſyluis: montes etenim incolit. nigro colore eſt, magnitudine accipitris, quem palumbarium nominant, forma longa ac tenui, lones cymindem tam appellant: cuius Homerus etiam meminit in Illade, cum dicit,

Aſternus, ſtellatus.

Perneſ.

Palumbarius, quatuor oſis.

Arctophaga, quatuor oſis.

Subarctones, Arctophaga.

Chalcidicis.

Cymindem.

B Chalcida diu perſubent, homines dixere cymindem.

C Nocturnus accipiter eſt. Sunt qui hanc auem non alia eſſe quam pyngem uelint. Interdum minus apparet, quia clare non uidet, ſed noctu uenatur more aquilæ. Et pugnat uero cum aquila adeo acriter, ut ſerpis ambe impleat deferantur in terram, & uix a paſtoribus capitur. Parit hæc oua duo, & in ſaxis ſpeluncæſq; nidulatur. Genus accipitris tinunculum uocat ruſtici, qui ſere in ædiſicijs nodos facit. Columbas defendit hic, terræque ceteros accipitres naturali potentia, in tantum ut uſum uocemque eius ſugiant. Hac de cauſa præcipuus columbis amor eorum. Feruntque ſi in quatuor angulis deſodiannar in ollis nouis oblitis, non mutare ſedem columbas: uel uti narrat Columella, eius pulli ſingula ſiſtilibus ollis conduntur, ſiſtipantiſque opercula ſuperponuntur, & gypho lata uafa in angulis columbarij ſuſpenduntur. quæ res auſus amore loci ſic concealat, ne unquam deſerant, multumq; alioquin auit. Sunt qui Cenchridin tinunculum uocant: & accipitrum quoque generis hanc Greci faciunt. Ventrículus illi minime carnoſus, ſed ingluuiæ ſimilis. Plurima in adunco genere parit: cum omnes quibus unguis adunco, parcius generant. huius quatuor reperti ſunt pulli, ſed plures etiam poſſe procreari apertum eſt. Rubrum eſt eius ouum modo muniſſola ſere aduncarum bibit. Cenchridis ſinum albugines exſeruat. Milui ex accipitrum genere magnitudine diſſeruit. Rapaciſſima & fameliica ſemper ales atque caruiciora. Ventrículum habet miluus calidum, & lienem exiguum, ſed quoque habet iecori ſimul & inteſtino adhaerens.

Pyngem.

Tinunculum.

Cenchridis.

Milui.

Adunco.

Cenchridis.

D Videntur milui artem gubernandi docuiſſe: eadem ſcribis, in celo monſtrante natura, quo d o p uſ eſſet in profundo. Oua parit milui huius magna ex parte, interdum terna: totidemque excludunt. uicenis diebus incubant. Hybernis menſibus latent paucis quibuſdam diebus non tamen ante hirundinem abeunt. Traduntur autem & ſolſtitio aſſici podagra. Miluus cum coruo pugnat: eripit enim miluus à coruo quicquid tener, ut qui & unguibus ſit præſtior & uolatu. Pipher, harpa & miluus amici ſunt. Laudatur malus necur ad oculorum uitia: ſed maluorum bilis acris admodum eſt, atque erodit. Colore quoque eruginoſo ſpectatur, & nonnunquam atro. In Aegypto autem colunt incolæ, quem accipitrem uocant: qui nec noſtris ſimile quicquam habet, nec Aegyptiis: ſed & magnitudine excellit, & ua-

Pipher.

Accipiter de Egypto.

- Ascalaphus.* bonis uidere potuit, cum tam ipsam aem uidisse prodigiū sit. Ascalaphū E fabulantur in bubonem uersum. De quo ita cecinit Ouidius,
 Ingenuis regina Erebi, testemque prophetaum
 Fecit aem: ipsūque caput phlegetrōnide lymphā
 In rostrum, & plumas, & grandia lumina uertit.
 Ille sub ablatu subius amagatur ab alis:
 In caput crescit longosque reflectitur unguēs,
 Vixque mouet matas per inertia brachia pennas:
 Fœdaque sit uolucris uentura nuntia luctus
 Ignarus bubo, dirum mortalibus omen.
- Bubo.* Ascalaphus appendices quasdā paucas habet, ut noctua, adnatas infra quā desinit inter finem. Bys græce dicitur (hunc & bubonem nonnulli uocant) ꝑ specie similis noctur est: sed magnitudine nō minor q̃ aquila. Nocturna auis & aduncis unguibus aluco est, maior gallinaceo: picas uenatur. Hæc res similibus specie constant, aluco, argobos, & scopi. Argobos quoque (quam ululam interpretantur) nocturna auis est, & unguis, specie similis aluconi & scopi: aluconi compari & picas quoque uenatur. Interdum raro apparet: sed noctu uagatur & palmarum colit fura & speluncas: pollet ingenio ac industria in uitæ nuanceribus argobos quaternis nunquam edit pullos. Colarem ulula ceterique aduncis sedū, unde has oritur bellum. Vula: rei prædicatur ad albugines, suffusiones, caliginis: adeps simuliter ad clamarē.
- Scops, i. scops.* Aluconi & ulule specie similis est, qui scopi uocatur, & unguis quoque, & carne uelutur: uerum magnitudine minor quā noctua est: colore plures candidas quibusdam maculis distinctoan capite utrinque ad tempora emicant plumæ. Duo feruntur scopii genera: & hi quidem uocales, alij uero muti. Et aliqui omnibus anni temporibus apparent: & ob eam rem *aloum*, id est perennes appellantur, qui etiam non sunt propter uitū carnis. & colorem habent glaucum: alij autumno interdum apparent, nec plus uno aut altero die immorantur, qui & etiam sunt, & uia de probantur. Differunt hi nullo fere alio à perennibus illis, nisi corpulentia pingui, & quod uox his deest, illis nō deest: & quod turnari aut palumbis æquales sunt. Imitatrix auis hæc est, non aliter atque otus & eodem modo capitur (ut arane) saltūdi imitatore: & ut nonnulli tradunt scopi aues omnes oris expressione & articulata uoce longe superant: & quemadmodum pſitacus & pica, sic H scopi hominum & aliarum auium uoces exprimere fertur. Nominantur ab Homero, inquit Plinius, scopi auium genus: neque harum facientes motus cum insidens plerisque memoratos, facile conceperim mentes neque ipsæ iam aues nascuntur. Aduncis quoque unguibus est nyctiorax, quæ & noctu uenando cibum sibi acquirit: habetque (quemadmodum & noctua) appendices paucas adnatas infra quā desinit inter finem. Non est ubique locorum similis nyctiorax. Apud nos, inquit Strabo, æquale equalis est, uocemque grauem ediri in Ægypto uero graculi habet magnitudinem, & uocem omnino diuersam. Nyctioracem nonnulli uocant etiam, a uem scilicet illam quæ se coturnicibus hinc abeanthibus docem præbet.

A 1 Quidam de Nyctimene in noctuam mutata: Conspedum locoque fugit.
 Et cunctis expellunt arctetoto. 2 Vni (inquam Peneates in Plinio Menecleo)
 affert noctuam, quæ tuta usque dicat tibi. Tum noctuæ vox est. 3 Aliis, Quibus
 pluma auti modo incutit, quibus pluma autum eruat. 4 Asitotiles ea habet,
 ubi *Augur polio idus fœtus, i. Asitotiles, magisterium* ambigunt sine sensu. Quod
 nec minus ambigue vident Theodorus Aluco quior gallinaceo est, ubi ea edpan. Ambiguum
 scilicet in uelle sit *magisterium*, id est speciei similis, an magnitudine compari
 & an sit gallinaceo compar, an alucon. Versus innotescit ea habet, le nsa paulo apertio
 re, Helios auti gallo maior, & agobus assimilatur ei: malum: rursus sensum & nos
 fecit finitus. 5 Scops. Asionem vocat Theodorus: Tyrannio *scops* esse nyctico
 ces dicit & eximur dici quasi *scops* nō erit, id est vocem noctu edere. 6 *Alucon*
scops. Sempationes vocat Theodorus. *Alucon* inquit Athenarus, si uerum sit ex
 plar. 7 Corporantia pinguis, ita legit Theodorus apud Aristotelem *scops* nō: uer
 um Athenarus *scops* nō habet, ut scilicet differat ab corpulentia, sed pernitiuit. 8
 Cicunum vocat Theodorus. *Alucon*, cicunia.

*Asitotiles**Sempationes**Cicunia*

De hirundinum generibus.

Cap. CXXXVII.

S Vnt etiam in genere non aduico quæ carne uescuntur, ut hirundo: so
 liquæ carne uescens avis, inquit Plinius, ex his quæ aduicos ungues non
 habent: una quoque ex his quæ carne uescuntur, bis anno nidificat: quæ (uti
 de ea cecinit Ouidius)

Hirundo
scops

Tecta subit: neque adhuc de pectore credis

Excessere notæ, signatæque sanguine pluma est.

Hirundinum penarum quandoque è nigris fiunt albæ. Venerculus hirundi
 ni longior: & neque gulam habet amphorem, neq; ingluuiem. Felcarum
 Calis uenat, alius inextimo adheret, uel in eodem hirundinum genere. Vo
 luctum soli hirundinis fletu osi volatus, uelox celeritas: quibus ex causis ne
 que rapinæ cæterarum alitum obnoxia est. Eadem denum sola autum nō
 nisi in volatu paluitur: uerū ut pennis pretualere, sic pedibus degenerare ui
 detur. Hirundo nulla arte mæloescit. Discedūt hirundines hybernæ mēibus
 in uicinas: & quidem uisæ sunt hirundines in locis quibusdā angustis nide
 a tēq; omnino deplumes. Discedunt ad arcturi ortū. Cōspiciuntur denum ad
 vii cal. Martiæque senescentes apparent. Auersæ hirundines coire feruntur,
 contra atque cætera autum genera. Bis anno nidificat hirūdo (ut diximus):
 & pullos edat imperfectos & cæcos: quorum adhuc recentium oculi, si quis
 stylo eos pupugerit, resanescunt, & cernendi uim postea plane recipiunt.

Plinius lib. 8
vi i i i ceteris
Alucon

De constituendōque nido ostendunt hirundines: luto construunt, stramento
 roborant. Si quando inopia est luti, madefactum multa aqua pennas pulue
 rem spargunt. Ipsum uero nidum plumis floccisque conlitemunt: tepefa
 ciendis ouis simul ne durus sit infansibus pullis. In emutienda prole tur
 ma æquitate alternat: cibo in tam max quā firmata, obseruantes ne qui
 pullus acceperit, his accipias. Notabili munditia egerūt parentes: extremē
 ta pollorum: adultiorūque circumagi docent, & foras lacunatim emutre
 re. apibus iniuria hirundo est. Hirundo tam iusta aquas uolitans ut penna
 sæpe percutatur, umbrem prænuntiat. Dicuntur hirundines excluso pullo la
 pillum dare: itaque in uentre hirundinum pullis lapilli candido atque ru

Alucon
*scops**Lepo chelido*
nino

DE DIFFERENTIIS

benti colore, qui cheledoni vocantur, magicis narrati artibus ingeniosur. E
Hirundinum caro secens cōcepta auxiliatur contra serpentes. Vva & fau-
ciuna dolor anginaue mangatur hirundinum cinere cum melle illitodie & 3
consillis succurritur & affectibus omnibus qui in guttare, aut columella,
aut ore contigerint: nōnulli & ad usus claritatem cōfisi sunt. Anginis citif
sime succurritur cinere hirundinis ex aqua calida potio. Sed efficaciores ad
omnia, quæ ex hirundinibus monstrantur, pulli syluestriū: figura nudorū
eos deprehendit, multo tamen efficacissimi ripariarum pulli. Sunt multi
qui cuiuscunque hirundinis pullum edendum censent, ne toto anno me-
tuatur id malum. Serangulatos cum sanguine comburunt in uase, & cino- 4
rem cum pane aut potu dant: quidam & mustelæ cineres pari modo ad mi-
scetialie & ad strumæ remedia. dant & comitialibus quousdie potu. In sale F
quoque seruatur hirundines ad anginam una drachma bibuntur: cui malo
& nidus earum moderi dicitur potus. Hirundinis rostri cinerem. cū myr-
rha tritum, & in uino quod bibitur inpersum se curos præstare à temulen-
tia tradunt. Iuuenit hæc Plotus Assynorum rex. Alium genus hiru- 5
dinum rusticarum & agrestium, quæ raro in domibus diuersos figura, sed
eadem materia confingunt nidos, totos supinos, fascibus porrectis in an-
gustum, uetro capax: in rum qua perita oculandis habiles pulli, & sub-
sternendis molles. In Ægypti Heracleotico oratio molem continuatōne ni-
dorum euaganti Nilo inexpugnabilem opponunt, itaq; fere unus spatio,
quod humano opere perfici non posset. In eadem Ægypto iuxta oppidum
Copton insula est sacra lida, quam ne laceret amnis idem, manunt opere, G
incipiensibus uernis diebus palea & stramēto, rostro firmantes, continu-
tis per triduum noctibus, tanto labore, ut multas in opere emori consen-
tisque misistia in illis cum anno redit semper. Tertium est earum genus
quæ ripas excavant, atque ita in terra scintillant: non sciunt hæ nidos. ri-
pariam uocant Latini, drepanis à Græcis dicitur. rara auscula est, apparet æ-
stare tantum cum imber incessit: tunc enim & apparet & capitur. Ripari-
arum pulli ad cinerem ambusti omnium hirundinum efficacissimi mortu-
fero faciem morbo, multisque aliis morbis humani corporis medentur. 6

Riparis altera
Argathalis.
In genere item ripariarum est, cui nidos ex musco arido ita absoluta perfi-
citur pula, ut inueniri non possit aditus. Sūt qui & argathalis in ripariarum
genere numerent. Soluti porro ingenio argathalis suum instituit nidum: H
intexit enim specie pilæ lineæ aditu archo. Ut pennis præualere, sic pedibus 7
degenerare uidentur hirundo, drepanus, & qui apodes dicuntur: hæc enim
omnia & moribus, & uolatu, & specie proxima inter se conspiciuntur. Sunt
uero apodes, quos aliqui cypsellos appellant, hirundinum adeo similes, ut
haud facile discerni ab hirundine possint, nisi quod tibis sunt hirsutis. Ni-
dum specie castellæ productæ longius longius hæt ex luto, uno aditu dato
ardentissimo faciunt: idq; locus angustus intra saxa & specus, ut & beluas deu-
tare possint & homines. Apparent apodes omnibus anni temporibus. Plu-
rimum uolant quæ apodes uocantur, quia carent usu pedum. hæ sunt quæ
toto mari cernuntur: nec unquam tam longo naves tanque continuo
cur-

*Hirundo,
Riparia,
Agrestis,
Sylvestris.*

*Riparia
Drepanis,
Falcata, Thro-
don.*

*Riparis altera
Argathalis.*

*Apodes.
Cypsellos.*

*Intus saxa in-
tra, infra, Plu-
uina, Nidificati
in scopulis.*

[illegible]

De coruino genere, scilicet coruo & cornice, & de monedula.

CORUI non tantum carnis aluntur, sed & alio pabulo. Circau rhospraci-
pue uiuere solent: nec loca mutant aut latent, sed semper apparēt. Cor-
uorum pennæ interdum à nigris in alias transeunt. Rosstrum coruino ge-
neri robustum ac prædurum est. Inguinem non habet coruus, sed eius uice
gulari amplum & patentem: in coruæ ipsæ fel albis uentri, aliis intestino
hæret. Coruorum genus, coruus, inquam, cornix, monedula, conuulgus
nunquam deserit, neque mas scilicet feminam aut feminam marem relin-
quit: minime quoque salax libidinofusque est, & raro coit. Generat cor-
uus ante solstitium: uero non modo bina, ut aliqui uolunt, parit, uerū
etiam plura, quæ æta scilicet quinquæ. Incubat autē ingenti diebus, & pul-
los cum iam potestas uolandi est, primum nudo eicit: deinde robustos iam
regione tota expellit: sagaxque longius. Itaque paruis in uicis locisque ar-
boribus, & ubi non satis cibi pluribus sit, non plus bona conuugia sunt.
Circa Cratonem quidam Theophrastus singula perpetuo, auctores sunt Calli-
machus & Theopompus. Genitores etenim abeunt ipsi, & compares ibi
relinquentes, soboli loco cedunt. Coruus tauri de alio aduersarius est:
quippe qui aduolans sequeat, & eorum oculos laceret. Malus cum coruo pu-
gnat: eripit enim milui de coruo quicquid tenet. Coruus uulpi amicus est:
pugnat enim cum asilone: unde fit ut hinc, cum ab illo percutitur, auxilium
petat. Agrestes corui sexaginta diebus, sunt maxime ante quam siccitas coquan-
tur autumno. Prædicunt coruæ singula quodam latrantes sive que concunē-

DE DIFFERENTIIS

tes, si continuabunt, uentos si uero carptum uocem telorbebunt, uentosum h. imbre. Et ut Lucretius cecinit,

- Mutant cum tempestantibus unâ
Rancisonos cantus cornuam secla uetusta
Cornuotimque greges, ubi aquam dicuntur & imbes
Pollicere, & interdum uentos aurâque uocare.

Corui eorum in arreo uase permixtum illisumque detrafo capite, nigritiam capillis affert: sed donec marefcat, oleum in ore habendum est, ne & dentes simul negrescant adq; in umbra faciendum est, neque ante triduum abluendum. Alij sanguine & cerebro eius utuntur cum uino nigro: alij excoquunt ipsum, & nocte concubia in plumbum uas condunt. Quam corui grandis capendum constat, quoniam transgressus abortus aspectus facit. F

Cornix, uel cornu

Cornici natura omninores est: nam & litora petunt cornices, & quæ unda elegerit animalia aggrediuntur. Nucis diuinam nostris repugnantem uolantes in altum in saxa regulisue iaciunt iterum ac sepius, donec quasiâ perfringere queant, circa urbes præcipue uiuere solent: neque latent unquâ, sed omni tempore apparent. Ales est inuaspicax: garrulitatis, à quibuscumque ramen ludata. Huc quoque deest ingluuiem sed enas loco gulam habet latam & patentem. Incessu ambulant cornices, ad est pederentem progrediuntur, neque currunt neque salunt. Cornicem solum tantum incubant, alfiduâque in opere perseverant: mares has cibum suggerunt, pascuntque incubantes. Pullos edunt imperfectos & carcos, magnâque proli curam impendunt: quippe quæ sola in adanorum genere etiam uolantes iam suos pullos pascens ipsa comitetur. Longa cornici uita est: & ab autumnio contripitur morbo. Cornix cum noctua dissidet: cornix enim meridie oua suæripiens noctua absumit, cum non clare interdum noctua in deat: noctua contrâ, oua cornicis noctua exedit: estq; altera interdum, altera noctu potentior. A cornice occiditur tympanus. Imbres præmanunt cornix, cum scilicet contra aquam clangores dabit perfundens sese. Et ut ait Vergilius,

Tympanus.

Cum cornix plena pluuiam uocat improba uoce,
Et sola in sicca secum spatant arena,
Et caput obiecit querulum uementibus undis.

Et Cæcero quoque,

Fusa cornu.

Fuscâque nonnunquam cursans per littora cornu
Demersit caput, & fluctum cuncto corpore.

H

Cornicis carnes esse, & illudum illucere in longissimis morbis utilissimû putant: & in tertianis fiat potestas capitiendi. Cornicis cerebrium coctum in cibo sumptum capitis doloribus remedio esse traditur. Monedula quoque deest ingluuiem, sicuti & corno & cornici, sed eius uice gulâ habet amplam & patentem. Monedulam uocant de cuius uenatione hæc narrat Clearchus: Vasculum si statuas oleo plenum, aues ad uasculi margines accedentes, effugietque suam in oleo conspiciet, sese unioergant: quo fit, ut pennis earum ex oleo concretis, facile capiantur. Monedularum tria sunt genera: unum quod coracia uocatur (latine graculum appellati putant) 3

magnitudine

*Monedula, uel
hæc.
sed unde ne
quid. Altheman
pro uoluit
scribi debet
uoluit.
Rogatus,
graculus.*

A magnitudine quanta cornu, rostro rotundo & tunilo. In Lemno insula graculos ob id colant, quod aduerso uolans occurrant locustarum exitio. Gracula sero à pabulis recedentes hyemem praesagunt. Immensa in Insulubrum tractu examina sunt graculorum monedularumque, cui soli aut furacitas aut argentique praecipue mara est. Alterum monedularum genus lycos, id est lupo cognominatum est paruum est & scurra. Tertium genus pal-nupes est, Lydiae ac Phrygiae terra familiare. Monedulae simali specie est a-uis, quam spermologon uocant, magnitudine tetracti aequales, ut auctor est Alexander Myndus, ab erudendis seminibus spermologos & spermatologos uocatur.

Lycos.

Lupos.

Lupos.

Spermologos.

Spermatologos.

Spermatologos.

Spermatologos.

1 Apud Apulidum de deo Socratis, uulpes astute coruam laudat his uerbis, B Quantum ad decoem, pluma mollis, ea pot arguam, rostrum ualdum: iam ipse oculis perspicax, unguibus tenax: nam de colore quid dicam? Enimvero cum duo colores praestabiles forent, picus & niger, quibus inter se nox cum die differunt, utriusque colorem Apollo suis alibus condonauit, candidum olori, nigrum coruæ. 2 Apud Ouidium 3 Falloorum. Phorbus coruo minasem

As tibi cum laetens haerebit in arbore sicus,

De nullo gelida fonte bibantur aquae.

3 Coracias, idem fortasse pyr- Pyrocoracias.

4 Graculos autem esse minime solitarias, sed gregales apparet ex Varrone de re rustica lib. 3.

5 Monedula, au fallos, de secunda illa specie à re quædam dicitur: cui & Ouidius immensum illum aut amorem tribuit.

Seytonis accipies quod auaræ poposcere auro,

Mucosa est in iuueni quæ nunc quoque diligit aurum,

C Nigra pedes, nigris uelata monedula pennas. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

da specie nonnisi quæ accipitur ut apud Constantinum Crisost. de agricultura lib. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100

De pico martio, plicatae, pica, & quibusdam id genus alius.

Cap. CXXXIX.

Sunt & paruae aues uncorum unguum, ut picus martius cognominetur: cui & rostrum adun cum esse tradunt. Hac humi nunquā consistere potest: tutior circum in capite habet. Tūdit hic quercus uermium causa, & eorum quos nōtē uocamus recipit enim egrellos linguis suis, quam manusculā & latiusculam habet. Incedit per arbores uelociter omni quodē modo: sed & supinus quoque more stellionum. unguis habet commodiores quā monedula ad tutiorem arborum reptationem: hic enim affinis ascendit. Sunt pici martii cognominē tria generationum minus quā merula, cui rubidae aliquid plūmę inest: alterum maior merula: tertium non multo minus quā gallina. nodularum in arboribus pullosque in cauis edocant pici autem soli. Piceorum aliquis (inquit Plinius) nudum suspendit in furculo prius in ramos cyathi modo, ut nulla quadrupes possit accedere. Picos martius pascitur formicis & his qui in arboribus nascuntur uermibus: qui & percussu corticis sono pabulum subesse intelligit: cū uermes ueniant, nam uehementer excavare dicitur. Iam uero melleos quidam, amygdalū quoddam inferuisset ligni, ita ut fixum constanter istum reciperet, uermis istum

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

Pico Martius.

DE DIFFERENTIIS

peritudit, & nucleum edit. Et Tichius author est clauum uel cuneum ada-
 ctam quantā ui libeat in arbores, in quibus nidum habeat, itam exilite
 cum crepitu arboris, cum infederit clauo aut cuneo. Picus martius in Tai-
 tano agro negatur esse. pici martij rostrum secam habentes ab apibus, ue-
 spis, crabronibusue non ferri traduntur. Vngues syngi grandes, quæ sima
 les ut monedulis uel, ut Plinio placet, graculis & creut. Lynx paulo maior est
 quàm fringilla, colore uario. digiti à calce syngi bini, ut paucis quibusdam
 auibz, eo quòd corpus eas minus quàm ceterarū prope sum est in aduer-
 sum. Lingua habet serpentibus similem: quippe quā in longitudinem
 mensura quatuor digitorum portigat, rursumque cōtrahit intra rostrum. 1
 Collum etiā circū agit in uerlum, reliquo quiescente corpore, modo ser-
 pentum uoce autem stridet. Plittace Indica aues quā uis uerbosior dicit, 6
 quāsi humanam linguam referent, quæ admodum alæ aues unæ, collū F
 habet breue & linguam latam, aptāque ad imitādam. Et loquaxior cum
 haberit unum reddant. Vindis est toto corpore, torque titum maniato in 7
 ceruice distincta. Capiti eius duritia eadem quæ rostro: ut si quando ad de-
 scendum plaga sit admonendus plittaceus, ferro uerberetur radice: nec sen-
 sit aliter ictus. Quæ accipit uerba pronuntians studetque ut quod homines,
 loquatur, in sylulis inconditam uocem, cum sinodi indoctæ aues solēt, mut-
 titionem autem expressum os & explanatum habet. Dum pullus est, atque
 adeo intra alterum sex ætatis annum, quæ monstrata sunt & cinus dicit
 & tenacius retinet: maior paulo segnior est & obliuiosus & indoctus. Cum
 deuolat, rostro se excipit, illi inimitur, leuorūque se pedum infirmitati G
 facit: culus rostris tam duritia est, inquit Solinus, ut cum è sublimi præci-
 pitatur in saxum, nūllū se ois recipiat, & quodam quāsi præsidio utatur ex-
 traordinariæ firmitatis. Inter nobiles & plebeos discretionem digitorum 8
 facit numerus. Qui præstant, quinos in pede habent digitos, ceteri ternos,
 inquit Solinus. Minor nobilitas, quia nō ex longinquo uenit, sed ex pectus
 loquacitas certo generi picearum est. Adamant uerba quæ loquuntur: nec
 discunt tantum, sed diligūt, meditantēque intra semet cura atque cogita-
 tione intentionem nō occultant. Nec uulgaris has forma, quauis nō spe-
 ctanda sans illas decoret in specie sermonis humani est. Vt cum addiscro
 alias negant posse, quā quæ ex genere earum sunt quæ glāde uescantur:
 & inter eas facilius, quibus quini sunt digiti in pedibus: ac ne eas quidem
 primis duobus uix ætas. Pica uoces plurimas cōmutat: singulis enim sere H
 diebus diuersam erant uocem. Picearū genera longa insignes canda, uariq;
 appellātur: proprium has caluescere omnibus annis cum ferunt rupa. Pica 9
 nidum in arboribus facit, ex pelis & lana: parit oua circiter nouē numero,
 pice cum diligentius usum ab homine nidum sentire, oua trāgerit alio.
 Glandes cum deficiunt colligit pica, & in repositorio abditas reseruat.

1. Ouidius 14. Metamorph. de pice in sacem mutata. . . Duro fera robora rostro
 Figit & iram longa darula tra ramus,
 Purpureum chilamydis pennæ traxere colorem,
 . . . Et fuluo traxit piceæque gressu auro.

A 2. Linguam manifestam, in *pyda*, fortasse longam. utrum interpet, quam habet longam & latam. 3. *Sapinus*, *Pinus*, in subiectum, filium modo. 4. *Theodorus* interpet *pyga* cum aene uult intelligi, qui *mororjé* dicitur. sed an recte hoc, an *lérrephé*, *féus*, considera lector. *lyx* sola, inquit *Pinus*, utriusq. binos habet digitos. 5. *Colum*, Hinc *torquilla* uulgo appellata est, inquit *Theodorus*: quamquam curio ab *torquilla* niquis. 6. *Solinus* & *Pausanias*, *Sola India meris pluracum*. 7. *Torque* tantum *Tarbo*, mirato, *Solinus*, inquit *pauca*. 8. Hec apud *Plinium* uidentur poni ad *picas* referri quam ad *pluracos*. Caudis lib. 5. *Metamorph.* de *Perseubus* in *picas* miratis, sic habet,
- *Nemorum coeuntia pice.*

Nunc quoque in alibus facienda pices remanet,

Raculoque garrulus, studiūque immane loquendi.

9. *Rapa* dum habet functiones fertur enim & uere ante calendas Martias & *Augusto*, ex *Plinio* & *Columella* & *Palladio*; uidentur hic *Pinus* intelligere de secunda *limone*, quae mense fit *Augusto*.

De aliis quibusdam auibus, quae uictus causa arbores & ligna ferunt contunduntque. Cap. C X L.

NON alio magis quam uenatu uermiculorū circa arbores lignaue nascentium (*uermis*, & *uermis* Graeci uocant) *pipra* uiuit, tum maior tum minor, utranque *spinosus*, id est *picum* martium appellant. Similes inter se sunt, uocemque similem emittunt, sed maiorem qui maior est. pascitur utraque ad ligna aduolans. *Pipra* cum lutea dissidet: oua enim inuicem exardunt. Ardeole quoque uimica est: oua enim & puli ardeole uiolantur. 2. *pipra*. In uis est & auis quae proprio nomine *uermis* dicitur: magnitudine parua, quanta est *acanthidis*. colore cinereus distinctus maculis, uoce parua: hic etiam lignipera est. Er *uermis* (*galgulum* interpretantur) lignipeta mirum in modum est: magnūq; ex parte ad ligna aduolans pascitur, cui magnitudo quanta tartari fere est: color luteus, uocem emittit magnā. Incola 3. maxime *Peloponēsi* auis haec est. Crex cum *galgulo* pugnat: amici sunt *galgulus* & *ledax*: colit enim *galgulus* fruteta & nemoralis: *ledax* taxa & mōres: suisque locis uterque contentus degit pacifice. De *galgulis* haec refert *Plinius*. *Galgulos* quidem ipsos deinde tres pedibus hominum capere consueunt, quia rutiliores ita se sperant. *galguli* cum fortum eduxere hinc abeunt. Auis icterus uocatur à colore: quae si spectetur, sanari id malum tradunt, & aene emori. Hanc puto latine uocari *galgulum*, inquit *Plinius*. Sitra quoque uictus ligna contundens. mores huc pugnaces, sed minus hilares, conuinnus, cōpos uirz familiaris. Rem malebcam ei tribuunt, quia resū callet cognitione. prolem haec numerosam faciliq; progignat. Cum aquila dissidet sita, & oua eius frangit. Est & *uicula* quaedā certhus nomine, cui domicilium apud arbores, uictus ex uermiculis in ligno nascentibus, qui culicibus similes sunt (*thripes* uocantur): mores illi audaces, angustum ligat, in uirz officiuoz clara. Quae ungues habent aduncos, quaeque carne fere pascuntur, aut uermiculis atque id genus bestiolis in ligno nascētibz: eorumq; causa arbores lignaue petunt, fere perfectum sumus.

1. *Pipra*, &c. *Theodorus* *pipronem* uocat. 2. Ad ligna, *uermis* *pyda*, ad maceriem *Pipra*. uerum *Theodorus*. *Antiochus*, in *salicis*, & arbores uiuiculis intelligi, & succis atque aridas ut ligni fortasse debeat, ad maceriem. 3. *uermis*, *pyda*, *Theodorus* *culicem* *legam* dicitur.

DE DIFFERENTIIS

tit. 4. Luteus, & ægis uero interpret, cinnamomum uiridans. 5. Cum galgulo. Hæc utraque similitudo est multis quidem suspecta cum quod in Græca. Aristotelis li-
tera, quod Theodorus (cum galgulo) uenit, habetur uasis in posterore uero galgulo
uasis uasis dicuntur etiam quod interpret Arabicus non idem habet utroque lo-
co nomen: nam pro galgulo in priore sententia aut nihil habet, aut oreo: in postero-
re uero siglor. Item quæm Theodorus ledum, Aristoteles autem docat. Postremo, quod
Aristoteles dunt, *ἡ δὲ τοῦ αἰγίου τοῦ αἰγίου τοῦ αἰγίου*, Theodorus uenit, Colu-
næ galgulus finitæ & nemora quæquam & uetus interpret ante illum ita uenit, Fe-
lex utro manet propellentes, & loca in quibus sunt arbores. 6. Ligna cædenda,
ἡ δὲ τοῦ αἰγίου. 7. Rem maleficam, &c. *ἡ δὲ τοῦ αἰγίου τοῦ αἰγίου*, quod ita reddide-
rit interpret, Et nigromantici uident ipsa, quoniam ceruicem in multis. 8. Vetus
ex uermiculis, &c. *ἡ δὲ τοῦ αἰγίου* est & ceruicem, sed alia uidentur uis, quæ locustas deo-
rat: ex Aristophane in Aulis.

ἡ δὲ τοῦ αἰγίου, id est quæ spinis uiscitant.

Cap. CXLI. P

Non ligna arborisue, sed spinas appetunt nonnulla ausum genera, at-
que in spinis uiscitant aut dument uermem autem aut quoduis ani-
mal asperratur acanthas, carduelis siue traupis, & chryso-metris. dor-
miunt hæc, & pascuntur eodem loco. In his acanthidi in uepribus spinisque
uiscitant: uermes nec ullum animal comedat. Vetus & colore ignobilis
est, sed ualor uocis amercitate. Acanthus oua parit duodena, aëis manibus:
hyeme ad loca nemoribus frequentia confugit. Acanthus & alinus inimici
inter se sunt: alinus enim spinas tenellas adhuc pascit, à quibus acanthidi ui-
ctus est. Sunt qui *uiscitant* quoque hanc autem uocari arbitrantur. Est autē
uiscitant (quali uaria in dixeris) auncula colore uario, & in dumentis uersatur:
Quæ *uiscitant* dicuntur, cum alaudis dissident: oua enim iniuicem exedat. G
Aegithus uis maxima cum alino dissidet, propterea quod alinus spancis
sua ulcera scabendi causa arerat, nidoq; ægithi dissipet: ob id agitur, si uel
nuderit alinus, oua denicetur, & pulli præ metu decidunt: itaq; ob eam in-
iuriam aduolans, ulcera eius rostro excant. Aegithus uite cōmoditate &
partus numero cōmōdatur, sed pede claudus est. Traupis spinis uiscitant:
uermem autem aut quoduis aliud animal asperratur: hanc carduelis esse
uolunt. Minusq; ausum carduelis im-perata faciunt: nec uoce tantum, sed
pedibus & ore pro manibus. Chryso-metris etiam in spinis uiscitat, & uer-
mem quoque & quoduis aliud animal asperratur, nō aliter atque traupis.
Er hæc quidem in spinas dumentisq; maxime uiuunt: uermiculos uero aut
bestiolis aliis ne arungunt quidem.

H

1. Acanthis, & acanthus, & iperurus uocatur, spinis uenit Theodorus. Est uer-
m uiscitant apud Athenienses & Suidam uis genus & uiscitant apud Pollucem, uerū non-
dum constat an sit acanthus. Vergilius de acanthide,

Leniorq; halyconem ulsonant, & acanthide dunt. 2. Oua denicetur. Pl. Quod
illa adeo pascit, ut uocem omnino uidentis audita, oua denicet, pulli ipsi metro cadit.

De is ausculis, quæ maxima ex parte uermiculis aliisque id genus a-
nimalculis uiuunt, *uiscitant* dicuntur. Cap. CXLII.

Passeres autem fore uermiculis aluntur: circa muros urbeum uersantur
passeres minor est quàm alauda. Eius pennæ ob temporis mutationem,
(ut propter singus) è nigris albidæ sunt. Neque gulam neq; uelut a m-
plam

Aplam habent sed uentriculus illi longior, qualis est ausculus fere omnibus. Fel in alus uētra, alius intestino iungitur. Passēres tam lauare tum poluerare solent: incedūt autem saliendo. Prociuius in uenerē auscula est & multipax: superflubens coit, & cito perficit. Feminae maribus umbellibores sunt, tum alius corporis partibus, tum uero maxime ipso rostro. Sūt qui feminas hoc in genere uiuaciores esse uolūt, quā mares, (& id quidem ob marium salacitatem) capi enim has inter nouellos pullos, cognoscique laborum callo assueuerant: mares uero anno diutius durare non possē arbitrantur, argumento, quōd ueris mino nulli mentum, id est partes sub rostro proximas habere nigrum spectantur. sed postea, tanquam nullas anni superuicere seruetur. Terpsicles author est, uentrem concitare passētes in cibo, uel oua co-

Brum. Passērum canis sarmentis cinematorum cochlearibus duobus morbo resistit regio. Passēres *Andru* uocant nonnulli, alij *Andruer*. Apud muros *Andru*, ueteres sepelique uictum querit at troglodytes, omnium auscularum mini *Andru* ma, praterquam illa quę *Andru* appellatur, id est regulus. In multis quo- que basilisco auiculae similis est, nisi quōd in fronte aurcas non habet pen- nas troglodytes. Est uero troglodytes basilisco regulusue paulo maior ma- gisque nigricans, annui rostris, caudamque semper gerit subrectam, in aue- ra parte candicantibus maculis interpunctam. magis item garrulus quā basiliscus est, & apud aliarum extrema cinerei magis coloris, breues item sa- cit uolamus. In hyeme sere quousque apparet hoc auscularum genus: in ci- bo calculum renem comminuit, & assa & sale condita, si assidue edantur: &

Cne alius progignatur calculus, efficit. Eadem prestat & combussit auiculae cinis epotus uerum sale obruitur integra, auialis pennae: uerum autem uni- cum pennis. In us que uermiculis uidentur tyrannus est, auis maxima: *Tyrannus* cui corpus non multo grandius sit quā locustae. Crassam gestat rutilam, cetera elegans auscula est cautiusq; suavis. Vermiculos petit & spiza, frin- gillam uocant: foro magnitudine aequalis, orospiæ non admodum dissimilis, & magnitudine quoque. Spiza contra quā uertur, astate tepidis lo- cis, hyeme singulis degit. Orospiæ (quasi montis fringillam dixeris) spizæ similis, & magnitudine ptoxiæ: sed collo oerulæ: & in montibus degit. uermiculus maxima ex parte uiuit. Spizæ, argutæ, id est pari species est. Sunt autem pari tria genera: horum maxima spizites, siue fringillago est,

D quippe quæ fringillam æquet magnitudine: aliter ipsa, id est monticula co- gnominis est, quoniam in montibus degit, cui cauda longior: tertius cetera quidem similis illis, magnitudine discrepat: est enim corpore cingulo. Pa- rus, ut aune, plutina oua parit. Inferunt inuicem apibus auiculae, quas pa- ros uocant. uermibus fere uiuunt. Para cenante græce dicitur, (ac si uis- toram dixeris) statos lacteque dies habet, exoriente syrio occu lata, ab oc- casu eiusdem prodit: quod nuncmur, ipsis diebus utranque. Melancory- phus etiam uermibus pascitur, aricapillam uocant. Hanc plutina edere oua aliqui referunt post Africum struthionem. Lam uel decem & septem oua eius reperta sunt: sed plura etiam quā uiginti parit, & numero impa- ri semper, ut narrat. Proprium huius & lusciniæ præter ceteras aues, ut lin-

DE DIFFERENTIIS

cucurbitis medicinalibus, his quibus collum porrectius est, magnitudo autem
 prior quam maxima spongiæ. Inana quoque habet canis spongiarum si- 4
 milia. Revertitur ferramento acuto, ut uix possit discindi: sed si una & ferro
 5 runda, & manu collidis, facile perinde ut flos maris aridus (halosachnem
 dico) confringitur. os eius per quam angustum, quoad sit exiguus aditus,
 ut etiam si uertatur mare, influere nequeat. Ambiguit ex quantum mate-
 ria componatur: uidetur tamen è spinis potius belones piscis constitui: po- 6
 scibus enim balcedo uenit, sed amnes etiam subit ascendens longius. Forti-
 ficat toto suæ ætatis tempore. parere nata menses quatuor incipit: partus
 huic maxime quinque ovis consumitur. Circa brumam parere solita est.
 dies earum partus qui maria quoque navigant nouerunt: natæ enim ma-
 re halcyonum fertur, & inde nomen illi dies traxere, septem scilicet ante &
 7 brumam, & septem à bruma: quamobrem quoties bruma festina existit, dies
 halcyoneæ appellantur. Septem primis diebus nidam cōficere autem hanc
 fertur: reliquis septem parere educatæque. Dies halcyoneas fieri circa bru-
 mam non semper nostris locis contingit, ut Aristoteles: at in Siculo mari
 pene semper id euenit: ut uero Plinius, in reliquis partibus est quidem mi-
 nus pelagus: Siculum utique tractabile. Halcyonē uidere rarissimum est:
 fere enim circa uergiliarum occasum brumamque ipsam apparet: & ubi
 primum per portum non plus quam nauem circumsolarit, statim abet, ut
 nusquam præterea uideatur. Antigonus auctor est halcyonas cum senue- 7
 rit cerylos uocari, quos tamē Aristoteles separate uidetur. Apud mare, in- 8
 quit, balcedo uersatur & cerylos. Idem quoque Antigonus tradit cerylos à
 nonnullis mares halcyonas appellari: alius ceryx mas est & halcyonæ femi- 9
 na: ut elegantissimo carmine ostendit Ouidius de Ceyce & Halcyone coni-
 iugibus, quos fabulantur in huius generis aues mutatos:

Tandem superis miserantibus ambo
 Alie mutastant fati obnoxios uideri.
 Tunc quoque mansit amor, nec conjugale solutum est
 Fœdus in alitibus coeunt fiuntque parentes:
 Perque dies placidos hyberno tempore septem
 Incubat halcyonæ pendensibus æquore nedis.

Halcyonæ. Fit in mari halcyoneum appellatam ex nedis (ut aequi existimant) halcyo-
Halcyonæ. num & cerycum: alij è sordibus spumant crasse scæcis, alij è limo uel qua-
 dam maris lanugine. Quatuor eius genera, inquit Plinius, cinereis, spissam,
 odoris asperualterum molle, leuiss, odore fœte algæ: tertium candidioris
 uetnaiculi, quartum pumicosius (spongiæque pumi simile, pene par par eam:
Malisium. quod opetum, id & Malisium uocatur: quo candidius autem, hoc minus
 probabile est. Ut uero Galeus tradidit, unū eorū densum est & graue, ter-
 tidum: olcet enim pisces pueridos, figura spongiæ similis: alterum figura ob-
 longiore, rarum & leue, odorem refoet marinus fœcis similem: tertium uer-
 mais figura, colore purpurascens, substantia molli, Malisium id uocant:
 quartum æque atque secundum genus rarum leuèque, succidæ lane simi-
 le: quintum postremo extrema superficie leui, interna uero habet asperaro-
 10 dore

*Dies halcyo-
 nes, Plinius.*

*Halcyonæ.
 cerylos, An-
 ton.
 Cerylos,
 Geyx.*

A dore quidem nullo, sed quòd gustu manifestam præset acrimoniâ. Hoc & omnium halcyoniorum calidissimum estur quod uel pilos erurete possit. Halcyonij genus omne discimus & abstergit, acn scilicet & calida urina gis tamen minùsue pro cuiusque generis acrimonia calotique, & quòd aliud alio partes habeat tenuiores. Nam cum prima duo genera ad alphas, lichenas, leprisque & pîoras utiliter adhibeantur, & præterea splendidam reddunt cutem, ad nò præstabit quod ultimo loco dictum est: quippe quod non summam tantum cutem extenit, sed abra det & exulcerat. Miliolum omnium est tenuissimum: itaque uelut alopecius medetur ex uino sialuo & tenui illitum. Vires habet mirum e omnium efficaces quantum halcyonij genus, ut Galeno placet. Vîus, inquit Plinius, tostus & sine oleo mîce

B lepras, lichenas, lentigines tollunt cum lupino & sulphuris duobus obolis. 10 halcyoneo uruntur & ad oculorum cicatrices. Phœnicopterus avis est lacustræscitica lacus enim & paludes uisitat, uisû pulchra & colore decora purpureo. Phœnicopteri linguâ præcipue saporis esse Apicius docuit, nepotum omnium altissimus gurgēs. Aut hanc breui carmine depinxit Martialis

Dat mihi penna rubens nomen sed lingua gulosis

Nostra sapit quid si garula lingua foret

11 Ad hæc lacus & fluuios petunt albicula, schorniclos, cinchilus, & tringa, 12 quæ omnes eandem motant: quin etiam calidus, cui cinereus color distans

C lacus solum & flumens, sed uitam etiam apud mare tradocit. Astutus hac & capi difficilis est: sed captus maxime miseret. Læsus hac est & prope mutulus incontinens enim parte sui post erore est: ideo suapte natura & per se, ut aiunt, nidum sibi construere non potest, sed in alieno parit. Hæc semper caudam motitat. Tringa inter minores has aves maxima est: turdo enim æquiparatur. Hæc & circa aquas uiuit, & caudam motitat.

1. Elea, Theodorus (nisi culpa sit libræorum) hanc auem confudit cum gnaphalo. 2. Alterum genus eorum, inquit Plinius, magnitudine distinguitur & canna.

3. Pila figura, inquit Plinius, paulum emittens, ut perquam angulato grâdû spongiarum similitudine. 4. Theodor. Magnitudo maxima amplior quam spongie.

5. Nidum ubi intertexere, in mare delerunt, ubi flumens ab iore cursu nobis uisitatam opus probatur. & partes quas aqua inuadit ostendit non firmas esse, ut si ceruus, ut neque si percutiatur fixo capatur, neq. ferro dissindatur. Id. Alienus. 6. Plinius, Puras ex spîis aculeatis edidit multisq. eibus enim uiuunt. 7. In lumbis ibi, Plinius.

D 1. Cerylos, Theodorus carulos dixit. 2. Numerantur ab Aristotele ut duca se aues halcyonæ & cerylus, cum differant tantum sexa, sicu & melicoryphus & sicula pro diuersis numerantur in eodem capite & erachacus & phœnicopterus, tamen non differant specie, sed affectione quadam. 10. Videtur phœnicopterus insigni esse magnitudine, ex Sueronio in Caligula. Hostius eris phœnicopteri, potiones, erachacæ non tamen inter maximas aues numeranda, sed inter mediocres magnitudine potius uidentur ex Cœ. Cæss. Iuuenalis in Saryr.

Et Scythiæ uolucres & phœnicopterus iugens. Heliodorus de rebus Æthiopicis lib. 6. ἡ φαιδὸν φωνὴν ἔχει dixit, id est phœnicopteram Niliacum. 11. Albicula apud Theodorum habetur, sed non in nostris exemplaribus Græcis. 12. Omnes ut color cinereus, ac habet uetus in præpæ.

Phœnicopterus.

Albicula
Calidus
Schorniclos
Aues
Cinchilus

Tringa.

Cerylus.

Larus, Larus.

Larus avis aquatica est, uoxque admodum & gulosi sui gula tota ampla & lata est. In petris marinis natiuitas lani. Oua bina ternaeue parient atque tunc unquam latent. Lani duplex genus, alter colore est eutercochus circa lacus & fluuios uiscitatulter albus est, & à mari uictu quartus, & proinde cum brentio & harpa dissidet lani quandoquidem & har à mari uictum petant. Eisdem ob causam, quia scilicet uictus earum similis est, inimica harpae & phoebus est cum peculiare propter ceteris est, ut oculos auium deuorare potissimum appetat. Harpa quoque cum trionche accipere dissidet & communibus inimicis harpa & miluus contra trioncham pugnant.

*Brentio, Harpa.**Phoebus.**Gavia.*

Gavia eadem quae lani creditur. In petris, inquit Plinius, nudificant gaviae & stare, dissidet anates & gaviae. Auis per alba illa, inquit Apuleius, gavia, quae super fluctus marinos natat, demergit sese prope ad oceanum profundum gremium. Charadrius à mari uictum petit. Degit plurimum in faxis & caernis. Praua hinc auis & colore & uoce est: & noctu apparet, die aufugit. Morbo regio medetur, (ut affirmant quidam) si ab agro uel conspiciatur duntaxat. Quocirca qui uentem uendunt, abscondunt eam ne ab agro prius uideatur, quam eam uendiderint, ut auctor est Euphranius: alij non hoc uisum, sed in cibo efficere assueverant.

*Charadrius, Eutercochus, Harpa, Miluus.**Cephus, Cephus, Fulix.*

Cephus (fulicam interpretantur) circa mare uiscitat. Cephi spuma capuntur: apperunt enim eam audius: quocirca spuma inspersa eas uenari in usu est. Caro eorum probi odoris est, excepta parte posteriore, quae circa clunes est, quae sola limem olet: sunt autem pingues. Cephi, inquit Aratus, cum relicto mari gregatim in terram aduerso uento reuolant, uentum praenuntiant. Fulica, ut Plinius tradit, cursum in capite pro apice gestat. Fulica maritima clagore tempestates praenuntiant: & ut catrinus quoque ex Arato tradit Cicero, quae & fulicem eam uocat,

Fulix.

Cana fulix itidem fugiens ex gurgite ponti,
Nuntiat horribiles clamaans instare procellas,
Haud modicos tremulo fundens ex gutture cantus.

Et Vergilius,

Lam sibi rum cutuis male temperat unda carinis,
Cum medio celeres reuolant ex aequore mergi,
Clamorémque ferant ad litora: cumque marinae
In sicco ludant fulice.

Arhya.

Arhya circa mare uiscitat, & in aqua degit. Arhyas cum frequentius in mare sese immergunt tempestates navigantibus futuras praesagire solent: huius causam reddunt, quod tranquillo mari progredi non audent arhya marinorum beluarum metus: ac cum tempestatem praesensent, audacter progrediuntur, quod tunc temporis marinae illae beluae in altum abierunt: uerum Auratus arhyas, inquit, maria aut stagna fugientes pennasque in terra rosistro purgantes uentum praesagiant. Arhyae saxi maritimi oua bina ternaeue statim à bruma parientur inuente uer: nec ullo tempore latent. Arhyae uentriculum

H

A ventriculum ample stantur nonnulla, tanquam medicamentū, quod concoctioni conferat: utrum (ut inquit Galenus) neque ipse facile concoquitur, neque inequit ad aliorum concoctionem inuat. Iecur autem inueteratum exsiccatumque ex aqua multa binas cochlearis epotum, secundas

8 eiecit author est Dioscorides. Eandem esse arthyam cum *αἰγάδα θαλάσσιον*, id est cum cornice marina authores sunt Helichius & Suidas. Et mergū quoque eandem esse autem nonnulli tradunt. Mergus, inquit Plinius, insatiabilis auis est, eo quod à ventre proximis recto intestino (manum inquam flexuoso) trahunt cibi. Mergi in arboribus nidificantes: paritunt oua plurimum terna, idē incipiente ueremur inquam latent. Inter aquaticas mergi solim sunt deuorare: quae ceterae reddunt. Mergi pennas toto purgantes, uentū, 10 maria quoque aut stagna fugientes, compellunt praefragantur & Vergilius testatus est,

Lam sibi tum cutuis male temperat unda carinis,
Cum medio celeres tenuolant ex aequore mergi,
Clamorēque ferunt ad litora.

Vocem nonnunquam mutare mergum author est Laetius:

Accipitres atque ossifrage mergique marinis
Fluctibus in salso uictum uicemque petentes,
Longe alias alto iaciunt in tempore uoces.

Mergi totam speciem, seseque immergendi frequentiam pulchre depinxit Ouidius in *Alaci* in mergum mutatione:

C Utque nouas humens assumpset it alas,
Subuolat, atque iterum corpus super aequora mittit.
Pluma leuāt cassus statit *Alacus*, inque profundam
Pronus abit, letique uiam sine fine terentat.
Fecit amor maciem: longa inuictuodia curum,
Longa manet uetuis, caput est à corpore longe.
*Al*quot amat, nomēque tenet, quia mergitur illo.

Cacartaia mari uictuatur: & cum se in altum immerferit, manet nō minus *Cacartaia* temporis, quā in quo spatium transieris iugeri. Minor quā accipiter auis *καταδύσασα* haec estigula eius tota ampla & lata est.

D 1 Larus, *ἰάραξ* & *φάλαξ* *θαλάσσιον*. Athenus. 2 *αἰγάδα*, Theodorus anazē *αἰγάδα* interpretatur. 3 Ex hoc Plinij loco fortissim Theodorus apud Anthonem *αἰγάδα* anazē uocat. 4 Charadrius, *λαορ* *θουανίης* uidetur Anstophanes hanc uocem mutare in Anthoni: *χαράδριος* ἢ *τῆς* *λαορ* *θουανίης*. 5 Cephus, Theron Azari-interpres, Auis & graecis itaq; macra admodū, uti carnis nihil habere uidetur, sed ossa solum & penas. 6 Quo pascio solitas spuma capideat, ostendit Nicander in *Alexiphat*. 7 Linum elct. Quae sola facit ut reddat uetus interpret. 8 *Aethyam*, Arrianus in *Populi* mari nauigatione *αἰγάδα* *θαλάσσιον* uel enometat cum *αἰγάδα*, tanquam uoci diuersis. Eadem fortasse apud illum est, quae cornu marinus uocatur de quo infra. Mergum etiam hungam à potius uocari auctor est Phocion grammaticus. *Ααγα*. 9 Quibus apimalibus intelligi recte fuit, inquit Aristoteles, ea cibum amia sunt.

10 Mergi in arboribus nidificantes, inquit Plinius. Qui mergum eandem esse cum arthya sentiunt, locū hanc Plinij aliter legam necesse est. Io. Claymondus ex comestura ita legendum arbitrat: *Γαῖα* in petris nidificant mergi etiam in arboribus.

DE DIFFERENTIIS

uerum codices omnes, quos equid fiderem, in altera littera confonant. *u* Maria-*E* quoque aut *fl*agna fugientes, & cetera. Neque hoc quidem *xyhyx* conuenire uidentur.

De elorio, crece, ortygometra & glortude.

Cap. CXLV.

Elorio.

Crece.

Crece dicitur mag-
nitudo com-
parat Herod.
ut aspec uide-
bitur.

Ortygometa,
ignis uolans.
Tarda incre-
mentis, dicitur
Herod.

Glortus.

Ha est.

Longitudo.

Elorius auis est apud mare uictuans crece similis. caelo tranquillo ad illius pascitur. Habet porro crece rostrum longum & acutum serratimque: crura item longa: & digius pedis posterior, qui loco calcis geritur, minutus est. Crece pugnax est, & ingenio ualens ad uictum, sed cetera infelix. Cum gurgulo pugnat, & merula, & uireoner nocet enim his & coru pullos. Lacustribus ambus similis ortygometra est, quæ ex his una est quæ duces se præbent coturnicibus hinc abeuntibus. Magnitudo illi rartaria, crura longior, uis timida, tardique incrementi. Glortus etiam ex his est quæ duces se præbent coturnacibus hinc commigrantibus: cui forma quoque similis est ambus lacustribus: hæc linguam exerit prælongam, unde illi nomen. Hanc in initio blandita peregrinatione auide profectam penitentiæ in uolam, cum labore scilicet subit, reuerti in comitaram piget & sequi: nec unquam plus uno die peragit, in proximo hospicio deserit uerum inuenitur alia, antecedente anno relicta: simili modo in singulos dies.

De ardeolarum generibus, porphyrione & hæmaropode.

Cap. CXLVI.

Ardea.

Ardeola.

Upstia.

Quidam de Ar-
dea urbe in a-
frica nuntia.

Afluuius & lacubus uictum petit ardeola: cui, ut inquit Ouidius,

Ex sonus, & macies, & pallor, & omnia capiam

Quæ deceant urbem: nomen quoque manfir in illa

Urbe.

Volat ardea protensis in aërem cruribus, quibus loco uropigy utitur ad uolarum dirigendum. Ardeola pipra animata est: oua enim & pulli ardeolæ uiolantur à pipra. Aquila etiam cum ardeola pugnat: unguibus tenam ualens aquila aggreditur: hæc autem repugnando emoritur. Et hostes sunt forices & ardeolæ inuicem se tribus inuadentes. Rursus amici cornix & ardeola contra uulpem genus communibus inimicitias. Ardea in medius arenas trahit hyemem prænuntiat uel, ut Aratus prodit, herodias, cum ad mare magno cum clangore uolitat, ambres prænuntiat: sed cum præter consuetum morem relicto mari, terram etiam cum clangore petit, uentos. Ardeolarum tria sunt genera, pella, alba, asterias, ad est Hællaris. Pella cotus difficilis est: nociferatur enim mas, & sanguinem ex oculis (ut aiunt) emittit. parit etiam ægre se mens, summoque cum dolore. Sagax & in uictu quæritudo operosa est & cornigerula. Agere interdum solet: color tamen est prauo & albo humida. Piculum cū us uicit, à quibus ledi tur hoc est cum aquila, à qua rapitur: cum uulpe, à qua noctu capitur: cum alauda, à qua oua eius diripiuntur. Reliquarum duarum, celsida colore est pulchro, & coit, & nidulatur probe in arboribus. Pascitur in paludibus, lacu, campis & pratis: & hanc inter aues altero oculo carere tradunt. Se dæstierias, quæ & ioue, id est pigra cognominata est, (ut cognomé sonat) iners otiosaque est. Est & quæ *abest* *abest*, id est albardeola uocatur, quæ magnitu-

dine

Herodias, fa-
licum nuntia-
liuorum.

Pella.

Pellus.

Uides.

Abest, id est

abest, id est

abest, id est

abest, id est

abest, id est

abest, id est

abest, id est

abest, id est

abest, id est

abest, id est

abest, id est

A dme minor est, rostro lato potrectoque. Ardeolæ rostrum in pelle asinina
fronti adalligatum, somnum allicere aiunt. Putant & per se rostrum eius-
dem effectus esse viuo collutum. Et crura longa habet porphyrio, collum-
que longum & angustum: & uolat potrectis cruribus, ut ardea, cum uropy-
gram ad uolarum ineptiam habeat. Avis est Lybica porphyrio, ut auctor
est Alexander Myndus uerum, uti Plinius refert, Baleares insule porphy-
rionem mittunt: laudatissima in Commagene. Gallinacæ magnitudinis est
porphyrio, colore cœruleum imitante. Rostra porphyrii & prælonga
crura rubent, pedibus filis. Annum quibus longa sunt crura solus porphy-
rio mortis bibat. Cibum omnem aqua subinde tingit: deinde pede ad rostrū
ueluti manu affert. Volatu porphyrio minime in sublimē fertur: palueta-
tionis insatiabili gaudio tenetur. in locis ubi columbæ se lauare solent la-
uatur: nec prius tamen se uel in palueterem daruel in luacrum, quàm am-
bulando certa spatia confecerit. In magnificis splendidisque domibus por-
phyrio ludicta delectatio est: quarum intra claustra solutus erat. Porphy-
rionem qui cibi gratia in cœnis apposuerit hominem scio nomen, in-
quit *Aelianus*. Scribit Polemon porphyrionem, si in edibus nutrian, ma-
lieros anxie obseruare, sensumque adulterij habere: ac significare ad patris
malias in cuius domo alitur: & id quidem haud alio modo quàm sese iugu-
lando. Hematopus multo minor est quàm porphyrio, quanquam eadem
crurum altitudine rostrum quoque illa & crura rubent. nascitur in Ægy-
pto. insidit ternis digitis. Præcipue ei pabulum muscæ uita in Italia paucis
diebus. Clitarchus in India scribit uolucrem nomine horionem nasci, ma-
gnitudine herodii æqualem, rubris cruribus, oculis cœruleis, sic musica
instructum, ut naturæ munere tam suauiter canat, ut ipsas Sirenes laceffe-
re possit.

Porphyrio
tarphion.

Hematopus.

Horion.

1. *Porphyrio*, alia uis est apud Athenienses, & hæc *porphyra* alia. 2. Cœruleum imi-
tante, uolat: uel, ut habet *Anthophanus* interpres, *uolans*, id est cœruleo, uel fœco, uel
nigro. 3. *Hematopus*, alius *hematopus*.

Porphyrio,
Læporphyra,
Hematopus.

De grue, platea, ciconia, & ibide.

Cap. CXLVII.

D Grues ad paludes aduolant & de ultimis, prope diretionem, in ultimam: ex
Scythiis enim cœpis ad paludes Ægypto superiores, unde Nilus pro-
fluit, ueniant: quo in loco pugnare cum Pygæis dicuntur. Immensus est
tractus quod penium, inquit Plinius, si quis reputet à mari Eoo. Rostrum ha-
bet grues longum. Balearice grues carrum in capite gestant. Coclit grues
non confidenter humi ferunt, sed stante: & quàm celeritè rem peragūt:
mas enim supersiliens, cito, ut passeres, perficit. Pariunt oua bina. In incessu
ante se pedes iaciunt. In grandiorum alitum genere grues tantum mutant
colorem, & in senectute nigrescunt. Grues etiā males prudenter faciunt:
loca etiam longinqua perunt (ut dictum est) sui commodi gratia: & uolant
flatu secundo alte, ut procul perspicere possint: & si nubes tempestatis in-
derunt, conferunt se in terram, & humi quiescunt. Ideoque grues silēto per
sublimē uolantes, se remittere: in mediterranea uero festinantes uenire

Gruis, *Pygæis*.

Gruis, *Balea*,
etc.

prælagire feruntur. Docem etiam habent: & eos qui clament in extremo agmine dispositos, ut vox percipi possit, quo gregem uoce cōtineant. Illud quoque animaduertum, græcos cum maria transmutant, trianguli efficere formæ: eius autē summo angulo aër ab us aduersus pellitur: deinde sensim ab utroque latere dilatante se cuneo, porrigitur agmē: quæ sequitur græves, in tergo præuolantium colla & capita reponunt: quod quia ipse dux facere non potest, (quia non habet ubi nitatur) reuolat sensus, ut ipse quoque quiescat: in eius locum succedit ex iis quæ assequitur: eique uicissitudo in omni cursu conseruatur. Cum consistunt, excubias habent nocturnis temporibus lapillum pede sustinentes, qui lassus somno decedens, indigentiam sono congruat: ceteræ dormiant capite subter alam condito alternis pedibus insistentes, dux erecto prospiciendo collo, & quod senserit uoce signifi-
cat. Eadem manu effatæ lasciuunt, gyrōsq; quoddam indecoro cursu nel singule peragunt. Corn. Nepos, qui dum Augusta principatu obuit, cum scriberet turdos paulo ante coepios saginari, addidit ciconias magis placere q̃ græves: cum hæc nunc ales inter primas exspectatur, illi uero nemo uelit retigisse. Græuum caro, inquit Galenus, tota fibrosa durāq; est: qua tamen uesci solemus postquā pluribus à morte diebus quasi cōpauererit. In Balcaribus insulis uispones in mensarum honore sunt: porro uispones uocēse minores græues. Geomphæni autem in Sardinia natiæ græui simili, ignoti iam etiam Sardinia, ut existimo. Platalea etiā migrant, & de Strymone amne ad Istrum, aduolant, prolemque ibi faciunt: Istrum habet platales magnū. Hanc sibi cibum quæ tete aiunt aduolant: em ad eas aues quæ se in mari mergunt: quæ G cum emerferint piscemque ceperint, usque eo premere earum capita mordicus, dum caput illi amittant, atque ita caputam extorqueant. eadēque hæc auis scribitur conchis se solere complere, easque cum stomachica alore concoxerit, euomere: atque ita hiantibus iam testis, eligere ex iis quæ sunt esculentia. Ciconiæ circa lacus & fluuios degunt: sed quoniam ē loco ad nos ueniam, aut quod se referant incognitum adhuc est: ē longinquo uenire non dubiū eodem quo græues modo, illas hyemus, has æstatis aduectas: hyeme nanq; latent ciconiæ. Abintare congregantur in loco certo: comatatræ; sic ut nulla sui generis relinquatur, nisi captiua & serua, eæ lege prædicta die recedant. Nemo uidit agmē discedentium, cum discessurum appareat: nec uenire, sed uenisse cernimus: utrumque nocturnis sit temporibus. Incessu pedes ante se iaciunt ut græues. Sane quæ ciconiis non inesse linguas confirmet uerū sonum, quo crepitant, os potius quàm uocis esse. ciconiæ nidōs eodēdē sepeunt. Eximia illis inest pietas: ceterū quantam temporis impendunt soribus educandis, citam & ipse à pulis suis inuicem aluntur: ita impenſe nidōs fouet, ut incubus assidue plumes eruant: & genitorum senectutem inuicem educare inuulgatū est. Nocent eis omnibus quidem locis nefas ducunt, sed in Theſſalia maxime, ubi serpentum immanis copia est: quos dam escandi gratia insectantur, regionibus Theſſalicis plurimum mali detrahūt. Prouide honos iis in Theſſalia serpentum exitio tantum, ut capitale fuerit occidisse, eadem legibus pena quæ in homicidium

Tyriana.
Geomphæna.
Platalea.
Procyon.
Plata.

Ciconia.
Platycæ.
Platycæ.

A homicidam. Trāspadana Italia iuxta Alpes Lariū lacum appellat, ad quem ciconiæ non permittuntur. Contra uenenata omnia ciconiarum ūtrocūque ualet. Ciconiæ pullum qui ederit, negatur annis continuis lippitatus. Figura & magnitudine ciconiæ ſimilis eſt ibes, autis mīſuētiffima. graditur magna celeritate: nec eam ocyus quīſpiam ingredi uideat, quā mōlli gradu & cūdo. Inuocant & Aegyptij ibes ſuas contra ſerpentum aduentum: in-eunte namque uere, (ut aiunt) angues alati ex Arabia in Aegyptum frequen-tes aduolant, quos ibes interficiunt: eīſque ob cauſam noem hāc colunt Aegyptij. Duplici genere diſtinguuntur ibes. Sunt enim alie candidæ, alie nigre. Candidæ apud Peluſium tantum nō ſunt, cum in reliqua tota Aegyptio habeantur. Nigræ contra, apud Peluſium tantū, in cetera Aegypto nulle. Extra Aegyptum non progrediuntur ibides. Incolis tum utiles ſunt, tum

*Alie candidæ,
ſitæ. alie,
nigre, colore
tenui.*

B inutiliter moleſtæq; utiles quidem, quod ſerpentes aliæque noxia anamacula, & omnia macellorum purgamenta deuorant: inutilis uero & moleſta, quod omnia deuorant, nec facile arceri poſſunt. Herodotus ita diſtinguit ibes quæ ſerpentes oppugnat, nigra tota uehementer eſt, cruribus gruinis roſtro ſdūco, eadem qua cres magnitudine. Alteri generi gracile caput ac totum collum, pennæ ubique candidæ præter caput ceruicemque atq; extremas alas & nates, quæ partes nigre ſunt: cruribus atque roſtro priori ſimile hoc genus eſt. Cuius ibidis ſine pennis crematæ potus, tormina ſanare traditur.

*Ex ſero ſdūco,
nigra, uel
nigra.*

i Plarales, Ariſtoles, di & uingles à la mē uingles poſſibles. 2. Cum ſtomachi calore. Anſoteles, & ſi uti & uingles rē, hoc eſt: ubi ſua implome coarct, uel ea parte quæ ant ſcuticulum proxima eſt. Plurachus hoc tribus herodo.

De aquaticis grauioribus, quæ omnes palmipedes ſunt de anſetum genitibus, de olore & onocrotalo. Cap. CXLVIII.

Palmipedum quæ grauiores ſunt, circa lacus & amnes uerſantur: huius generis anſer præcipue ruſticis gratus eſt nam claſſe paſcuntur in neſotrophis & anates, quæ quodulæ, boſcades, phalarides ſimilæſque uolucres, quæ ſtagna & paludes rimantur, ſed maiore impenſa: anſer aurem nō magni fruſtus, ſed minimi oneris eſt. Anſeri gula tota ampla & laſa eſt: &

*Palmipedes
anſer, phalar,
Alie, uingles
der.*

D appendices quafdam paucas habet infra quā deſinit inteſtinum. Iecur far-tilibus in magnam amplitudinem creſcit: exemptam quoque lacte muſſo augetur. Anſeres in aqua coeunt: à coitu ſeſe aquis ingurgitant. Anſeribus admittendis, ut Varro & Columella prodidere, tempus apertiffimum eſt à bruma: atque ad parandum & incubandum à calēdis Martijſque ad ſolſtium. Pariunt uere, inquit Plinius, aut ſi bruma coarctare, poſt ſolſtium quadrageſimo die prope. Bis anno, ſi priorem ſortum gallinæ excludant: triās plurima oia quindecim, pauciſſima ſeptem. ſi quis ſurripiat, paruant donec rumpantur. hæc Plinius. Singule, inquit Varro, non plus quater in anno pariunt uelut Columella, ſingule ter anno pariunt, ſi probubeantur foras ſuos excludere. Pariunt autem ſingulis ſortibus oia, primo quina, ſequenti quaterna, nouiſſimo terna. Formæ tantum incubant: pulli autem

*Galſtium Co-
lumbella ſe al-
tana parte mē
ſe lūny.*

formandis excludendisque triginta diebus opus est, cum sunt frigora: nam E
septidus quinque & viginti satis est. negatur anser aliena excludere ova, nisi
subiecta quoque sua habuerit. Supponuntur autem gallus huius generis
ova, sicut peromina, plurima quinque, paucissima tria: ipsi autem anseri-
bus incubanda subijci utilissimum novem aut undecim: supponuntur au-
tem paucissima septem, plurima quinde cum. Pullis anserum utrica cōcōctu
mortalis: nec manus auditas, nunc efāctate nimia, nunc suamet ut nam
si anserculus adhuc parum firmus & indigēs ciborū percrevit in piscium,
fruticibus aut solchoribz herbas oblectatur ita pertinaciter, ut collum ab-
rumpat. In legendo anserum grege observare solēt, ut mares formaz que
quā amplissimū corporis, & albi coloris elegantur: quōd plerūque pullos
similes sui faciūt. Nam est & aliud genus rarium, quod à sero mangatum, F
domesticum factum est. Id neque æque secundum est, nec tam pretiosum:
propter quod minime nutriendum præcipiunt. Hoc autem genus, candi-
dum præcipue, nutriendum: non quia magis sit structus, ut dictum est, sed
quia minimi oneris: at tamen præstat ex se pullos atq; plumam, quam nō,
ut in ouibus lanam, semel demerere, sed bis anno, vere & autumno, collere
licet: rursus enim plumigeri vestimentum molliorūq; plumaz, quæ corpori quā-
proxima: & è Germania laudatissima. Candidi ibi, verum minore: gantz
vocantur: est vero Aristoteli anser maior, est & minor, qui gregatilis est.
Anser solenniorē custodiam præbet quā canis: nam clangore prodit in-
sidiantem. Anseres continuo clangore intempesum hyemem prælagunt.
Anserum caro excrementosa est, concoctūque difficilis. atque domesticarū G
omnium avium calidissima, humidissimāq; & crassissima: ut eodem ordi-
ne apud veteres habita sit cum struthocamelæ carne: at tamen nihilo sunt
ceterarum autem alis deteriores: ventriculi suavitare etiam superiōr. Iecur
quoque anseris in cibo gratum est, concoctione facile optimūque succi: &
qui abunde nutrit, si alimenta quæ anseri antea præbentur, lacte fuerint
imbata. Testes anserum in cibo ad sobolem procreandam iuvare feruntur:
lingua vero singulari quadam proprietate stranguarie prodest. Sanguis
anseris adversus venena in antidotis mulcerum maxime utilis: contra lepo-
res marinos valet cum olei aqua portione. Item contra mala medicamēta
omnia asseruatur cum Lemnia rubrica & spinz alba succo, passi llorū dra-
chmis quinq; qui in cyathis ternis aquæ bobātur. Anserinus adeps calidior H
est, & partium magis tenuium q̃ siliis: quia ratione corpora facilius pene-
trat, & eorum quæ intus & in corpore sunt, acrimoniam magis obōndit.
Ex anseris adipe in Cōmagene Syriz fit unguentum odore secundo, pa-
ritur & medicamētum celeberrimi usus, quod à gente dicitur Commagene-
num, utilissimum ad perfrictiones, contusionē, cæcos ac subitos dolores,
omniūque quæ acropis cutantur. Adeps anseris labris fissis prodest, si eo per-
linat: aut gravitatē dolorū sedat instillatus: quidā adtrunc succo
cervi cepet & alij pari modo. Si aqua in aurē intraverit, præcipuū remediū
est anserinus adeps cum cepet succo. Secretus anserinum (ut auctor est Gale-
nus) præ nimia acrimonia nullus est usus. Chenalopex circa lacus & amnes
vernatur

*Clangor, aliar,
gantz, ut Rbe
non placet.*

Comagenum.

*Chenalopec,
Chenalopec,
Pulparier.*

A uerifacit. Est uero chenalopex corpore quàm anser minor, sed animi robore superior atque ad inuadendum audacior, ut qui se ab aquila, felis ac ceterorum hostiū inuictus melius defendat. Pullos suos uerberenter amat: eandemque operam, quam perdit, in eis tuendis potenter ante suos fortis se se procolatens, aucupi spem sui capiendi præbet: ha uero interea dum uenator illudat, elabuntur quibus fuga elapsus, se se alis eleuatis discedit ac sepe, ut pulsi facilius euadant, capiendam se uenatoribus præbet. Parit chenalopex nonnunquam ova hypenemia. Anserū generis sunt chenalo-
3 peces, & quibus lautiores epulas nō nouit Brittānia, ceramades, fero anserē minores. Olor grauius habet corpus:

Nec se celoque louique

Olor.
χέντρυς.
cygnus.
ceram.

B

Credit, sed -

Scagna penē patalósque lacus ignémque petosus,

Quæ colat elegit contraria flumina flammis.

- Collumque à pectore longe

Potrigitur, digitósque ligat iunctura rubentes:

Penna latas uelut tenet os sine acumine rostrum.

Appēdices quasdam habet olor paruas infra a pud intestinum. oloribus ut alter alterum deuoret in more est in azime in uolucrum genere. Aquilam, si pugnam cœperit, repugnantes uineunt olores: ipsi autem nunquam nisi provocati inferunt pugnam. Canere soliti sunt, & præcipue iamiam mortui in mari A fisco hoc sepe sentiri ferunt, uolūt etiam in pelagus longius.

C Præcipue faciem purgat atque erugat cygni adeps. Olorum similitudinem

4 onocrotali habent: nec distare existimarentur omnino, nisi fauibus ipsis

Onocrotalus.

inisset alterius uteri genus. huc omnia inexplēbile animal congerit, mira ut sic capacitas: mox perfecta rapina, sensum inde in os red data in uerū alium ruminantis modo deferet. Gallia hos septentrionalis pro xima Oceano

marit. Onocrotalorum duo produntur genera, alterum aquatile, alterum

solitudinis. Diomedæas autē luba catartētas uocant & eis esse dētes oculōs-

Diomedæa
cat.
catartēta.

que igneo colore, cætero candidas tradense:

Si uolucrum quæ sit dubiorum forma requiris,

Ut non cygnorum, sic albus proxima cygnus.

Magna pedis digitos pars occupatoraque cornu

D

Indurata rigent, sinēmque in acumine ponunt.

Hæc Onidius.

Solus uero, Forma, inquit, illis quæ fulcra, color candidus, ignea oculi, ora dentata. Congreges uolitant: duo super his duces, alter agmen ducit, alter cogit. Cum sortitum adest tempus, rostris scobes excuant: deinde furentis in uersum superpositos imitantur texta cratrum, & sic cōtegunt subtercausta: hanc sinuem componunt terra quam egerant, cum puteos excuarent: sic in dos uoluntur bifori accessu. Aditus qui demittit ad passus in ortum desinat: qui excipit rostrētēis, occasum uersus est: ut lux morantes excuset, & receptui non denegetur. Aloum exonerant: adiectis flantibus subuolant, quibus proluies longius auferatur. A ductas barbaros clangore infestant: Græcis tantum adulantur, miro discrimine. Hæc in solo

A De corus aquatilibus. Cap. C L.

Corui aquatilis naturaliter caluenter, quibus apud Græcos nomen est inde. Phalacrocoraces uires Bale arum insularum peculiare, nam etiam in Alpibus capiuntur. Qui corax, id est coruus appellatus est, magnitudo illa est quanta ciconis, sed crura breuiora: palmipes nariusque, colore nigro. Insidet arboribus, & nidulatur in us unus ex hoc genere. Et hoc quidem uires circa aquis uictum sibi querunt.

Corus aquatilis.
Phalacrocorax.
Coruus marianus.
Reges.

1 Corax, καρὸν ὀνόματι hac est, asfallor, apud Atrianum in pons Euxini natiuitate, & alicubi athys: quancquam aliter uideatur Suda & Hesichus, un supra in athys.

καρὸν ὀνόματι ὀνόματι.

De brinthe & upupa. Cap. C L I.

Montes autem colunt & syluas upupa & brinthus: cui & uictus probus, & uox sonora est. Vpupa quoque montium incolae est & sylvarum, consuetudine paulo maiori: & ut poeta de tyreo ait,

Brinthus.
Upupa.

-Cui stant in uertice criste,

Prominet in modicum prælonga cuspide rostrum:

Nomen epops uolucris est, facies armata uidetur.

Epops.

1 Obscena palu aui, crista infensa plicatili, contrahens eam subrigensque per longitudinem capitis à rostro residentem. Eminent petiit, inquit Pausanias, in galeæ modum. Vpupa una in suo genere non nudificat: sed stipites arborum subiens, parit sine ullo stramento in cauis: & nudum potissime è stercore hominis facit. Trimestris aui upupa est: quippe quæ cum sexum eduxerit abit, &

Deferta quatit nemorum, & inuas plagas, ut Æschylus testatur est. Colore etiam immutatur tempore æstatis & hyemis, ut idem auctor est,

Colore speciem multummodo pingit suam:

Nam uere candicans ubi extitit nouo,

Æstate tum deinde ut recanduit leges,

Alas repente uarias macularum quant.

Vagatur hic semper sustulens locos,

Deferta quatit nemorum & inuas plagas.

D Indicum upupam Indorum rex amoris deliciasque suas ob eius uenustatē circūgessat. Vpupæ cor in lateris doloribus laudatur.

1 Crista, &c. νεῦσις dixit ei Anstophanes, quasi implet habentem in galea enim, ut in scholis habetur. scilicet ab insigni crista dictum est. 2 In suo genere, &c. ut si inuoluitur. 3 Nudum hominis stercore luto loco circumlit, inquit Ælianus.

De auius partim peregrinis, partim monstrosa. Cap. CLII.

Hercynia aui.

IN Hercynia Germaniæ saltu inuicem genera alium accipimus quarum plura signum modo luceant, quauis densa uox obtegat & denset tenebras, unde homines loci illius plerumque noctu rationem uix moderantur iudicio plumarum resurgentium. Authores sunt omnibus annis catce-

DE DIFFERENTIIS

Memnonides, uel Aethiopiae aues, & confligite ad Memnonis sepulchrum, quas ob id Ménonidas aut menemonias uocant. Hoc idem quanto quoque anno facere eas in Aethiopia circa regiam Memnonis explorantem sibi Crenatius tradit. Aues haece tetri Mariandineam incolere ferunt, colore nigrae corporis forma accipitris simili. Carne abstinent: eas enim ad cibum femina satis sunt. Seleucides uocantur auculae, quae iugiter locustas, quas *ἀσπιδες* uocant, edunt, easdemque celeriter excernunt. Harum aduentum ab loue precibus impetrat: Casy montis incolae, fruges eorum locustis uastantibus. Nec unde uentiant, quoue abeant, compertum est: nusquam sospellit, nisi cum praesidio earum indigenarum. inexplicabilem habent deuotissimi naturam. Scythiae terrae incolae aues est otidis magnitudine, quarum binos pro-

Seleucides aues,

Scythiae aues,

Elephas,

Scylla,

Phoenice, uel Ind.

creat pullos. & quae pepererit oua, non incubitu fouet, sed condita in leporina aut uulpina pelle relinquit: atque ita obuoluta in summa arbore collocat: cumque à uenatione nasci, custodit: & si quis scandit, impugnat. & uerberat alis, perinde ut aquilae faciunt. Apud Perlas gignitur aucula rhyntaces nomine, in qua nihil inuenitur externi: sed interna omnia adipe plena quoque sit, ut eam aere atque rore solum nutriri arbitrentur. Chloritum dicunt magi geminam inueniri in scyllae auis uentre, congenitam ei: ferroxque includi iubent ad quendam prodigia moris sui. Aethiopes atque Indae discolors maxime & inenarrabiles ferunt aues: & ante omnes nobilem Arabie phoenice: haud scio an fabulose unam in toto orbe, nec usum magnopere. Manilius: senator author est, neminem existere, qui uideri uellet a tem. Nam ut tradit Ouidius: - Nec fruge nec herbas,

Sed thuris hachrymis & succo uiuit amomi.

G

Aquilae narratur magnitudine, capite honorato, cristis facie caput plumbeo, apice honestante plumarum serie, medio exeat alio: auri fulgore circa colla, cetera purpureus, cetera roseis caudam pennas distinguens, &

Et Tyrio pinguntur crura ueneno.

+

Viueret quadraginta & quingentis annis uel ut aliis placet sexcentis l. X: senescentem casia thurisq. furculis (uel ut tradunt alij, cinnami) construere nidum, replere odores, & superemori. Ex ossibus deinde ac medullis nata primo ouum uermiculum, inde fieri pullum prodit idem Manilius.

Fortuna sit uel masculus hec, fortasseq. neutrum:

Felix quae ueneris fœdera nulla colit.

H

Ipsa sibi proles suus est pater, & suus haec:

Nutrix ipsa sui, semper alumna sibi.

Hæc atque alia de phoenice Laetantius. In Arabia quoque cinnamomus aut cinna mulgus auis appellatur, quam furculos cinnamomi portare, ac nidum ex his conficere iunt. Nidificant excelis arboribus: & ramis ad quos quoniam non est peruenire ob tam oram altitudinem & fragilitatem, accole congenies illis plumbatis petant in culis: deestisq. pretius uendunt amphoribus quod hoc cinnamomum magis quam aliud mercatores probet. Aues daenades nuncupatas Aegyptij ad potentium coronas alligare soliti sunt, ut uellendo & assidue cantando potantes à dormiendo sustineat.

In maris

Cinnamomus, Cinnamomus, Cinnamomus

Daenades,

- A**In maris Caspij insulis aenem quidam nasci ferunt, quæ magnitudine anse- *Ans Caspia.*
rem superet: pedes autem habeat grui perfunctuales: dorso sit uehementer rab-
bio, uentre mundi, collo albo & disseminatis maculis croceis distinctis: non
minus quam duo cubita longo, rostro nigro. uocem similem canis mittit.
Ans etiam Caspia est, æl potius Indica: (nam in India etiam nascitur) anse-
ris magnitudinis: & lato quidem, sed tenui capite, cruribus paruis. uario co-
lore distinguitur: nam eius dorsum purpureum est, uenter maxime coccine-
us est: caput & cunis exalbescunt uocem captinam mittit. Apud Caspios
etiam latra est aue procreata magnitudine maxima gallinæ, uersicolore
uaretate florentem: supinamque uolare, & sub collum extensis cruribus ip-
sum uide subleuare, tñ catelli uocē edere: neque in sublime, sed circū ter-
Bram ideo uolare, quod in altum non queat sese a molle. Caneum exi- *Caneus.*
ma formæ pulchritudine aenem Chircuchus prædicat, pauonis magnitudi-
ne: cunis pennarum extremitates sinuagda similitudinem gerunt. Quæ si
albos intectur, eius oculi quo sint colore nescias: sin te aspicat, purpureos
dices. Quod in alborum oculis album, illius pallidum est. peracuto uidendi
sensu prædita est. capitis plumæ partim candidulis oculis, partim guttis
quibusdam albis in alias implectatis distinctæ sunt. Eius pedes sandatacini: &
uox canora. eam in deliciis maxime omnium animi Indi habent, ut qui
aspectu illius impleri non possint. ex oculis sacula splendet, ut lucidissimæ
flammae similis sit. gregarij uolant, ut nubes esse uideantur. Auis in India
nasci fertur: magnitudine triplo maior ouide, ore permagno & longis cri-
Ctibus: eam absconum quoddam sonare: summamque eius alas pallidas: cete-
ras uero pennas cinericias esse. Indi celā uocant. In India auis ad sturni ma- *Stila.*
gnitudinem accedens, uariis coloribus picta nascitur, quæ & humanā uo-
cem effingit, & plittacis uocalior, & maiore est docilitate. Nō tamē huma-
num uisum æquo animo sustinet: sed libertatis desiderio famem potius
quàm seruitutem amplectitur: cercionem appellant, quod similitur emodā *Cercio.*
æque cinclus mouet. Particularum quarundam auium Indiarum genus in
excellis rupibus nidificat: quarum magnitudo perdicū, sandatacino colo-
re: Indi sua lingua dicerum solent nominare: Græci, ut fertur, dixerum. Hu-
ius sterco si quis multum magnitudinē sumpserit in potionem dissolutum, ad
uiscerum morietur: mors leuissimæ somno similis est, & nullum omnino sen-
Dsium doloris habet. Quamobrem summopere Indi ad assequi studēt ipsam
etenam maiorum obliuionem existimant inducere. Quod quidem ex In-
dia manent missum rex Persarum omnibus rebus antefert & asseruat, insa-
nabilem malorum remedium, si sumere sit necesse: neq. apud Persas quis-
quam aliis quàm rex id habet. Peregrina auis & gnaphalus esse uidetur, *Gnaphalus.*
quippe quæ raro in nostris locis apparcat, inquit Aristoteles. Gnaphalus uo-
ce proba est, & colore pulchro: necnon ingenio ualet in uitæ officijs, & spe-
ciem præ se ferre decoram. Incédia auis inauspicata est: propter quam se- *Incédia auis.*
penam etiam lastracem Urbem in annalibus inuenimus (inquit Plinius): quæ
sic auis ea, nec reperitur nec traditur, quidā ita interpretantur incédiam,
quæcūque apparuerit carbonē ferēs ex aris uel altaribus: alij spinam ueniā *Spinaria.*

eam uocant. Sed hæc ipsa, inquit Plinius, quæ esset inter aues, quæ se scire diceret non inueni. Verùm Felhas sponturnus, ait, aui genus est turpis figuræ, occurritrix: unde artificū perditus. Sponturnus ea græce dicitur, ut ait Sancta Colonna. Chornam quoque auem ab antiquis nominatam ætymaduero ignorari: quendam clamatoriam dicunt: Labéo prohibitoriam. Et apud Nigidium subis appellatur aui, quæ aqularum oia frangat. Tragopanadem uel tragopana plures affirmant maiorem aquila, cornua in rēponibus curuata habentem, ferruginea coloris, tantum capite phœniceo. Equidem & hanc auent, inquit Plinius, & pegalos (quos Æthiopia generare dicitur) e-
 7
 quino capite uolacres, cornibus armatos: & griphas auratos aduocitate rostri, fabulosos reor. Porro griphas sunt qui tradunt quadrupedes uolucres esse, corpore & ungulibus leoninis: ore & alis aquilinis, sed candidis oculis & igneis, & capite cunulimodi pictores fingunt, alites ferocissimas. Maculas quasdam griphibus inesse, quidā auunt, quales pardalibus. in Asiatica Scythas aurum elidere, & cum his assidue bellū esse. Arimasps circa metalla.
 Scymphalides. Circa Scymphali aquas, aues anthropophagos fuisse auunt: quas Hercules sagittis confecit: uerū Pindar Camareus Heracle minime aues interfecisse, sed crotalorum strepitu abegisse tradit. Arabiæ terre deserta loca, & alia fert ferarum genera, & aues quoque Scymphalidas cognominatas, leonibus ac pantheris in homines haud minus atroces: insolant enim in eos, dū illas occupantur: rostrisque ferunt, atque adeo interficiunt, & quæcumque ex ate aut ferro gestant homines, ea pettorant aues. Sin uero ex cortice uestis cōtexuerint crassiorē, nō aliter Scymphalidum rostra coracibus, q̃ minorū autum pennæ uisco inhaerēt. Sunt autē Scymphalides gruum magnitudine, ibis specie, sed rostra habet ualidiora, nec adunca morte ibis. Cirā in capite gestant. Aues istæ Arabiæ Arcadiæ cognomines, an eundē fuerint generis, nihil affirmo (inquit Pausanias): alioquin fieri quidē potest, ut cum nate primū in Arabia fuerint, earū pars aliqua in Arcadiā ad Scymphalum fluiuium uolauerit: indeq; nomē Scymphalidū ortum, cum aliud tamen nomē sortitis apud Arabas sortite sint. Esse in maledictis antiquis stringem com-
 9
 uenis, sed quæ sit auium constare non arbitror. Has ita depinxit Ouidius:

Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinis,
 Canices pennis, ungulibus hamus inest.
 Nocte uolant, puerosque petunt nutricis egentes,
 Et uisitant canis corpora rapta suis.
 Carpere dicuntur lactentia uiscera rostris:
 Et plenum potu sanguine guttur habent.
 Est illis stringibus nomen: sed nominis huius
 Causa, quod horrenda stridere nocte solent.

Fabulosum autem arbitror, inquit Plinius, de stringibus eas infantum labris immulgere. Nec Sirenes impetrauerint fidem, licet assertet Dino Clitarchi celebrati authoris pater in India esse: nulnerisque earum cantu, quos grauato somno lacerent. De his ita cecinit Ouidius,

-Vobis Acheloides undæ,

Pluma

Chornam aui.

Camareus.

Prohibitoria.

Subis, uel

Sabis.

Tragopanades.

Tragopan.

Pegalos.

Griphas.

Triph.

Scymphalides.

Arimasps.

Sirenes.

- A Pluma pedesque autum, cum virginis ora geratis. Deinde,
Ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures,
Tantrique dos oris linguz dependet usam,
Virginei vultus, & vox humana remansit.

1 Ovis magnitudine. Hoc in loco uetus Aristotelis interpretes habet, Non minor aequalis legisse videtur apud Aristotelem, *ἰσότητος αἰνέσθαι* αἰ εἰς αὐτὸν, ut legit Theodorus, & ante illum Plinius. Et mihi certe quadare magis videtur Aristotelis contextui, ut legatur *ἰσότητος αἰ εἰς αὐτὸν*, nō propter phrasin solitā, sed quod antea verba plus dixerat Aristoteles *ἰσότητος αἰνέσθαι* nihil muto. 2 Quando & ubi ursus est stans phœnix ostēditur Solinus & Plinius sed quæ falsā esse nemo dubitat, inquit Plinius De phœnixe lege Herodotū, Ovis in Metamorph. Claudæum & Lactantium. 3 Solinus, Caput honorato, in cornu plumis exantibus, in fluitis stans. 4 Solinus, Postera parte purpureis abspice cauda, in qua roseis pennis coruleis interficitur uxor. 5 Geopaphus, &c. Hæc omnia referit Theodorus ad uelum auem, ex Græco exemplari (ut opinor) mendoso : nam & in notis exemplaribus & ueris traditione tanquam diuersæ ponuntur auct. & Solinus, Cornibus uentris proferens armatū caput. 7 Hæc ales, inquit Solinus, gressu stilicet, equum nihil præter aures habet. 8 Geophas pascis Latinis phœx appellatur, tradidit Nonius, ut Plaut. in Aulul. Pici diues, qui aures montes colunt : eos solus fipero. 9 Singam, &c. Hæc Syria græce nuncupatur inde Hermodam in suis uocabuli explanatione post annotationes Plinianas.

No.
Syria.

De struthio camelo.

Cap. CLIII.

- S Truthio Africanus, quem & struthio camelum uocant, animal est naturæ duplicis partim enim auem, partim quadrupedem refert quippe quæ ut non quadrupes pennas habeat, ut non uis, neque sublimis uolet, nec pennas ad uolandum commodas gerat, sed pilis similes. Item quasi quadrupes sit, pilos habet in palpebra superiore & glabret capite & parte colli superiore esturæque citha habet utrinque pilosiora : sed quasi uis sit, infra pennas tegitur. Bipes enim tanquam uis, bisulcus tanquam quadrupes est : ut uero alij, in capite pilis minutis, oculis grossioribus nigrisque, nō distincti sed nuda & colore camelis collo oblongo, rostroque acuto. Magnitudine non a uis, sed ceruorum est. Africi autem uel Æthiopici struthio cameli altitudinem equis insidentis equo excedens, celeritatem uincit : ad hoc demum datus pennis, ut currentem adiuuent. Vngula uero ceruis similes, bisulce, comprehendendis lapidibus utiles, quos in fuga contra sequentes ingeritis pedibus. Quæ paruant complura, quæ propter amplitudinem pro quibusdam habentur uasis : conisque bellicos & galeas ceruorum pennas adornant. Concoquendi sine delectu deuorata, mira natura : sed non minus soliditas in tanta reliqui corporis altitudinem colla froice occultauerint, latere sese existimantium. Struthio cameli caro, ut & reliquæ partes omnes, excrucientosa est concoctioque difficilis. Venterculus nonnullis in pretio habetur, & loco medicamenti quod concoctionem adiuuet : qui tamen ipse non facile concoquitur, tantum abest ut aliorum ciborū concoctionem conferat. Sciam struthio camelinū efficacioris ad omnia usus, quàm est adeps anseris. Animalium eorum quæ inter sanguine prædara, terrestria appellauimus, eo scilicet quod ærem recipiant, partisque faciant in terra, indicatæ iam differentiz sunt. Hinc natura æquarum dicitur.

Struthio
camelus.
Struthio camelus.
Struthio Africanus.
1 Quæ dicitur.
2 Quæ dicitur.
3 Quæ dicitur.
4 Quæ dicitur.
5 Quæ dicitur.

De struthio
camelo legi
Struthio lib.
15, & Oppia
nem de uenat.
lib. 3.

DE ANIMALIVM DIF- FERENTIIS LIBER VIII

Continet ea quæ in sanguineo genere aquatilia dicuntur: quæ
scilicet in aqua uidentur, & in aqua quoque parantur, uidelicet
piscium & ceterorum genera.

De piscibus, & primo de eorum partibus exterioribus.

Cap. CLVIII.

Pisces, 1266



Nec ea quæ aquas incolunt, piscium genus
unam esse ab aliis distinctum: quod & forma p
euariatur numerosiore. Habet id caput & pro-
na & supina ea parte qua uenter & uiscera co-
tinentur. Caudam continuam indiuisibilemque
fere parte gerit posteriore, sed uarie. Mutila-
tus autem est piscium genus atque imperfe-
ctius quàm auum, partibus exterioribus pi-
scium ceteram nulla ceruix, nulla manus aut
pedes, sed nec alas habet, sed pinnulas quas-

dam: nulla testes aut intus aut foris, nulla mammae, neque meatum genita-
lium ullum habet piscium genus foris conspicuum, sed continuo ac simpli
ei corpore à capite in caudam usque porrigitur. Capita piscibus proportionem G
corporum maximam oculi omnibus sine palpebris: utrum non duri, sed lu-
bri. Auditus uero olfactusue nullum continent membrum manifestum:
quod enim uidere tale potest per loca narium, id non ad cerebrum usque
transire: sed partim obsequium & carum mox desinit, partim ad bran-
chias fertur audire tamen atque olfactare pisces palam est. Sunt autem qui
uel maxime animalium pisces audire ualere arbitrentur: uidelicet hominū
experimento, qui assidue in mari uersentur, ceteraque piscatoriæ petessēt.
Sunt etiam qui liquidius inter pisces audire prodantur, ut lupus, magil, sal-
pa & alij quidam: cetera piscium genera minus audiunt. Sunt in piscium
genere oris discrimina, alius enim os ante & promptum est, alius infra parte
supina, ut cartilaginei generis maxime parti: quā obtem hoc genus nati H
conuersum resipiscitur, cibum corripere nequit. Adhuc differētia existit,
quod alius os reclusum est, ut ille quæ carne uescitur: alius enim uires ore co-
tinentur, alius subinde est in artibus compressum & coarctatum, ut scilicet
qui non carne uescuntur. Dentes habent omnia piscium genera serratos
pōtissimumque coequentes, excepto scaro, & acutos: atque serie dentium
multiplici fulciuntur. Piscibus etiam data quidam est lingua, sed imperfe-
cta incertaque, ac minime explanata: ossa enim nec fere absoluta est, sed
adhaeret, extrema eius parte tantummodo discreta. In lingua etiam dentes
nonnulli & in palato & toto ore, ut parba uuluerum molant, quæ actu
subagere non queunt: præterea in os uergetes, ne ex eadem cibi, nullū ha-
benti-

*Hæc re-
generatio ai-
ditur apud An-
staxen libe-
lyster, animal*

- A** bentibus retinendi adminiculum. Palatum etiam quibuscumque adeo carnosum est & molle, ut si parum diligenter aduertas, lingua ad esse videatur, ut cyprino. Piscibus nullum omnino collum esse dixeris, aut breue admodum ex duobus solum prius uertebus compositum. Branchias autem pisces re- *Apollonia*
habent per caharum, quibus humorem, quem ore acceperint, redduntque *Piscium, quod dicitur*
etiam pinnae, quas magna ex parte quatuordecim gerunt, binas scilicet parte *Pinna*
prona, & binas supina. Ex his quidem in piscibus similiter quodammodo habentur, atque alie & crura in antibus: his enim alie duae superne dependent illis pinnulae duae parte prona: his pedes te supinae parti subduntur, aliae pinnulae infra adherent fere iuxta pronam partem. Binas illas quae parte prona lateribus geruntur, omnes fere habent: reliquae quae subduntur sunt carent nonnulli ex his qui longi sunt & corpulentissimi anguilla, ut conger & mugil.
- B** lum genas, quod in lacu Sipharum nascitur: & praeterea quae tantum appellatur. Iis uero qui perlongi sunt, atque magis serpentis speciem referunt, ut murena, nullae omnino sunt pinnae, sed flexu solo impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes: quibus neque branchiae integre atque discretae, ut ceteris piscibus habentur. Cartilaginei quoque generis aliqua pinnis carent, ut scilicet quae plana sunt & caudam habent, ut raia & pallinax: istaeque ipsa latitudine natiuitate. Rana tamen pinnas habere uidemus: & quaecumque suam latitudinem colligunt in mucrone. Ex branchias ipsas quidam pisces operimento spinoso integritas continent: at cartilaginea omnia cuticulari tantum operimento operata. qui integritas habent, his in obliquum
- C** utroque latere tenentur: qui tegumento illo spinoso carent, cartilaginea dico, his fere si plana sunt, parte inferiore supinaque habentur, ut raia. Rana autem deductas in latera habet branchias: sed si oblonga sunt, eorum lateribus adherent, ut in quouis muscelino genere (quod galeodes uocant) cernitur. Item branchiarum ipsarum, alius simplices branchiae sunt, aliis duplices: omnibus tamen simplex est, quae nouissima corpori admodum est: & aliis paucae, aliis multae: uero in utroque laeus atque partem omnibus sunt. Habent quibus paucissimae sunt singulas branchias utrinque, & aliae duplices, ut apertae: alius binae utrinque, aliae simplices, aliae duplices, ut cōgro, scaro: alius quatuor utrinque simplices, ut accipenser, dēfici, murenae, anguilla: alius quatuor duplici ordine, nouissima excepta, ut turdo, perca, siluro, cyprino: his qui galeodes dicuntur etiam duplices & quinque utraque ex parte sunt: gladio octonae duplices. Ita branchiarum colligitur numerus. Sed praeter branchiarum discrimen, pisces à ceteris animalibus differunt, eo quod non pilis, ut terrestria quae animal generant, non cornibus, ut nonnulli quadrupedes quae oua pariunt, non penna, ut genus auum, integuntur: sed plurimis squama cutis operata est: quae pro sua rigiditate tenuitateque facile auellitur. Pauci quidam scabri sunt, carumque habent asperam: paucissimi leues cartilaginea enim squamis carent, sed aspera cute fere munantur: leuia sunt perperca: conger autem & anguille & thumi leues sunt.
- S**quama integuntur illi pisces tantum, qui ouum arenarum frustulene pariunt: nam ex longis conger tale ouum non edit, nec murena. qui autem

DE DIFFERENTIIS

ſquamis integuntur, ut ex tenuioribus ac ſenſcentibus duriores craſſioresque efficiuntur ſquamæ. Teſtes non habent piſces, ſed nec genitale ullam foris conſpicuum, ſicut nec ullam aliud animalium genus quod carcat pedibus: meatus tamen idem eſt coitus, qui & ſiccis excrementis: quæ quidem ſimiliter tam in ſecernis eorum quàm in maribus ſunt. Piſces cæcæ ad natum data eſt, quædammodum auius uropygium ad uolatum dirigendū: ſed continua ſere ac indiſta uerum cauda ipſa nō omnibus ſimilis eſt: ſed cum cæteris non euariet, platorum nonnullis ſpinofa, & longa, & gracilior eſt, ut torpedina & paſtinace, & ſi quid aliud humiſmodi cartilagineum eſt: quorundam carnoſa quidem, ſed breuis, ut tauri accidit.

1. *Arenidum, & ſepis*, quæ non continuæ, ſed quoddam arenulæntum eſt, ita diſſundi in multa poteſt. *Acidivrem maculæ*, id eſt ſanguoſum & ſiabiſdem coſpiciuntur tranſibit: Theoderus, in mollibus, ſciſcit in ſepio.

De piſcium interioribus partibus.

Cap. CLV.

G Via paucis piſcibus in eſt, ut congro, anguilla: iſque breuis, ſed plurius ab ore ſtatim ſequitur uenter: quocirca ſæpius enenit grandioribus nonnullis, ut dum per impetum inſeſtantur minores, uentriculus in os procidat. Piſcium cor ſuum micronem non ad pectus ſpectantem, ſed contrà quàm in aliis ſpectatur animantibus, ad caput & os habet: extremūque eius inde pender, quâ branchiæ dextræ acque ſiniſtræ inter ſe cœcunt copulanturque. Sunt etiam meatus alij de corde ad branchias tendentes ſingulas pro ratione magnitudinis, hoc eſt maioribus maiores, & minoribus atētiotes ſimiet quos in maioribus craſſa admodum & candida ſiſtula eſt, quæ de cordis extremo oritur. Piſces omnino pulmonē non habent, neque arteriam: (non enim reſpirant) ſed branchias uice pulmonis obtinent, quibus diximus modis. Piſcium iecinora maxima ex parte pallidior ſcula ſunt. Iecoris partes in quibusdā adeo dirimantur, ut binæ eſſe iecinora uideantur, ueluti cartilagineis. Iecur adipeum nonnullis eſt, ut cartilagineis: quorum iecinoribus colliquatis oleum facimus. Lien piſcibus partim non magnus eſt, partim uero notæ gratia duntaxat habetur. Fel habent omnes piſces: ſed aliis iecori adiunctum eſt, ut muſteligenis, ſiluro, ſquatinæ, leuſtæ, torpedini: atque ex longis anguillæ, belonæ, xygenæ: aliis, & H magnæ quædam parti, inteſtino annexum eſt, dependens à iecore meatibus quibusdam perpetuis ſummæ tenuitatis & aut ſemotius à iecore, aut propius, ut ranæ, accipenſi, dentici, mutantur gladio. Nonnulli etiam uero inteſtino præteritum continent, ut amia. Sæpe etiam genus idem utrūque patitur ſitum, ut congritalis enim ad iecur, alius inſta ſepoſitum adheret. neque renes neque ueficam piſces habent. Venter piſcibus unus & ſimplex eſt, ſed figura uaria eſt: alij enim modo auium uentriculum habent carnoſum, ut mugilis: nonnulli uentrem inteſtino ſimilem habent, ut ſcætes, qui & ruminare ſolus piſcium creditur. Inteſtinum etiam ſimplex eſt replicis ſe, ſimilæque ſibi in omnibus eius partibus. Piſcibus magna ex parte ſuper-

ne cir-

- A ne circa utericalum exeunt appendices, ut in his quasi lacunis cibum conditum macerent atque concoquant: nonnullis complures, ut gobio, galeo, perca, scorpioni, mullo, sparco. at magis parte altera plures exeunt, altera una tantum: alius paucæ, ut hepato, glauco, aurata. Tum autem eiusdẽ speciei consortes inter se differunt: auratarum enãm alius plures, alius pauciores. Sunt etiam quibus nullæ omni no sunt, ut magnæ cartilagineorũ partu ceteris ita ut alius paucæ, alius uel plurimæ habeantur: omnes tamen ad ipsam uentrem eas appendices habent. Pisces testibus carent, ut modo diximus: sed *apud*, id est meatus continet binos, qui à præcordiis uenique maiore exortu bifurces, utrumque spinæ latus perperit, cocæque superne in unum caput, atque ita ad ostium excrementi finiunt: (quod enim ad spinã est, id superius nomino.) hoc ergo inferitur atque in locis tenditur seminarum. Pleni u meatus in maribus *apud*, id est humoris fecundici redduntur tempore coitus, latissimæque patent eo tempore, etiam impectitis, æque in maribus atque illi qui in feminis in matricem seruntur, attritusque piscis mutuo, atque adeo etiam si compresseris, facile semen ipsum effluet genitale candidum. ubi uero id temporis præterit, incerti uel meatus ipsi interdum redduntur, ut de testibus in auiũ genere expositum est. Differunt inter se meatus genitales maris & feminæ, tum aliis rebus, tum etiam quod maris lumbis inherere firmius, feminæ mobiles sunt. Piscium uulua bifida sunt, & non ut auium supra iusta septum, sed infra habentur sicut bipedum aut quadrupedum quæ animal pariuunt, sed tenues & membrana con-
- Cilantes & longæ ut in minutissimis pisciculis partem uulua utranque, dextram scilicet & sinistram iungi in faciem unius oui uideatur. At galeis reliquisque cartilagineis uulua bipartita pertinensque suprà ad septum, quomodo auias est, & infra quoque porrecta: atque etiam de medio sui bipartim sinus archor ad septum usque pertendit: ac oua hoc in loco ad septi originem maxima pro parte consistunt: mox prolapsis in spatium lauis, ite tus animales excludantur. Piscibus ouiparis nõ infra apud alium, sed lumbis adherens uulua continetur: at cartilagineis uterus utrumque sinum habet, scilicet in parte priore & ad lumbos: partem etiam uulua superiorem, in qua oua gignuntur, sub septo ad lumbos & pronã habent, inferiorem ad
- D alium: hac enim iam procreant animal. Piscium ossa proportionem similia sunt animantium terrestrium uisiparorum ossibus: qui etiam inter eos animal generant, cartilaginem pro spina habent, ut ea quæ cartilaginea appellantur: in his namque quod per dorsum proportionatum ossibus tendit, cartilago est: quæ etiam humorem in medulla speciem continet. Quæ autem oua pariuunt, spinam continent: quæ perinde ut spina dorsi in quadrupedũ genere habetur. Sed propriũ in piscibus est, quod nonnullis spinula quædam pretenues separatim per carnem inherere. Piscium sebum adipem par se fertur enim concretere solet. Cartilaginea nullo discrete adipem carni uentrine adherente pinguescunt: eorum tamen quorundam recinoribus collaquis oleum facimus. Pisces genituræ loco *apud* habent, id est genitale quoddam uisus sui generis, quod meatibus quibusdam continetur,

apud, id est
fere.

apud.

Alia, partem
atque.
Alia, sinum
atque.

et apud
ibi.

et ibi.
spinula, in ad
ibi.

DE DIFFERENTIIS

qui à septo uenâque maiori oriuntur, ut ante dictum est. Semen eiusmodi E
genitale habent mares omnes præter anguillam.

1 Respirare etiam pisces condebunt nonnulli, ut apud Oppianū lib. 2 de pisc. & Plinū. 2 Interfatio, &c. Interfatio potius lego apud Aristotē hoc in loco, quā interfationem ex ueteri translatione, ut in ex lib. 3 de partibus animalium, cap. 14.

De sexus discrimine in piscibus: deque eorum coitu, & aliis quæ
ad generationem pertinent. Cap. CLVL

Epitragra

Piscium maxima pars consummatur mare & femina. In piscium tamē
genere sunt qui omnino sexus discrimen alterutram in partem non ha-
beant: nonnulli enim nec mares nec femina gignuntur. Sunt enim pisci
nonnulli epitragæ appellati, qui nec osium nec semen prolificum unquā E
habeant: sed qui solidiores pinguiorēque in eo genere sunt, ut intestinum
paruum est, & laus præcipua in pasta. Nec desunt quæ absque maribus seu
uno formæco formantur: sunt enim genera quædam, ut pulsetum, erythri-
norum & chanarum, in quibus omnibus ova reperiuntur. Hæc perinde pa-
riunt ut aues ova, quæ hypememta decumbat: uerum ea quæ aues concipiūt
pariuntque etiam sunt inter cuncta piscium uero nonnullis, cum spontea
ediderint ova, cuncta, ut ex his animal progeneretur: in his tamen, si in
genere mas est, inter cuncta manent ova, quæ sponte constiterint, nisi mas
suum asperserit semine. Piscium feminæ plerumque maiores suis maribus
enadunt: qui ex cartilagineis parui sint, & pars plurima gregalium, &
genus omne laxatile. Feminas quoque maribus esse uiuaciores constat, eo G
quod feminae uetustiores quā mares capiantur. Pisces non coire existi-
mare quidam: sed mares uentrem ad arcinas fricando semen exprimere:
feminas deinde ore exsorbere, atque hoc pacto concipere. coeunt tamen
pisces omnes in quibus sexuum discrimen reperitur, uel ad motus uniuersum
partibus supinis, exceptis planis cartilagineis: quanquam eorum coitus qui
ova pariant, rarius cernatur: quoniam congressione quamprimum digres-
sio sequatur. fieri tamen ita eorum coitum uisum est. Tanta enim celerita-
te rem peragunt pisces, ut etiam piscatores complures lateant: nemo enim
eorum aliquā tale cognitionis gratia obseruauerunt: tam enim coitus eorum
uius aliquando est. Ex cartilagineis autem plani, uideique habentes cau-
dam, ut rata & pastinaca, & reliqua huiusmodi, non solum ad motus supi- H
nis, sed etiam tergo se in uentrem supinis marium superpositi (modo cau-
da nullo impedimento ob crassitudinem sit) coeunt. Squatinæ & quibus
plurior cauda est: his autem multo partium supinarum coitus agitur. Sūt
qui se uideisse confirmant nonnulla ex cartilagineis uerū, modo eandē ter-
restriam coherere. Coitus etiam tempore completa ex his sibi adhaerentia
capiuntur. Piscium cæterorum diuersa genera coire, uisum à nemine est:
squatinam solam & ratam hoc facere creditur argumento: piscis cuiusdam
qui nomen ex utroque compositum trahit, rhinobaci. Conceptus pisci
magna ex parte uentris agitur tempore: sed tamen & astate, & autumnio, &
hyeme nonnulla coitus implentur. Apud Lesbium insulam omnia tam pe-
lagia

Alogica quàm Eurypica parere solent in Eurypo, & coeunt autumnis, paritè uere. Cartilaginea etiam autumnis mares cum feminis congregantur sed uere subeunt Eurypum disiuncta, neque coniugium reperitur ullum donec pariant: uerù nec pariter omnibus aut simpliciter aut generatim id euenit, sicuti plurimar parti, ut uerno tempore concipiant neque etiam ceteris temporibus tam numerofo partu fitificatur quàm uere. Denique latere non deer, ut stirpium & quadrupedum animantium genera, plurimum interesse ex regione nò solum ad ceteram corporis felicitatem, sed etiam ad coitum partumque ampliorem sic in piscium quoq; ratione locis ipsiſ discrimen plurimum oritur, non ad magnitudinem tantum habitumque uegetotem, uerum ad coitum etiam & partum: ut uidem alibi pluries ge-

Bnerent, alibi minus. Tempore coitus cum mares motas illos genitales plenos iam seminis genitalis habent, modo quo dictum est, formant mares sequentes uentrem coitum suis percussit rostris: quo etiam fit ut mares semen & celerius fundant & largius. Tempore deinde partus mares feminas sequentes, quæ illæ oua ediderint, ipsi mordicus fere uorant: pisces uero ex his quæ remanserint, oriuntur, quibus scilicet mas semen asperferit genitale. Sub partu enim mas sequens, semen ouis quæ reliqua sunt, aspergit, & quæ uitale ad uirum conuegitur, ex his pisciculi enascuntur: quæ uero nò attingit liquor masculi ille uitalis, steriles sunt & irrita sunt. Nò omnibus enim id contingit ouis in tanta multitudine: alioqui replerentur maria & stagna, cum singuli uteri innumerabilia concipiant. Discernuntur partus

C sic discernant pisces, ut alij oua pariant, alia animal. pariunt oua omnes qui squama inuegiuntur: animal omnes qui genere cartilagineo continentur, excepta rana, genus enim cartilagineum tam planum quàm muscelinum animal generat, reliqua oua pariunt. Sed nec cartilagines quidem fetus sine ouos pariunt enim intra se primum oua, & augent atque excludunt, præterquam rana: mox animal foras pariunt. Oua piscium imperfecta eduntur omnium, excepta rana, & potamine duriusculo intacta: quæ postquam edita sunt, foris augentur & perficiuntur: incrementum enim omni simile uermibus est. Animal enim quæ uermem pariunt, primo exiguum edunt, quod per se augetur sine ullo auxilio: ita & piscium oua in mari crescunt: sed quædam summa celeritate, ut murenarum: quædam paulo tardius. Ouum piscium non bicolor ut auum, sed unicolor omnium est, & al-

Dbum magis quàm latrum, tam antea quàm postea cum fetus insidet. Et piscium generatio ex ouo, quantum ab auum generatione differat, simili rationem agitur modo, siue intus siue foris est ouum: quippe cum & fetus in summo ouo nascatur, membrana obducta: & uenæ similes inter mitta spectantur, & caput & oculi deniq; partes superiores principio sunt prægrantes: in crescente etiam feru, humor pari modo subinde absumitur, denum nabal superest quod non fortum subierit, sicuti de uisello auum expositum est. Adhæc tribus in alio suggeritur eodem modo pisciculi albus, quo aurum pullis luteus nutritur etiam non ex luteo, cum oua piscium unicolora sint, sed neque est luteum à candido se paratum, sed nascuntur in uisilla usque-

DE DIFFERENTIIS

quaque & confunduntur. Fetus, ubi absumptus fuerit oui humor, nuclei si- E
gura iam constant: & primum nullum accipiunt cibum, sed ex oui humo-
re iam hausto incrementum. post nutriuntur aquis dulcibus usque dum satis
augeantur. Piscibus autem hoc commune omnibus est, ut celeri incremento
perficiantur, sed precipue coracino inter minores: orphus uero breui ex
paruo insignem magnitudinem accipit. Qui ova paruum pisces, in his oui
ipsam arenidum est, & tota uulua ovis repleta est: itaq; fit ut in paruis qui-
busdam pisciculis ova tantummodo gemina esse uideantur: nam ob tenui-
tatem coagulationemque uulua incerta in his est. De conta piscium satis dictu
iam est. Partus autem piscium neque eodem tempore, neque simili mo-
do omnium fit: nec pari temporis spatio geritur uterus. Pisces plurimi se-
mel anno pariunt, ut hysere qui xxi, id est susanei ex argumento cognomi F
nantur, quia susum rebus capiuntur. quidam tamē sepius sunt enim qui
has pariunt, ut saxanles omnes & in his nullas ter parit. Non desunt qui om-
nibus anni repositibus pariunt, ut murena. Pariunt pisces plurima sui par-
te mensibus iustribus, Martio, Aprili, Maio: Autumno pauci, ut salpa, lar-
gus & nonnulla similia, paulo ante æquinoctium: addit ut torpedinem &
lquatnam. Sunt certe quæ per hyemem suos edant partus, ut lupos, mugil-
is, belone. Mugilum quoque genera grauescere mense Decembris incipiunt,
geruntque diebus tricenis. Per æstatem mense Iunio thonna circa solstitiū
parit: spargi etiam per æstatem pariunt: & qui pelagici sunt, æstate magna
ex parte pariunt. Nec etiam pari temporis spatio gerunt uterus: alij namq;
diebus tricenis ferunt uterum, alij minus. Pariendi terminus piscium com-
pluribus est, ubi uermiculi nati in uentre fuerint: innascuntur enim min- G
ta quoddam animalia uermium speciei, partumq; expellunt. Profecto omne
genus piscium celeriter adolefcit, & precipue in ponto: quippe cum incre-
mentum singulis diebus intelligatur. Omnino ita existimandum est, ut ei-
dem piscium generi, non inisdē locis degenti, nec coeundi uterūque se ten-
da tempus esse idem, nec fortificandi, nec in magnitudine proficiendi. Ve-
rum hac nos ita exponamus, inquit Aristoteles, ut magna ex parte res cœ-
nuit. Lacustres & fluuiales pisces quinto suæ ætatis mense uterum ge-
stare magna ex parte incipiunt. pariunt omnes intra annum. Nec semen
generationis simul omne emittunt mares, nec ouum formine: sed modo H
marinorum hi quoque semper intra se aliquid plus minuscū, semine o-
uorum, mares liquoris prolifici retinent. Cyprum quinques aut sexies an-
no, chalcis ter, reliqui semel edunt ova. Pariunt omnes in fluuiorum sta-
gnantibus locis, & lacuum arundinetis, ut phoxim & peroc. Non solum pa-
res cum paribus, sed etiam admodum grandes cum paruis conueniunt, ad-
mouentque mixtur, quos aliqui umbilicos uocant: qua quidem parte for-
mana ouum, mas liquorē uenerēum depromit. Et ova quæ liquor ille
uitalis contigerit, admodum glutinosa redduntur, & candidiora ex tem-
plo cernuntur: maiorāque reddi eodem die propemodum dixerim. paulo
autem post, oculi sortis existunt conspicui, pregrandesq; apparent: quæ ex
ouis non attigerit liquor masculi ille uitalis, hæc steriles redduntur, ut in

marino

*Arenidū, la-
dupis, nō sa-
depin.*

*xxi. hysere,
saxanles pisces.*

*Semen genera-
tionis, Iupir.*

*Umbilici pi-
scium.*

A martino etiam genere euenire diximus: mas deinde oua quæ edita sunt custodita, formata abut cum pepitit. Pisciculus iam ex secundo ouis incrementum accipit, deinde uelut putamen, quod membrana est ouum ambiens & pisciculolum. Horum quibusdam cardius in crementum ex ouo est: ideoque filius: mas, uel quadragesima aut quinquagesima affidet custodens oua, ne à piscibus occurrentibus absumantur. ac minorum nonnulla, uel tertio die speciem pisciculi capiant. Formas eū parturienti sepe numero singulas, mares tredecim sequuntur. Mox formata oua procedendo emittunt mares scitantes semen illud suū ouis respargit, ut modo diximus. uerū plurima pereū quod enim forma non stabili, sed mutans continē patit, dissipari oua necesse est, uidelicet ea quæ non in materē incidunt aliquam, cui hæreūt, B sed excepta unda ferantur. Habent mares omnes semē geniale præter anguillam: quæ ootum neque ouum neque semē fortita est. Pisces maxima quidem ex parte ouo gignantur, ut dictum iam est: quidam tamen uermes nascuntur, ut mugilum genus quoddam, & aborum fluuiatilium piscium: ad hæc anguillarum genus. Sed sunt qui & limo & arena proueniunt, etiam ex his generibus quæ per coitum & ovi primordio generantur: quod cum aliis locis palustribus, tum apud Grudum factū olim memoratur: stagnis enim sub canis ortu refectis, & limo iam arido, ubi primū umbribus restagnare loca inciperēt, pisciculi nascebantur generis mugilum. Quod per coitum procreatur, magnitudine ~~non ita~~ ad est haletula: paruiter in his aliquid uel ovi uel seminis continebatur. Quæ autem nec ouum nec ani- C mal pariant, omnibus iis ornus uel ex limo uel ex arena, uel etiam ex putredine per summa aquæ facta agitur, ut in anguillis & apuarum generibus. De coitu & partu atque de omni piscium generatione dictum iam est.

1 Epitagon, ab hinc si scribitur sic dicti, utquit Theodoros. 2 Quo uero differat piscium generatio ex ouo ab aliâ generatione, pluribus ostendit Aristoteles lib. 6. histor. animalium.

De ratione uictus piscium.

Cap. CLVII.

Pisces omnes fortitatem, etiam piscium, suo tempore deuorant: reliqui uictus ratio non eadē omnibus inest: alij enim carnauori sunt, ut cartilaginei, & conga, & alij quidam. Alter etiam alterum edat: maiorūque D minores sunt præda, exceptis mugile & cephalo: ij enim soli carne omnino abstinent: alij non carnibus tantum uelcuntur, sed & aliâ deuorant: alij nanque cæno uelcuntur, ut cephalo: alij cæno & stercore, ut daſquilli: alij alga, ut scarus, melanurus alij & carne uelcuntur & alga, mulchōq; & cōchis, & cæno, ut mulli. salpa stercore & alga: porrum etiā petri, & cucurbita capnos. Vescitur mugilis unusquisque alga & arena: cephalorū genere est, qui non nisi mucore uelcitur suo. Anguilla plurimū dulci humore uiuiscenam qui in piscium genere humorem accipiant, eum non potius, sed cibi potius gratia assumunt. Vivant fluuiales tū sese mutuo deuorantē, tum ex herba, nū ex radice, & si quid in cæno compendant: nocte potius pascere, interdum sedere in altum solēt. Ceteris piscibus capta minorum

Aa ij

DE DIFFERENTIIS

à fronte agitur ore, ut solent natant: ac charulaginei (quodadmodum etiam E de lphini & omnes fere cetacei generis) resupinati corripunt: habent enim os subter. Visus causa utuntur preliu maiores contra minores: maior enim quisque atque robustior minorem infirmiorémque deuorat. Et pisci alij gregatim degant amicique sunt, ut qui dromades uocantur & thyni & a hamientij non gregatim, unicuique uiuunt. Qui amici sunt congregant partim cum utro terunt, partim eum sortum ediderunt. Est sane plurima piscium pars gregaria: nec ullus grex caret duce: & horum nonnulli non modo gregales sunt, uerum etiam conjugales. Greges statis temporibus (ut modo dixi) constituunt: scilicet cum utrum gerant, aut post partu. Cedit in gregem no solum quæ eiusdem generis sunt, sed etiam quibus idem aut similis passus appetitur, modo abundet cibus: nam lupus & mugilis quamquam inimici sunt capitales, tamen stato tempore congregantur. Talis piscium uictus est.

*Dromas,
a gregale.*

*Coniugales,
mugilæ.*

*Cusfer.
Cusfa.*

1. Porcum, *aggreis*, id est marthubium: ita habetur in nostris exemplaribus Græcis.
2. *aquasider* Theodorus: cusiores uocat & cusiores aut libet hutor. animalium. *Ætias* parunt omnes, qui custiones uocantur.

Quod loca mutant pisces uarie, atque latine. Cap. CLVIII.

Locum etiam mutant solent pisces: alij enim ex ponto aut in pontu transiunt: alij per hyemem ex alto in luora teporis gratia ueniunt: contra æstate ex huiore in altum uidentes æstuum discedunt. semper quæ imbecilliora sunt prius utraque ratione discedunt: ut scomberi ante quam thyni. Petunt autem pontum tum passus gratia, qui uberior & cõmodior ibi propter aquarum dulcium admixtionem suppediatur: facti enim copis amenu loci illius, ut mare sit dulcius, & cibus largior habeatur, quem tamen illam deferunt: nam etiam propter partu sunt enim ibi loca ad partitionem aptiora & tutiora. (bestiarum namq. magis pauciores ibidem sunt, nec in ponto fere quicquam maleficum est.) & humor dulcior ac potulentior sortum melius educat. Quin & latet piscium complures: alij hyeme, ut happurus & coracinas, thynus, & pisces saxatiles, omneq. catulagineum genus, diebus scilicet frigidissimis: nonnulli æstate, ut glanchi: non enim fere capiuntur huiusmodi statibus quibusdam temporibus, eisdemque semper: cum ceteri omnes fere semper capiuntur. Saxatiles uero coniugatim mares cum feminis conduntur, quomodo & fertificare solent: ut turdi, merule, perca. Duo lacus Italiæ, inquit Plinius, in radicibus Alpũ, Larius & Verbanus appellantur, in quibus pisces omnibus annis uergilarum ortu exsiliunt: squamis cõspicui crebris atque prescens clamoribus caligatum effigie: nec amplius quam circa eum mensem uisuntur.

De coloris mutatione in piscibus, uocetq. & somno. Cap. CLIX.

Mutant colorẽ pisces nonnulli pro anni tempore, (quemadmodum & ex auihus quedam) ut qui merule uocantur & turduere enim nigrescunt, post uer albedinem suam recipiunt. Plura etiã mutat colorem: cum enim

A enim cæteris temporibus cædida sit, ætæno uaria redditur. Pisces uocis quidem expertes sunt: quippe qui neque pulmonem neque arteriam aut guttur obtemant, sed sonos quosdam stridorisq; mouent, qui uocales esse existimantur, ut lyra & chromis: his enim quasi grînitus quidam emittitur: chalcis quodâmodo stridet. cuculus perinde ac coculus aus obstrepat, unde nomen accepit. Necnon cartilaginei generis nonnulla reba, id est stridere uidentur: uerum ab his uocem emitti ullam, recte dici non potest: at sonum siue strepitû reddi uerius dicens. Dormiunt pisces noctu potius quàm in meridie: & magna ex parte uel ad arenam, uel ad lapidem aliquem procubentes quiescunt in his gurgitibus, uel sub saxo aut limbo abditi. Plani autem pisci arena sese occultant: unde prehendantur sine ipsius arene, tollanturq; siu

Linnæi, Syn.

B kina percussificat: laginea uero ita in meridie dormiunt, ut uel manu tollantur.

De ualitudinis piscium differentiis, tum ex locis,
tum ex temporibus. Cap. CLX.

L Oca pro sua natura piscium genera quæque sibi habent ad incolumitatem commodiora: quod enim litorale aut pelagium est, hinc suo loco pro naturæ desiderio uersari commodius est: quod autem ambigit, id cômmodo utroque degere potest: sed sunt loca quædam singulis propria, in quibus rectius ualeant. Lamosa regio planum educat piscem, ueluti soleam, rhombum, passerem: at arenosi gurgures planos quidem non pessime, sed pelagios melius pascunt, ut auratas ac dentices. nec omnia mari potest piscis omnis inesse, ut helops, qui Pamphilio profundo nec alio mari pascitur, ut Atlantico faber. Cômmodiora piscibus (quod simpliciter dixerim) loca sunt ea quæ algarum copia scatens: pinguiotes enim locis his capiuntur. nam & quibus alga in cibo est, abunde hic pascuntur: & quibus caro appetitur, plures pisces libi reperiunt. Inerest etiam aquilonia loca sunt, an austrina: genus enim longum aquilonis melius urget: & quidem æstate loco eodem in aquilonis plures longi quàm lati capiuntur. Sed discrimen piscium diuersitate etiam locorum ac temporum existere potest: ut circa Cretam insulam gobiones omnëq; saxatile genus sans pinguescit. Lupi pisces in Tyberi amne inter duos pötes meliores sunt. rhombus Ranæne, mureneq; in Sicilia, clopes Rhodi. Illa non in nouissimis mira, amarissimos esse pisces ad Pelen insulam & ad Clazemonas contra ad scopulû Siciliæ & Leptim Africæ, & Euboram & Dyrhachiam: rursus ita salos ut possint salassimæ existima ri, circa Cephaleniam & Ampelon & Paron & Deli petrasan portu eiusdê insule dulces. Quam differentiam pabulo constare non est dubium. Thûnas post arcturû melior est, æstate deterior. Vigêt pisces ouipari sere uetis tempore donec pariât, uisipari autumnos: & mugiles item, & mulle, & reliqui generis eiusdem. Pariendi tempore laborant omnes pisces: unde fit ut tunc potissimum etiam in terram seruntur poero graui stimulo agitati in terram. Innafeuntur etiam in uentre minuta quædam animalia uermium speciei, quæ partum expellunt, ut dictum antea est. atque omnino id temporis motu perpetuo incitantur donec pariant: à partu statim requiescant.

Aa ij

Piscibus omnibus (exceptis quibusdam paucis) umbres conducunt, tum ad E. ceteram sanitatem, tum etiam ad partum: contrâque anna sacri incommodi sunt: annis enim pluvius non modo plus cibi nascitur, verum etiam pluvio calore plurimum iuvantur: ueluti etiam quæ terra gignat: ita volera enim quavis rigentur, tamen nō tantum proficiunt quantum imbre: quod idem arundinibus etiam lacu prognatus erant: nihil enim fese accrescunt, nisi aquæ pluvie incidant. Ex pluvius autem ipsis æstivi imbres commodiores sunt: parti maximæ pectû, & præcipue cū ver, & æstas, & autumnus imbrebus absidat: enim hyems contrâ ferentior fuerit. Locis autē frigidis parum urgent: & hyeme maxime infestantur, qui lapidē in capite habent: ut chæomus, lapius, phanger, & ambra: facit enim lapidis rigor, ut per algore gelent & deficiant. Sed cum plurimis pisciū generibus imbres conducant, quibusdā tamē nocent, ut mugili, cephalo, & ei qui à nonnullis myrinus vocatur: fit enim ut pluvius multo exerceatur, si modum aqua excefferit, atque ad postremū malo eodem intereant. quod tamen non magis imbelium copus quàm algore accidere videtur: iam enim quibusdam in locis multi capti sunt: ceci cum bycæus fuisset asper: in multis etiam albos habentes oculos capti sunt. Piscium usus maximè fallitur circa solis ortum & occasum ac proinde rebus capiuntur præcipue non multo ante quàm sol oriatur, aut postquam occidit: quippe cum noctu quiescant, luce autem iam clariore melius uideant. Morbus pestilens nullus incidere piscibus unquam videtur, qualis plerumque hominibus & quadrupedibus nonnullis accidit, tum fers nō ut banis: & grotare tamen & ipsi putantur. Ex quidem piscatores pro morbi indicio capiunt, cum aliquo extenuatos languentibus similes, & colore immutato inter multos pingues ac ualidos eiusdem generis ceperint. Matrem genus ita se habet: fluviatile & lacustre peste quidem & ipsum immune est, sed nonnullis morbi incidunt proptij: glatis enim canis exortu potissimum syderatur & tonitruo sopitur magno: quod & cyprino accidit, sed leuius. Chalcida pediculi multis sub branchiis inserti interimunt, quod nulli ex cæteris accidit.

In alimenti medicamenti que ratione piscium discrimina.

Cap. C L X I.

Quod ad alimenti rationem attinet, non parva est piscium differentia. H Alimenterum sine quod ex piscibus provenit, sanguine gignit tenuiorem quàm quod ex pedestribus: adeo ut nec abunde meriet, & per insensibilem halitum celenas digeratur. estque eorum caro temperamento frigidiore humidioreque. Pisces, prope dixit, omnes, boni succi esse iudicantur, exceptis lacustribus, palustribus, & qui in immundis fluminibus ac turbidis degunt. Præstantissima vero eorum piscium caro habetur, tum ad bonos gignēdos succos, tum ad gustus voluptatem, qui in mari synocero uicantur, ubi dulci aquæ non miscetur: maxime vero ubi regione venti perflauerint: & ubi neque limoso neque tranquillo luote continetur mare. Qui non apud litora sed inter saxa & scopulos degunt, indeq; mactant, id est

A id est saxatiles appellantur, saluberrimi omnium sunt: modo caro eorum minime dura sit, ut phycides, iulides, perca, scarus, merula, turdus. Hi neq. alimento utuntur uario, nec loca mutant, nec flumina libus aquis gaudent: idcircoque perpetuo manent inculpas: omniumque mollissimam simul ac maxime friabilem habent carnem: quomobrem & concoctu sunt faciles, & probum generant succum, sanguinemque crassitudine mediocrem: & humectant modice. corpus quoque recte & alunt & augent, neque excrementosi sunt, neque flammam gignunt: & ut Mnesitheus prodidit, uel fictius præbent alimentum. Saxatiles, ut diximus, carnem habent mollem & friabilem, ac proinde saluberrimam: alij molli quidem sunt carne, sed minime friabili, utpote quibus innatus est succus quidam lentus pinguisque, alij nihil uiscidum pingueue habent: quia quidem in re cum saxatilibus conue-

Turdus quoque merula, iulides, perca, scarus, merula, turdus, hi neque alimento utuntur uario, nec loca mutant, nec flumina libus aquis gaudent.

Mollissimam simul ac maxime friabilem habent carnem: quomobrem & concoctu sunt faciles, & probum generant succum, sanguinemque crassitudine mediocrem.

Dum piscis, crassusque sit.

B nuntio tamen quod caro illis durior exstat diffusiue: cuiusmodi sunt muli & pelagici propemodum omnes, nisi qui forte præuo alimento suam corrupeunt carnem. Qui duri sunt crassorem corpori præbent in cibo succo, ægréque conficiuntur: nam neque in ventrem concoctio, neque in lectore uenit, in sanguinem mutatio, nec denique, quæ in singulis sit partibus assimilatio, tam facile in duram habentibus carnem, perficitur, quam mollem. Duram habent carnem scorpi, pagri, trachini, orphi, glamei, caniculi, conghi, hamæ, coracina, myli, thunnæ, atque id genus alpece tilagines quoque omnia præter torpedinem & pastinacam. Mediocritatem obtinent nonnulli pisces inter durum ac molle, qui scilicet neque tam molles sunt

C quam qui mollissimi: nec duram tamen carnem habent, quales sunt murena, lacerti, passeræ, thombi, cythari, sciæne, hepæti: (& ut Xenocrati placet, aselli,) hos omnes Philotimus ἀπαλίστους, Mnesitheus μαλακίστους uocauit, id est teneros pisces. Homini bus in otio uiuentibus, sensibus, imbecillibus & ualensudinarius accommodatissimum ex his atque saxatilibus gignatur alimentum: qui autem corpus exerceant, ualidius desiderant. Quod uero ad succi crassitatem tenuitatemque pertinet, in symmetria omniumque excessus mediocritate consistunt pisces saxatiles, pelagici & litorales, ut gobij, murenæ, buglossi, aselli, omnesque qui neque insuauæ malis odoris neque glutinosum quicquam gustu præ se ferant. Grandiores pisces omnes (quos

ἀπαλίστους, Mnesitheus μαλακίστους uocauit, id est teneros pisces.

D cetaceos uocant) crassum tenacemque succum procreant. Saxatiles pisces febricitantibus petrocholis utiliter in cibo dantur: nec ipsis minus aselli conueniunt, nisi si qui prope lacum aut magnum flumen, quod in mare decedat, depasti, humidam magis glutinosumque habeant carnem. Proxime asellos sunt buglossi & torpedo: itemque lupus & mulus, post mugil & pelago. Qui ἀπαλίστους uocantur, saxatilibus humidiores præstant succum: & his qui à morbo conualescunt sunt magis idonei, & ventrem quoque & urinam uehementius cient. E marinis piscibus saxatiles, uti Diphilus prodidit, facilius corrumpuntur, bonum procreant succum, leuissimæque sunt, & modice nutriunt, atque abstergerendi uis obtinent. Pelagij contra, copiosius nutriunt, difficilius concoquantur digerunturque. Pelagici litorales præstāt, inquit Aristoteles: quippe qui cibo copiosiore meliorisque potantur: tum

Κατὰ δὲ τὴν, Ceteros piscis.

etiam bene ex calido singulôque temperata sunt loca magis terrena: quo fit E
ut caro eorum piscium magis confectum pelagiorum humida, mollis so-
lutaque sit. Sed discrimen horum quoque, diversitate etiam locorum ac te-
porum existeret potest: ut thynnus post æthiurum, uti diximus, melior est,
æstate deterior. Lupa pisces in Tyberi amne inter duos pôtes meliores sunt,
inquit Plinius: rhombus, ruennæ, murenæ in Sicilia, elops Rhodi. Qui
tamen pelagij dicuntur, longe perstant is qui limoso litore uisunt, aut ubi
in mare influunt amnes: tum ut ex his probus gignatur succus, tum etiam ad
saporis gratiam. De terribres sunt, qui in paludibus aut maris stagnantibus
locis uersantur: his etiam peiores sunt, si stagnantia loca in quibus uiuunt
angusta et exiguae sunt, & neque magnos recipiunt flumines, neque fontes ha-
bent scaturientes, neque multum est quod effluat. Quod si nihil penitus ef- F
fluat, sed perpetuo stabilis maneat aqua atque immobilis, longe sunt de-
tiores. Excrementitia penitus macolâque, & omnino pessima caro est eorû,
qui sordidas limosâque aquas incolunt ubi uero flumines multos ingentef-
que suscipit mare, (uti in Poneo fit) qui locis eiusmodi degant pisces, quod
præstantiores ut qui in paludibus natiuantur, eò sunt inferiores is qui in
lyncero mari uisitant: mediû inque locum obuiuent inter pelagios ac flu-
uiales pisces. Marini autem pisces suauiores sunt fluminalibus, ut Xeno-
crates prodidit. facile in corpus digeruntur: sanguinè inque procreant co-
piosum, & bonum in corpore reddunt colorem. Qui autem in fluminibus aut
stagnis uisitant, ut idem author est, stomacho sunt ingrati, crassioresque
cum gignunt, nec tam facile petuntur. Sunt tamen & inter fluminales qui G
marinis minime cedât, ut in Nilo coracinus. In Rheno perca & in Tyberi
lupus uictus enim in huiusce generis locis probus est, & qui abunde suppe-
ditatur. Porro eorum qui in fluminibus degunt, ceteris præstât qui in eo amne
capiuntur, ubi & aqua copiosa est, & celeriter fluit: mali contrâ sunt, qui
in paludosis stagnantibusque fluminibus uiuunt. Omnium autem pessimi, qui
in fluminum ostiis uictum queritant, in quos cloacarum, balneariû aut co-
quinarum, & straminis ac linæorum sordes, ceteraque urbium purgamenta
defluunt. Qui in piscinis seruantur pisces, si ad pelagios confectas, ingrati
sunt sapore. qui è mari in flumines ascendunt puros ac lymphidos, suauiores
sunt iucundioresque: qui uero in aqua stagnante limosa clauduntur, quan-
uis pingues, insuauiores tamen sunt. Pisces quicumque herbis radicibusque o- H
pimus ad sanarietatem pascuntur, ij meliores euadunt: qui autem cernosis her-
bis maline succi radicibus uisitant, aut is quæ ex urtibus expurgantur,
(uti modo diximus) pessimi: putrescuntque ac male olent, si post capteuram
paulo diutius seruentur. Nec minus & qui in aquis uitiatis degunt, mali o-
doris atque insuauiores macolique euadunt: cumque sint alijs longe pingui-
ores, citissime putrescunt. Minime uero tardissimeque omnium putrescunt,
qui puro ex mari uictum petunt, bonique odoris sunt & sapore iucundiorum
guadoninis autem uel nihil uel minimum in se habent. Qui in paludibus
aut fluminibus gignuntur, eorum caro sere spinis abundat: quod in marinis ra-
ro accidit. Pisces cum impleri incipiunt à costis boni omnes sunt: sed pro-
cedente

*Alia in Ty-
beris, in agro,
uide infra in la-
p. 10.*

A cedente utri tempore alij præstant, alij non. Marina utero gravis melior est: coracinus etiam cum utero lætè optimus est, mugilis uero & lupus & reliqui lætè omnes squama intecti, deteriores sunt cum ferunt. Sumas sibi lætentes & non ferentes pauci sunt, ut glaucus. Hæc Aristoteles. Xenocrates autem, uere inquit, cum utero gestant, optima est piscium maxima pars: æstare præstant phagni & synodontes. Hepatas autumno uilescit, ut qui uittolum tunc procreat: suctum lupi uero ac mugilis eo tempore gratiores habentur. Subeunt etiam fluuios piscium genera cõplura, & præstât in fluentis & lacubus, ut amia, mugilis, gobiones etiam punguiscunt, qui in fluuios ascenderint. Fluuiatiles & lacustres optimi sunt post partum & seminis emissionem, postquam cibo se refecerint: sed nonnulli etiam cum ferunt, cõmendantur, ut superdeæ alij flammantur, ut silurus. Cum ceteri omnes mares suis forminis sint præstantiores, glanis scemina præstat suo mari: & in genere anguillarum quoque meliores sunt, quas forminas nominant. Viuantur senectute pisces: & quidem thanni ad rem salutariam senes improbi sunt: multum enim carnis sale absorbunt, quod idem uel in cæteris piscibus euenerit. Pisciculi recens nati facile in uentriculo corrumpuntur: qui uero ceteræ speciei sunt & magni, dum sunt, concocti difficiles & stomacho ingrati: qui autem & ætate & magnitudine sunt media, concoctionem pariter & digestionem facilius admittunt. In partibus quoque pisciã discrimine nelli: quæ nanque easde proximæ sunt, suaves existunt, & meliuscule nutriunt, ut quæ sui motu nec exercere uar magis: quæ uero ad uentrẽ C perueniunt, punguendinas nonnullas habetæ: proinde stomacho innatant, & per aluum facilius redduntur. Dorsum carnem habet duriorẽ: caput uero etiam manus præbet alimenti, & quod non facile digeritur. Rursum pisces assati, Xenocrates ait, nutriunt magis, nec tam facile permeant: iurati minus exhibent alimenti & citius permeant: frangi gustus suaves, sed stomacho minus grati, faciliq; corrumpuntur: minus nutriunt, & uentriculo innatant. Piscium genus omne dum adhuc spirat, (ut ita dicam) coquendum est: non enim facile seruari patitur, nisi carnem admodum duram habeat. Piscium ius, qui recentes sunt, modo per se, modo cũ uino alium mouet: idem & urinas citè uino maxime. Præparatum uero ad hunc usum conficitur: ephycide, scorpiõne, iulide & pereis, atque aliis saxatilibus mollioribusque: & qui uris minime recipiunt, ex aqua, oleo, sale & anetho. addit Plinius apium, coriandrum, & porrum. Jus piscium in patina coctum cum lactacis tenacissimum discitur. Piscium adipem ad suffusiones imponere nõnulla. Omnium piscium fluuiatilium marinorumque adeps liquescit: uolo, admixto melle, oculorum claritati plurimum confert. Piscium natura generatim ita se habet.

De cartilagineis.

Cap. CLXII.

Q Vicquid inter marina pedibus orbatum & branchias habens animal generat, sub cartilagineorum nomine continetur, præterquã rana. *Cartilaginea.*

Cartilagineis omnibus quod per dorsum proportionatum of-

fibus tendit, cartilago est, (ut modo diximus) quæ etiam humorem in se- E
dulle speciem in se continet. Horum animalium, inquit Galenus, cutis est
aspera, nobisq; splendescende *modis* uocari putat *ἀσπρὴ* & *ἀσπρὴ* cer-
te græce in uniuersum selache appellant Aristoteles primus: hoc nomine
eis imposito, nos distinguere nō possumus, nisi cartilaginata appellare libeat
aut cartilaginea. Huius generis maxime parti os infra partem supina situm est:
quæ obrem hoc genus, nisi conuersum respicietur, cibum corrumpere ne-
quit. Horum aliqua pinnae carent, idelicet quæ plana sunt & caudam ha-
bent, ut raia: & pastinaca, siue ipsa latitudine natam ranam tamen pin-
nas habere uidemus, & quæcumque suam latitudinem nō colligunt in mu-
cronem. Branchias habent omnia cartilaginea, nō spinosa, ut alij pisces, sed
curtulari operimento operatas: atque iis fere si plana sunt, parte inferiore su-
periusque habetur, ut raia. Rana autem deductas in latera habet branchias:
sed si oblonga sunt, eorum lateribus adherent, ut in quouis multichno
genere cernitur: in quibus omnibus branchiæ duplices sunt, & qui-
tus ex utraque parte. Squamis minime operiuntur cartilaginea, sed aspera
cutis fere monstratur: leuia sunt perperca. Cauda ipsa non omnibus similis
est: planiorum enim nonnullis spinosa, & longa, & gracilior est, ut torpedi-
ni, pastinacæ & huiusmodi aliis: quorundam carnosæ quidem sed breues,
ut ranis. Omnibus certe hoc commune est, ut partes quæ caudæ proximæ
sunt, medius partibus multo sine carnosiores. Differunt nonnulli mares à
fuis sexibus, eo quod manibus bina quædam circa excrementi ostium pen-
dent, quibus formine carent, ut in galeorum genere perspicitur. Raia sex- G
uina & id genus omnibus genitale simile muliebri est. Iocoris partes in
cartilagineis adeo distinctiuntur, ut bina esse iecinora uideantur: estque iis re-
ctus adspicui, adeo ut eorum quorundam iecinoribus collisquatis oleū fiat.
Magnæ cartilagineorum parti nulla sunt circa uentriculi appendices: uul-
ua cartilagineis bipartita pertinetque supra ad septum, quomodo auiibus
est, & infra quoque porrecta: arque etiam de medio sinu bipartiti sinus ar-
ctius ad septum usque pertendit, ac oia in loco ad septi originem, ma-
xima pro parte consistunt: mox prolapsis in spatium latius, sexus animales
excluduntur. Partem itaque uulue superiore in qua oia gignuntur, sub
septo ad lumbos & prona habent inferiorem ad aluum, quæ procreatur ani-
mal uerum non omnibus oia iuxta præcordia hærent, sed nonnullis galeo- H
rum generis in medio iuxta spinam consistunt, ut caniculis. Cartilaginea
nullo discepto adipe carni uentrisue adherente pinguescunt. Cocunt ex car-
tilagineis plana, uideique habentes caudā, ut raia, pastinaca & reliqua hu-
iusmodi, non solum ad motus supinis, sed etiam tergo seminarum supinis
marium superpositis: modo cauda nullo impedimento ob crassitudinem
sit. Squaræ & quibus plenior cauda est, iis arctius inuicem tantum partium
supinarum uicibus agitur. Sunt qui uidisse affirmant nonnulla ex cartilagi-
neis uersa modo carum terrestrium coherere, eorum etiam tempore cō-
plura ex his sub adherentia capiuntur. Cartilagineum generatam planam
quæm galeodes animal generat nec tamen cartilagineis factus sine oia est.

pariunt

ἀσπρὴ,
ἀσπρὴ.

Cartilaginea.

*Aliis, quæcunq;
sua latitudinem
colligunt in mu-
cronem.*

A pariunt etiam intra se primum ova, & augent atque excludunt, præterquã
 rana: mox animal foras pariunt. Ova maxima quidem ex parte iuxta præ-
 cordia omnibus sed nonnullis non iuxta præcordia, sed in medio uulvæ cir-
 ca spinam ova adhaerent, uti modo diximus: unde aucta in anum transfe-
 runtur utri locum efficiunturq; animalia infra ad genitale, umbilico hæ-
 rentur ad uulvam: ut ova absumpto parvis nō aliter fiat, quàm in his quæ
 iam inde à primo orta animal generant. Ova ita fere cartilaginea simul &
 ova parte superiore continent complura, & alia maiora, alia minora, & in-
 feriore animalia iam excludit. unde fit ut genus id piscium sæpius mense &
 parere & coire nonnulli arbitrentur: quippe quod non simul uniuersa ede-
 re solet quæ conceperit, sed particulatim repetens sæpe & diu peragrat, ut
 dum superius ova contrahit, inferius concoquat atque perficiat. Superfec-
 unt cartilaginea, & ferunt utero mensibus cum plurimum senis: & cum tẽ-
 pus parienti instat, reperit litus & uada, pelago & alto relicto gurgire, ut
 neque tepore careant, & progeniem tutius collocent. Ova omnium cute mol-
 liore operta sunt, præterquam ranarum, quod unam solidam durumq; est.
 Omne genus cartilagineum minus fortificat, quia animal gignit. Carti-
 lages tantum uelcantur cartilaginei: & resupinati cortipiunt pisces quos de-
 uorant: habent enim os subter, ut ante diximus. Motus eorū lentus pigreq;
 est: ut qui non spina aut neruo corroborantur, sed cartilagine. Latent omnes
 diebus frigidissimis. In hoc genere torpedo & pastinaca molliorem habet
 carnem atque suauem, & quæ modice alium moueat, nec concocta diffi-
 cilem: quæ & medio cruet corpus enutrit, sicuti & alia quæ carnem habet
 mollem: ut nonnunquam in piscem etiam saxatiliū penuria his uti pos-
 sis. Rana uero leuira & squatina atque alia id genus duriora sunt, & con-
 coctu difficilia: ea alimentaria autem præbent copiosius, quàm aut torpedo
 aut pastinaca: senibus tamen inutelia sunt. Dipylus omnium cartilagineo-
 rum carnem concoctu esse difficilem, faciliūque gignere statuosum pro-
 didit: usumque eorum assiduū ac diuturnū uisus hebetudinem pro-
 creare.

*Animalia iam
 mense, &
 tempore
 parit.*

1. Plana sunt, &c. t. à maxima uti uocantur hæc ab Aristotele lib. de animalib.
 gressu. 2. De his plura uidetur apud Aristotelem lib. 8. histor. animalium, & lib. de
 generatione animalium.

De cartilagineis planis.

Cap. CLXIII.

Planorum piscium unū genus est, quod pro spina cartilagineam habet,
 ut rana, pastinaca, squatina, torpedo: & quos bouis, lamia, aqual, rana
 nominibus Græci appellat. Rana piscis est cartilagineus planus: cutim ha-
 bet asperam, & caudam quoque spinosam ac longam. pinna nō habet, sed
 ipsa extrema corporis sui latitudine natat. Branchias habet nō à latere, sed
 parte inferiore & supina. genitale seminae simile muliebri est. Coeunt rang
 non solum ad motus inuicem partibus supinis, sed etiam tergo seminarum
 supinis matium superpositis. Rana in utero gerunt testacea quædā, in qui-
 bus humor ad ovi similitudinem consistit: figura eius testæ similis tibiarū

Rana

legulis est: meatū ſque quidam ſunt capillamentorum ſpecie in teſtis. Atque E
 cum pepererint, ruptis teſtis excluſiſſime ſceni. In locis uicinatibus cœ- 1
 noſis, nec longe à litore, ait author eſt Oppianus. carnem habet ſapore qui-
 dem gratam, ſed duriorē & cōcocta difficiliorem quā torpedō aut pa-
 ſtinaca: & que copioſius præbeat alimentam. Rarum hyeme potiffimum
 comedēdum ſuadet Archeliſtatus. Auribus ut iſſimū batis piſcis ſel recens,
 ſed & inueteratum uino. In hoc rararum genere, *αἰθέρις*, quam letitiam
 uocant, ſel habet reſoni adnexum: & carnem uiroſam & concoctioni reſi-
 ſtentem, candidam tamen: à nonnullis rhina uocatur. Ea uero que aſteria
 batis nuncupatur (quāſi rarā bellatam dixeris) molliore eſt carne, ſiccior,
 que melioris. Rhina, quā ſquatina uocamus, planus piſcis eſt & carti- 4
 lagineus: alperam gerit cutim, quā lignum & ebora poliuntur. ſel habet re-
 ſoni annexum. Squatinarū cœtus, eo quod cauda his pleniſſe & craſſior eſt,
 aſtritu munito ſupinarum partium agitur. Bis anno parit ſquatina una ex
 planis primus partus uerno fit tempore: ſecundus autumno circa uergilia-
 rum occaſum, quī partus felicior eſt. ſætas ſuæ nonnunquam & emittit
 & recipit intra ſepſim: ut uero Oppianus ſcribit, nō intra ſe recipit ſictus,
 ſed ſub pinnulis ſuis meret. Piſcium ſola, more polypiſium colorem mu-
 tare creditur. Hoc quoque habet in piſcibus caprandis ſolerti: obuiat are- 5
 na ſeſe, cūmaque nullam ſui corporis partem inuictam reliquerit, uerberat
 radiolis ſui oris, quos piſcatores uirgulas uocant: quas cum piſciculi aſpere
 rint, adnataſt quāſi ad algas quibus uelſi ſoliti ſunt. Squatina duram habet
 carnem, concoctu difficilem: ſed quæ corpus magis alit quā aut torpedō
 aut paſtinaca. Diphilus rhinam cibum eſſe leuem ait & concoctu facilem:
 & ex his grandiores magis alere. Squatinæ piſcis cutis combuſta uerendo-
 rum puſſulas diſcutit. Piſcium ceterorū diuerſa genera cōte uſum à ne-
 mine eſt: ſquatina ſolam & rarā hoc ſacere creditur argumēto piſcis
 cuiuſdam, quī nomen ex utroque cōpoſitum trahit rhinobati, quāſi ſqua-
 tinorariā appelles: eſt enim parte priore rare ſimilis, poſteriore ſquatina,
 tanquam ex utroque proueniens genere. In hoc planiorum piſcium car-
 tilaginatoſum genere paſtinaca eſt, à Grecis *γάρ* uocata. Pelagijs piſcis,
 ut & reliqua cartilaginata, ut Ariſtoteles tradit: uerum, ut Oppiano placet,
 in locis degit cœnoſis, nec longe à litore. pinnas non habet, ſed ipſa ſua lati-
 tudine natat. Caudam habet longā & ſpiroſam, in qua naſcitur quī radius H
 uocatur aduerſis ſquamis, quo nihil eſt uſquam ueneniatus: utpote quo ut- 7
 bores necantur, & hominum caro rabeſcit. Hoc radius (quod telum eſt ei)
 latrocinauit ex occulto, piſces tranſeuntes figens: argumēta huius ſoler-
 tiæ, quod tardiffimū piſcium hūmagilem uelociſſimum omnium habētes
 in uentre reperiuntur: Paſtinaca carnē habet molliorem, ſua uem conco-
 ctūque facilem, & quæ corpus mediocriter alit: aliūque modice mouet
 quā nonnunquam & in piſcium ſaxatiffimum loco in cibo uti licet. Cibi cau-
 ſa extrahi debet è dorſo eius quequid ſimile eſt croco, capūque totum: &
 modice collui in cibis, quā ſaporis gratia perit. Paſtinaca contra ſummi ſcū
 remedio eſt, cinere ſuo ex aceto illiſo, uel alterius. Radius qui eius caudæ
 intra-

αἰθέρις,
letitia.
Rhina.
αſteria *γάρ*,
bellatam.
Squatina.
Rhina, *γάρ*.

Αἰθέριος,
Squatina.
Squatina.

Paſtinaca.
γάρ.

Αδερφό *ſqua-*
mi, *αἰθέριος*
αἰθέριος *μόλις* *φθ*
νόν.

Annascitur, dentium dolores mitigat, inquit Dioscorides: quos & frāgīl ar-
que excutit. Pasticæ radio scātificatē gingivās in dolore vtilissimū pro-
didit Plinius. Conteritur is & cum helleboro albo illitus, dentes sine ulla ra-
tione extahet. Pasticæ item radio: ad alligandas umbelico, confutatur fa-
ciles partus sapere, si inuendū ablatīs sit, ipsāque demum in mare demissa. Le-
cur pasticæ in oleo decoctum, lichenis & lepras tollit. prunū scabēri-
quos, non hominum modō, sed & quadrupedum efficacissime sedat.

Est & torpido piscis cartilagineus planus:

Hæc grauis & mollis, sunt nulla in corpore pigro

Vires & animū premittit grauitate, natantem

Non et ceteras, liquidū ita clam subiecit in undis.

*Torpedo
negon.*

B Dens parte prona iuxta caudam pinnas habet, pro reliquis latitudine uti-
tur: & utroque sui corporis semicirculo, quasi geminis pinnas natat. cau-
dam habet longam atque spinosam. Huius secori tenacitas nulla præfertur.
Pel habet iccori annexam. prope litora cernosa iacet, ut Oppianus tra-
dit. Parit circa autumnum paulo ante æquinoctium. Fortis etiā suus & e-
manit & recipit intra seipsum, ut squarina. & iam quidem uisa est torpedo
grando, quæ sorus intra se circiter octoginta haberet. Condi per hęc me
torpedines terra, hoc est uado maris excavato, tradunt, quod frigoris causa
castigare Theophrastus exillimauit. Sunt qui duo torpedinis genera tra-
dunt: marinum scilicet & flumatile. Quæ de torpedinis solertia narrantur,
uera omnino certique sunt, inquit Aristoteles Torpedo pisces quos appe-

C tit, afficit ea ipsi quam suo in corpore continet, facultate torpendi: (ipsa ta-
men non torpens) atque ita retardos præsupote, capit & uelociter. Abdit
se in arenā & limorum pisces qui adnatantes obtorpuerint, coeripit quam
rem plerique à se conspectam retulerunt. Plato torporem appropinquan-
tibus tangentiūque inferre torpedinem tradit. Quin etiam peccul & à lon-
ginq, uel si hasta uirgine aut fuscina attingant, uel piscatoris linea, quā-
uis paruas illos laceratos torpescere: quilibet ad cursum uelocis alligari pe-
des proditur. Torpedo, ut Galenus auctor est, mollem habet carnē & sua-
uem, nec concoctū difficilem: quæ corpus mediocriter alit & aluum mo-
dicè emollit: quæ & nonnunquam in saxatiliura piscum inopia, eorum in lo-
co uti licet. Ictus torpedinem, exiguum in cibo præbere succum traditi

D & cartilagineum quoddam in se continere, quod stomacho sit pergratum.
Diphilus cum alioqui uirolam torpedinem concoctūque difficilem esse
dicat: quæ circa caput tamen sunt partes, & teneras esse, stomachoque gra-
tas, & concoctū faciles prædicat: aliis uero maxime: optimas quoque esse
quæ parua sine præterito si in simplici iure coquantur. Torpedo uina ad-
huc diuturnis capitis doloribus admoda, cruciatu uelocientiam mulcet
ad quod illi ob stuporem quem affert accidere paratur. Oleum quoque in
quo uina torpedo sit decocta, acerbiores articulorum dolores illitum le-
nit. Euerfam se dem prociūūque coarctat apposita torpedo, ut prodidere
quidam. Licet in edetur imposita torpedo. Minus & quod de torpedine
inueniendi capiat, cum lana in libra fuerit, triduoque adseruetur. sub dio,

DE DIFFERENTIIS

faciles partus facere: postea quoties inferant, adiuvare. Venenum inhibet E fel corporis inus genitalibus illum.

Rana marina.

Rana piscium.

Walsinger,

u. d. p. 107, 110.

110.

Et usu turpes, & molles tergore ranae
 à planorum piscium genere sunt, quod pro spinâ cartilaginem habet. Ra-
 nas caput amplum atque spinas asperum: quo fit ut solum non recipiat
 intra se. Rana non ipsa sua latitudine natant, sed pinnas habet: & quae pro-
 prii parti accommodantur, eas infra gerunt propter amplitudinem par-
 tis superioris: quae autem parti superioris commixtae sunt, eas iuxta caput ad-
 junctas habent: nihil enim latitudo impedit, quo minus moveantur. Rana
 tam eni contra quam alia plana cartilaginata deductas in latera habet bran-
 chias, eas tamen non spinoso rostris operimento continet, (veluti ea quae non
 cartilaginea sunt) sed cuticula. Posteriores partem carnosam habet rana: F
 & caudam quoque carnosam & brevem. Dependent illi ante oculos grimi

Pinnae, Cui-

mentis sub oca-

lis cartilagineae

exerit. Op-

pinas, Carti-

lagineae quod in

cauda sub cuti-

culis.

na quaedam, quae longitudine capilli speciem referunt, quorum extrema ro-
 tundis quibusdam praepilantur, quasi effectus causa additis: haec, inquam, ubi
 locis arenosis aut sterilibus obturbato solo se abscondit, piscatur atollens
 illa pendentia fila, assultantemque pisciculus pertrahens, donec tam prope ac-
 cedant, ut eos suum in os adducat. Fel habet rana senonum à iecore, intelli-
 nis commissum. Rana cartilagineorum sola, non animal sed ovum parit:
 quod & solidum durumque est, neque tamen prope osi similitudinem ha-
 bet, cum sit squamosum atque asperum. edit ova simul omnia, & iuxta ter-
 ram. Rana inter cartilaginea fortificat numerosius: verum quod de facili
 pereunt, hinc efficitur, ut appareant paucae. Ranas marinarum ex vino
 & aceto decocturam succus contra venena bibitur, & contra ranæ rubrae G
 venenum, & contra salamandras. Quae de ranis ad dentium dolores sunt
 descripta, omnia ex marina efficaciora. Ex hoc cartilagineorum piscium pla-
 norum genere & bos est, latitudine ingentior qui in duodecim lepe cubi-
 torum latitudinem portatur corpore in tanta vastitate carnosum, praemol-
 li atque umbellilo. Dentes intus parvi & occulti, ac proinde

Bos, Asiat.

Non viribus ullis

Confidit, sed fraude viros in funera pellit.

11

Hinc grati pastus, hinc molli in umbra palato

Grata suo, & leno nimium in cuncta sapore.

H

Lamiae.

Non longe à litore versatur in locis cornosis. Lamia quoque in hoc carti-
 lagineorum planorum genere est, magnitudine insigni: quae tamen non-
 nunquam amaram gregem aggressa, vulnere accepisse visa est. Et item
 aquila cum his numeratur, quam & Phalotumum inter pisces duræ carnis
 recte adnumerasse dicit Galenus.

Aquila, Asiat.

110.

Rana, Asiat.

110.

1 Rana, *Asiat. 110.*, nomen habet ex eo quod cauda quibusdam aculeis constat
 ad similitudinem tubi agrestis mora ferens. Haec Mallianus. *110.* & *Asiat. 110.*
 tanquam varios pisces numerare videtur. Et Sophron, *110.* piscem quendam aut non
 praesens an idem sit qui *110.* non explicatur. 2 Figura eius testis, &c. Haec senten-
 tia non habetur in veteri Anthonis translatione, & mihi certe videtur suspecta. 3
 Molliore, &c. *110.* legatur apud Athenarium, sed unde an rectius legatur *110.*

DE DIFFERENTIIS

Hæc urinantes circa spongas, graui periculo infestant, atroxque cum his di-
micatio. In mari rubro tanta est earum copia, ut respicere & nauimediū
urinare tutum sit nauigantibus, remos plerumque ipsos inuadentis. Theo-

Carcharias.
Carcharias, car-
charias, car-
charias.

Cynophthalmus.
Lamna, stylis.
Cynophthalmus, car-
phthalmus.

Galeus, galeus.
Galeus, galeus.
Galeus, galeus.
Galeus, galeus.
Galeus, galeus.

Ualpecula, ual-
pecula, ual-
pecula, ual-
pecula.

Carcharias, car-
charias, car-
charias.

Galeus, galeus.
Galeus, galeus.
Galeus, galeus.

Galeus, galeus.
Galeus, galeus.
Galeus, galeus.

phrastus carchariam uocat: & eandem carchariam Archestratus. In amnes
nonnunquam subit canicula. Huius caro, quæ prædæ et asque excrementi-
tia est, in vulgi cibum sale maceratur, in quatuor partes dissecta: ingrati au-
tem saporis est atque mucosæ, adeoque non nisi raro absque sinapi aut oxe-
lyzo, aut alio id genus acri quopiam condimento edi solita. Ex his qui bene
periti sunt, aliud ex alius membris, aliud ex ore pharmacum colligunt, quod
cynosphthalmum appellant. Nicodorus Colophonius carchariam lamia quoq;

uocari tradit, & scyllam. Alium canicula genus ætissime uocatur, acu-
leo insignis, quem ad ceruicem gestat, quod in aliis galeorū generibus non
conspicitur, uel, ut alij produnt, innati sunt ins aculei duri, alter in capitis
summo uertice, alter in cauda: utque uenenatum quiddam habens. cibo in-
grati & hoc est grauique odore. Hæc & inter galeodeis pisces numeratur,

& malefica est aculei uenenofo. Tertium canicularum genus, idemq;
galei species, *galeus alar* uocatur, id est galeus canicula, & *galeus*, & *galeus*, &
galeus & *galeus* colore est uario. Caniculis hisce in medio uulæ circa spinā
oua adherent: quæ cum accrescunt, absoluta feruntur per uulnam bifurcā
anteriorumque ad præcordia. Canicula testacea quædam gerunt in uero, in
quibus humor ad oui similitudinem consistit. figura eius, testis similis uba-

rum ligulis est: meatūsque sunt capillamentorum specie in testis: fetus de-
inde, rupta dilapsūque illa testa proueniunt. Cum ceteri galei his anno pa-
riant, uti modo diximus) canicula semel parit in uero. Fortum ubi aliquis
imminet metas, an se recipit, & rursus emittit, ut & ceteri galei. Galeus ca-
nicula uiroso sapore est, & malum procreat succum. Dentium dolores se-
dantur cerebro canicula in oleo decocto adseruiatque, ut ex eo dentes se-

mel anno colluantur. *Ualpecula* idemque, id est uulpecula, gustu similis est ter-
reftri uulpecula quadrupedi, unde illi nomen. Oua ad præcordia continet
super mammas illas: quibus, ut descenderint iam absolutis, fetus innasci-
tur. Fetus suos frequentissime emittit & recipit alopecias. Pisces, qui uul-
pes marini non cupantur, cum se deglutisse hamum senserint, hoc modo
libi opotulantur: translucientes magnam lineæ partem usque ad tenuio-
ra fila, lineam ita abrodunt. Archestratus, inquit, uulpem galeum piscem

Rhodi optimum esse: & eandem pingue à Syracusanis uocari. *Ualpecula*, id est
spinaci idem generandi modus, qui uulpecula est: oua enim ad præcordia
continent spinaces super mammas illas: quibus ut descenderint iam abso-
lutis, fetus innasciatur. Spinax unus ex galeis recipere intra se prole spinæ
impedimento non potest: & hoc quoq; illi peculiare, quod cor habet pen-
tagonum. Galei *leues*, id est leues uocati, oua per uulnam mediam, ut canice

le gestant: quæ postea in utrumque uteri sinum descendunt, & animal gi-
guntur umbilico hærentes ad uulnam, ita ut ouo absumpto, partus non ab-
iciaturque in quadrupede contineri uideatur. *Ualpecula*, id est bellaris, quem
quidam alij uocant, parit spississime: quippe qui bis mense putatur parere: quod
ideo

A ideo uidetur, quia ovis eorum non simul perficiuntur. sepiissime fetus suos intra se recipit & emittit. Ceteros galeos suauitate uncti asferias estq; tenetior & melior, ut licetius prodidit. E galeorum genere est & qui apud Romanos maximo habetur in pretio, quem galexan uocant. Hic in Græco quidem mari nusquam uidetur nasci. & cum ceteri gales duriores habebit carnem, hic tenetior carne præditus est. Quæ galei uocantur, ita se habere palam est: quæ autem *musella*, id est musella appellatur, similitudo sunt mureni, nullamque cum muselo communem habent, in Salphio lacu nascuntur plurima. De musella hæc cecinit Anthonius,

Galexin, parrifin.

musella, mureni, musella.

Quæque per Illyricum, per stagna binominis Istri
Spumantem indectis caperis musella natantem,
In nostrum subuecta fretum: ne lara Moselle
Flumina tam celebri defraudentur ab amno,
Quis te naturæ pinxit coloratra superne
Puncta notant tergum, quæ lumen circumit iræ:
Lubrica cæruleis perducit tergora facis.
Corporis ad modum fartam pinguefecit illinc
Vtique sub extremam squalet cutis arida cundam.

Ut uero alij, musella breuis piscis est & iecorino adeo similis, ut eundem esse diceres. Pupillæ oculorum ad cyaneum colorem accedunt: citius mentum quam iecorini matius est, & manus quam chremynis algas depascitur, & satilis est: itaque similiter ut musella terrestris omnium cadauerum in quæ incidit, oculos exciit. Proxima est scaris mæsa generis dicitur musellarum,

C inquit Plinius, quæ muris dicta inter Alpes quoque lacus Rhenæ Brigantinas æmulas marinis generat. Comitula morbo correptis datur musella maris iecur.

Musella marina.

1 Galei uocantur, &c. Theophrastus musellos uocat. 2 Squales, ut eundem arbitror, apud Plinium lib. 9. galeus est, cap. 14. & proquaque Massarius in prore capere non squalum sed galeum legimus. 3 Pagna spongiosorum cum canibus marinis pulcherrime describitur à Plinio lib. 9. 4 Scyllam, &c. Est apud Oppianum Scylla, quæ in alto degit pelago, rursus licet ad idem uide an sit eadem quæ Scylla, in Oppiani exemplaria sunt mendosa, & legendi poetæ sic *musella pro musella*. 5 An idem piscis hic sit, qui apud Ouidium in Halicarnasso inter pelagios pisces numeratur.

Musella, Squale.

Squale.

Cereyrolque ferax scopulorum sine moratus,

uel cerceus, *apud Græcos, cerceus.*

D Oppianum, qui in saxorum cauemis uisitur. 6 Suspectus musla quidem uidetur hic Anthonis locum, ut prius in eâ admonui. 7 Quomodo ferax canis & recipit, docet Oppianus lib. 1. de pisc. 8 Hoc loco libenter secum sumus acceci. An musella inter pisces quam Theophrastus uocauit, et Oppianus quoque & Plinius uocauerit. 9 Spinacem, inquit Massarius, sic à spinis quæ bing & alba erant & densa non cepati. 10 Martius, alibi murens, sed potius legendum arbitror martius ut scilicet comparatur musella, quæ lacustris sunt, martius piscibus uel optimis, uel martius, scilicet musella, de quibus Plin. hoc loco lib. 9. & inter marinos pisces Colomed. lib. 2. audas musellas habet: & Ennyærtes est apud Apulicam apud prima,

Omnibus ut cipea præstat musella maras.

De piscibus longis.

Cap. CLXV.

Q Vi longi sunt pisces & corpulentæ, ut anguilla, conger, ut mugilæ genus quod in lacu Sypharum nascitur, parte corporis proma benas habet.

Bb ij

DE DIFFERENTIIS

bent pinnas: sed quæ in cæteris piscibus supina parte habentur, carent ex his & nonnulli. Iis uero qui prælongi sunt & serpentis speciem magis referunt, nullæ omnino sunt pinnae, ut in urinæ: sed flexuoso impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes: & is neque branchiarum integræ sunt atque discretæ, ut cæteris piscibus habentur. Genus piscium longum æquilongis locis melius uiget. Ex quædam in istius loco eodem in a quilonis plures longi quàm lati capiuntur.

De murena & aliis quibusdam longis.

Cap. CLXVI.

*Murena,
Muraena,
Tegmæna,
Tegmæna.*

Murena prælongus piscis est, & serpentis potius quàm piscis speciem referens. pinnas nullas habet sed flexuoso impulsu corporis adnatatum ita man utitur, ut terra serpentes ad gressum modò quâsimili reperit in huius more, & in sicco quoque nonnunquam: nec ullæ hæc branchiarum, inquit Plinius. Licinius Macer murenas tantum femininum sexus esse tradit: Aristoteles myrnam uocat mare qui generat. Discrimen, quod murena uaria & infirma est myrus unicolor & robustus, colore laticis. Myrum præterea, Dorsion anchora est, nullus per carnem sparsas habere spinas: sed totum in alimentum utilem esse, & carne admodum tenera. Sunt uero duo eius genera, alterum nigrum, alterum subrufum est præstat qui niger est. Ad murenam reuertamur: dentes tam in das quàm extra os possidet. In Gallis septentrionali nauentis omnibus dextra in maxilla septem maculæ ad formam

*Myrus,
Myrus.*

*Aristoteles
myrnam
uocat mare
qui generat
Dorsion
anchora est.*

septentrionis auro colore fulgent duntaxat uentibus, pariterque cum anima extinguuntur. Tenuissimum his tergas, conerit anguillis crassius. Branchias non habet murena integras articulatæque, ut cæteri pisces: quæ tamen utrinque possidet, & eas simplices. Fel habent murene semotum à iecore, anellatus comatussum. exiunt in terram, & sæpe in ea capiuntur. Licinius Macer (ut diximus) murenas tantum femininum sexus esse tradit: & concipere à serpentibus in sicco liquis elapsis, id quod falso credi affirmat Anderas. Murenarum certe coitas, ut & Aristoteles prodidit, complèxi mundo supinarum partium agitur, ut serpentum. Murena omnibus anni temporibus parit ova parua: cuius parus & numerosior est, & ex paruo in maximam cito adolefcit. Murena neque in stagnis gignitur, nec temere fluuios ipsam subire inuenias: nonnunquam tamen & quæ in utroque uiuunt, in mari scilicet & aqua dulci, reperiuntur. Partim pelagia partim

Alia scilicet

litoral murena est, sed fore in saxorum cæternas degit: & sola ex pretiosis piscibus (quævis Tharsensis Carpathique pelagi quod est ultimum, ærænaula) quouis hospes fredo, peregrinum mare sustinet. Sola carne uescitur murena. pinguis cere murena traduntur. habent autem quibusdam annis temporibus. Ouidius prodidit in eo uolumine quod Halicuti con inscribitur, murenam rete circumdatam maculas appetere ipsas conicium teretis ac lubrici tergatum multiplici flexu laxare donec euadat. Murena ut hæserit hamo, amplius deuocat hamum, adinouetque dentibus lucas atque erodit. Idem infixum hamo inuertere se, quoniam sit dorso cubellæ, spinæque li neam præsecare. In piscinis nonnullis commisceri eas cum aliteris noct piscibus

*Hæc Ouidius
in Halicuti
con inscribit,
non murena.*

- A piscibus non placent quia si rabie vexantur, quod huic generi uelut canino
 toler accidere, firuissime persequuntur squamosos, plurimóque morden-
 do confundunt. Fuisse non interimi murenas aune, eadē in scrolo protinus.
 Animam in canda habere certum est, (inquir Plinius) eaque ista celestium
 4 exanimari at capitis ictu difficulter. Nouacula & ferrum quæ pisce tacta
 sunt, olent. Murena morsus uenenosus est: eadē que committuntur sympto-
 mata, quæ uiperæ morsum uerum perniciosius illas teretes esse minoresque
 ac uarias, atque & uiperæ prognatas tradit Andreas. Murena polypo hostis
 est & carabo, atque cum utroque pugnat. Probantur ex murenis maxime
 5 è Siculo fredo quæ *ῥαῖνι* & Latine flutz dicuntur, quod in summo superna-
 tantes, sole torrefactæ curuare se posse, & in aquam mergere desinant: atq;
 ita faciles capta sint. Carne in habet murena nec durā nec mollem, sed me-
 diocrem: quæ item succum procreat neque tenuem neq; crassum, sed me-
 diocrem: quæ tamē in uitiolis aquis degunt, pessimæ sunt. Alunt murenae,
 inquit Isidorus, nō minus quàm anguilla aut congi. Murena morsus, ipsa-
 rum capitis cinere sinantur. Lachenas & lepras soluit murenarum cinis cū
 mellis obolis ternis. Est & murena quardam fluuiatilis, cui spina unica est,
 ut Dorian prodidit, non aliter quàm asellorum generi, quod callarium di-
 cunt. Serpentis quoque speciem refert anguilla, piscis longus ac lenissimus
 habet pinnas uota branchias, quas utrinque quaternas gerit simplices, & ad-
 que exigua segula quoque illi exigua, sed in secore inest. In omento sebū pan-
 gulæ paucam, & in paucis melli plurimæ coeant. Nō est in us genus ma-
 6 sculatum formicinum: nec per coirum procreantur, nec parit oia. Nec
 uero capta unquā aliqua est, quæ aut semen genitale aut oia haberet. Me-
 tus quoque uel femina uel uulua accommodatos nulla rescissa ostendit: sed
 hoc unum fere inter sanguinea genus totum sine coita, sine ouo procrea-
 tum quod ita esse argumento constat, quod in nonnullis seculis stagnis,
 aqua omni exhausta, & limo detracto, anguillæ denuo generantur ubi aqua
 accessit pluuia: nam siccis temporibus gigni nequeunt, etiam in stagno
 perennat: quippe quæ umbre & uiuant & alantur. Connatis sibi inuicem
 anguillis ætatis corporum mutuo, ut nonnulli tradunt, mucus quidam in
 arenam limūque distillatur uero alius uidetur, aut rari se scopulis exa stri
 7 gimenta inueiunt: nec aliū est earum procreatio: nam anguilla neque mas
 neque femina est, ut modo diximus, neq; prolem ex se aliquā potest pro-
 creare. Quam autem differentiam maris & feminæ anguillæ notarūt qui-
 dam, scilicet alteram caput habere amplius atque oblongius, alteram, hoc
 est feminam, repandius, hæc non maris ac feminæ differentia est, sed ge-
 neris: non sunt enim formæ, sed quia aspectu à cæteris differunt, formæque
 appellantur. & sunt in anguillarum genere meliores quæ feminæ uocan-
 tur. Effluuiis in mare descendant anguillæ: & in utroque humore degunt,
 magno scilicet & dulci. Anguillæ octonos uiuunt annis duræ & sine aqua
 senis diebus aqulone spirant, austro paucioribus. At hyemem eadem in
 exigua aqua non tolerant, nec in turbida: ideoque circa uergilas maxime
 capiuntur, fluminibus tum præcipue turbidis. Anguillæ pauce quædā cer-

*Murena flutz.**Murena fluuiatilis.**Anguilla
hyemalis.
æstiva.**Murena, æstiva.*

DE DIFFÉRENTIIS

tisque locis uelociter limo atque edulis, si quis apponat: sed plurimæ dul- Et
ci humore uiuant, idq. qui uiuunt anguillarius dant operam (hæ angios
dicuntur) summopere curæ, ut quàm maxime pura, sincerique sit aqua af-
fluens semper & effluens per ripas, ubi uiuaria exsternuntur: an torbida namq.
breuis suffocatur intereunt: adeoque quo eas facilius capiant, aquam pertur-
bant. pascuntur noctibus: interdum in luto quiescunt. exanimes pisciù sole
non surgant. Anguille quantus uel ex pusillima capiantur aqua, succum
probum nunquam efficiunt, sed lentum possitosiusq. Et anguilla palustris
sapore magis ingrato est quàm marina: sed uberius alit, ut Diphilus author
est. Icteus autem anguillas inter pisces optimum pro creare facit, & sto-
macho admodum gratus esse prædicatur: undeque nutrire, & edere facile
sanatos reddere. & Macedonicas anguillas inter salisamenta numerat. Cō- F
ger, quem & gongrum appellant gryllus quoque à nonnullis uocatur, an- &
guille similis est, longus leuiusq. ac lubricus. Pinnulas tantum binas habet:
& binas utrinque brachias, alteras simplices, alteras duplices. gula illi exi-
gua est. In felles suis ambigit: alii enim ad leucæ, alii in frà sepositum ad hæ-
ret fel. Conger ad ingentem crescit magnitudinē, præsertim in Sicyone, ut
Eudoxus author est. Congrorum generatio, ut Oppianus tradidit, nõ aliter
fit atque anguillarum, artros scilicet corporum. mutuo, indeque mucore
quodam in arenam limamue distillant ex quo nascuntur conghi. uerum
ut Aristotelis uidetur, conghi se totam intra se continent, ouum scilicet, sed
totum in arenadum, quale in piscibus cernitur qui squamas integunt. Nec
ipsa fortaria satis patet in utro pinguedine oblorescit enim prolixiuscula, ut G
in serpenticibus, quod certe ignis periculo innotescit: pingue enim absumit-
ur atque euaporatur, poua autem crepitant & extrusa desiliunt. ad hæc si
palpites & artros digitis, pingue locæ uniusq. senseris ouum autē duriuscu-
lum. Congri itaque alij pingue habent, ouum nullum: alij contrā, pingue
nullum, ouum autem quale modo exposui possident. Congrorum genus
duplex, albicans pelagij sunt: at uero migrantes ambigunt, partimq. pe-
lagij, partim uero litorales sunt. Viscitant autem frequenter in paludibus
& ad fluuiorum ostia, ubi copia influit aquæ dulcis:

Et fluctus cæno commixtus uentice multo

Voluitur à terra.

Carne tantum uelociter conghi, uti docet Aristoteles. Congri polypos e- H
dunt: leucæ enim & lappum conghi corpus usum hostis in damacatione effu- 7
git. Conger & murena caudas inter se prærodunt. Conger, ut Philonimo
placet & Galeno, duram carnem habet: quæ tamen concoctu non admodū
difficilis est, uti Xenocrates docuit, nec mali sacci. Nutrit copiose, uerum 3
orpi non adeo gratus est. Acus siue belone, quem & aculeum uocamus: &
rhapada, piscis est longus, tenuis & levis, nostro præcæto & in cornu mo-
dum duro. Dentes non habet, ut refert Athenæus: sed habet iccoria annexā. 9
fecundat sero, & hyeme parit. Vnus piscium de hæcote utro non tam pro-
pter multitudinem ouorum, quàm magnitudinem parit: habet enim hic ri- 10
mam quandam sub uentre mo, ut cæcæ serpentes, ~~uocant~~ uocant, à partu
uunt

*Anguilla Ma-
cedonica,
Cyren, Giger,
Fryxer,
Gryllus.*

*Acus, belone,
Rhapada,
Aculeatus,
& Durus.*

- A uiunt, & uulnus coalescit & modo phalangiorum proles parentem offensa circumdat, & si tetigerit, fugiunt. Vicinat belone locis partium siccioris, partium arenosae. Postquam laqueos retiſque piscatorum euaserit belone, uti refert Oppianus, dum conuersa morsu lacerare rema cupit, dentibus haeret in lino, atque ita capitur. Stomacho minime grata belone estimalum procreat succum, facileque corrumpitur & parum nutrit, ut Xenocrates prodidit utro Diphalus, concoctio difficilis est, sed probum efficit succum. Belone sphyræna similis est, eam Athenienses celleram dixerat. Sodas Larine appellatur, quæ à Græcis sphyræna, nostro similibus nomine, magnitudine inter amplissimos rarus, sed tamen non degener. Duplex earum genus, patrique longum. Si reti claudatur sphyræna, serpētis in morem è maculis elaboratur: adeo lubrico est ut ergo. Gregatim degunt sphyræna: sapore uo admodum grato sphyræna est sed succum pignit bonitate medioctrem, & qui copiosius nutrit, quam qui è congro. Zygræna piscis longus est, ut prodidit quidam: ab alio uero inter cetera numeratur ferocissima. Zygræna sel adnexum iecori est. Caro zygræna & dura est & insuavis. Zygræna cū sit aspecu infauito infelicisque, non est prospera nauigantibus. Forma (ut Oppianus scribit) anguilla proxima est ecbeneis, pisciculus æquipedalis quinque digitorum crassitudine, ut Trebius Niger prodidit. Qui eum uidere, inquit Plinius, simiaci magnæ similem esse dicunt. Satis assuetus est, pelagiusque, raro litora petens, colore nigricante fuscescens: rostro acuto, atque prope in hami morem incuruo. Hanc errore nonnulli pedes habere prodiderunt: expes autem omnino est: sed quoniam pinnas habet pedibus similes, hinc fit ut pedibus instare uideatur. Hoc pisce carinis adherente, naues tardius ire creduntur, inde nomine impolito, & è nostris quidam. Latinis remora appellauerunt eum. Ruant uenti licet, & seruiant procellæ, imperat fatiori, uirique tantas expesit, & cogit stare nauigia, quod non uincula ulla, non anchoræ pondere irruocabili factæ. Hæc peritoriam Antonij nauim Acciasio mare tenuisse fertur: & postea Caij Caligula. Ad mirandum certe, quomodo adherens teneat, nec idem polleat in nauigram nec proscindamque è Græcis alij lubricos paruas atque proscindentes conueni ad maturitatem alligato eo, prodiderunt: alij sale adferuam a dalligamque grauidas, partus soluere: ob id alio nomine odyngolyontæ appellari. Præterea hæc esse eiusum adferuari in sale Trebius Niger arbitrat, ut aurum quod incidit in altissimos puteos, ad motus extrahat tamen in cibos non admittitur. Oblongo corpore musculus est, argenti Græci uocant, piscis paruus, cauda tenuis. Dentes nullos habet: sed pro his, setis, suillis similibus inus os hirtum, & linguam etiam ac palatum. Balenam antecedit musculus, & oculorum uice fungitur, non strisque uiam ducitque per æquor, nec balenz solum dux est, sed & ceterum aliorum, ut tradit Oppianus: nam cetera non luge cernunt. *Αἰνία* in quodam Lybia fluuio nascitur septem cubitorum, quæ branchias habent perforatas, ita ut per eas respirare possint, inquit Strabo. *Αἰνία* id est hirudines, quas & sanguifugas uocant, nonnulli captas seruant: diuersus etenim earum ad extrahendū fan-

Sphyræna.
Belone.
Ogla.

Zygræna.
Lobelia.

Ecbeneis.
Unguis.
Remora.

Color nigricans.
ex. m. d. m.
hircus, fulgi-
gus.

Remora.

Odyngolyontæ.
Alia, appel-
latur.

Argulus ma-
rius.

Argulus.
Alia, ex li-
gula cum ap-
pellatur.

Αἰνία.
Αἰνία.

Αἰνία.
Αἰνία.

Αἰνία.
Αἰνία.

guinem usus est: quippe eadem ratio est, quæ cucurbitarum medicina- E
 lum ad corpora levanda sanguine, spora menta laetanda, iudicatur: sed gi-
 trum, quod admixtum semel desiderium facere circa eadem tempora anni
 semper eisdem medicinis seruntur. decidant satietate & pōdere ipso san-
 guinas, aut sale cineribus aspergit. Quod si forte harudinum penuria sit, aut
 cum admoventur, pauciores quā pro desiderio adhæferint, foraspe cau-
 da inciditur: ita enim fiet ut effluente ex ipsis sanguine, ab attractione non
 desistant, donec cinere aut sale aspergāt. Scire autem oportet, harudines
 non sanguinem qui in intimo corpore est extrahere, sed eum qui in extre-
 ma carne cōtinetur, exugere. Aliquando, inquit Plinius, affusa relinquunt
 capiteque causa valde uersa infanabilia facit, & multos interimit: inuolunt-
 que nris remedio uersa maximèque ruse ita formidantur. Ergo surgentia F
 ora forcipibus percidunt: ac ueluti siphonibus desinit sanguis, paulatimque
 momentum capra se contrahunt, nec relinquuntur. Hæc Plinius. Incedunt
 harudines parte corporis prioris præcedente, & quod reliquum est corpo-
 ris, ad illam contrahunt: & hoc quidem pacto, uero ex loco in alium ferun-
 tur. Capilli denigrant sanguisugæ, quæ in uino nigro diebus quadragin-
 ta computruere: alij in aceto sextarius duobus sanguisugarum sextarium
 in uase plumbeo iubent putrescere totidem diebus, mox illini in sole.
 Sornatus tantam vim habere tradit, ut nisi oleum ore continent qui tin-
 gunt, dentes quoque eorum denigrari dicat. Palpebrarum & aliis quoque
 locis nasceturum pilorum, psilothrum sanguisugarum cinis ex aceto illitus
 esse putatur. comburi eas oportet nouo uase fictili. In Gange Indię Scitus
 Sebosus haud modico miraculo affert uermes brachais binis LX cubitorū G
 caruleos nomine & colore, (hæc nomen à facie traxerūt) aded robustis utri-
 bus, ut elephanteo ad potum uenientes, mordicus cōprehensa manu ipso-
 rum, rapiant in profundum. Cœcias Gnauius author est, in Indo fluuio be-
 stiarum ferarum experte, uermem nasci, qui eorum qui in ligno gignūtur
 & aluntur uermium, speciem habet. Hunc ad septem cubitorum longitu-
 dinem, & eo amplius excrefcere: cuius crassitudinem decem annos natus
 puer manibus uix circūplecti queat. Hæc in superiori oris sede unus dens
 inest, in inferiori alteram bo quadrāguli cubitalem longitudinem habet:
 & quo deumque siue animal siue lapidem comprehendit, facillime cōte-
 rit. Inter duo ima in sede fluminis uersant, noctu ad terram procedit, & in H
 quo deumque incidit, uel equū, uel bouem, uel asinum cōicit, atque in suas
 sedes trahit: & in flumen abstrusus, membra omnia, excepto uentre, exci-
 At si interdu sume premitur, siue camelus siue bos in ripa bibis, uolentis-
 simo impetu, summa læta modicus comprehendit, & robusto tractu in
 aquā protractum eductus pellis duorum digitorum crassitudine est. Hūc
 cum ceperint, ariginea dies appēsū tenent: atque ex eo in fictilia uasa cras-
 sum oleum stillat, quod quidem ipsum regi Indorum apportant. Huius ea
 est uis olei, ut sine ullo igne eius infusa hemina, quencunque lignorum a-
 ceruum comburat. Ac si uel hominem uelis, uel aliud animal cauerere, pec-
 tum ut hoc infuderis, funditus statim deslagrauent.

*Harudines
ruse.*

*Caruleos.
bestias.*

A 3. Etiam lib. de lib. animalium videror Aristoteles mucronem separare à piscibus sacra modo. 1. Plinius codices plurimos pro myro myrrum habere, uerū my- Apoles.
ro, ut Aristoteli placet, (Theodorus mucronem uocat) umbres nocturni situm in plu- Marina.
ma multisque, quodlibet modum aqua excellit. Coloris lutei, huius tamen ut legi-
Theodorus Archemus uera lespeid est colore suis, quæ quæ dicitur in citharæ obstru-
tione uidetur & uocis Aristoteli inserpser. Sed singulus restat, quid Archemus addi-
dit, hoc uerū. *Incens. & ipso, ut flicet in omnibus partibus tam exterius quam interius*
uocis uocis colore. Nihil uocis mutare, sed admodum uere. Siquis enim à Plinio inter ma-
riores pisces numerat, uerum tanquam alterius generis à mucrona. 3. In utroque
laxer eos pisces numerat etiam à Galeno, qui in utroque humore, sitit in mare &
aqua dulci utriusque, in lib. de cibis, malique sit. 4. Versus codices nonnulli
habent, No uocula pisces quæ casta sunt, ferum odore, ut sic nonnulla pisces. 5. Sicut
lofres, &c. Mureli lib. 11.

Que nasario Siculo grande murena profunda

Now make your own merge file entry:

B Fluct. Theodorus enim fides fluitas interpretatur lib. 4 histor. animalium, Rhyades findit quoniam piscium homines vel nautis feruntur cicada est, fugare ut odorem sentientes. Libro secum quinto, rhyades per stant parum: Theodorus spargos vocat. Libro 4, rhyades spargus. piscium genera dixit solitari, id est qui salitrane vagantes. In Empyreo mē pō jūcti sē lōq; ad citharistas salitariorum genus in aere. Sed unde ne mēda in his locis sub-
stantia Graecis exemplibus, & Gyllius, inquit Diphobus, similis est angustis, sed in-
fima. 7 Vescuntur. Hae non de congro, sed de musca nactas Oppianus. Alio
huic loco vetus Theodorus, sed nos hic de Gerzani fecimus lectionem, & veteris in-
terpretis sensum haec edidimus. Et ex Plinio quoque lib. 9 polypum congrui lace-
rant. 8 Qui non adeo grauis haec animā, scilicet de leone apud Orbiliam.

9. Dura, Adhuc Malleus, dorso conules ad unam inclinante, squaræque argenteo-colore. Et Alburnus Magnus Scinam habet squida colons. 10. Fictum de

Chusene. Delphinus propter multitudine uero, inquit Plinius, 11 Sphyryna. Marum quibz dicit Plinius hunc & alios quoddam pices, de quibus in hoc lib. 18 scribit, in uollo uicibus nominatur Sphyryni Theodorus mallicolum uocat. 12 Sefquipedalis. Apud Plinium legunt hic quidam semipedalis. 13 Belichus habet perhorat. Et gulum perforatum habent ad respirandum Alhanes. 14 *notus sumus* & *Adrianus* est emulgete sanguinem, namque cum idemque erupant. Quo pacto ferantur, neque ad usum accommodantur, monstrat Galenus lib. de hirudinibus. 15 Brachius brevis. Alias, brachus brevis & cubitorum. Solinus ita habet, Hirina habet brachia longitudinis cubitorum non minus sedem.

De plaris piscibus, qui *de-fecti* dicuntur, id est qui passeri-
na sunt foete. Cap. CLXVII.

Y *resolubilis & ligatus*, id est pisces qui passerina sunt specie (qui & plati uocantur) eodem modo natiuitate quo coelites, & altero oculo orbati inceduntur eorum natura à recta figura peruersa est. Piectaceum genus non continet enim in eo genere mas est, sed ovis in omnibus reperitur. Lamosa regio, ut Columella prodidit, planum educat pisces, ut soleam, rhombum & passerem. Cibo suaves sunt, & probe nutriunt rhombas, passer & buglossus. Passeres à rhombis sive tantum corporum differunt, dexter resupinatus est illis, passer latus. rōs, quam passerē uocamus, buglossus similis quodammodo est non tamen omnino eiusdem speciei: buglossi namque caro, ut Galenus affirmat, & renella magis est, & in cibo suavior, atque in omnibus prestantior eūdem passeris: quamquam nec illius caro dura est, sed me-

DE DIFFERENTIIS

diocriti. Xenocrates autem baglossum & plectam, eamē habere duram & li-
 corruptioni maxime obnoxiam, probūque gignere succū & alium me-
 diocriter crete pradicat, ut uero Diphilus, plecta & baglossi suaves sunt, &
 copiosum præbent alimentū. Baglossi caro, ut docet Galenus, ex his est, quæ
 succum gignunt: neque crassum admodum neque tenuem, sed qui usque-
 quaque mediocritatem obtineat: qua & in saxatillum penuria eorum lo-
 co uti licebit. neque uiscus utriusque prorsus eadem ratio est: baglossus nāq;
 loca arenosa magis, passer corniola amat. Cynoglosson quoque plectam uo-
 cant Athenienses, à baglossō diuersam. Rhombum Diphilus baglossō &
 plecta nihilo dexterorem iudicat, quod scilicet ad saporis gratiam pertinet,
 alacritus, quod ex eo præstatur copiam. Mediocritatem obtinet rhombus
 inter duram & mollem carnem, ut Galenus: asello tamē durior est. Xeno-
 crates autem duram esse eius carnem, nec facile contrahi posse: oportere ue-
 ro rhombum magnum uno die adseruatum, postea coquere in uentriculo
 egre concoctionem patulē, sed nutritie abunde. A rhombus passeris (uti modo
 diximus) seu totum corpus differt, unde et resupinatus est illis, passeri
 leuius. Latus admodum piscis rhombus est, uel Martiale teste:

Quantus lata gerat patella rhombum:

Rhombus latus est tamen patella.

Rhombi abditi pinnas exertas mouent specie uentriculorum: ita Plinius.
 Aristoteles uero de *h. a.*, Cum nullam, inquit, sui corporis partem intectā
 reliquerit, uerberat radiolis sui oris, quos piscatores ungulas uocant, quas
 pisciculi cum asseuerint, adharant quasi ad algas quibus uesci soliti sunt. G-
 laci moderate (ut alunt) rhombus unus in polio, deinde remittitur in ma-
 re. Baglossō atque passerī similis tanta est, piscis tenuis gracilisue, & in ca-
 bo quoque gratus, & qui paruo igne indiget. pinnas habet tantum duas.
 Tante frequenter & optime nascuntur in Alexandriæ Canopo & Seleucia
 Antiochiæ. Tante leuiter siccatur pondere x. i. i. i. cum oleo cedrino per-
 unctis pilis x. mensibus, psilothrum palpebrarum esse putatur. Citharus &
 piscis planus rhombo similis est: uerum rhombus teneriorem habet carnē.
 neque huius tamen caro dura est, sed mediocritas, uel iudicat Galenus. Est au-
 tem, ut Xenocrates prodidit, stomacho ingratus: malum procreat succum,
 sed non facile coerum pituit. Alga piscatur, in arenosis locis uiscitans. Den-
 tes habet serratos, linguam solutam, cor album atque latiusculum. appen-

dioces habet plures superne circa uentriculum. In hoc genere alius rufescit
 aut flauescit, alius candidior est. Hæc ex Atheno. In mari rubro, inquit
 Elianus, piscis nascitur, cuius corpus ita figuratum est, ut similitudinem
 lingulæ eius latitudo gerere seruat. Squamæ non magnam tangenti a-
 speritatem habent, subaureo est colore, & lineis à summo capitis uertice
 ad extremū eandem sic distinguitur, ut eas cytharæ fiduculas contentas ef-
 se dicas, unde is cytharus appellatur. Os illi possum h. & subdidit, idemq;
 nigerrimum est, atque cingulo croceo circumligatur. uentex uarietate distin-
 guitur, fulgore aureo & ingris quibusdam lineis. Pinna aureas habet rufo
 colore multipliciter nanatur. Cauda est nigra propter extremam: enim cā-
 didissimam

*Imbaglossi ad
 M. uero dicit
 Archestratus.
 Cynoglossus.
 Rhombus.*

Idem.

Tante, mathe.

*Alto hoc loco
 Plinius legitur
 channæ car.
 Citharus.
 x. Angly.
 R. Sten.
 R. Sten.*

Ad diffinito colore asperguntur. Alij item pisces nasci dicuntur, toto corpore porpurei, certis intervallis aureolas lineas possidentes: eorum vero caput eungulis violaceis illustratur, uno quod est ante oculos ad branchias pertinente, altero secundum oculos usque ad medium caput excurrente, alio autem tanquam monili sic collum circumspicante. Piscis est, ut nomen indicat, Apollini sacer, ut & Apollodorus auctor est, sicut cytheria Veneri. Inter planos pisces, ut auctor est Doriion, una cum psetta & buglossis namentur & elichurus, quem etiam corin vocant. Lato quoque generi epodas ex Ovidio adiecit Plinius, eorum ex numero quorum nomina apud vernam aliam reperiuntur.

Pisces.
Epodas.

Epodas.
L. cor.
Epodas.

1 Rhombus, *acc.* Nusquam Aristoteles (quod meminerim) rhombum nominat, sed *rhombos* & (ut testis Auchenius) Latine *rhombos* rhombum vocant Theodorus passerem interpretatur. Galenus *rhombos* a rhombo distinguit, & pro una specie *rhombos* accipit, quam Plinius passerem vocat, & nonnunquam psetram ita & Auchenius interpretatur. itaque *rhombos* quasi genus videtur esse rhombi & passeris & item unam significabit speciem, passerem scilicet, ut fecit Hermolaus in annotationibus in Plinium. Passer interea quidam vocatur ut quidam piscis est apud Aristotelem alius à passerem, cui solis inquit, non longe à rectore est in istius commissum. Theodorus non habet. **2** Buglossus. Conuenit Hermolaus buglossum latine solam dici & quoniam Plinius arguit Varro buglossam nominant, aut solas est, ut illi non absimilis. Plani locus est in Cassin. cum dixit nullius, Vin buglossam? (Respondit *frax*) Quid opus est quando minor domi estis buglossa estiam nunquid sciet. De solas & psetta haec testis Plinius. Terra quidem, hoc est uado in mari excavato, conchi per hyemes psetram solentem ut tradunt, licet, solas cum rhombis non totam pontum Latine vocetur solas piscis imponitur, & Ovidius in Halieis.

rhombos.
Buglossus.
Solas.
Buglossus.

Cinus, & Ovidius in Halieis.

Passeres solas candidos & concolor illis.

Passer & Adiatro mixtus sitior rhombus.

3 Dexter respiciamus, *acc.* Adin Massenus asperum esse rhombum quandoquidem ossis quidam torrida aeneas habet, quem admodum traus. **4** Veberris, *acc.* *Veberris* *res* *est* *aliqua* *et* *agrorum* *et* *alios* *passis*, Vetus interpret, Et cum lauent, habet in officio quandam partem sicut uirgam. **5** *trachis* Theodorus unum vocat Tenuli gressilur, *acc.* *trachis* *sim* apud Achenium: in idem piscem, non potius legendum, *trachis* *est*. **6** Cytharus, *acc.* *cytharus* *est* *et* *alios* *passis* apud Plinium, in istis idem. **8** Lato quoque, *acc.* Ovidius quoque in Halieis, lato epodas et solas, passer & rhombo conuenit.

Pisces.
Epodas.
L. cor.

De piscibus quibusdam litoralibus facilibusque, de scaro.

Cap. CLXVIII.

D Pud antiquos nobilissimus habitus accipenser nullo nunc in honore est, inquit Plinius sed scaro datur principatus hoc est ut qui ceteros omnino suauitate praestet. Hic solus piscium dicitur ruminare: hunc etenim uni aqualium dentes pluri & non ferrati. Litoralis piscis scarus est, circa petrosa herbosique loca degens herbis nunc uelutur & phuco praecipue. Solitarius hic est, (ut auctor est Aristoteles) & carnui oras quoque. Sed Plinius, herbos, inquit, dicitur uelut, non alius piscibus. Linguam habet paruum, & quae ori non ualde adheret: cor triquetrum & candidum, lienem nigrum. Superne circa uentriculum exeunt appendices complures. binas utrinque branchias habet, alteras simplices, alteras uero duplices. astat opti

Ce

DE DIFFERENTIIS

mus habetur. Noctū fere nō capitur: dormit enim in cauernis laetans. So-
 las piscum, ut refert Oppianus, magnam edīt uocem. Vacat Euryppus Py-
 raus scato & chryssa, & reliquis spinosioris generis, ita Aristoteles. Scarus, 3
 inquit Columella, totius Alie & Græciæ litoribus Sicilia tenus frequen-
 tissimus est: nunquam in Ligusticum, nec per Gallias enauit ad Ibericum
 mare: itaque ne si capti quidē perferantur in nostra maria, diuurni quæst
 possideri. Vti uero Plinius refert, scarus mari Carpathio frequēs, promon-
 torium Troadis Lectum sponte nunquam transit inde aduectos Tyberis
 Claudio principe Opratus præfectus classis, inter Hostiensem & Campa- 4
 niz oram sparsos disseminauit: postea frequentes inueniuntur Iulie in li-
 tore, non ante ibi capte. Alga uestitur, uti diximus, phucōne marino, eōq;
 capitur. Fallitur quoque à piscatoribus per forminas, quas amore nimio
 prosequitur. Marum scari ingens Ouidius prodidit in eo uolumine, quod
 Halionte suū inscribitur: scarum inclusum nassu, non fronte erumpere, nec
 infestis uimibus caput inferere: sed auersum caudæ scibus crebris laxato
 foras, atque retrofūm ita erumpere, quem loctum eius, si forte alius scar-
 us extrinsecus uideret, apprehensa mordicus caudā adinuare rixus erum-
 pentis. Duo esse scarorum genera prodidit Nicander Thucaterenos, alterū
 onian uocari, alterum xolon. Saxatilis est scarus, ut diximus: & caro illi, ut
 Diphilus scribit, tenella, fragilis, suavis, leuis: atque facile & concoquitur
 & in corpus digeritur, modicōque aluum mouet. Non sine præcautione ta-
 men scaro (præsertim recenti) uescendam suadet: piscitur enim nonnun-
 quam marino lepore: quo sit, ut eius interanea cholera excitent. Xeno-
 crates scarum cito in uentre corruptum dixit. Scari piscis marini lectore ad
 parotidas utuntur nonnulli.

Vide ut men-
 daci sint in
 hoc loco ex re-
 platis Angli-
 calia.

Scarum apud
 Plinium uel
 in pennis del-
 ctum feruntur.

Quo modo co-
 piatur leges a-
 pud Oppianū
 lib. 4. de pifc.

desert, alio m.

Ruminatus,
 uisq;

Scarum.

1 Sed scaro, &c. Scarus, inquit Plinius, principalis hodie. Extrat Enniquerus apud
 Apulium apologia prima, de scari perstantia: Scarum peritich, cerebelli leuis pe-
 ne suprema. 2 Dicitur ruminare, &c. Ruminat & piscis, quem ab ea ce ruminatē
 quidam appellant, &c. Theodorus Aristotelis uerba cerulæ mīto uero ita uer-
 tendum uident, Ruminat & piscis (scilicet quidam) & quem ab ea re piqua, id est
 ruminalē appellant, ut incertum addit finem quo animalium genere nomen inde-
 beat, &c. Aristoteles ex Aristotelis auctoritate scribit scarum esse carniozum. 3
 Scarum habetur in codicibus nostris, & hic in cap. 8. lib. 8. & cap. 17. 4 Opratus,
 &c. uide ad ea legendum &c. ad Oppianus uel Octavianus ex Macro bio lib. 3. Sc.

De mullo, coccyge & aliis quibusdam similibus.

Cap. C L X I X.

Attilio
 Typhus,
 Typhus
 Typhus

Post scarum mustelinumque, ex reliqua nobilitate, gratia maxima & co-
 pia nullus. Nomen his fenestella à colore mulloorum calciametorum
 datum putatrigle à Græcis uocatur, ut nonnullis placet, quia ter anno pa-
 riæ solus saxatilis. Rufus piscis est, gemina barba insignis ferresed nullū
 expirantem uericolore quadam & numerosa uarietate spectari, proceres
 gula narrant, rubentium squamarum multiplici mutatione pasciscens,
 utique si uisro spectetur inclusus. Litoralis piscis est, in arenosis fere litori-
 bus uisitans: & inter saxatiles quoque à nonnullis, sicut ab aliis inter pe-
 lagios

Alagios numeratur quandoquidem fecedit nonnūquam & in alium mare.

Plures habet appendices superne circa uentericulum: gregarius est. Ter anno parit, sed autumnō potissimum, oua sua limo committens: unde fit, ut sepro parete uidetur: diuius enim frigus continetur in limo. Mullus postea quam ter pepererit, libenter reddetur, inquit Arsenius: gignuntur etenim illi in utero uermiculi quidam qui semen eius desorant. Mullis magnieu-

4 do modica, binasque libras ponderis raro admodum exasperant: nec in uiuatis piscibus creſcunt, cum sit molliſſimum genus, & ſeruitutis indi- gnatiſſimum. Septentrionalis tantum hos & proxima occidentis parte

7 non gignit oceanus. Vigent mulli potissimum ab autumnō. Eorū genera sunt plurimum & phucus uelcuntur marinis, & ostrea, & limo; & aliorum pu-

B ſcium carne: & barba gemina insigniuntur inferiore labio. Sunt & qui barba carent: uetum lautilſimi barbati, ut Sophron auctor est, *γάρβα*, uocantur. Xenocrates ita diſtinguit, Mullus pelagicus, qui & optimus, perquam eu-

6 biundus est igne uel ſulcore & ueluti mure autēque ſplendet cœus, quo à ſaxatili genere maxime diſſert. barbam quoque gerit. Lutarium ex iſui-

6 liſſimi generis appellat, ut qui cœno & ſordibus uel uiliſſimis paſcitur. nec lioræthibus grana, laudatiſſima ex mari putiſſimo, & qui conchylium ſap-

7 dutam carnem habent mulli, ſed irribilem tamen: quo ſit, ut nihil habeant in ſe aut lenum aut pingue, ſed nec male ſucci quiequam. Difficiliter concoquitur, nec facile corrumpitur: quod ſi probe concoquatur, nutrimenti

C plurimum præbet. Stomacho grata eſt mulli caro, inquit Diphilus) modicęque aſtringens, & aluum ſilit, præſertim aſſenā ſua: grauiſ eſt & coſt-

7 coſta difficilis: ſanguinem autem elicit quous modo parata. Iocunda quidem eſt mulli caro, inquit Galenus, atque hominum nature ſamiliaris: aſſiduo tamen mullorum eſu, oculorum aciem hebetari prodiſt Dioſcorides. Mullos in cibo inuſiles neuiſ inuenio fieri, inquit Plinius. Mulli grandio-

7 res nec adeo ſaui ſunt carne atque minores: nec concocta tam ſacili, ut quæ dura admodum ſit. Et ut in uniuerſum dicam, mullus neque tamant habere ſauitatem, neque corpori ſalubris adeo uidetur, ut tantopere expe-

Non in quibusdam expleantur.

Tarente.

Mullus iſurius.

Mullus.

Quædam leuæ.

Lutari.

DE DIFFERENTIIS

fodientes eo (fodere enim potest) huc descendit & pascitur: imbecilliorisque E
ne eodē adnascuntur arcei piscis alioqui facit ille inter herboſa ſana uſitans.

*Sargus ex ma
lenius, mō
regius et n. aj
uſitanti regius
per dicitur a
per athenis.*

Inſignis ſargusque notis, inſignis & alis:
Ex ſpumis ueluti palis horrentia terga
Occulit, ut totus ualido mucrone tegatur.
Nec dextram iniucies, riſcant quod tergora demis
Sensibus.

Sargus his patit, aere ſcilicet & autumnio paulo ante æquinoctiū. Fert uie-
rum dies triginta, coit menſe Decembri. Sargus cum hamo tenetur, ad ſco-
pulos lineam terit, abſcissim certe piſcem eſſe ſargū tradit Numerius. Ma-
res pro ſceminis concendū quo in certamine qui uictor eualeſcit, ſolus ſcemi-
nus potitur omnibus. Captarum miro amore tenetur ſargi: ut ſepulſime ꝑ
ementita earum ſpecie decepi capiantur. In cibo laudatur ſargus eſt enim &
ſtomacho gratus, probū generat ſuccum, ſacileq; in corpus dgeritur, abū-
de nutrit, & alium mouet. Gregalis piſcis ſarginus eſt: ſed ſarginum alium
eſſe à ſargo, Epicharmus author eſt. Vt circa nullum lutarium ſargus, ita
in mari quod à Cyrena in Aegyptum panditur, piſcis pediculus nomine,
circa delphum eſt: qui omnium pinguiſſimus efficitur paſculi copia, que
delphum opera ſuppeditant. Ruſus eſt & coccyx, id eſt cuculus, ut author
eſt Numerius: & nullo ſimilis, ut Pſeuſippus. Quo fit ut nonnulli trigolam
ab ſimilitudine coccyga appellent: ſed partes poſteriores ſqualidiores ha-
bet trigola. Coccyx ambigit: hoc eſt partim pelagijs eſt, partim apud liſceas
degit arenoſa. Coccyx piſcis perinde ut cuculus aus obſtrepat, unde nomē
accepit: at ille dura eſt. Hirūdinem quoq; piſcem (nam eſt & hīdo po-
lyo ſimilis) Pſeuſippus nullo ſimilem eſſe tradit: chelidona Græci uocant.
Chelidon ſcilicet habet ſcarſum à uetore iſteſtinais cōmiſſum. Volat harūdo ſa-
ne perquam ſimilis uolucris hirūdinis: ſublimisq; adeo uolitant hirūdi-
nes, ut mare ne attingant quidem: altiſque in uolatu ſeſe atollunt quā-
milans, non tam alte tamen quā lolligo: & pinnis ſtridere ſentiunt: ſunt
enim his pinnæ latæ & longæ. Item pelago gaudens, & nigro tergoſe mal-
uus ſubit in ſomana maria. Piſcis ex argumento appellatus lucerna, lingua-
que ignea per oſa exerta tranquillis noctibus relucet. uolitat autem miluus
(Reges uocant) cum ſibi à maiore piſce intulit, ſed ſumma tūcū maria ar-
tingens: neque enim tam alte ſe efferit quā aut harūdo aut lolligo, ut ne-
ſcias uolūt ne an ſuper aquā natet. Quoties uero cernatur miluago extra
aquam uolans, rempellaſes mutari Trebius Niger author eſt. Carnem ha-
bet miluus coccygi cuculōne alioqui ſimilem, ſed duriorem. Rubellio quē
erythrinum & erythrinum uocant, litoralis piſcis eſt, & arenoſa loca inco-
lens: uel, ut Ariſtotele placet, pelagijs magis. In hoc genere non reperitur
mas: omnes enim ouis grandē capiuntur: neque mas ullus adhuc uſus eſt:
quā obrem de his nōdum competum habemus quod fidem faciat ſaris.
Erythrinus ſapore uacundo eſt, & alimentum præbet copioſum, in cibo ſi-
ſtat aluum: ſi in uino ſuffocatus moriatur, ænerem ciere dicitur uinum il-
lud epotum, ut ait Xenocrates: uel ut reſert Plinius, rubellio in uino putre-
ſcit,

Sarginus.

*Pediculus po-
ſci.
Coccyx.
Cuculus.
Trigola.*

*Hirundo.
Chelidon.*

*Milvus.
Miluago.
Reges.
Lucerna.*

*Erythrinus.
Erythrinus.
Rubellio.*

A factus, ut qui inde bibere tantum uini affert. Venerem concitit erythrinū
 12 in cibo sumpti. Et rutilus pagrus (pagrus etiam & phagnus dicitur) similis
 erythrino est: & modo pelagius modo litoralis, in faxorū cavernis degens.
 Lappellum in capite continet, quod hinc pectus maxime infestatur:
 sicut enim lapidis rigor, ut per algos gelet. Cor ali iniquum est: solitarius
 est & carniuorus. Vere pagrum uigere sentit Aristoteles at canicula: exor-
 tus colendum suadet Archestratus. & caput in eo præcipuum: duram habet
 13 carnem, & quæ nec corrumpitur facile, nec alium ciet. Est & stomatilis pha-
 gnus sed marinus præstat. Noleus est piscis, qui (ut refert Alianus) adue-
 nientem Nilum præsentens præcurrit, futuramque aquam Aegyptus præ-
 nūtiat. Pagro similis atque erythrino hepatus est: qui & lebias à nonnullis
 14 appellatur, colore nigricante. estque piscis solitarius, carniuorus, dentes ha-
 bet pectinatis coarctos: oculos, quàm pro corporis ratione maiores, cor-
 triquetrum & candidum lappulos gerit in capite duos, ut Hegesander au-
 15 thor est, colore splendorque ostreis similes, rhombi figura scilicet caret. Ap-
 pendices habet quasdam paucas superne circa uentriculum. Saxatilis est,
 ut Diocles prodidit: & in cavernis latitas in alto mari. Hepati caro, ut Gale-
 nus docuit, duræ mollinæque mediocris est: autumnio uilescit, author
 Xenocrates.

Pagrus.
 Pagrus.
 Phagnus.
 Phagnus.
 Phagnus.
 Phagnus.

Hepatus.
 Hepatus.
 Hepatus.
 Hepatus.

1 De mollis calcemenna, uide Hermolaum in annotationibus in Plinium.

2 Ovidius in Hallesio.

-Tenui suffusus sanguine nullas. Addit Mallerius, Si citius desiqua merui, sis

C guineum colorem habet. Epicharmus τῆς γαῖας uocat, id est ἡ ἀποχρῶν, id est
 gibbas, ab eo quod caput scorum conigit. 3 Sero parere. ὅτι ἡ γαῖα, ut sero pariat
 in Theodoris ad Grecum lectorem. Et ueritas interpreti alieni sed manca est. 4
 Binisque libris. Multi scribunt memini Horatius lib. 2. Sermon. & quadribus Sene-
 ca epist. 96: sed rari huc. Multum etiam 1. x. x. librarum in mari rubro caprum Lici-
 nius Mutianus prodidit, inquit Plinius. 5 Eorum genera plura Mullorum genera
 forsitan pabulo maxime diversa intelligemus: cum & de purpura dixit Plinius. Algæ
 sūt, murex, alga, ostrophagum, conchis, carniuorum, carniuorum, iuro limbus. 6
 Lutanum. An hoc formale melle de Oppiano, qui in conchis leonibus uisitat. 7
 Ictur possimum. Mullus, qui quo pacto apparenti coadiutorque, docet Galenus lib.
 4. de aliment. 8 Decepti capiuntur. Quo pacto fallantur spargi piscatoribus sub
 caprum specie, legitur apud Oppianum. 9 Sarginas. Theodoris sarginas uoca-
 uit, nisi mendosus sit codex. 10 Volat hirsuta. Quod de hirsute scribitur, hirsute
 scilicet uolare, &c. an de altera hirsute potius dicatur, quæ polygo similis est: cum
 dicit Plinius, eam ut pisci, sed uoluci hirsute similem esse. Massarius aliter sentit
 equid adhuc nihil affirmo. Non me late, hunc ferre uerba apud Plinium aliter
 à nonnullis distingui: enim qui bene Pliny locum hoc modo legit. Volat hirsu-
 do sine perquam similia uoluci hirsute, nem milui: ut scilicet hoc sine hirsute ex
 pite: deinde aliter principit. Subis summa maria piscos ex argumento appellat
 lucerna, &c. ut scilicet dicitur hirsute piscos milui & lucerna. Non à sensu exemplari-
 bus non recedimus. Ecce Plinius ipse lib. 2. cum lucernam inter machina numerat,
 milui non numerat. ut Rubellio, à colore rufo, in fallor quancum Oppianus
 lib. 1. ἡ γαῖα ἡ γαῖα, id est sanguis, erythrinus dicit. Rubellus enim uocat hunc Theo-
 doris ex Plinio, & rubrum: sed cum dicitur Cyrenia, hircum. Erythrinus figurat
 11 etiam forsasse uidebitur legenti primum caput lib. 3. de generatione animalium
 nisi mendosus sit codex, quod certe suspicor. Nā quod statim in eo loco sequitur, (Er-
 enim nonnulli sunt in habere oua uidentur, ut de his in historicis scripsimus) de phoxi-

Erythrinus.
 Erythrinus.

Volat.

Sarginas.

Rubellus.

Rubellus.

Erythrinus.

Erythrinus.

DE DIFFERENTIIS

nis potius uerum est: sexto enim libro huius amantissimum, probat Aristoteles eam eijam. E
sine eorum consilio: quod argumento consilii nonnullorum summatim: nam pho-
nim situm, prope dixerim: eum non fuit, & admodum parui adhuc, eam habent. De
rubellione huc erythrino tantum hoc habetur, quod o mnes, grandi capiantur. 11
Pagur, inter eos pisces qui in saxosis cauernis latitant, numerantur ab Oppiano &
agrophagi. Pagros numerant Atheniensium in maiore piscium genere, & eorum qui
tristri uocantur, id est: ut equidem abhorreo: qui in paruis dissili in paruis in multitudine
uel ut in siluestra conduntur. Affertur, inquit Orbelius, pagrus ex Indico mari
sile conditi, duri & extracti. 12 Pagrus dissiliit dentes longissimi memini: cum
Plinius lib. 12, ut uideri possit emoluitur, id est habere dentes excisos, uel quid habere
caninos dentes longiores. 13 *agrophagi*, unde an legendum sit apud Atheniensem
amantissimum. 14 A concharum similitudine gemma ostracis dicitur, ut inquit Plinius,
odrea. nomen & similitudinem dedere.

De synodontis, synagri, charace, chromi & cantharo. Cap. CLXX. ^F

Pagrus similes sunt, ut Icelius tradidit: (quod scilicet ad alibi facultes ac-
riner) synodon, synagrus, charax, chromis, orphus, acarnan & anethias:
in cibo enim suaves sunt, modice astringunt, ac proinde difficiliter excer-
nuntur. copiosum dant alimentum: magis uero alunt, qui ex his carnosi sunt
minisque pingues. Synodonta uocant piscem, & cuius cerebro est synodô-
ntos gemma. Synodonta: *synodonta*, ad est inaequaliter & cum uarietate
quadam rufos dicit: Epocharmas. gregalis & lioralis piscis est, partim in ter-
ra, partim in arenosis uiscitans. Quaternas habet utrinque branchias, cili-
que simplices: sel uero à iecore semorum, & intestinis commissum. Carne
uiscitur synodon: & mollia (que *synodonta* dicuntur) apperit. Euenit illa ple-
runque, ut dum minores pisces insequitur, uenter in os procidat ob uoraci-
tatem. Synodontas daram habere carnem tradit Xenocrates: sed suocam
creare probum, medio crumque, nutrire faciliq; & in corpus digeri, & alia
mouere. Synagrus alius piscis est: uerum genere nequaquam dissimili. Est
& charax eisdem generis cum synodontis: cui & uiscus similis esse solet,
partim scilicet in ter-
ra, partim uero locis arenosis: sed charax synodontis
melior est. In mari rubro nascitur charax. pinas habet & utrinque, & à ter-
go, auri similitudinem speciemque gerit. Inferiores partes purpureis cin-
gulis illustrantur: similiter & cauda aureum colorem gerit. Purpureus co-
lor oculos pulchre adumbrat. Atque immunda chromis huius quoque ge-
neris est: qui (ut Plinius ex Ouidio refert) in aquis nidificat. Lapidem in ca-
piti habet, ac proinde algore maxime infestatur. Vocalis est, & quasi grun-
nitum emittit: liquidiusque audire creditur. Fusaneus piscis est: fusimq;
capuntur chromes. In uere omnia piscium optimus habetur, ut auctor est
Anaxius. Orphum ex hoc genere, rubentem Plinius ex Ouidio refert. Can-
tharus hic est, & dentes habet ferratos: solitariusque capitur. lioralis est
magis quam pelagus: uniusque plurimum in fixorum cauis. Orpho hoc
proprium est, quod in eo meatus, qui seminales dicuntur, nulli inueniuntur:
& hoc quoque, quod uel dissolutus diutius adhuc uiuat. Dum paruus est, or-
phacine à nonnullis uocatur. Breui ex paruo insignem accipit magnitudi-
nem: ut uir fert duobus, uo amplius, annis. caro illi dura est.

Agrophagi.

*Synodon,
synodonta.*

*Synagrus.
Charax.*

Chromis.

*Orphus,
cantharus,
cantharus,
cantharus.*

Orphacine.

A hac piscis, nec facile concoquitur, alimentum præbet copiosum, nec improbum, sed tamen quod lentius est: non facile corrumpitur, & urinam cret. Partes quæ ad caput sunt, facilius concoquantur: carnosiores vero graues sunt, & concoctionem non tam facile recipiunt: teniores sunt quæ circa caudam. -Concolor illi Cantharus ingratus saccus, inquit Ouidius, parum litorealis, parum pelagijs est. Cantharus nassa capitur, eisa carabo aut polyposides utrouis alio, Cantharum Xenocrates author est, & grati saporis esse piscem, & probè creare succum: qui & abunde nutrit, facillèque in corpus digeratur, & aluum modè creat.

Cantharus, vel carabo.

1 Exsulis synodontes, dixit Ouidius in Halieutic, eo forsitan modo, quo Oppianus *ἐκ τῆς ὁδοῦ* ait. 2 Dentex Columella pelagijs est piscis, qui & arenato gurgit optime pascitur. 3 Nidificat. Arqui Ouidius in Halieutic,

Dentex.

B Acque salum dulces nidos mactata sub undis potius de silpa dixisse uidentur. Ceryx uel cheeryx apud Athenarum lapillum in capite gerit. Ex *πλάτ* apud Aristotelen inter eos pisci numeratur, qui acutissime uidentur. An uel *cermyx* uel *cheeryx* idem sit qui *chromis* cum Theodorus hunc omiserit: & quid *chromis* additus sit ab explanatore aliquo, tanquam magis notus quam *cheeryx*: alioqui locus ille Aristoteli suspectus est. Chremes uem apud Oppianum piscis est, qui in palatibus uoluit, & flumorum effugit idem sit cum *chrome*, an *diacrus*: locotio, ut uidetur, similis est *cheeryx*, ex Eliana. 4 Ouidius in Halieutic, non orphanum sed orphanum uocat, modò ablit menda, & inter pelagijs pisci recenset. An sit idem cum *orphio*, consideranda epichema habet *ὄρφιος*. 5 Meatus, *ἡσυχία* uero, ita legendum arbitror, non *ἡσυχία*. 6 Cantharus, &c. Theodorus *καράβιον* hunc uocat.

Ceryx, Xylia, Chromis, Xylia.

Orphan.

Carabion.

De anthiarum generibus.

Cap.

CLXXI.

C His natura non dissimili anthian esse docuit Icelius. Porro anthian nonnulla sacrum piscem uocauere: quòdquidem quo in loco anthias sit, nullam ibi beluam esse confessum est, quo iam indico secure spongiatores urinantur. Sed id casu sic euenire dixerim: quo modo & ubi sit limax, nequeus est neque perdidit omnes enim limaces ab his eduntur. Frequens hac piscis apud Chelidoniaz Afir insulas, & circa Sarpedonem promontorium, Anthicon petris sunt pascua grata profundis. Non illis semper gaudent, uulgòque trahuntur Quò gula, quò uentris iubet inflamata libido. Ante alios, istos compellunt cæstra palati.

Anthian.

D Anthias æstate parit, hyeme in cibo optimus est. strepina gaudent, eòq; allecti nonnunquam capiuntur. Anthiaz cum unum hamo teneti uiderint, spinas quas in dorso serratos habent, lineam secare traduntur, eo qui tenetur extendente, ut præcidi possit. Hæc Plinius: at uero Ouidius, Anthias (inquit) is ergo quæ non uidet, uincit arma. Vim spinæ nouique suæ, uersòque superius Corpore, linea secat, fixumque intercipit hamum. Nam, ut Oppianus scribit, dentibus aut nullis atmat, aut certe obfucis obfusis: sed si hamo denectur, plurimum renititur, magnasque ostendit in renitendo uires. Anthiam stomacho minime gratam esse, sed probum tamen generare succum Icelius author est, facillèque excernitur. Anthiarum

Quibus modo capiuntur anthia, ostendit Plinius ex Oppiano. Plinius, si Anthiaz, si spinæ, si hamus, si uires, si succus, si excreta.

DE DIFFERENTIIS

Species quatuor: alie namque fulue, alie candidiores, nigricant alie. Sunt E
 & quos *clarii*; & *melanotus* vocant, quasi magnos aut canos habentes oculos a
 dixeris quādo qui de m supercilium in eis ueluti in orbem ducitur. Anchiam
 quoque alij callichthm uocant, alij callionymon: nonnulli elopa: & alij hy-
 con. Quos tamen diuersos esse pisces Doctores affirmat: est enim callichthm
 (qui & callionymos à quibdam uocatur) ferratis dētibus, & carniuorus,
 & gregalis atque, ut sentit Oppianus, pelagus, & qui non admodum lito-
 re gaudeat. Hunc sacrum piscem cognomine uocant: nam ubi callichthm
 est, noxia magnarum non cetera monstra ferarum apparēt: & si hamo de-
 tinetur, argentei ui reuertitur. Callionymus Aristoteli litoralis piscis est, idē
 qui & uranoscopus uocatur ab oculis, quos in capite ita finos habet, ut etiā
 si nocturne, non potest non suspicite celum nonnulla agnum uocant. Fel cal-
 lionymo in iecore inest proportione corporis maxime omnium pisciū co-
 piosum. Uranoscopus malam procreat succum, & sapore habet uitosum,
 ut Xenocrates auctor est: & cibus grauis, ut Diphilus proclit. Et sunt qui
 callionymum dicant esse uentrem esse pleneque negant. Fel callionymi ocu-
 lorum suffusio, albugini, & hebetudini oblectanturque modetur. cicatrices
 sanat, & carnes oculorum superuacuas consumat: auribus utilissimū, cum
 rosaceo infusum. Ignarus piscis est hemerocres: oculos hic habet in sum-
 mo uertice, os inter oculos medium. Interdiu semper dormit, noctu uigi-
 lat oberrans: indeque à nonnullis nycterus uocatur. Piscis not acissimus, & e-
 nunquam edendo satius. nec cessabit unquam,

Donec cum rapido disrumpat uiscera uentre:
 Et nimio passu uita spoliatur onustus.
 Est tantæ legumum crapulæ uentrisque rapacis:
 Appendat si quis piscem, deum porrigat escas,
 Dum cibus ore uenus, passu & summa ora replentur,
 Antipiet.

G

Ellops quoque nonnulli anchiam uocant: eandēque esse quē callichthm
 & callionymum arbitrantur. Doctores distinguit, uti modo diximus.

Est præterea helops nostris incognitus undis, ut scripsit Ouidius.
 Pamphilus namque mari profundo nec alto pascitur: quanquam Arche-
 stratus elloper ex Syraculis præcipue laudare uidetur. Branchias quatuor
 habet utrinque simplices. Fel à iecore semotū est, & marissimus comassum. H
 Helopi palma in saporis inter pisces multi dedit exlique stomacho gratus,
 abinde nutrit, & alium facile mouet, ut Xenocrates docuit. Appion gram-
 maticus eundem esse ellops & accipenserem tradidit. Sed falsum, ait Phi-
 ridius, qui eundem accipenserem et alium erant: quanquam & peregrinus,
 & apud antiquos piscium nobilissimus habetur accipenser est: tanta nan-
 que erat apud Romanos ueteres accipensetis gratia, ut à coronatis ministris
 cum tibicine & caneu in conuiuium introduceretur. Vnos omnium ac-
 cipenset squamis ad os uentis contra aquam nando meat. Nullo nunc in ho-
 note est: quod quidem maior, inquit Plinius, cum sit catus inuentu. Piscis
 est non equidem magnus, figura ad triquetrum accedēs, costis porrectio-
 re. Hu-

clarii
melanotus

callichthm
callionymos
uranoscopus

calionymus
palcher
uranoscopus
ignarus
nycterus

nycterus

nycterus
notus

ellops
ellops
ellops
ellops

accipenser

DE DIFFERENTIIS

teri circumdatum arenas arare cauda, atque ita conditum transire rete, pro-
didit Onchius. Quapropter solent in tuendo sese lupam alis prestare pi-
seibus nonnulli prodidere: necum, ut Plinio placet, minus in prouidendo lu-
pus sole nux habet: sed magnam robur in pernituendo: nam ut huerit ha-
mo, tumultuoso discursu laxat uulnera, donec excidant insidit. Lupus &
maigilis quamquam inimici sint capitales, tamen flato tempore congregan-
tur. Cum fert utero lupus deterior est. Luporum laudatissimi, qui appellan-
tur lanati à candore mollitque carnis. optimo sapore iudicantur in Tybe-
ri amne inter duos pontes. Hæc Plinius. Lupus marinus, inquit Xenocra-
tes, quo maior est, eo durior euadit. Optimus autem est qui magnitudine
mediocri est: tenellus enim & stomacho gratus, bonique succi est: suavis
quoque & copiosum præbens alimentum: facilisque & per corpus digeri-
tur, & per aluum. desertur: contra qui in piscina seruantur inclusi, sapore
sunt minus grato. Cum in utroque humore uisitetur lupus piscis, marino
scilicet & dulci, qui in puro mari degit, inquit Galenus, longe præstantior
est eo, qui in mixtis uisusque aquis uiuit: atque quod ad succi probitatem
attinet, ne aubus quidem montanus ualeat cedit. Optimis quoque ma-
rinis piscibus æquari tradit Xenocrates fluuianles lupos, maculosis uar-
nolus, (ita uoco *αἰσχροῦς*) ex Tiburtino Aniene. Lupi appellant Foron-
henses piscem ex quo garum faciunt. In mari rubro piscis nascitur quem
perseum Arabes simul & Greci nominant, aspectu lupo similis, parti ma-
gnitudine cum anchia maximo. nasa est leuiter adico, cingulis aureis dis-
tinguitur, que à capite exorientia oblique seruntur, & ad uentrem usque
pertinent. frequentibus & prægrandibus dentibus munitus est. Ex omni-
bus piscibus qui in eo mari uersantur, robore & audacia maxime excellere
dicitur. Asellorum, inquit Plinius, duo genera: collyri minores, & bocchi,
qui non nisi in alto capuntur: idemque prælati prioribus. Et callaris asel-
lori generis, ni minor esset. Quos Plinius asellos, Greci *ἰσέες* uocant, & i-
sionis, id est alinos & asellos: quos Phylotimus *ἰσέες*, alij *ἰσέες* duxere, inquit
Galenus. Est uero *ἰσέες* & *ἰσέες*, ut Aristoteles prodidit, (inquit Athenæus)
piscis minime gregatilis, cuius os magno hiatu reuissum est, non aliter at-
que galei: & qui solus inter pisces cor in media aluo gerit: & in cerebro la-
pillos habet molari forma. *ἰσέες*, inquit Aristoteles, cuticula temporibus ca-
lidissimis latet: indicio autem esse uidetur, quod longo interposito tempo-
re capitur. Cum pisces uenarum *ἰσέες*, obruit arena sese: cumque nullam sui
corporis partem intactam reliquerit, uerberat radiolis, quos in ore gestat,
quos piscatores uirgulas uocant, quas pisciculi cum aspererint, adna-
tant, quasi ad algas quibus uesci soliti sunt. Differunt autem (ut Dorio tra-
dit) *ἰσέες* & *ἰσέες* *ἰσέες* quidam *ἰσέες*, appellantur: *ἰσέες* autem *ἰσέες* & *ἰσέες*
ἰσέες: nonnulli uero *ἰσέες* alij *ἰσέες*, ut refert Euthydemus. Archestratus
ἰσέες à quibusdam *ἰσέες* uocari dicit. Oniscus, ut Oppianus scribit, in locis
pascitur cœnolis & herbædis: onos non nisi in alto mari minoribus pisci-
bus insidians: quos & canicula temporibus latet. Cuius hamo tenetur, non
facile sequitur trahentem: sed plurimum reluctando, piscatori non paruum

Lupus lanatus

Lupus marinus
maculosis
αἰσχροῦς
Foronhenses
perseum

Asellus
bocchi
callaris
ἰσέες

Asellus
ἰσέες
ἰσέες

ἰσέες
ἰσέες
ἰσέες
ἰσέες
ἰσέες
ἰσέες
ἰσέες

A facit negotium. Afellorum caro, inquit Galenus, mollis quidem est, sed non itaque ac farinillum friabilis. Xenocrates medium habere substantiam manu etiam inter molle & durum, & succum probum eundemque copiosum gignere. Afelli ipsi non parum inter se discrepant: nam qui in Lyncesto mari uisuntur, proboque utantur alimento, carnis bonitate cum facilibus contendunt qui uero presso aluntur nutrimento, aut in aquis quoquo modo missi degunt, (praefectum uero si uinose fuerint aquae) molle quidem habent carnem: uerum ob pinguedinem lentiorisque, neque suaves adeo iam sunt, & alimentum gignunt excrementosum. Ex afello pisce lappili, qui plena luna inueniuntur in capite, adalligantur linteolo contra febrem circumsus. Bacchus, ut Xenocrates tradit, mediocri est substantia: ut uero Diphulo placet, bonum procreat succum: sed qui non facile cooquatur, & uinosum quid in se habeat. Afelli nomen à colore deductum est, ut Varroni placet, sicui & umbrae turdicae.

Abstract

Filed as for A-
thous: sym-
placenta lo-
to resolution.
...
...

1 Quia sine macula lupo vocat Columella, idem fortasse sunt quos Pharus [a] Lupo lupo
natus dicitur quos vero Columella uarios, eos Oribasius *ἰσχυρομένους*, ad est maculatos, Lupo uarios.
2 Et pisce mormyris (mormyros uocant alij) eodem modo reus declinant, in gre- *ἰσχυρομένης*,
na sese condentes, in arenosis locis habere uidentur. Mormyros (Theodoro mormur di- *Μορμύρος*,
cur) affine paru. Copiose autem mormyris, inquit Iesias, (Epicharmus mormum *Μορμύρον*,
uocant) Archestratus pisce uarietatem, neque tempore ulla bonum esse dicit. Confi- *Μορμύρος*,
dera lector, an uissem an diuersi piscum sint hoc nomen omnia. 3 Ex Sirabo *Μορμύρος*,
ac. Est Amo fluuius in Tiburtino agro, qui in Tyberim infusus terribi abest miliano. Mormus,
ut refert Blondus in Umbria. In hoc fluuii nadu longa magnam esse oronem piscum *Αίγρεα*,
copul, quos proles uocamus. Hermolaus hoc in loco apud Plinij pro cultus callaris Troia,
lege, ex Athenaeo, ut scribiturum Plinij ipse lib. 32. Separat callariam ab αἰσθησὶ *Καλλία*,
genere quandoquidem αἰσθησὶ minor est callaris. Apud Athenaeum Dorio refert quod-
dam *καλλία* (quo uocare infuso Euthydemus *καλλία*, Archestratus *καλλία*). 4 *Καλλία*,
Anastoteles (quod meminit) infuso ut nominat quoddam *καλλία* her. 5 Verbera. V. *καλλία*,
tus interpret. Habet in sensibus quoddam partem sicut uisus, &c. Vide supra in squa
na, & uermis combo. 6 Vnde idem piscus bacchos uocatur, confusus & schella-
na, unius loco ex Dotione refert Athenaeus. 7 her *καλλία* est signū signū omne
uocat Cerasus & mormyris infusum uocatur Plinij lib. 32. de re.

De umbral & glauco.

Cop. CLXXIII.

DUmbra, quam *umbrae* vocant & *umbrae*, lapillos etiam in capite habet: Vndeque algore infestata. Sciæna cum meruit, caput oculosque abscondit, aut in caverna quapiam, aut herbis marinis, reliquo corpore neglecto, ita se totam abscondi putans. Sciæne caro minime quidem dura est, sed mediocritas: quæ tamen siccitatibus duriuscula fit. Sciadæus, inquit Xenocrates, bonum gignit succum: facile in corpus digeritur: saporis est iucundi: nutrimentum præbet non admodum copiosum. Sciæna interitanea, & squamæ combustæ, paucos discunt. Siæna alia esse videtur à sciæna: nam siæna, uti Oppianus scribit, in saxis herbosis degit: siæna vero in saxis nudis. Ventræ quoque flumiatilem habet Ausonium,

Chen, Y.
Edwards, R.

² latetque restare mediis femoribus dies sexaginta. Appendices habet paucas

² latetque restare mediis femoribus dies sexaginta. Appendices habet paucas

DE DIFFERENTIIS

superne exeuntes circa ventriculum. Fortum, cum metuit, ore recipit, rursum, emittit. Caput in cibo precipua laus vel ut Archestrato uidetur, rostri maxime, *(et rostrum)* uocant, licet in cetero capitis totius. In maiorum piscium numero offendantur, qui à nonnullis *rares* uocantur, id est qui in partes secantur ad patinam. Caro illi dura est. in omnibus lupo inferior est & ut Xenocrates prodidit, non minus à lupo uincitur, quam ipse sparum superat. Verrucas tollit glauci iecur. Glauco est ure sumptuosus (uel uti alius placet, & glaucifens) mulieribus lactis copiam facit. Glaucoas, inquit Diphilus, in cibo similis est cephalo & mugili.

Glaucoas.

Viscera marina.

1. De umbra marina extra Enchy uertus apud Apulicum. - Melasurum Turdum merulinusq; umbelinasq; marinam. 2. Lactis efficit. Ovidius in Halieut. Ac nunquam altius conspectus sydere glauci. 3. Glauco iecur. Hermolaus hoc in loco Pliny glauci uerum legit, non glauci. 4. Glaucoas piscis eadem sit eius glauco, an alius, considera lectos.

De sparato & aurata.

Cap. CLXXIII.

Sparus.
Sparulus.

SPARUS de quo Ouidius in Halieuticis, Et super aurata sparulus ceruice resurgens) Xenocrate, uel modo diximus auctore, lupo & glauco in cibo deterior est. Ictus uero ita prodidit, Sparus, cum aliis plerisque piscibus copiosius alitur, tum uero quam magna melioris succum generat. Diphilus sparum acrem esse praeferat, carne tenera, minime uirosa, stomacho grata, concoctus haud difficilis, & quae urinam citius exstilla tamen difficultus concoquitur. Aurata, quae chrysocephrym Graeci à fulgente splendore uocant, in gustus suauitate prima pars tribuit ictus uerum ut Marcellus cecinit,

Aurata.
Chrysocephrym.

Non omnis laudem pretiumque aurata meretur

Sed cui solus erit concha Lucina cibus.

Litoralibus piscis aurata est, partim saxosis partim arenosis locis degens: pelagus quoque uonunguam appendices habent auratae superne exeuntes circa ventriculum, aliae plures, aliae pauciores. Parit aurata astat. parit uero, ut lupo, in iis maxime locis quae flumina exeunt in mare: quinetiam in maritimis paludibus auratas quoque gigni apertum est. medijs feruoribus laet, ut oncos, plurimum temporis. Hymne aduersa uale tudine laborat. Fusci na septuaginta capitis interdum dormiens, ut lupo: alio qui minime fusci na posse capi existimatur. Auratam Ephesij ioniscum uocant, ut Archestratus auctor est. Aurata carne m habet cadidam, solidam, & quae bonum procreat suum, abundeque nascit, facile digeritur atque excernitur.

Onci.
Plinius.
officiis.

Ioniscum.

Orati.
Chrysa.

1. Aurata. Orata, ut Festus inquit, à colore auri quod mystici orum dicebant. Auri collecta chrysa habet Plinius ex Ouidio qui in Halieuticis inquit. - Et cum chrysocephrys ioniscus decus. Oppianus in Halieutic lib. 1. *ἰονίσκος* ἔστιν ὁ χρυσοκέφαλος, id est ut uerit Lippus, Aurata à splendore nomine dicta.

De turdo, merula & aliis quibusdam saxatilibus. Cap. CLXXV.

INTER saxatiles scarus, ut dictum est, principatum obtinere creditur: secundum uero locum Galenus merula ac turdo tribuit tertium deinde iulidis,

Ad phycida & perca. De scaro factus diximus. Merula, quæ *αἰσχροί* graeco dicitur, inter saxatiles laudata, colore est subobscuro urandante. Merula in 125
est, ut Oppianus traditur, turdus uero *αἰσχροί* uocantur, formica, inter saxatiles
quoque nobilis, inquit Phinias, & *αἰσχροί*, ad est nigris quibusdam macu-
lis indignis. Merula & tardus mutant colorem: nunc enim nigrescunt: post
uer albedinem suā recipiunt & hyeme laeant. Branchias habet turdus utrin-
que quaternas, easque duplices, excepta nouissima. Mollis utriusque caro est,
& quæ probam creaturam: qui tamen per halitum facile digeritur, ne-
que copiose admodum nutrit. Turdam nouissimi *αἰσχροί*, alij *αἰσχροί* uocantur.
2 Turdorum cōplura sunt genera. Iulis (ut Galeno placet) saxatilis piscis est
cuius caro & concoctu facilis, & corpori humano saluberrima est. Et Op-
3 piano quoque iulis piscis saxatilis est in muscolis algosisq; saxis unctis: par-
uus admodum pisciculus aeternum hominibus in mari natantibus & umā-
nibus uenerato morfu infestissimus. Agmine dēso adhærēt ualides immoq;
corporibus natantum, non alijer atque muscæ solent in aquamisso. Os hinc
(inquit Aelianus) secleratissimi uentri refectum est, quæcumque piscem de-
gustarit, inhabilem ad esum, periculosumq; ei qui postea gustauerit efficit.
Hominem quoque non minus morfu persequitur mus, (sæpe à Grecis uoca-
4 tur) piscis alioqui paruus: sed duro tergo & dentibus robustus. Est & *αἰσ-*
qui capricosus dicitur, caro eius uirus olet & dura est, difficiliorq; concoqui-
tur, cuius ori grata est. Phycis, qui & phycus dicitur, saxatilis piscis & tenel-
C lus est: perca similis est spinis nullatis, mutaque colorem: cum enim cete-
4 ris temporibus candida sit, ut mo naria redditur. eadem pisci sola ex ma-
rinis piscibus nidificat ex alga atque in nudo parit. Et cum ceteri pisces, qui
oua pariunt, semel pariant, pusilla phycides bis anno pariūt. Differt in hoc
genere mas à femina, quod mas nigrior & squamis amplioribus est. Phy-
cides, quamquam cetera abstinent carne, tamen squillas sepe numero appe-
tant. Mollem carnem habent phycides, probamque succum gignunt, qui
facile dissilatur: nec multum nutriunt. Facile corrumpantur, inquit Dupli-
lus, minimeq; uirosi sunt. Est & phycen huic similis, pisciculus saxatilis &
tenellus, faciliq; (ut perca) corrumpitur. Phycidi perca similis est, quæ & per-
cus dicitur, piscis & amni & mari cōmunis, ad est marinos & fluuiatilis. Sa-
xatilis est circa muscosa algosq; nichitans, uirgulis lincisq; quibusdam
D uariis. Branchias habet utrinque quaternas, easque duplices nouissima ex-
cepta plures quoque appendices superne circa uentericulum. Parit fluuiati-
lis perca in fluuiorum & lacuum paludibus, ad est quæ prope fluuios aut la-
cus stagnat, (*μακρόδερ* uocant) in apudnatis. In partu continentem emul-
tunt suum fortum, eo quo rariè modo: adeo enim fortis ipse continuo filo
sibi coheret, ut eum piscatores ex arundinibus colligant. De fluuiatili per-
ca hæc cecinit Ausonius,

Nec te delinas mensuram perca silebo,
Amnigenos inter pisces dignande marinis,
Sed us pumiceis facilis contendere nullis.
Nanque & gustus iners, solidæque in corpore partes

Segmentis coeunt, sed dissociantur artibus.

E

Perca alimentum gignit saluberrimum, & quod concoctu facile est: verum, ut inquit Diphulus, æque atque phycis facile corrumpitur. Pro locorum tamen ratione in quibus uiscitant, perca nonnulla uarietas contingit. Quæ in Rheno gignitur perca, marinis piscibus in sacra probitate æqualis est, ut prodidit Xenocrates. Perca salta ē capite cinis, melle addito, uiscendotam pululas discunt. Channe aut chaune, phycidi & perca similis: pelagus piscis, ut Aristoteli placet, & carne sola uiscitur. Circa sacra uiscitur, ut scribit Oppianus, algæ muscōque plena. Colorem habet, uti ex Aristotelis sententia refert Athenæus, nigro rutiloque uarium, aut in nigro rufescentem, & maculis lineisque quibusdam distinctum. Hinc uenter prope os positus est: adeo ut eum minores pisces insequitur, uentriculus illi in os nonnumquam procidat ob uoracitatem. Channe omnes grandæ capiuntur. Et ex se

Conspiciens channe gemino fraudata parente est, inquit Ouidius.

Carnem habet channe mollem quidem & tenellam, sed quàm perca carnē duriorē. Channe igitur siccatum pondere. x. iiii. cum oleo coctio, perunctis pilis nouem mensibus, pilothicum fit palpebrarum.

1. Variante, &c. Metallaque uerentes dixit Ouidius Athenæus uero *alæque* *perca* *ad* *gignit*. 2. Inia, &c. An idem sit piscis Galeno & Oppiano qui *in* *dia* uocatur, ambigui uidetur. 3. Vide an fortasse hoc in loco apud Athenæum legi debeat (ut edidit Hermolæus) *de perca* *ad* *est* *ius* 4. Spinis uallata. *alæque* *perca* *ad* *gignit*.

Ty.

De melanuro, coracino & aliis quibusdam. Cap. CLXXVI.

Melanurus.

Saxatilis piscis est melanurus: & prope litora in locis arenosis algæ par- G
sclitur. Cotacino similis est piscis uariis, notis pluribus nigris insignis, 1
non aliter atque sargus. Percarum ducem Numenius melanurum dixit. Vi-
ribus haud magnis est, sed solers non facile reti aut nassa capitur: nec ad pas-
sionem mari usquillo, sed tempestatibus agitato proficiscitur: capique
tunc temporis apud litora esca ex caseo & pane. In Stabiano Campanæ ad
Herculis petram, inquit Plinius, melanuri in mari panem abiectione rapiunt:
isdemque ad nullum cibum in quo hamus sit, accedunt. Xenocrates me-
lanurum stomacho grauius esse prædicat, probumque gignere succum: &
qui facile digeritur, abundeque nutrit, atque haud difficulter excernitur. H
Iocius melanurum sargo similem esse tradit: uerum succi bonitate atque
suauitate inferiorem: probe tamen nutrit & succum procreare modice as-
tringentem. Melanuro similis est melanderinus: & coracinus melanuro 2
similis est: pelten hunc uocant Nilæ accolæ. Et Alexandrini *mel* *en* *ex* Parme- 3
no autem Rhodius eum plantancon uocem dixit, *alæque* quoque nonnulli
hæcoracinum uocant: alij tamen alium piscem significare æolian contem-
dunt. Est uero coracinus piscis annis & mari communis. colore est nigro-
carne, præsertim in pinnulis. lapidem gerit in capite. Gregalis piscis est: &
parit autumnio inret algas locis densis. Fert iterum longo temporis spatio:
& cum uero fert, optimus est coracinus, perinde ut in æna. Parit etiam non-
nunquam in esse tritici. loca saxosa incolit & herbida, latet hyeme: neque
capi

Melanderinus.

Coracinus.

Euphrosia.

Pecten.

Pecten.

Pecten.

Pecten.

Pecten.

A capri solet nisi certis quibusdam temporibus & eisdem semper. Prodest cor-
 racino ferre, præter cæteros pisces annus squalens, quia teporem potius
 affert. Cum alij pisces magna celeritate adolescant, hoc coracino præcipue
 accedit inter minores. carnem habet duram, & ad salutarem idoneam, uti
 infra docebimus. Coracinus marinus parum corpori præbet alimentum, id q̃
 bonum medioenter, ut Iocius prodidit. Sed coracinus in Ægypto princi-
 patum obtinet, & præcipue qui in Nilo nascitur: idèque Nalo peculiarem
 esse piscem uoluerit nonnulli. hunc Xenocrates, uel nobilibus marinis pi-
 scibus æquari tradit. Dorion coracinum à nonnullis saperdes appellat, o-
 primūque in palude Mæotide gigni prodidit. Porro saperdes, ut Aristote-
 les author est, inter fluuiatiles lacustrèque pisces, cum utrum gerit, com-
 mendatur. Xenocrates *αἰγίστι* scribit piscē esse prædare carnis, qui & in ma-
 iorem auctus magnitudinē durior euadit, sapore uirido, difficulter in cor-
 pus digeritur. Est & *αἰγίστι* apud Athenæum, carne quàm sit haerax duriore.
 Coracinarum carnes aduersus scorpiones ualent impostæ, fel eorum us-
 sam excitat. Coracinum fluuiatilem sale maceratum *αἰγίστι* appellant Ale-
 xandri: hoc inter salsumenta facile consoquuntur digeriturque, abunde
 nutrit, mutaturque mali est succi. Coracini salsumenta panos discutunt
 & carbunculos.

1 Theodorus oculatam uocat: utrum Plinius utrinque enumerat piscem eodem
 prope uersū, tanquam uarios, lib. 32. cap. 7. Oculati Cellus inter medice maxime pi-
 sces diuinitus numerat. Melanurum Athenæus *ἰππὸν ὀφθαλμὸν* uel *ἰππὸν ὀφθαλμὸν* uel
καταὐτοῦ ὀφθαλμοῦ dicit. 2 *αἰγίστι*, quæ Nomenclus *αἰγίστι* uocat, an idem sit, uide apud
 Athenæum. 3 Coracinus, *αἰγίστι* dicitur, quod assidue oculos moueat, inquit
 Athenæus: *αἰγίστι* uocat scribit Mañan, à *λατὶ* figura Theodorus quon-
 doque *αἰγίστι* uocat, nonnunquam graculum uocat. Porro graculo similem draconem
 manu omnia Plinius, uel *αἰγίστι* uocat, uel *αἰγίστι* uocat, uel *αἰγίστι* uocat, uel *αἰγίστι* uocat.
 Et nigro cui nomina dicitur colore. Coracinus. Athenæus quoque ex A-
 ristophane *αἰγίστι* uocat, uel *αἰγίστι* uocat. Epicharmus *αἰγίστι* uocat, uel *αἰγίστι* uocat.

De exocoeto & cordulo.

Cap. CLXXVII.

Mistrar Arcadia seu exocoetum, appellatum ab eo, quod in fircum
 somni causæ erat. Circa Clitorem uocalis hic traditur & sine bran-
 chinem aliquibus adonis dicitur. Piscis est colore sublimi subfuscus:
 D cui à branchiis utrinque ad caudam usque protenditur linea siue uirgula
 candida. Est autem figura minime lata, sed terete, magnitudine paruis mu-
 gilibus, qui apud litora inueniuntur æquali hoc est longitudine octo digi-
 torum aut semipedali. Et, ut paucis rem absoluam, pisciculus qui tragus uo-
 catur, similis est exocoeto, præterquam quod tragus infra gulam nigrū
 quoddam genit, quod tragi, id est harci barbam uocat. Est autem exocoetus
 piscis fixatilis, ut qui petrosus locus uisitat. Hæc mari tranquillo unā cum
 maris effluxu egressus dormis in sicco inter lapillos ad solem euerfusi qui
 ubi satis quiescit, se se denno aequi uersus renouat, donec ab undis manibus
 recipiatur. Obseruat quoque tunc temporis anes marinas, quæ in hunc pa-
 sciuntur, sæpe namque illum aggrediuntur. Has cum uiderit, quantum po-

Tragus.
Squalus,
ἀγρόδον.

Cordulus,
ἀλφιδιον.
αυφιδιον.

Teragus.

καρπίς.

tali, fugit quocumque modo saliendo reptandoque, donec in aquam pectat. E-
pact. Tragus uero cui similem diximus exocutum, infraque gulam ruga
quoddam habere quod tragi, id est hirsutia uocatur, pisciculus squalidus
est, minimūque aut succi continens aut pinguedinis: mactat apud lito-
ra herbosa. Excunt in terram & alia aquantia, ut qui marini mures uocan-
tur, & polypi, & murenzifed inter ea que brachias habent, qui terram pe-
tit, ut inde cibum accipiat, unum adhuc tantummodo nouimus, inquit A-
ristoteles) cordulum nomine. Pinnis hic caret, sed brachias habet & pedes,
& caudam præterea latam & laeam. Naratque pedibus & cauda, quam li-
mulem sibi habet, quod paruum magno licet conferre. quadrupes idem
est, ut ad ambulandum idoneus: egressūque cibum pect in terra.

1 Subfusio. Oppianus, *fas. 36. i. dir.* Acheatus, *κόσινος*, id est subfusio. 2 Tragus, *Β*
acc. Teragus parvus piscis est ex Ouidio, an id an alius à trago, nondum constat. 3
Inter pisces non inter quadrupedes cordulum nomenclaturum Aristotelem secuti au-
thores, cum quia brachias habet, quod piscium proprium est, uel quia cui uo-
cat eum Nomenia. 4 Latam, *αυφιδιον*: utriusque interpreti, non ipsam.

De marino dracone & scorpione.

Cap. GLXXVIII.

Draconema-
rinus.
αγρόδον,
Draco.
αγρόδον α-
γρόδον, *Μα-
αλιν*, inquit
Oppianus.

Draconculus.
Graculus.
Hæc sicut de
serpente mari-
ni de Aristote-
le narratur.

Scorpio.
Scorpius.
Scorpio mari-
nus.

Litoraliscus piscis est draco marinus, partim in arena, partim inter saxa de-
gens: cætero quidē corpore (ut *Aliaus* prodidit) aliis piscibus similis
capit uero atque oculorum magnitudine terreni draconis speciem similitu-
dinemque gerunt: magni enim sunt & uenusti: maxillæ eius similitudinem
quandam habent cum terrestribus. Et pelvis quoque non procul abesse à ter-
rena draconis pelle palpati uidebitur. Simul & insectis & ueneratis arma-
tus est: aculeus habet namque in brachijs aculeos spinasue uenenatas ad cau-
dam spectantes. Quidam aliud uolunt esse draconculum: est autem, ut *Pli*
na tradit, graculo similis. Draco marinus captus atque immensus in are-
nam, cauernam sibi rostro mira celeritate excubat. Draconem marinū car-
nem habere duram uescientibus omnibus apertam est. Draco marinus ad
spina sua qua ferit, ut uenenum ipse dissoluit & impositus, uel cerebro toto,
prodest. Denique dolores sedantur ossibus draconis marini scarificatis gin-
guis. Quemadmodum draco marinus, sic & scorpio laedit, dum manus at-
rolitur: aculeo namque uenenofo armatur: piscis partim pelagus, partim li-
toralis. Est enim duplex scorpiorum marinarum genus, ut *Isidorus* author
est. Sapore præstant atque alimenta bonitatis qui pelagij sunt: hi rufi
sunt colore. Alterum genus subarrum est, palustre potius atque cernosum.
Vario colore scorpium esse tradit *Epicharmus*. Plures habet scorpio appen-
dices superne circa uentriculum. bis anno parit. Caro scorpiorum dura est,
& cum litapi manditur. Vt uero *Isidorus* scribit, cartilagineam duritiā ha-
ber scorpius: alimen nāmque præstat copiosum: faciliq; excernitur, ut qui
absisteriam uiam habeat, qui pelagij & rufi colore sunt, ubertius alunt. lo-
cinotis doloribus scorpio marinus in uino necatur, ut deinde bibatur. Scor-
pius marinus necatur in uino, uel sic uicia & calculos sanant: lapus qui inueni-
tur in scorpiomis marino cauda, pondere oboli ponus. Puros dilucite scor-
pium uino decoctus, ita ut foueantur ex illo. Scorpij marini fel alopecias
replet:

A replet oculorum suffusione, albugini, hebetudini obfcuritatis modetur.

Vcl ut alij tradit, fel marini scorpionis rufi cum oleo uetere aut melle Attico incipientes suffusiones difcunt, inungi ter oportet intermillis diebus.

3 eadem ratio albugines oculorum tollit. Scorpiana, inquit Xenocrates, dura *Scorpiana* habet carnem, faporis minime ingratum. In mari rubro fagittarius gignitur, *Sagittarius* et inacei speciem habens, firmis & bene longis armatus aculeis.

1 Ab Ephippo *Spasmoda*, id est dracena vocatur. 2 Spasus, *Spasus* dracena uenenam habens, sed minus nociferum. 3 Plinius scorpianam & scorpionem tanquam diuerfos enumerat. Arrianus quoque difformi tradit scorpionem & scorpianam & colore & flecto. Scorpilus quoque auctor Aristoteles in alio fimbicare uicem cum cibus an sit *Scorpilus* & scorpionum genere.

B

De mugilum generibus.

Cap. CLXXIX.

1 Non in saxosis locis, sed in maritimis paludibus fere uicinat mugilū *Mugil* genus, & apud flouiorum ossa, ubi copas infuit dulcis aqua: atque in his maxime locis parit. Mugil, ut inter pisces, facillime audit. Venericuli habet animum modo carnolum: & altera uenericuli parte plures exeunt appendices, altera uero una tantum. Mugilum genera plura sunt sed quatuor

2 principia numerantur, cephalus, chelon, fargus & myxos: ita Aristoteles. *Cephalus*

lectius autem, Leuciscorum, inquit, id est mugilum plura dicuntur genera, cephalus, cestreus, chelon & myxinos: quorum cephalus & suauitate & flecta probitate ceteris praestant. Secundum locum obtinent, qui *Myxos* dicuntur

C turas inferiores sunt myxini sed omnium deterrimi chelones, qui & bacchi banchus appellatur. Haec lectius. Euthydemus duo producit mugilū genera, sphenica (quod iciumum est & figuram refert quadrigulam) & didactylea, qui laetudinem habet minorem quam duorum digitorum. Dorian mugilis marini species duas posuit, cephalum & *Myxos*, id est iciumum.

Sunt qui omne mugilum genus sponte omni opinantur, sed non recte: nam & oua eorum foeminae, & semen genitale mares habere cernuntur: uerum genus quoddam eorum est, quod nō coitu, sed limo arenis enascatur, ut quod apud Gnidum olim factum memoratur. Stagnis eorum sub cantu ortu relictae, & limo iam arido, ubi primum imbris restagnare loca inciperent, pisciculi nascebantur generis mugilum, quod per coitum procreatur

D tur magnitudine menule paruule: nec in eis aliquid uel oui uel seminis continebatur. Et genus quoddam mugilum reperitur in flouis lutescentis, in

3 quo nec mas est nec foemina. Nascuntur & in Siphariū lacu mugiles, qui basin tantam pinulas habent. Qui chelones dicuntur & fargi, myxi atque cephalus, grauescere mense Decembris incipiunt: geruntque diebus tricenarius. Parit cestreus in locis maxime, quā fluuus exit in mare, ut dictū est. Et inter primos pisces partum accelerat: parit namque hyeme. In piscium genere alter alterum sui generis edit, excepto mugile. Cephalus & *Cestreus* soli carne omnino abstinent: cuius rei argumentum est, quod neque in uentre tale quid unquam habentes reperiuntur: neque eisa in eos ex carne utimur, sed panis ossa. Neque oua cestrei ab ulla belua uiolantur: ideoque co-

Dd iiij

DE DIFFERENTIIS

*diversitate
morum
fieri
opra,
dicitur
piscem
Alia,
nam
non
facile*

piscis existunt sed cum adoleverint, tunc à cæteris piscibus corripuntur. Vnde
scitur mugilis unusquisque phæco algæ, atq; arena. Gulosus omnium ma-
xime mugilis est atque insatiabilis, inquit Aristoteles: quocirca venire di-
stincto transiit: & cum sit seivus, vilis est. Cum hic metuerit, caput absco-
dit, corpus totum occultari credens. Eadē tamen tanta facilitas, ut in Phœ-
nice & Narbonensi prouincia, comus tempore è uariis marem linea lōga
per os ad branchias religata emissum in mare, eadē inque linea retractum,
femina sequantur ad hauriendosque feminam mares partus tēpore. Scit
mugil esse in efica hamū, insidiāsque non ignorat: auditis tamen tanta est,
ut cauda uerberando exeat, cibos, capitur autem efica, ex pane, lacte &
menti-riā sicut non nunquam superat. Viget mugilis autumnos: deuior
est cum fert utero. Cū plurimus piscium generibus umbres conducit, tū
gili tamen nocens est: nam ut pluuia multi ex his de facili exsiccantur, si
modum aqua excesserit. Ex cum pisces omnes, dum uterū gerunt, graui sti-
mulo agitentur, ita ut in terram exsiliant, omnium maxime mugilē ita so-
licitari certum est. Mugilus & lupo quanquam iuncti sunt captales, ta-
men statō tempore congregantur. Sepe mugiles cauda abscessi uiuunt: ab-
roditur uero à lupo eius cauda. Subar cestreus in amnes & lacus, ibiq; pro-
spectu degit. Cestreus (ut Artemidorus tradidit) abscondit in Nilum utre, cum
pregnantes sunt: descendunt autem paulo ante pleiadum occasum unā o-
mnes parturiri: & tunc quoque in septa incidentes capiuntur. Sunt magiles
(ut Iulius auctor est) boni admodum succi: facile exsiccantur, nec multū
alunt. Porro ex alio mari mugil optimus habetur, sapore iocundo, subacri,
lupo nihilo inferior: subacris hac purū lymphidū inq; fluuen carnis duriciem
temperat, euaditq; delicatior: qui uero in limosis lacubus stagnantibus
locus capitur, iuiorior est. Attritis imponitur cinis: à capite mugilū: cōburi-
tur autē in fictili uase: illani cū melle debet. Intet falsamēta medæ mater
Cestreus est. Bāchi, quē quidam myxion uocāt, selauribus utilissimū est.
Inueniuntur in bāchi piscis capite ceu lapilli: hi poti ex aqua, calculosis præ-
clare medētur. Mugilū genus præstantissimū cephalus est, nomen à capitis
grauitate sortitus. Est uero cephalus alter, qui chelon dicitur: aliter phereus.
Cephalus, quē chelona uocāt, litotibus gaudet: sed prope palades maxime
uicētur, aut ad fluuiorum ostia ubi copia influit dulcis aqua: alter eiusdem
generis trāslitotanus, qui non nisi mucore uescitur suo: quicquid semper
ipse seivus est. Pascuntur limo cephalū: quo sit, ut graues & sordidi sint. Pi-
scem ipsi nullū omnino edunt, sed & carne penitus abstinētius rei argu-
mentum est, quod nihil tale in uentre unqua habentes, reperiuntur. Et quo-
niam uersari in limo solent, efferunt se, urinantque sepe, ut corporis for-
des motum ue abluant. Qua fortū seque eorum à nulla belua molantur: quā
propter copiosi existunt: sed cum adoleuerint, tunc à cæteris piscibus corri-
piuntur, maximeque ab archana. Pars cephalus ad æquinoctiū autumnā-
le, & eius scotus nouissime fere omnium apparet. De cephalo Galenus hæc
prodidit. Cephalus ex eorum piscium genere est, qui squamis integuntur.
Nascitur autem non in mari solum, sed in paludibus ac fluuiis: quo sit, ut ce-
phali

*Barchina
Aspersione,*

*Cephalus.
Chelon.
Litho.
Cephalus
trāslitotanus.*

Archana.

Cephalus.

- A phali non paruum inter se discrimen habeant: ut uideri possit cephalus pelagi-
 us alterius esse generis, carnéque ipsa plurimū differre ab eo, qui in pa-
 lude uagat, aut fluuio, aut limoso aliquo stagno, aut cloaca, qua expurgatur
 urbium stercorem: est enim eorum caro qui in cernosis & sordidis aquis
 uisitant, excrementis mæscique plenafuit optima eorum qui in puro ma-
 ri uiuunt, præsertim si uentorum flatibus agitur. Inter pisces cephalus ma-
 xime uera que aqua uiuit, marina scilicet & dulcis: hanc habet naturam,
 ut aduerso flumine patens, quā longissime à mari discedat. Et hæc quodē
 cephalus non merofus illas ac paruas spinas non habet, sicuti neque marino-
 rum quispian alius uetus qui ex fluuio aut palude in mare descendit, non
 secus ac congenetes huiusmodi, spinatum plenus est. Hæc de cephalo Ga-
 B lenus. Pausanias quoque cephalos lutosos esse pisces testatur: cernosiusq, lo-
 cus & fluuiis turbulentis gaudere. Cephalis præstantiam suam indicat gu-
 stus: qui enim præstantior est, & suauior sentitur & acrior, pinguetudinisque
 experit contrā, qui pingues sunt atque insipidi, nam in gustu, tum nero
 in concoctionem sunt deteriores, stomachoque aduersi, & malis procreis
 succum. Hic tamen si sale condiant, (nam & cephalis sale adseruatur) lon-
 ge quā ante præstantior euadit: nam quod in eo maculosum uisibilemque
 est, ad totum deponit. Recens autem salitus iamdiu in sale adseruato me-
 lior existit. Leuciscos uocant nonnulli pisces quosdam in fluuiis genitos, *Leuciscus.*
 alterum cephalorum genus esse rari. Est autem leuciscus cetera quidem in-
 queque cephalo similis, nisi quod leuciscus candidior paulo est, capite-
 que minore & sapore acutiore. Quod ad alendi facultatem attinet, cepha-
 lo fluuiatili similis est. De cephalo autem fluuiatili ita cecinit Ausonius ca-
 pitonem uocat.

Squameus herbosas capito interlucet arenas,

Viscere prætenetis fartum congestus aristas:

Nec duraturus post bina trihoria mensis.

- 1 Mugil & mugil tam genus quā speciem significat: nocturne clare mugiles à
 quibusdam *mélomé*. Mugil apud Varronem etiam in piscibus dulcibus feruatur, 2 *Mélomé.*
 Chelon, &c. Plinius placem in candalabrum dicit ex Ouidio, an idem labrus sit qui
 chelonem Theodorus labronem uocat: sicut & *elapsus* sargosum, & *elapsus* mactonem *Labron.*
 D interpretatur. 3 Bacchi legunt apud Athenarum, unde in porthebachis legendum *Labron.*
 sit. Sed hancum alteram speciem uocant quidam, quæ myxinas dicitur, ut infra ex-
 phicabitur. 4 Mugil satianthis etiam oxyrinchus uocatur, ut Daphilus prodidit, *Oxyrinchus.*
 5 Sipherum lacu mugiles, &c. An sint hi mugiles potius ex anguillarum genere? 6
 leuiscus utilis, &c. Videtur Theodorus hoc in loco legisse, *leuiscus* id est uetus non Al *Cepion.*
 dium secun hieram Græcam, quam & huiusmodi nris cius Atheniensis, na reddere ma-
 bitimus. 7 Cephalus, &c. Theodorus capitonem uocat. Cephalum alium à cepha-
 lino, qui & *Elapsus* uocatur, Dion ambrosius est 8 Phereus, &c. alius *myxinas*, id est *Cephalus.*
 translocatus, ut uertit Theodorus: hoc est, ut ego arbitror, qui loquens à moribus de-
 git. 9 Euxydemus & Dexion hoc non de cephalorum sed mugilum generibus re-
 ferunt, sed nane, ut sapet uideri licet. 10 Mucorem uocant, &c. Est apud Aristotelem *Pholis*, quæ
 pholis, quæ mucorem quem ipsa emittit, sibi obducit in utro eo quasi cubili quiescit.
 uide uidem sit piscis, an eiusdem saltem generis. 11 Et apud Aristotelem achar-
 nas, quem a flare laborare scribit, atque eo tempore exire mari. Athenæus acham o-
 ben & alio loco acarnan, qui suauis piscis est, & in gustu subest negans: qui & medio-
 Acharnas.

DE DIFFERENTIIS

Acron.
Acron.

enter maris, & alium dicit. Achinas, ut quid Xenocrates, neque stomacho gratus est, E neque probum generat succum. Dura carnis est, nec facile corrumpitur. Et Plinius acron non habet, an idem sit pisces an diuersi:

De dasquillo, salpa & quibusdam aliis. Cap. CLXXX.

Dasquillo.
Dasquillo.
Salpa, miltom.
Indolis h.
Salpa.

Pascuntur cephalo corno, ut dictum est: dasquilli corno & stercore. Salpa quoque stercore uescitur, aerum hanc natura, ut alij alibi pisces principatum obtineant, ut coracinus in Aegypto, zeus Gadibus: circa Ebusum, salpa, oblenus alibi: & qui nusquam percoqui possit, nisi serula uerberatus. Stercore, ut diximus, uescitur salpa, piscis alioqui saxosis locis uictitans, algolisque & muscolis atque alga pascitur herbisque. reperitur & in paludibus maritimis sed elca breuida precipue capitur, ut stercore. Quin & cucurbata capitur, quod ei ex omnibus una euenit. Est uero piscis colore uarius, uirgis uel maculis quibusdam rubentibus distinctus. Serratos habet dentes: & solitarius uagatur, auditum habet peracutum. Semel parit, ætans scilicet in tota locis plurimis nonnunquam uero autumno. Gultui fere ingrata salpa est, ut Archestratus auctor est: in usu autem cibario messis tempore maxime habetur aut autumno: ut uero Xenocrates docuit, salpe quæ in alto capiuntur, sapore sunt incundo, subacti: abundeque nutriunt, nec facile corrumpunturque uero apud litora, carnem habent durioram, saporisque ingrati, & quæ malum procreat succum. Salpe expungat ulcera in linteolis conserpitis. Gignatur & in mari rubro piscis stromateus non mane, salpe similis: ungulas habens per uniuersum corpus extensas auri speciem referentes. Bani quoque uirgulis insignis est piscis, qui seferinus uocatur. Faber, qui & prisca consuetudine zeus appellatur, in Gadum municipio generosissimus piscibus adnumeratur. in Atlantico mari pascitur, nec alba.

Alia, salpa.
Stromateus.
Stromateus.
Faber, zeus.

1 Circa Ebusum, &c. Archestratus circa Mytilenem, Diphilus circa Alexandriam salpas prædicant opimas. 2 Virgis uel maculis, &c. Oppianus, *αἰσχροῖς*: Achonius, *μακροῖς καὶ ὀπίσθις*.

De gobione. Cap. CLXXXI.

Gobio.
Gobio.
Gobio.
Gobio.
Gobio.
Gobio.
Gobio flauis.
Gobio.

Piscis paruus gobio est, & ex iis qui parui perpetuo manent. Gobius appendices habet plures superne circa uentriculum. Paruus luxu litora gobionis, suæque oia lapidibus committunt lacienscula & arenida. Subeunt in fluuios nonnunquam abique pinguescunt. Egobionibus sunt qui in fluuiorum ostiis aut paludibus maritimis uictitane partim etiam in saxis, & partim in arena degunt. Qui saxatilis est, hanc Numenius *αἰσχροῖς* uocauit, nec marinus solum piscis est gobio, sed & fluuiatilis, quem hoc modo depinxit Ausonius,

Gobio non maior geminis sine pollice palmas.

Præpinguis, teres, ouipara congelthor alio:

Properique iubar imitatus gobio barba.

Præterea alius albus est, nigricat alius, & alius uiridior est, *αἰσχροῖς* uocatur.

Gobionem

Αἰσχροῖς.

A Gobionem album Eurypii non esse pelagium certum est, inquit Aristoteles. Denique

Lubricus & spina nocuus non goniis ullus est. Et,

Goniis aculeo pugnat, fundisque uenerum.

Gobius fuscus.

*Procerum, sed minus uir-
tutem habet
atque bonum.*

Gobiorum caro, inquit Gabenus, ut aliorum & saratiliu piscium carne durior, ita mollior est quam mullorum crassitudine uero & tenuitate medioctem generat succum. Prestantissimus autem est gobio, nam ad uoluptatem, tum utro ad concoctionem digestionemque, & ad probam gignendum succum, is qui in arenosis litoribus aut inter saxa uiuit, qui uero in flumorum ostiis aut paludibus maritimus degunt, diuersam plane carnem habent ab his, qui in puro mari uiuant: neque enim neque iucundi sunt sa-

B poris, neque succum tam bonum prestant. Quod si limosa fuerit aqua, aut urbem fluvius expurget, deterrimus euadet qui in illa aqua gignatur gobio. Copiosum, inquit Icelius, sed non bonum procreat succum gobiones sapore grati: facile excreuantur, nec multum nutriunt. Gistui gratiores sunt candidi nigris uindrum autem gobionum caro substantia est ratiore, magis pinguedinis experta, succumque praeferat tenuiorem, neque adeo copiosum: ob magnitudinem tamen magis alit. Gobios, qui saratiles sunt, teneriorem habere carnem Diocles prodidit. Diphilus, gobij inquit, pertas simili perstant alimentu. qui uero ex his parui sunt & candidi, tenera habet carnem: minimèque uirus olens: probum gignant iacch, & facile concoquantur uiridiores squalidiores minùs pingues sunt. Gobius recens, inquit Dio-

C scorides, si in suillum uentrem coactus infusatur, & in aqua sextantis duodecim, donec duo supersint decoquantur: tam extolatus & sub duo refrigeratus potus deus, alium sine molestia soluit: canum reptiliumque plagis utiliter imponitur. Gobionem saratilem, uni modo diximus, nonnulli *scorides* uocant. *scorides* quoque piscis est in herboris litoribus degens. Blennorum cinis, inquit Plinius, cum rura, uel sic uiria & calculos sanat. Epicharmus quoque uilem quandam piscem *scorides* nominat.

Gobius fuscus.

scorides.

scorides.

Blennius.

scorides.

¹ Gobio, *scor.* Sicula *scorides* uocantur, alij *scorides*. Sunt qui *scorides* & *scorides* habent.

D De apuarum generibus & similibus quibusdam aliis.

Cap. CLXXXII.

¹ E Gobionibus paruis & ignobilibus, qui terram subeunt, creatur pisciculus qui *scorides* dicitur apuæ genus. Porro quam apuam nostram, aphreni Greci uocant, quoniam is pisciculus à pluua nascitur. Grauis tibus apua est & concoctu difficilis, ut Diphilus prodidit. Sunt autem apuæ plura genera: quæ aphreni & aphros, id est spuma uocantur, non ex costa gignuntur, sed ex terra arenosa consistunt: quod quidem apuæ genus nec incrementum capir, nec prolem affert: & teporis longioris spatio perit, sed denovo nascitur: unde fit ut breui quodam tempore excepto, omnibus fere anni temporibus generetur. Effertur id pisciculi genus funditus de terra, argumentu est, quod

scorides, qui in arena gignuntur.

scorides.

scorides.

scorides.

scorides.

scorides.

scorides.

DE DIFFERENTIIS

nisi tempore tepido non capiuntur : utpote quod de humo ad summa re-
tus gratia veniat. Funt loci umbratili & tepidi, quoties tempore benefi-
cio solem tepescit, ut in Attica terra apud Salaminem, & iuxta Themisto-
cleum, & in Marathonie : nonnunquam vel cum aqua de celo incidit co-
tur pisciculus hic in spuma, quæ à copioso umbre cadente efficitur, unde vo-
men spumæ (σπῆς) accipit : ferèque interdum per summa maris, (cum cel-
lum tranquillum fuerit) & in spuma fluitat, perinde ac in fimo uernicu-
lus voluitur : quomobrem in loca complura gentes id apud affertur è ma-
ri : & copiose quoque generatur, & capitur anno tranquillo & humido. his
itaque oetus partim ex limo aut arena, partim per summa facta patredine
agitur. Reliquum vero apuarum genus, fortura piscium est : quæ etiam co-
bites dicitur à gobionibus, ut modo diximus, parvis ignobilibus creatur. F

Colaris.
Phalerica.
Atencherda.
Murex.
Trichas.
Trichas.
Trichas.

Quæ vero phalerica vocatur, nobiscas gignit, quibus unâ cum spumæ u-
ser soleis scicops & aliis quæ ex his procreantur vocantur autem trichas.
Ex his trichas oritur, nile edulium, ut testis est Iulius Pollux. Trichas, vel,
ut Aristoteli unde tur, trichas, cum pōtuno ingreditur, videtur & capius :
sed exiens nusquam visus adhuc est : sed hi soli istum amant subeunt, unde,
quæ diuiditur fluvius, per abdolum terræ meatum in Adriaticum mare de-
fluit : argumento est, quod subeuntes ex Adriatico in meatus illos nun-
quam capiuntur : sed descendentes in Adriaticum semper. Trichas his anno
parit. Est apud genus quoddam, quale in portu Atheniensium nascitur, quod
enkrasillochos dictos progenerat. ut vero quibusdam videtur enkrasillochi
ex illo apuarum genere procreatur, quam cobitum appellari diximus quin-
etiam genus aliud apud est, quod maxarum & mugilum sic ferunt. Illa ve-
ro altera quæ aphros & aphritis dicta est, humida est, brevisque, ut dictum
est, tempus durat, & restant tandem caput & oculi. sed iam piscatores quæ-
admodum deportare possunt inuenerunt : sale enim aspersa plus temporis
adseruari potest. Ex hac certe ceteris quæ hactenus dixi sunt omnibus
prestat. Cobitum etiam epleton pisciculum vocat Doriom : & illam quoque
quæ ex athine pisculo procreatur. Est sine epletus in apuarum genere pi-
sciculus. epletos vocat nonnulli pisciculos : qui in fossiles re linquantur Nilo
recedente. Preterea quoddam apud genus inglutit Doriom nominat. Locustas
in apuarum genere quædam, inquit, alba & tenuis admodum est & spumæ,
quæm ciborum nonnulli appellant : alia plenior crassiorque corpore, & sor-
didior prestantior quæ nuda & tenuis est. Engraulis, ut scribit Oppianus,
apud genus est, pisciculus perimbecillis & timidus : ut quingrauius sit pi-
scibus omnibus præda. Engraulis cateractum & uelut nodo indissolubili
colligati natantur nonnunquam uel nautæ remorari possunt : capiunturq-
rebus magno numero. Sūt, inquit Orbasius, pisciculorum minimorum
genera quedam, quæ sicut adseruantur, quæ unâ cum acronibus oleibus
eduntur. Vocantur alia *negalita*, alia *negalita*, alia *negalita*, alia *negalita*, quæ
omnia & stomacho infesta sunt & alium citant, nec facile corumpuntur.

An hoc an-
chylus sit,
an alius pifc.
Enkrasillochos
et Englutit.

Apuarum tanta est Athens copia, ut obuiosa sit Chrysippus refert) vul-
gare sit mendicorum edulium : cum tamen aliis locis, ubi longe deteriores
nascuntur,

Aphros.
Aphritis.

Epleton.
Epleton.
Epleton.
Epleton.

Colaris.
Phalerica.
Atencherda.
Murex.

Enkrasillochos.
Enkrasillochos.
Enkrasillochos.
Enkrasillochos.

DE DIFFERENTIIS

Chalcis.

Chalcis trichiædæ acque triffæ fimilis eft, piſcis ariſtoſus ſpinofuſus(aut ſic- E
cus & ſqualidus, hoc eſt *ἀγρίος*) neque multum in ſe pinguetudinis cōtinet, 5
neque luccum copioſum in alimentum præbet: facile tamen in corpus di-
gentur. gregalis piſcis eſt. Et gregatim natæ chalcedæ (ut modo diximus)
locum ſemper mutant, modo in alto pelago, modo apud litora degētes.
In ſturiolum quoque numero chalcis eſt. Ter parit, & gregatim ſua con-
gurgiti altiori mandat congeſta. ſonitum quendam & ueluti ſtridorē non-
nunquam emittit. Chalcis urino infeſtatur dīto, ut pediculi ſub branchiis
innati phatunæ inſeriant: quod nulli ex cæteris accidit. Chalcedas nōnulli
ſardinos uocant. Ariſtoteles cithinos ſardinos dixit. Eſt utro cithinus &
chalcedi triſſiq; ſimilis, & in alendo quoque: quē Dorion condimēto ſua-
miorē em euadere prodiit. Sale cōiungitur nonnulli piſci culi, in quibus chal-
cis eſt & halecula.

Sardinos.

Cithinus.

Chalcis.

Halecula.

Agrius.

Agrius.

Triſſæ.

Theris.

Aloſæ.

Clypeæ.

Atherina.

Aryſæ.

Chalcis.

Enia.

Spania.

Sardina.

Sardina.

Sardina.

Tagadina.

1. Triſſæ. *agrios* uel *ἀγρίος* alius, opinos, marinus eſt piſci culus uerſicolor: theſ-
ſi à quibſum uocatur & theria. 2. Ariſtoſus ſpanoſus. Theodorus ſpinofum
dixit. Græci Ariſtotheli exemplaria uel *ἀγρίος* habet, ſed falſo, ut opinos. Athenæus
ἀγρίος ſententiæ eſt ſqualidus, aut ſocus. *agrios* Theodorus aloſam uocat. 3
Eniæ uelut ex arapud Apulerum.

Omnibus ut clypeæ præſtat muſſella marina, &c. Sunt qui legant clypea.

4. Aloſam. Atherinam Phascolius uilem eſſe piſcem tradidit: an eadem ſit cum
aloſa, conſideres leſor. Atherina (quam aitham appellat Theodorus) ſe ſolia reſeū ge-
neris, ita nanque interpretatur *ἀιθία* prima. In hoc genere parit: ſæpius que eius pi-
umum ſere omnium apparit, parit ætatis aliam ætatis. 5. Chalcedus piſcis alius à
chalcedæ eſt. Cyaci frequens, figuræ ſæpe, *καυκασίαν καὶ τριπόδα*: an idem ſit, qui
ſubert Chalceda Theodorus etiam interpretatur, nonnunquam & ſpaniam: que in-
ter ſuſaneos piſces numeratur, & qui ſemel parit. Verum in loco uidetur exem-
plaria omnia mendoſa: nam chalcis gregalis eſt, non ſuſaneus: & ter parit. 6. Sardi-
nam habet. Columella piſci culum ſuſaneus idoneum, & à chalcedæ diuerſum: niſi
deprimam. ſic codex. Item ſardinam Galenus, uel ſardenam *καυκασίαν*.

De halecula, mæna, ſmaride & boce. Cap. CLXXXIII.

Halecula.

Halecula ri-

ma.

Alci.

Mæna.

Mæna.

TAbentes haleculas incrementi minui piſces iubet Columella præbe-
ri us, qui in uenariis ſeruantur piſcibus. Rualem quoque haleculi no-
minat inter ea, que ſunt incrementi parui animalia. Alecē appellat nō-
nulli quam Græci *μαρίνα* uocāt, & Plinius mænam. Colore mutantur mæ-
na, candidiores hyeme, & ſunt æſtate nigriores, ad quod maxime ſuis pin-
nis & branchiis declarant. Herboſis litoribus gaudet mæna, & gregalis eſt.
Omnem piſcem ſæcondiſſima eſt, & poſt brumam parit. utro graui-
melior eſt. Forma rotundior ſemine, potteſtior mari & latior. Erit ut
cum ſortu impleri ſemina incipit, maris color in nigriorem, plūſque ua-
rietatis mueretur, & caro deterrima cibo efficiatur. uocantur à nōnullis per
id tempus *μαρίνα*, id eſt hirci. Mæna ſucci bonitate goboones ſuperat, ut tra-
dit Iſidorus. ſed ſua uitate inferiores ſunt. Capitis mæna uim, quæ ſale adſer-
uantur, cuius, exſiccandi uim habet, nō admodum ætrem: idēque ad ſeſis
rimas connumunt quidam & ad columellam diu induraram. Hæc Galenus.
Mænarum ex capibus enis, inquit Dioſcorides, ſi imponatur, calloſas ſe-
dis

μαρίνα.

Alci.

A distimas aboleticuius etiam garum putrida oris ulcera, si eo colluantur, si-
bit. Plurimas menarum muria & caputum eius, inquit, cum melle sanat stru-
mas. Anginas menarum salutarum ex capribus cinis ex melle illitus abolet.
Mene salte cum felle taurino illitit umbilico alium foliunt. Capitis me-
narum cinis ad rhagades & condylomata utilis, vulgo è matris uacundissi-
mus habetur sal: ex eo salte genere quod è muria salamentorum recoqui-
tur, acrimque consumpro liquore ad naturam suam redat. Meridi simi-
les sunt bores & smarides, ut Pseudippus auctor est. Est autem smaridis piscis

Smarides!

litoralis, & litoribus gaudet herbolis. Colorem mutat non aliter atque in-
marcanda enim hyeme, rursus aestate ad nigredinem redit: quod maxime
suis pinnis & branchiis declarat. Smarida nonnulli *maris bores, & uocanturque* uo-
cantur. Smaridis caput exustum excrecentes in ulceribus carnes reprimunt
normas colubet, thymos clauoſque absunt. eius caro, non secus ac cetera
salamenta, scorpionum ictibus tantumque rabidorum moribus prodest.
Verèdorum pustulas discutiunt smarides illitit. Mulieribus lactis copiam
faciunt smarides cum pullana sumptex, uel cum feniculo decoctæ. Box, ut
diximus, mène & smaridi similis, in dorso quasi pectus, *magis ubi testis*, uti A-
thenæo placet, nominatur: piscis parvus, oculos habens pro corporis capite
ne grandes adeo ut Aristophanes Bizantius, non *alecem* aut *alece*, sed *alecem*
potius appellandam statuerit, ab oculorum scilicet magnitudine, quasi bo-
uinos habentem oculos. Piscis gregalis est & litoralis, in locis herbidis ui-
ditur.

maris bores
uocanturqueSmaridis
Piscis litoralisalecem
alece

Citans. Concoquitur factius box, atque in corpus digeritur surulentus, &
alium mouer: merum assus suauior est & tenerior. Sunt & quidam pisces
alecem *alece* dictæ, id est mène candidæ, quas aliqui *alecem* appellant: alij
diuersos asserunt.

Lecanorini
alecem
alece

1. Aleculam arbitramur Hermolaus genus, non speciem esse: idemque apud nos si-
gnificare aleculas, quod anthracidas apud Græcos, id est prunatos aut carbonarios
quicumque scilicet in pruna & crinula commode coqui possint: uerum ex Columel-
la apparet speciem esse. 2. Alecem appellant nonnulli, &c. Alex Plinio nō piscis, sed
garum uinum est, scilicet imperfecta nec collata fex, nec sane occurrit locus quisquam
apud ueterem aliquem auctorem, qui plane ostendat alecem aut alece piscis genus esse.
Hocenus in primo Sermone, Ego fecem prunus & alece uiuam. Notum

Alecula
Anthracides

Alex

Marcellus locum hunc citans piscem significare dicit. 3. Quos Græci smaridas ap-
pellant, muros unde Theodorus ceteros interponit, inquit Hermolaus. Sunt quidem
genera Plinio & Marnala quoque inter uiles pisciculos, sed diuersi à smaridibus, un ex
D Plinio ipso liquet lib. 2. Marnal. lib. 12.

Cecres
Cecres

Fuisse cetres aut inules mernas,
Odoz impudicus urces ferebatur.

4. *Uroſcopi*, &c. Vocant interpretatur Theodorus. Et certe lesio Pliniana in
uulsi codicibus boſi habet, non box, ut notat Hermolaus. Bocas, inquit Festus, pi-
scis genus est à boato, id est uocem emittendo. *Uroſcopi* in *alecem*, id est bores uiri-
que dicit Oppianus: quasi duo sint eorum genera.

De alijs quibusdam piscibus, qui uocales dicuntur.

Cap. C L X X V.

Pisces uocis quidem expertes sunt, ut diximus, sed sonos quosdam stri-
doréſque mouent, qui uocales esse existimantur, ut lyra, ut chromis, &c.
Ec

Lyra

Atem in molem creuerit, cetera. Et quidem iam caprus est thynnus sene x, inquit Aristoteles, cuius pondus erat ad talenta quoddecim: & caudæ intervallum ad cubita quinque & palmum: (Plinius, duo cubita, inquit & palmum.) Levis piscis thynnus est, mari æquique cõmunis. Differt mas thynnus à sermina, eo quod serminæ pinnula iuncta sub ventre est, quam aphares nuncupant, quæ masi deest. Coeunt thynni mense Februario post idus & pariunt luno ante nonas. & semel anno parit thynna: sed quoniam partus præmature, partem sero productæ, hinc sc̃ificat & his creditur. Edit sua oua condita quasi utriculo, in quo oua exigua multaque consistunt. Inctem enim autem partus præcipua sumit celeritate. Pelamides ac thynnus in Pontu parant, nec usquam alibi ut sentit Aristoteles ut vero Strabo refert, parunt in Mæotide palude. A partu statim oua sua, & prolem deinde parvâ adhuc, denorat thynna. Carne sola vescitur thynnus: magna ex parte quandoque etiam algam tangit, sed & glande quoque pinguisfit, ut modo diximus. Thynni omnium maxime gaudet tepore: & ob eam rem arenam & licora adjuunt, per summa etiam maris natât, quo tempore pontantur. Latent thynni præcis gurgitibus hyeme, & bruma non nagentur. sed ubique deprehensi, usque ad æquinoctium, ibi hybernant. Pinguescunt à latibulo maiorem in modum sunt quoque magna ex parte suavisissimi cum latent. Præmadix in corno se abdant, cuius rei argumētum est, quod neque eo tempore, hyemis scilicet, capiuntur: & si capiuntur, dorso sicculento pinnis que Copectis spectantur uerno autem tempore productæ & appropinquæ ad terram coeuntes parientis quo tempore sicut gaudiæ capiuntur, tempestiveque ranciper esse putantur: autumno vero & hyeme deteriores sunt, simul etiam mares pleni genitali semine (quod *Xipia* appellant) per id tempus coeuntur, cõque præstant ad usum sicut in utero adhuc parvo, difficile capiuntur: adultiore iam, larga captura propter infesta asili stimulum. Circa cantus enim exortum agitantur asilo thynnus habent enim per id tempus cetum vermiculum quem *Asilum* ad est asilum vocat, effigie scorpionis, magnitudine aranei. Infestat hoc ceto dolore, ut uel in naves serpentum exiliant quod facit, ut sit in æstate deterior thynnus. Post arcturum deinde melior est iam enim eo tempore ab infestantis asili agitatione requiescit. Thynni in Pontum dextra ripa intrant, exiunt leuæ: id accidere existimatur, quia dextro oculo plus cernit, (utroque hebet natura) leno habetius. Est in Eriop Thraciæ Bosphori, quo Propætus Euxyno iungitur, in ipsius Euxropam Asilum que separatis freti angustius, saxum mari candoris à uado ad summa perlucen, iuxta Chalcedonem in latere Asie. Huius aspectu repetit terræ, semper aduersum Bizantiæ promontoriū percipit petunt agmineque omnis captura Bizantiæ est magna Chalcedonis penuria. Operiuntur autem aquilonis statum, ut secundo fluctu exeant ex Pontonec nâsi intrantes Pontum Bizantiæ capiuntur. Intrant thynni, uti modo diximus, è magno mari Pontum uerno tempore gregatim: sed multa tamén in Propontide æstiuant: Pontum non intrant. Thynni nauigia uelut euntia comites, mira quadam dulcedine per aliquot horarum spacia & passum multa à gu-

Et ij

Aphares
apud
id est

Id est
deur
Id est
Id est

Præmadix
Præmadix
Id est
Id est

Asilum
Id est

DE DIFFERENTIIS

bernaculis non separantur, ne uolente quidem in eos sepius iacto, territi. E
Pomphol. Quod si eos qui ex thynnus faciant hoc, pompholos uocant. At uero pōpulum
 alium esse piscem sentiuunt & Ouidius & Oppianus, atque Athenaeus: pelagium
 quidem piscem, & qui pelamidi similis sit, sed diuersus tamen: qui &
Pelamis. circa naues frequenter conspicitur ludibundus, easque ad terram usq; eun-
 tes comitetur. Pelamis, Diphilus auctore, cibis grauis, copioseque alit, con-
 coctus difficilis, arinam ciuit: quod si sale maceretur, facilis aluum mouet,
 & extenuandi uia praedita est. Sapore quoque inundo est, inquit Xenocra-
Sarda. tes, & meliusculum procreat suu comane facile corrumpitur. Sarda, ut idē
 ait, gustui grata est: ob eam quam in se habet acrimoniā cybio prestant
Thynnus. uocis appetentiam incitat, & aluum mouet. Thynni autem caro, eodē au-
 thore, stomacho aduersa est, aridaque & mali succi acgre desicitur aluo, sed
 copiosum praestat alimentum: & in summa, grauis cibis est, ut Diphilus
 prodidit. Galenus thynni, inquit, sicuti & grandiores alij pisces, succum gi-
 gnant crassum tenacemque: ac proinde eorū usus se nibus inutilis est. Quae
 autem pelamides uocantur, carnem habent teneriorem: & succum gignant
 crassum, qui ad mediocritatem magis tendat. Et, ut paucis dicam, thynno-
 rum caro, qui & etate & corporis mole sunt mitiores, non perinde dura est
 atque senioetum maiorumque. Thynni recentioris adipē Attalus ad recentio-
 ra ulcera usus est. Philothrum est thynni sanguis, sel, accur, siue recentia
 siue seruata: accur etiam triuam, mixtaque cedria plumbea pyride adserua-
 tum. Thynni ad rem saluamentariam senes improbi sunt: quae autem pel-
 lamides uocantur, is longe prestantiores sunt: ut quae laudatissimis salis-
Cybiarum ge- nera. mentis non cedunt. Haec parti eu latum confectū in genera cybiorum dispar-
Cybia, cybius. tiuntur: concesa namq; pelamis quae post quadraginta dies à Ponto in Mipo-
 tum reuertitur, cybium uocatur. Cum uero annuum excessere tempus, &
 iam primam thynni uocantur, uti diximus hī membracian caeli etruice &
 abdomine commendantur atque cladio, recenti dumtaxat: & cum quoque
 graui rudi: cetera parte plenis pulpamentis sale adseruantur. Melandrya
 uocantur ex his quernis assulis simillimamillima ex his, quae caude proxi-
 ma, quae pingui carent: probatissima ea quae siccibus. Haec Plinius. Xeno-
 crates ex teras thynni partes praeter collum & abdomen melandrya uoca-
 uit, quod nigris quercuum radicibus similes sine. Sed quoniam recipiant
 H discriminata thynnorum partes, quae sale adseruantur, mox referetur. Thyn-
Thynnus. ni salis carne Dioscorides & Galenus uocari scribit. Haec si edatur, iis quos ui-
 pera, quae preter dicitur, momordent, auxiliatur: oportet autem uinum
 quamplurimum subinde cogantur haurire, indeque euomere. Is quibus
 dysenteria opus est, ad est, qui acrioribus cibis ad uocutionem proripandam
 indigent, accommodatissima est. Canum moribus utiliter imponitur. Pe-
 lamidum saliarum capotum cum uel cybiorum cum melle ad cōdylomata
 & rhagadas utilis est: sarda priuaciam contra praeteris morsum prodest.
 Quod cybium uocatur, inquit Galenus, uulnē à cane inflicto non sine
 utilitate imponi prodidit quidam: & contra draconem marinum ex ace-
 to. Cybia uetera elusa in nouo uase, deinde trita, profunt dentium dolori-
 bus.

A bus. Alium purgant cybia uetera; priuatimque cruditates, pituitas bilé-
que trahunt. Pamphilus melandryn genus thynni grandissimum esse sta-
12. uit. In pelamidum maiorū genere apolectus, (uel, ut alij legunt, apolectū)
uocatur pelamidum generis maxima, tritone durior. Orcynus pelamidū
generis maximus neque redit in Maotem similis tritoni, uelustate melior:
uel (ut Diphilus prodidit) orcynus cum magnus est, chelidoniae similis est,
13. quod scilicet ad carnis duritiem attinet. Orcynus, inquit Dorsion, ex oceano
per columnas Herculis in nostrum mare permeant: quo sit, ut in Iberico &
Tyrrhenio mari capiantur plurimi: circa Gaduram insulam pinguis-
simi, ut refert Iocestas deinde circa Siciliam: quo uero longius à Gadibus re-
cedant, eo macilentius magis euadunt. Orcyna carne tradit Xenocrates Ho-
B. macho ingratam, malique fucci, & aridam: ab eade nutrire, nec facile per al-
14. uam excerni. Synodontis maior pelamus appellatur. Triton pelamidū ge-
neris magni, ex eo horrea cybia fiunt, quæ duriora solidiorque sunt, quam
quæ ex pelamide. Chelidoniae pelamidi simile præstat alimentū, nisi quòd
durior est. Xanthus, inquit Diphilus, tenerior est quam orcynus uetus quo-
que nonnulli olet.

Melandrya.
Apolectus.
Apolectus.
Orcynus.

Synodontis.
Triton.
Chelidonia.
Xanthus.

1. Alyfcorodryx, &c. Oppianus & hoc pelamidas uocat. 2. Thynnus Aristis *Pelania.*
reles nonnunquam inter pisces gregales numerari aliquando uero inter fuscatores, nisi
alibi mensura sit in exemplaribus. 3. Sarda quoque &c. Ex hac (oponit) Gallienus *Sardis fuscis*
ta sunt præstantissima, quæ sardica uocantur & sardis, de quibus infra & Galenus lib. *mem.*
C. 3. de aliment. 4. Thynni femina est Aristoch, Oppianus ei *Aristis* uocat. Thyn-
nidæ quoque nonnulli enchidas uocant, & *enquidæ* uel *enquidæ*, ut refert Athe-
neus. *enquidæ* quoque nonnulli conuicio ex Aristotele, pro pelamidibus accipiuntur, si-
cut & thynnidæ quoque. *enquidæ* sunt apud Oppianum inter eos pisces, quos in li-
mani degunt, nec etiam ex hoc genere, an mensura sit, pro *enquidæ*, an sit *enquidæ*.
species. 5. Aphara, athena uocat Athenæus. 6. Aristochis lib. 6. hist. anima-
lium hæc de thynno refert, nec tamen lib. 4. ita scribat, Thynna partem fetus præma-
ture, partem siccæ produci. Ede primam partem circa mensis Decembrem ante bru-
mam, alteram uero: Quo pacto hæc conueniant, si uera sint exemplaria, consideren-
dum. 7. Hippurus uetus piscis est alius pelagus, qui naufragiorū fragmentis ma-
ris in modis oblectatur, (Theodorus equidæ uocat.) Latet hippurus hyeme, & nō
caput præterquam ceteris quibusdam temporibus, ut illius diebus paucis, & uisum
semper. Vix tantum partu, omnis partus de maximo in maximum celestine augetur.
Coryphæna etiam ab Athenæo uocatur & arcuata. Ouidius hippuros celestidit: *Coryphæna.*
Est & hippus nomen apud Plinium & Oppianum pisces quidam licetcales, in arena
D. loca uisibiles. Hunc Athenæus etiam hippidum uocat archarum. 8. Cyboerus *Hippus.*
genera (ut consilio) appellat Plinius, quæ à Genere *Cladæ*, *melandryæ* & *enquidæ* *enquidæ*
uocantur ut eisdem nominibus appellentur pelamides consilii patet, quibus & ma-
riam thynorum, quos orcynos uocant. Pelamidas quoque magnas cybia uocat Ioc-
estas. 9. Clidæ, &c. Clidæ, ut fallor, peccatur parce, quæ fuscibus proximæ sunt. *Clidæ.*
10. Melandrya Pamphilus genus thynni grandissimū esse statuit. Hinc arabæ, me-
lândrya dicta & melandryæ. In orcyno, quæ melandryæ dicuntur ab Iocsto, eandē uocem *Melandrya.*
à Diphilo uocantur. ut sit thynnorum collum *enquidæ*, ut Xenocrates tradidit *enquidæ*.
quod & ori grauius est, nec facile corruptum. *enquidæ* quoque, inquit Diphilus, nonnulli *enquidæ*.
enquidæ dixerunt: est quæ cibis grauius leniusque, nec facile decoquitur. 11. Apolectum,
inquit Xenocrates, carne consistit, quam in uinum singulare: & quæ sapient sit non
adeo grauius. Est uero inuicem, inquit, cybia damna, opera fœda, nec facile corrupti. *enquidæ*.
ut. An error sit in exemplari (inuicem pro inuicem) consideranda. 12. Quæ Dorsion de

DE DIFFERENTIIS

*tyrrhenica,
ionica,
oceanica.*

tyrrhenica.

tyrrhenica.

oceanica, eadem fere sacra: Oppianus de maioribus thynnus. nōpe quod ex oceano per E-
fretum Gaditanum ingreditur mare mediterraneum: quo sit, ut plurimum in Thyrro-
Tyrrhenoque mari capiantur ipsa ista aetio passim reliquam mare perorient. Ocy-
porum genera statim videret Oppianus *tyrrhenica & ionica*, qui in alto pelago degit,
atque ad litora accedunt. Ocyrops quoque Aristotelian alto fortificare. 14. Si quis
ea quae hoc in loco afferuntur ex Plinio & Aethiopo conferat, (mea quidem sententia)
si non eadem, at similes certe erunt, paulumque inter se differant, melandryas, apolestias,
oceanicas & xanthias, itonon, synodontis & chelidomas. Hermolai consiliarius est in-
tononem eundem esse, quem Graeci chelidontiam vocant: apolestia vero, quam cyno-
donta. Athenaeique sensum explicat aliter atque nos reddidimus hoc scilicet paula,
Maior pelagus synodontis appellatur, duntaxat quoniam chelidontiam, licet paulo post, Ocy-
rops similia est chelidontae cum magis est: Aethiopus vero, in nostris saltem co-dic-
ibus ita habet, *ὅς ἂν πάλαι μελάνδριν καλεῖται καὶ αὐτὴν ἰόνικον τὴν πελαγονίαν καλεῖται*. Et paulo post, *ὅς ἂν ἰωνίαν καλεῖται καὶ ἰόνικον τὴν πελαγονίαν καλεῖται*. In maiora consilia utere lesbo.

De fassamentis.

Cap. CLXXXVII.

*Sassamentum.
Sassa.
Thynnus, s.
tyrrhenus, i.*

Proferre uideretur hic locus, ut de fassutis aliqua dicamus. Salis facultatem
tradunt medici compositam esse humores etenam corpori excrementi-
tios digerit extenuatque & corpora ipsa in sese coit atque condensat.
Quae igitur corpora sua natura sunt sicciora, haec (cum supra diximus) sale as-
persa redduntur ob nimiam siccitatem cibo inepta: quorum uero caro dura
est & excrementosa, ea ad fassamenta erant idonea. Excrementosa autem vo-
co, quae succum in sese continent pituitosum undique conspersum: & haec
quidem quo facit copiosior crassiorque, eo melior caro, si sale adseruatur,
eundem. Quorum autem mollis admodum fuerit, aut impenitus sicca caro, ex-
crementosumque expert, ut saliantur inepta sunt. Mollum itaque carnum
pulce si quos *μαλακίζουσι* vocant) & qui excrementis uacant, ut fassamenta. G
ex illis fiant, minime sunt idonea. Huius generis sunt, qui laxatiles uocantur
atque asselli, qui in puro mari degunt, sed neque multi, quod dura sit cor-
num caro excrementisque uacua, sale inuetera uaur. At coracina, mylla, pe-
lamides, & praeterea sardae sardinique, & quae sexitana uocantur fassamen-
ta, atque id genus alia. Ad haec inter ea quae in puro mari degunt, quae *μαλακίζουσι*,
id est cetace uocantur, ut balenae, delphinae & phocae, cum sale conduntur,
euadunt meliora: aut quae carnem habent excrementitiam omnia. Huic ge-
neri proxime accedunt magni thyni, quos melandrias, itononae, chelidontae. H

*Sardina.
Sardina sal-
samentum.*

*Sardina sal-
samentum.
Sardae.
Mylla.
Mylla.
Sardina.
Tyrrhenus.
Tyrrhenus.
Tyrrhenus.
Tyrrhenus.
Tyrrhenus.
Tyrrhenus.
Tyrrhenus.*

isque uocari diximus sale nōque cum conduntur, euadunt se ipsis melio-
res. Praestantissima autem omnium, quae mihi certe expetiri licuit, inquit
Galenus, sunt quae à ueteribus medicis sardica uocantur fassamenta (hodie
sardae uocantur), & qui nunc ex Ponto afferuntur mylla. Secundum uero ab
us locum obtinent coracina, pelamides, & quae sexitana uocantur. Haec Ga-
lenus. At Diphilus myllo coracinū in omnibus praefert ut qui sub pinguis
est, bene carnosus, succi non omnino malisfacile & concoquitur, & in cor-
pus digeritur, abunde quae natum. Quae cybia dicuntur atque horza, inter ma-
iora fassamenta praestantissima sunt, ut inter pinguis cordylae, & quae *σινο*
i. *σινο* uocantur. Porro thynnium aut Diphilus ex pelamide maiore fieri:
cybia uero atque horza (quae eiusdem sunt generis) ex minore. Et thynnium
quidem

- A quidem uetustate eundant meliora recentibus acrioraque; & precipue Bizantina. Qui circa Gadram insulam capiuntur orcyini, pinguiissimi sunt, ut supra ex locis autoritate indicauimus. ex his elidia sorsum cōduuntur sale, & melandryx quoque uetram abdomina ipsa (quæ *Amelodyx* uocant) pinguis, ceteris paribus suauitate præstant, uel eodem autore: & elidia hæc ipsa superat. Diphilus quoque orcyini abdomina, & elidia sapore grata, & tenera prædicat: & quæ *uina* dicuntur, sale adseruatas me diocrotes esse: quam Xenocrates carum ipsam orcyini stomacho ingrati esse tradit, malique succi atq; aridam. Salsamenta omnia quæcunq; ex sale duriora euadunt, ac uelum nervosa coriaceaque cōcoctu sunt difficilia: ut contrà, quæcunq; extenuatis digestisque à sale crassioribus lentisque crementis tenuum redduntur paruum, eadem ipsa in cibo crassios ac glutinosos humores extenuant. Quæcunq; inquit Diphilus, à marinis, lacustribus aut fluuiatilibus salsamenta fiunt, parce nutriunt, aluum ciunt, appetitum ciborum irritant & sitim faciunt. Sunt & seratis piscibus medicina: salsamentorumque cibus prodest à serpente percussis, & cōtra bestiarum ictus merito subinde habito, ita ut ad uelperam cibus uomitione reddatur: peculiari-
ter à chalcide, ceraste, & quas sepas uocant, aut elape dyspædæue percussis. Contra scorpiões largius sum, sed euoni salsamenta prodest, ita ut sitis toleretur. Imponuntur salsamenta & contra morsum canis rabiosi: uel si non sint ferro uisæ plage, corporaque clysteribus exinanita, hoc per se sufficit: & contra draconem marinum ex aceto imponitur: idem & cybio profectus. Fistule aperiuntur siccanturque salsamentis cum linæolo immixtis: intrique alteram drem callum omanem auferunt: & putrescentia ulcerum, quæque serpunt, emplastri modo subacta & illita, parui uero profunt salsamenta cocta. Carbunculos uerendorum priuatum salsamēta cocta cō melle restringunt. Salsamentorum cinis fistuli uasæ combustorum, addita farina marmoris, ad dentium dolores inter remedia est. Aque prodest dicuntur omnium salsamentorum spina combustæ triteq; & alina. Interitus piscium ceterisque, quæ absterenda essent, sale maceratis, sir liquoris exquanti genus, quod garon uocauere, ut sit illa putrescentiū sanica. Hoc olim cōficebatur ex pisce quem Greci garon uocabant: nunc è scombro pefce lautissimū in finibus Carthagini: ad sociorum appellatur: nec liquor ullus pene præter uingenta maiore in pretio esse cepit, nobilitatis etiam gentibus. Scombro quidē à Mauritania Beticâque & Cartea ex oceano intrantes capiunt, ad nihil aliud utiles. Garum, & Clazomen, & Pompeios & Leptin nobilitas tantum huius est alex, imperfecta nec colata fex. Corpue uero garum & priuatum ex iuuili pisciculo minimūq; conficit, aquam nostri, aphyen Greci uocant. Poros uidentis piscem ex quo faciunt, lupum appellant. Sic & alex peruenit ad ostrea, echinos, urucas, camunatos, mulorum iocinera. Garum uehementer calfacit, si Galeno credimus, atque exsiccat: ideoque à nonnullis ad putrida adhibetur ulcera: clysteribus unicuique ad dyfiteriacos cōsedicūmque dolores. Sunt qui precipue cōtra omnia aurium uulua laudent garum exsiccatum sociorum cyathum in calice nouo lenta pru-

*Alia, sed non
rara.*

Garum.

Garum.

Garum pefci.

Garum pefci.

Alex.

DE DIFFERENTIIS

na decoquere: unde & spuma pennis deterfa, poſtquā deſicet ſpumare, & epi-
dum infunderetſi tumeant aures, coriandri ſucco prius mitigandas uide-
re precipiunt. Contra canum morſus prodeſt garum, maximèque crocodili
& ulceribus quæ ſerpunt, aut ſordidis, oris quoque & aurium doloribus
mirifice prodeſt. Et uix medetur garū cochlearibus ſubditum. Alece ſcabies
pectoris ſanatur inſula per eusem incifa: & contra canis morſus draco-
niſque marum prodeſt: in limicolis autem conſerpeis imponitur. Garum,
ut Dioſcoridi placet, non ex ſcombris ſolum, ſed & aliis quoque piſcibus at-
que carnibus conficitur. Hoc alij, niſi ſallor, & aliud eſt muriam dicere. Mu-
ria, inquit Plinius, ſive ſallago illa, ſpiſſa, mordet, extenuat, ſecat, dyſente-
ricis utilis eſt, etiam ſi nome inſana corripit, ut quæ exulcerata ſint ſubae:
iſchiadicis quoque infunditur, ut exulcerationem promit. Iſtu quoque apud E-
mediterraneos aquæ maris uicem penſat, de paſſentia ulcera ſiſit, mor-
ſus à cane medetur: poſſimum autem ſilurorum ac menarum muria me-
dici nonnulli uentur, quæ etiam interdum ad oris ulcera accommodatur.
Hæc obiter indicata ſint: modo ad inſtitutum opus reuertamur.

Garum.

Muria,
ſallor.

Trigloporus.

Trigloporus.
Platichthys.

Platichthys.
Myliuſ.

Muria uel
muria.

1 Salis naturam ſuſius explicant Dioſcorides & Plinius. 2 Sticcoris cuiuſdam
piſcis, & qui externæ pinguedinis ager, meminit Dioſc. & alijs quoque uocat. Et Nume-
nius & Morio & alijs quoque dixit. Galenus item ex Philoſtracho dicit & carum piſcem trachin-
em eſſe dicendum & eundem à nonnullis vocari prodidi. Xenocrates. Nō idem, ſed
alius uidetur apud Oppianum platichthys qui inter eos piſces numeratur, quos apud li-
tore arenolo uiduunt. 3 Sardica ſallago (opino) ſa ſide, quæ dicta eſt pelamus
longa, quæ ex oceano uenit. 4 Myliuſ, quæ & myli) uocatur & gnondia, & pla-
tiſſici: qui enim in hoc genere ſunt maximus, ut & morio dicitur: qui uero media ſunt
maxime, ut & morio dicitur. Myliuſ apud Oppianum inter eos
piſces numeratur, quos uero ſaxa nuda uerſantur. 5 Caruſ ipſam, &c. Reſe item
numum carum intellexit Xenocrates: & partes ſolum illas, ſortitus quas Iſcius me-
liſſidrys, Diſchus colas uocant. 6 Graeci opungant genus ponant, quod hamu-
tum, hoc eſt ſanguiculum appellant, ex inſellus thymi cum beſachus, ſaxæ & cruo-
re. Muria non eſt inſellus, ſed ex thymo ipſo ſec conficitur, Annapelluſ, Thun-
ni, inde uero Platichthys nobilitans (ut inquit Plinius) quæ inquit muria ſive morio. Ca-
toni, Palladio, Columella, non loquuntur ex piſcibus, ſed ſallago ſiſtinam ſigni-
ficat. Hæc Hermolaus. 7 Aleæ neutro duntaxat genere, inquit Hermolaus, ſed Pl-
nius alecem ex mullo cum iſcio dicit.

De ſcombro, colia & amia, & alijs quibuſdam qui ſale
adferuntur. Cap. CLXXXVIII.

Scomberus.
Scomber.
Trigloporus.

Colia,
ſallago.

Hiſpaniæ cetarias ſcomberi replens, thynnus non commercatibus: & Man-
ritania, ut modo diximus, Beticæque & Carthæ ſcomberos ex oceano
ingrantes capiunt, ad nihil aliud quàm ad garum conficiendum utiles. Hiſ
eſt in aquis ſulphureus color, extra qui eſſetis. Scomberi ita ut thynni, coeunt
menſe Februario poſt idus, pariunt Iunio ante nonas. Scomberi diſcedunt à
locis frigidioribus calidioribusque antequam thynni, ut qui imbecilliores
ſunt: ſæpe tamen ſtatu aſtutino uehementius occuſante ſir, ut cum colis &
ſcombris exeant thynni in mare. Scomber minores ſunt quàm colis, ut re-
fert Iſcius. Colis uero magnitudo ſardis æqualis eſt. Colis quaſi lineas
quaſdam habet depictas, nō in dorſo, ſed obliquis. Colis magna ex parte
non

H

3

non

A non subeunt Ponnam, sed in Propontide trahunt ætatem & pariant hyemem in Ægæo. Optimus esse in Propontide indicat Aristoteles anæquam pariant. capiuntur subeuntes Ponnam, exeuntes minus. Verum, ut Diphilus prodidit, principatum obtinet Amiclanus colias, & ex Hispania sextanus: minor enim tenuiorque est & suavior. uel, ut Plinius tradit, colias si-

*Atlanor, ponnæ-
dræ, ætætra-
tæ.
Lætantæ.
Scumbæ.
Colias.*

ue parianus siue sextanus à patria Betica, lacerto rum minima genera: ab us Mizotici. Scombri, ut Icteus auctor est, meliorem in cibo præbent succum quàm colias, & quæ stomacho breui descendit. Colias succum dat leniorem ac mordaciorem quàm scombrius, abundèque nutrit: ut nero Xenocrates auctor est, & scombrius & colias carnem habent non aliter atque thunnus stomacho ingratam, aridam, malique succi, & quæ non facile aluo

*Parian, vel Pa-
rian, suseum;
Læcorus.*

excernitur, atque copiose nutrit: verum colias caro ori minus grata est, minusque succi habet. Scombrius sapore est non adeo ingrato, nec facile corrumptur. situm prociat. Cæca Parium præstantissimi habentur. Scōbri in aceto putrescunt, exstant uoluit strangulatu oppressas. In mari rubro laertus est, cuius magnitudo ei qui nascitur apud nos, æqualis est. Virgatus spectatur: lineis nimirum aureolis circumdatur à branchiis ad caudam pertinētibus, quas media argentea distinguit. ore est hians, maxilla inferior eminet in superiorem. uirides oculos habet, quos aureo fulgore palpebre ambiunt. Eiusdem nem maris serena est pelcis cui nomen phœnix: is nigris li-

*Phœnix.
Hamia, æpina.*

neis, quæ corruet interfecant macule, distinguuntur. Hamia cum thynnus uere in pontum intrant ad dulciora pabula, ætatemque ibi producunt. Incrementum hamia singulis diebus intelligitur. os hamie angustum, sicut & mugilis. Dentes habet ferratos, spissos, præcutos & ualidos, branchias ocultas. Fel suo intestino pari processu annexum continet, sepe etiam replicatum. gregalis est & cauiora: magna etenim ex parte carne uelutur: sed algam etiam tangit nonnunquam. Ad ostia fluminum uersatur, & in paludibus marinis, ubi copia influit dulcis aquæ. Subit & in flumos, ibique prospere degit, sicut & mugilis. Hamias etiam in Alopeco unctio reperies, inquit Aristoteles. Audaces sunt hamia, dentibusque plurimum sedunt: quippe quæ cum sint thynnus imbecilliores, corporèque molliori ac teneliori intrepide tamen cum alias beluas, tum uel delphinos præsertim solita-

*Hamia, vel pa-
rian, non del-
phinos legi a-
pod Oppianum.*

rios & à suo grege oberrantes cateruatim aggrediuntur uulnerantque. Pugnatur, cum beluam uiderint aliquam, colligunt sese: deinde quæ cæteris magnitudine præstant, lustrantes gregem circumuallant. Dentes sunt his ualidi, ut diximus: & iam cum alia belua, cum lamia aggressa, uulnera accepisse uisa est. Piscatoris lineam, si forte hamo teneatur, pertrahit hamia: eicam autem in primis ex ipsa multa pisces expectant. Philotimus hamia carnem duram esse prodidit: & id quidem recte factum cōfirmat Galenus: uerum Icteus tenetram esse, bonique succi, sed modice nutrit. Autumno & circa uergilarū occasum optimas esse hamias Archelstratus auctor est. Trocta

*Trocta.
An uero sit pi-
scis est hamia,
an certe sicut
hæc.*

DE DIFFERENTIIS

scatores contra machinantur longas anfas: ille uero quoniam quodammodo ualeat salu, anfas sepe transiit, ac linea contra, ad alios pestes reuertitur. Hic etiam sui generis grege coacto, delphinum inuadit: adeoque urgente ipso, ut uisum illum lacerent. Delcanum piscem tradit Euthydemus à Delcone amne nominatum, (in quo & capitur) sile conditum, uentriculo esse gratissimum. Dorion uero eundem piscem à nonnullis *αἰθρία λελανία* uocari scribit. Elacarena quoque sallemento idoneus piscis est, octaceus, id est præter grandis. Et callibios sile conditur. alium mouet, & attenuantem uim ob-

Delcanus.

αἰθρία λελανία.
Elacarena.
Callibios.

Adonardula.

Salimella Sereniana.

Σαλπίς.

Σαλπίς.

Πιστις.
Πιστις.

1 Mauritania, &c. Et Scomborata insula dicta est apud Strabonem à *Σκωβρίαις*, qui circa eam capiuntur. 2 Sulphureus color qualis sit, explicat ipse Plinius lib. 3. Pulmonis & fulgura sulphuris odorem habent, ac hoc ipsi eorum sulphurea est. 3 Cor-
P
lian Theodorus non recte, ut inquit Hermolaus, ancedulam uocat. 4 Linea quas-
dam habet de pectus. *αἰθρία λελανία*, ita legitur apud Athenæum, sed aliter legi potest. *αἰθρία λελανία* id est, *αἰθρία λελανία*, ut intelligatur à *δὲ* dorio, uelut in alio piscis genere. Hic Hermolaus. 5 Scutarius, à *Scutis* in Benetia, ex Strabone, Plinio & aliis fere omnibus urbem etiam quidam esse Scutaria non longe à Carthagine nouis (non de salimenta nomen traxerit) prodit Athenæus ex Strabone. 6 Lacertorum genere meminit Plinius: & à Celsio lacertus inter grandissimi alimendi pisces ostenditur quo & sallementum fieri prodidit. Videtur ex Plinio lacertus genus esse, & in his cohan esse minimum. Iohannes Sepmbrum colla minores affirmat. Theodorus solum lacertum uocat. 7 *Σαλπίς* Aristoteli piscis est *γαργαλίου*: carnem habet duricem mollinèque medicamentis, ut Galenus auctor est. in litorebus conolis uisitat, & in saxorum cauernis. Est & *Σαλπίς* piscis similis belone & cestra, auctor Plineus. 8 *Πιστις* *αἰθρία λελανία*. 9 Est & *Πιστις* piscis apud Athenæum idem, an alius? 10 *Πιστις* elacarenem sallementi genus abstrahit, quod melandryum uocatur. 11 *Σαλπίς* hic uidetur Athenæum codex.

De pectrandibus alis quibusdam piscibus, quorum nonnullos etiam *αἰθρία*, id est octaceos uocant quidā. Cap. CLXXXIX.

Χιπρία, Σαλπίς.

Χιπρία.
Ολιδαν.

Γαλεός, Σαλπίς.
Γαλεός.
Τομὸς θυρία.

Cetorum magnitudinem habet xiphias pelagius piscis, ratōque litus ^r
Cadiens. In mari Tyrcheno xiphiaz nauticarū magnitudinem æquante quorum, dum nasant, tertia fere corporis pars supra mare eminentes fertur, ut Strabo auctor est. Rostrium habet mucronatū & rigidum adeo, (ut scribit Oppianus) ut possit durum quatuor confringere saxum: & à quo naues periclitæ merguntur in oceano ad locum Mauritaniz, qui Coetra uocetur, non procul à Lyxo flumine, ut Trebius Niget auctor est. Rostrium hoc, ut ^H
inquit Aristoteles, partem habet inferiorem parua, superiorem magnā, reliquo corpori longitudine æqualē, osseum hoc & *πίσος* uocatur, id est gladius. Piscis edentulus est. Branchias habet octonas, cāsq; duplices, sed à re-
eore semotum. Agitantur xiphiaz a silo circa canis exortum: habent enim per id tempus sub pinnā cea uermiculum, quē *αἰθρία*, id est asilum uocant, ut de thynnō supra diximus. Inest hic tūc dolore xiphiaz, ut interdum in terrā emittit xiphiaz, & uel in nauigia sæpenumero incidat. Galeos quoque uocatur xiphiaz & *θυρία*, thynnorum uenatione pinguis cit. Verum & alios persequitur pisces galeos, sed pestanacam præcipue. Tomum thuri-
anum aliqui xiphiaz uocant, inquit Plinius. ut uero Athenæo placet, thuria-

A num vocatur caniculae marinae frustum. In frusta secatur xiphias. carnem habet aridam. concoquitur difficulter: sed plurimum nutrit, sicuti & ceteri grandiores pisces omnes, ut inquit Macrobiius, qui à quibusdam (quod in frusta secari soleant) *nam* vocantur, ab aliis pelagij: sunt enim id genus omnes concocti difficiles: qui tamen, si recte conficiantur, plurimum exhibent nutrimenti. In cibū sinapi conditur xiphias: est enim sapore ingrato, uiroso: eius abdomen ceteris paribus praefertur. Marinus grus Corinthiaci maris alumnus ad quindecim pedum magnitudinem crescit. Eius caput & os alitis gruis similitudinem gerit. Squamæ gentilis avis ei similes sunt. Tanto in salsiendo robore est, ut tanquam emissum à contento nervo relum feratur. In maximo Caspae lacu oxyrynchi ab acumine rostri nūc

Turris xiphias.
Pelagij pifces.
Grus marinus.

B pari magnitudine octo cubito totum procreantur. Eos Caspij captos distringunt: & muris conditos atque exsiccatos vendunt simul etiam adipe detracto, farinas ex eis conficiunt, atque exempta ex iis viscera excoquant unde ad permultos usus accommodarum sit glutinum, quod & firmissime adhæret atque conglutinat, ut difficultate dissolvatur. Oxyrynchus Nili alumnus ex acumine rostri nomen trahens, illic venerationem & religionem habet: ut piscatores valde timeant, ne quādo is piscis apud eos facer & magna religione praeditus capiatur. Oxyrynchus quæ mare rubrum profert, ore est prelongo, oculis ad similitudinem auri fulgentibus, eius dorso signa pallidioris insignita sunt. Pinne priores illi nigrae existunt: quæ vero sunt in dorso, albæ, cauda proluxa & viridis, quam mediam aureola linea intersectat.

Oxyrynchus.

C Ichthyocolla appellatur piscis ceticus, cui glutinosum est coriū idēq. nomen glutino eius: quidam vero ex ventre non ex corio fieri dicunt. Laudatur Ponicæ, candida, maxime scabra, carens venis squamisq. quæ celeriter liquefcit. Epimachidas rostri emplastris capitis utiles, & iis quæ ad lepras apponuntur, & teranochris, quæ cutem facies erugant & extendunt. Silurus quoque in Nilumeta venit, piscis anni ætate mari communis, sed maxima ex parte fluviatilis. In Nilo thynnus magnitudinem æquat: quāquam alibi quoque quā in Nilo natus. Silurus grassatur, inquit Plinius, ubiq. 3 que est, omne animal appetens, equos innatantes sepe demergens: præci-

Ichthyocolla.
Quoniam modo
liquescit ac pa-
ram dicitur de
est Plinius lo-
co.
Silurus.

4 que in Mæno Germanæ amne, & in Danubio. Mari extrahitur porculo D marino similis. Et in Boristhene memoratur præcipua magnitudo, nullis ossibus spinisve interstitis, carne prædulci. De siluro ita cecinit Ausonius,

In Mæno, aliq.
legimus Rhe-
na, vel in Aeno

Nunc pecus æquoreum celebrare magnæ silure.

Quem velut Actæo perductum tergora olivo

Amnicolam delphina reor. Ersequitur,

Talis Atlantico quondam balena profundo

Cum vento moeuiæ suo telluris ad oras

Pellitur, exclusum fundit mare, magnâque surgunt

Æquoræ vicinisque timent decrescere montes.

Hic rament hic nostræ mitis balena Mossellæ

Exitio procul est, magnâque honor ad datus amni.

5 Qui silurus à Plinio, glanis ab Aristotele dictus est. Glanis branchias habet

DE DIFFERENTIIS

utrinque quaternas, cūque duplices, nouissimæ excepta. sed continet lecori E
 anserum. Cuius parit, continenter emittit suum sortum, continuoque si-
 lo sibi coherent, ut rana. Parunt glanes grandiores altiore gurgite: qui-
 pe cum nonnulli sex pedum altitudine portant, maiores breviorē contemni-
 ſunt. præcipue ad radices salicis aut cuiusvis arboris, atque etiā inter
 arundines & algas muscolanæ congeriem. Cū ceteræ formæ in studio
 excludunt, si mas aragistardissimum tamen glaneos incrementum ex ovo
 est. Quamobrem mas quo in loco plurimus sternas confluerit, perſeuerans 7
 oua custodit, ne à piscibus occurrentibus abſumatur idque vel ad quadra-
 gesimum & quinquagesimum diem facit. donec facis iam uicta soboles se
 rueri à ceteris piscibus ualeat. Deprehenditur sæpe à piscatoribus, ubi oua
 custodit: dum enim anser pisciculos quærendo profiliendoque, ædum so-
 nūq; mouet. Manet apud oua tam ardente animo, ut cū sæpe à piscatori-
 bus oua, quæ per altos gurgites subsidunt, educantur quoad magis fieri po-
 test in uadum, ipse tamen eodem studio se quatur: neque desistere usquam
 paritur. Er tunc quidem si maior natus sit, minisque uia exercitatus (ut nō
 nunquam accidere solet) facile hamo capitur: sed si peritis & hamis affue-
 rit, morsu dentis sui durissimū ramis hamata & sortum assidet custo-
 dit: uel ut Plinius refert, qui glanis uocatur aut scos mordet hamos, nec de-
 uorat, sed efica spoliat. Cū ceteri pisces omnes mares suis feminis sint præ-
 stantiores, glanis femina præstat suo mari: dāmanatur tamen, cum uterum
 gerit. Canis exorta potissimū (quod sublimis naret) sydenatur glanis: & to-
 G nertuo sopitur magno. A dracone angue, gurgite parum alto ictus nonnū-
 quam interficit. Siluros si recens edatur, probe nutriti & aluum emoluit filo-
 9 rus ē iure: sale uero conditus, minimum suppeditat alimenū. Arteriam ex-
 purgat, & uocem adiuuat reos salutaris in cibo, infusa corpori spicula ex-
 trahit saliti caro trita atque imposita: uel, ut Plinius habet, siluri fluuiacilis
 carnes impositæ siue recentes siue salis, tela corpori inharrentia extrahūt.
 Muria eius incipientibus dysenteris prodest, si in ea insidentes foueantur:
 fluxiones namq; ad externas partes euocat. ischiadici infusa medetur. Vel,
 ut tradit Plinius, ischiadicos liberant salsamenta ex siluro infusa, clystere e-
 uacuat prius aluo. Siluri fustina, præcipue Africi faciliores parus fieri di-
 cuntur. Glanidi qui in Danubio gignitur, similis est piscis latus nomine:
 Ex hoc genere, qui in Nilo fluuiō proueniunt, ea magnitudine inopemur. H-
 tur, ut ducentarum librarum pondus impleant. Piscis est carne & candidis-
 10 sime panis & lumnissima, quocumque appareat modo. Præstantissimum
 esse in Italia latum circa tractum Scyllum tradidit Archestratus. An-
 taceum piscem grandem (ceteri Herodotus uocat) in salsamenta præbet Bo-
 risthenes fluuius, delphini magnitudine, nullis ossibus spinisue interstitis.
 Corio (uti sunt) adeo aspero regnat, ut eo perpolantur hasta. Scortum
 condiuntur sale maxilla & quæ circa palatum sunt antaceorum partes, ut
 quæ alis partibus suauitate præsent: licet ex orpyno quæ cladia dicuntur
 & melandryæ. Antacea in glacie coniecti nonnunquam effodiuntur, ut
 Strabo auctor est.

*Hoc de siluro
 Plinius,
 Sydenatur, d-
 quæ dicit p. 11.
 114.
 Supra, cap. 1.
 114.
 Silurus.*

Latus, Antac.

*Antaceum,
 Antacum.
 In siluro quod
 dicitur, ceteri
 eorum prode
 Antacum.*

- A** 1 Xiphias, &c. Gladium interpretatur Theodoras, cetaceūque vocatur. 2 Gladius
 quibus modis capiamur docet in Scribo lib. 3 de pisc. 3 Silurus
 quorū dicitur à dno Ambrosio in Hieron. 4 Mar. extrahunt. habundē silurus, ni
 fallor, sed alius à plectonita etiā scribitur. fuccus lectus planatus, cōstitūti bus vel
 antiquis omnibus codicibus, quos equidē videram. Nam q. quōd à nōnullis legitur hoc
 plectē & in Danubio Maris extrahuntur plecto marmo similimus, mera coniectura. *Mora*,
 mihi certe videtur esse neque enim exemplar ullum accitum, eorum quae mihi viderē
 contigit, tale quippiam indicat. Neque maris plectis nomen, quod & iam, apud alios
 habetur auctorem. Glanis autem qui in Danubio hērōne legitur, meminit Arhe-
 ngor lib. 7. Beluas quoque pignoras quasdam scribit Pausanias in Rheno & illo ga-
 gni, quibus nomen nō audidit, sed forma simile esse tradit glanibus, quos Herme &
 Meandro procreantur, excepto colore nigresce & corporis robore, in quibus glanis
 inferiores sunt. Alitans vero prodrū glanem piscem, incolit Meandru & Lyci Alano-
 rum fluminum, & Europae Scythorum, siluri speciei similitudinemque generatimque
 quae storum siccum amantissimum esse, marem silurē qui foras affluit ab aliorum
 piscium inanis metur atque seruat. Si quis horum auctorum loca diligenter cōferat,
 videbitur eadem esse belua apud Pausaniam, cui nullum nomen ab eo est in dno, cum
 eo qui silurus vocatur ab Alano, & qui silurus est grassior Plinio, & voras D. Am-
 brosius & nem glanis Achenas. Alius deinde est silurus, qui man extrahunt plectulo
 marino similitis & in Bonifherie memoratur, &c. Et qui ab Aufonio deservitur: atque
 fortasse idem qui Amareus Herodoto & Straboni, de quo infra. 5 Glanis, nō sil-
 lor, alius est, ut qui maris est, nō fluviatilis. De glani non memini legisse quiddā ma-
 rino. 6 Sex pedum altitudine. *Emys* dicit Aristoteles, quod Theodorus ad-
 didit trum piscium altitudine, id est, quindecim pedum. 7 Om. cōstitūti. Plinius
 lib. 9. Silurus mas solus omnium edna cōstitūti oua, expe & quinquagenu diebus ne
 abstinent ab alim. 8 Hamus affertur, *ἡμωσφόρε*, id est, hamos ante edena. 9
 Silurus, &c. Hec non Silurus, sed fel attribuit nonnulli, *ἡλας* non *ἡλῆς* legentes.
C apud Dioscoridē in de forficis piscibus, quid apud Galenum lib. 31 de simpli. med.
 facilius ea habeatur, *ἡλῆς*, id est, felium salūm carnem totam atque impositam
 spicula arca habere infixa trahere aliis. Quo quidem in loco ego ponis *ἡλῆς* quā
ἡλῆς legem (facili sunt scriptoris lapsa) vel ex Paulo Aegineta, qui in litta 2. hec
 habet de siluro, non de eluro. 10 Quod Herodotus *ἡλῆς* dixit hoc modo ca-
 pisse Plinium & de eodem forficis plecte in libro.

De aliis quibusdam fluminalibus, & lacustribus piscibus. Cap. CXC.

- S**unt & in quibusdam amnibus nonnulla praedictis haud minores: Elos
 in rheno, Actius in pado inertia pinguescens ad mille aliquando libras
 cathenato caput hamo, nec nisi boum iugis extractus. Atqui hūc, uti dixi-
 mus, minimus appellatus clupea venam quandā eius in faucibus mira cu-
 pidine appetens morfu exanumat. In Gēge Indix plataniſtas vocant, rostro
 delphini & cauda magnitudine autem quindecim cubitorum. In Ataxi gi-
 gntur piscis grandis, qui à Celsus scolopidus dicitur. hūc augescēte luna ca-
 didus, amminuta vero riger omnino est: qui cum septa iuliam excreuerit
 magnitudinem, à suis spinis interit. In huius capite lapis inuenitur chōdro
 similis, qui sebecus quartatis modici traditur. In Aquitania salmo fluvia-
 tilis marinis omnibus praefertur, de quo Aufonius in Mosella,

Nec te pumero rutilantem uisere salmo
 Transietim, late cuius uaga uerbena cauda
 Gurgite de medio summas referunt uti undas,
 Oculis placido cum prodiit aequore pulsus.
 Tu locatus squamosus pectore frontem

DE DIFFERENTIIS

Lubricus, & dubius facturus fercula cornæ
Tempora longarum fers incorrumpere motorum:
Præsignis maculis capitis cui prodiga natus
Aluuat, opum atq; fluens abdomine uener.

Et quoniam in Mosellanos Aufonii poetæ pisces incidimus, age uero, quæ de aliis quibusdam fluuiarilibus cecinerit, uideamus,

<i>Cypri.</i>	Squamens herbosus capito inter lacer arenas Viscere præteritis fartum congelbas anclis, Nec duraturus post bina tribonia mensas Purpureisq; salar bellas tergora guttis. Et nullo sperat nociturus acumine rhedo. Tūque per obliqui fauces ne rare sarani, Cum deflueris famæ melioris in annem Liberior, laxos extores barbe natatus Tu melior peiore æuotibi contigit omni Spirantum ex numero non illaudata senectus.	1
<i>Salar</i> <i>Rheda,</i> <i>Barbas,</i>	Hic etiam Latio risus prænomine cultor Stagnorum, querulis uis infestissima ranis, Lucius obscuras ulua cernōque lacunas Obsidet hac nullo men sarum lectus ad usus Feruēt fumosis obido nitore poplinis. Quis non & uirides uolgi solatia rhocas Nont & albumos prædum pœnibus hamis Tōque inter species geminas neutrumque & utrumque, Qui nec dum salmo, nec iam salar, ambigūque Amborum medio sarno intercepte sub æuo.	F 1
<i>Lucius.</i>		
<i>Times.</i> <i>Albumos,</i> <i>sarno.</i>		G 1
<i>Cyprius.</i> <i>Cyprianus.</i> <i>Cyprianus.</i>	Ex fluuiantis & lacustris cyprianus est, ut Donon author est: qui & cyprianum hūc piscem appellauit, sicuti Oppianus cyperinm. Gregalis est, ipsa molus & carmuoruan arenosis locis uidetur. Brachias habet utrinq; quatuor, easque duplices nouissimæ exceptu palatum illi carnosum admodum est & molle, ut nasi diligēter inspexeris, lingua ad esse uideatur: Cypri ni quinques aut sexies anno partum faciunt. Vada petunt cum parturiūt: ac sex numero singulas feminas, mares ueldecim aut quatuordecim sequuntur. Mox sexuana oua procedendo emitit, & mutans continet parit: H	
<i>Phoxinus, sexies</i> <i>Cyprianus, quatuor</i> <i>partum.</i>	quo sit ut dissipari oua necesse sit, uidelicet ea quæ non in materiam inciderint aliquam: sed cyprinus tunc ea custodit, cum congesta repererit. Post glaciū tardissime augentur cyprinorum oua: augentur tamen quæ mares custodiunt ad milij magnitudinem: sopitur quādoque cypinus conitruo magno ut glanis, sed leuius. Inter amicos pisces, steriles annotantur; carini & balaga, qui nec ouum nec semen ullum prolificum unquam habeant. Balero & tilons lumbricus canis exortu innascitur, qui debilitat coque ad summā aquam efferri, quæ aestu intereunt. Phoxini inter fluuiatiles pariunt, ut percæ in ariditatem, an fluuioꝝ & lacuum paludibus, quos	
<i>Cyprianus (ciprianus) mares.</i>	phoxinæ uocant, quæ scilicet propè fluuios aut lacus stagnantes.	
<i>Carini.</i> <i>Balago.</i> <i>Balero.</i> <i>Balagus.</i> <i>Tilons.</i> <i>Phoxinus.</i>		

uero

A vero statim fere ut natus est, & admodū parvus adhuc oua habet ut liqui-
do appareat oua illi inesse uel absque corpore. *videtur* fullonem uocant grega-
lis hic est & partus tempore penes horas tranquilliora. Sunt in fluuiliis pisci-
culi quos *ἀστὴρ* appellant. hi sub saxis stabulantur. Capuntur autem à non-
nullis si xopercusso sub quo latent: protinus enim excurbantur, ut qui au-
diant, & caput per strepitum teneantur. Piscem thymalum à thymi odo-
re sic nuncupatum. Tectus fluuius Italice procreat. is ad cubiti magnitudi-
nem accedit lapi & mugilis mediam specie similitudinemque gerit. Eius
capiti nō qualis ceteris piscibus odor est sed thymo similem recens colle-
cto odorem reddit. Non alia fere esca quàm culice, illa quæ homini nocte
diēque infesta est, capitantur qua sola fere delectantur.

1 Capito, &c. Cephalum interpretantur nonnulli capitonem, uerum rectius an-
B leas, nondum certum est. 2 Sarno, alius sarno. 3 Carin & balagi, & c. ita legit
Theodorus Græca autem exemplaria habent, sed mendose, *καρὶν καὶ βαλὰγι*. 4
videtur, &c. *τροπὴ* à Donato uidetur piscis, & eius decedente macula omnes fordesce-
re dicitur: an idem? 5 *καὶ σαρ*, &c. Coetum uocat hunc Theodorus, nomine *σκαῖαν*
mutato *εἰ* & *αἰδῶ*, qui Numerus apud Athenienses gubis fixatus est. Ego uero arbi-
tror non esse eandem piscem *αἰδῶ* cum *αἰδῶ*. *κίττα* enim sunt apud Athenienses lib. 3.

De Nilotactis piscibus, & aliis quibusdam ignotis. Cap. CXCII.

Piscēs in Nilo Ægypti fluuio plurimi sunt ac diuersi: sed maxime noti
sunt, ut inquit Strabo, Oxyrynchus & Lepidotus (quos cōmunis omnium
consensu Ægypti decorum loco colebant) Latrus, Alabes, Coracinus, *οἰστῆρ*,
C id est porcus, Phragorinos, qui & Phagrus, Silurus, Thriss, Mugil, *ῥαπῆν*,
2 Dilichnus, Physa, Bos. Addūtur præterea ab Athenæo, *Μαροῦς*, *αἰστῆρ*, id est
Torpedo, Simus, Synodontis, Electris, Anguilla, Abramis, Typhle, aliq̃
plurima. His adiungimus quorūdam aquatiliū apud auctores posita no-
mina, quorum differre nunc insignes aut nullæ aut pauce admodū repertiū-
tur, Aloperias. Attheus piscis castitate insignis, qui postea quàm cum pari
suo tanquam cum uxorē quadam coniunctus sit, alia non attingit. Aspar-
gi pisces marini, hyeme conquireunt & latentiorē progrediuntur ad pa-
scua. Basiliscos in saxis nudis uiētuar, ad est quæ sine herba algæ ueraciter
Beon, *βοῦν*. Bogyrys in scopulis uiuit: Cynolectia, Cynops, uel Cyno-
pus. Claria piscis litoralis, in locis cernosis degens. Etelis & squamosus est,
D & oua parit. Eleginus, gregalis est, lapes, Liparis, Lamyrus: Mendelius pi-
scis (ut uidetur) ad salisamenta idoneus, Marinus, Morys, Mythus, uel My-
stus *μύστος*, id est papauer, piscis marinus & gregalis. Olophagi, aliis opso-
phagi in fissorum cauernis degunt. Phyea, Parus, Phytarus, Rhacinus, Pal-
lus. Scepanus in iuoribus degit cernosis Scepinus, quē Dorion Aragenum
uocauit. Scarris petrosus piscis, circa nuda saxa degens, Taulopias, Turpe-
na, Thacis, Theila, Teragus paruus, Vrena piscis, Vna. Vna marina, inquit
Plinius, in uino putrefacta, us quæ inde bibent, ædium uini affert.

1 Lepidotus, &c. Lepidion est apud Athenienses an idem, an aliud? 2 *Μαροῦς*, *Lepidon*.
&c. In Ponto inueniuntur multi pisces, quæ à Maro de palude nomina sortiti sunt: uerum
hec maxime Nilotactis est: qui uel *Αἰστῆρ* rectius, adueniente enim Nilum peruenit,
aque percurrente praesentant.

DE DIFFERENTIIS

De piscibus mira.

Cap. CXCII. E

Luna.

Pylorofolius.

*A Theophrasto
lib. in lib. de
piscib.*

Pomorus.

*Cucumis
Maritima
Oculus.*

Demonstramus piscem quendam formæ pulchritudine eximium dicitur appellari lunam, exigua magnitudine, lata figura, colore cyaneo: in dorso pinnas habere molles & leues, easdemque in natido explicare, & ad similitudinem lune semicirculi effigiem: simul & ipsum cum est plena luna, tum impleri, tum implere. Nempe arbores, si ex his ullum appendens decrefcente luna, exciderit atque iacere ac si ad plantas admoventis, eas marcescere & evanescere. Si iam plena luna in id aquæ, quod in perfossis puteis reperitur, quis hunc piscem iniecerit, aquam lugem & perennem fore sin extrema luna, aquam evanescere. Quod si hanc eundem in fontem scarificum conieceris, quo modo diximus de putore, ad rationem lunæ, modo evanescet, modo implebitur. Phylam Aegyptii piscem novum habere ferunt, quando luna augeatur & diminuat, cuiusque secum luna pariter decrefcente pariterque augeat corporisq; habui modo esse opimo, modo gracile & tenui. In Lucino tantum lacu piscis est, qui octonis pinnis natat. Piscium genera eximium à Theophrasto mira produuntur, circa Babylonem irrigua decedentibus fluviis, in cavernis aquas habentibus remanere quosdam inde exire ad pabula pinnulis gradientes, crebro caude motu contraque venientes refugere in suas cavernas, & his obertos stare capita eorum roræ marinæ similia, reliquas partes gobionum branchias ut ceteris piscibus, circa Heracleum, & Toronem, & Lycum amnem esse multissima. In Ponto unum genus esse, quod extremas fluminum aquas seferat, cavernaque sibi faciat in terra, atque in his vivat, etiam reciproci amebus siccato litore effodi ergo: motu dentum corporum vivere eos approbant. Circa Heracleam eandem eodemque Lyco amne decedente, & circa Tium Ponti Mælesiorum coloniam, ovis relictis in limo generari pisces, eisdemque effodi, qui ad pabula preda palpitent exiguis branchias. Eadē in Pontis regione apprehendi in glare piscium quosdam, maxime gobiones, non nisi putarum calore vitalem motum facientes. Idem tradit in Paphlagonia effodi pisces gratissimos cibis, verrenos altis serobibus, in his locis ubi nulle stagnantesque: & varia horum genera in terra defossos reperiri, immobilesque vivere prodiit Aristoteles. In Hyphalide Indis flumine piscis esse narratur, pomorus nomine: crassus quibusdam ocellis, squamis versicoloribus, cauda aurea, in quancunque voluerint partem vertit. In mari quoque piscis cucumis est, in colore & odore cucumeri similis. In Cyzicena chalcus piscis frequens est, orbiculari specie. Qui orebis vocatur, rotundus est & sine squamis, rotundusque capite conditissimum esse piscis consistit. In mari rubro sive Arabico piscem Leonides Brizius gigni ait, gobio ætatis perfecte magnitudine nullo inferiore, nullo oculos nullumque os habentem: more tamen piscium branchias his innatas esse: capitis figuram, & si minus expressam, coniectari posse, infraimum ventrem formam quandam levis contractam in suam apparere, que smaragdi colorē reddat hoc si oculorum loco & ovis esse idem ait. Captus cum primum est extra aquam, inflatur. Et si quis etiam nunc viventem in mare velit relucere,

superstat

A supernas morte inflat uero uellicis quocirca Leonides ut ab affectu physici *Physiologiae* salum appellatum esse. Hunc si quis gustauerit, statim acerrimas dolores premittit: deinde etiam perire dicitur. Miracula quaedam dira Ctesias in Armenia scribit esse fontem, ex quo nigros pisces illaco mortem afferre *Physiologiae*. in cibespod & circa Danubij exoritur audiri, uocit Plinius, donec ueniat ad fontem aluco appositum, ubi finem id genus piscium. Hoc idem & in Lydia in stagno Nympharum tradunt. In Arcadia ad Pherecum aqua profuit è satis styx appellata & esse pisces paruos in ea tradit Theophrastus lethales & ipsos, quod non in alio genere mortiferorum fontium. In Africa feruentis aquae lacus esse existimant, in quo pisces & uicere & nare dicuntur, & ad obsecum cibum assilire: si quis in frigidam eos misce

B cerit, perire. Haftenus de piscibus dixisse abunde est: sequitur ut de cetis praeceptamus.

De cetis.

Cap. CXCIII.

I Nter aquatilis peculiaris quidam natura cetaceo generi est, ut delphinus, balena, & quaecunque alia ex his fistulam habent: cū & mare accipiūt *Cetis, cetacei, fistulae*. quemadmodum pisces, pedibusque careant, & cibum in humore capiant: aërem uero spirant ut terrestria, ut quodammodo terrestria sint & aquatilia. Hoc genus neque pilis integritus alio uero more, quae animal generant, neque pedes habet illos. Branchias non habent certe, sed fistula us data à na *fistula, nares*. Cura est, qua humorem quem unā cum cibo recipiunt, excere possent, quemadmodum pisces per branchias emittunt: ea uero prope cerebrum sita est, delphinus quidem à dorso, balena uero à fronte. Mammas habent cetæ in aequatili genere & haec: id quod in delphinis manifeste à nonnullis perspicuum est. Delphinus testes habet intus conditos, & qui ad alium necessarius. Pulmonem habent omnia cetacea atque respirant: ideoque cum dormiunt, edita per fauces aëporis fistula dormiunt, (quā etiam spirant) pinnae suae mouendo leniter. Et quidem uisus est delphinus dormire rostris emerso, ac scire. Pel habent omnia, excepto uno delphino. Nullum ex his oua habere cernitur, sed statim sortem concipiunt, ex quo reducto in formam animal conficit, quemadmodum homo & quadrupes quæ animal parit. Cocundi modus omni cetaceo generi idem quæ piscibus est: supinus Denam admodum partibus rem peragunt: nec parum multumque temporis, sed medio cre in coitu ipso consistunt: & paulo quam pisces diutius in coitu morantur. Cetacei, prope omnes, (quemadmodum pisces cartilaginei) maiores pisces resupinati corripunt: habent enim os subter: unde fit, ut periculum minores pisces facilius possint euadere: alioqui pauci admodum feruarent: quippe cum delphinus celeritas atque eundi facultas miræ esse uideatur. Beluæ omnes marinae, quæ ingenti sunt mole, (exceptis cetibus) & tardius se mouent & usu sunt hebenore. Duram habent carnem: cetacea omnia & excrementosam, praeque succi. Atque recensetur a cetis, si optime concoquantur, crudi succi plurimum in uenis congerisse: quodque cibo omnino inuisus habetur. Quamobrem ipsis facile consistere in cibo

Et. iij

DE DIFFERENTIIS

utimur: na enim fit, ut alimentum quod ex ipsis in corpus digeritur, & tenuius reddatur, concoctionisque & sanguinis generatio accommodatur. Iuba in uis uoluminibus, quæ scripsit ad C. Cæsarem Augusti filium de Arabia, tradit ceros sexcentorum pedum longitudinis in flumen Arabæ uersas: se pinguique eius negotiatores & omnium piscium adipe camelos perungere in eo litant, ut asinos ab his fugeat odore.

1 Prope cerebrum, uti de ibi pateret potius legendum cenleo, quàm uti, id est ante cerebrum, ex ipso Aristotele de delphino, qui non à fronte, sed à dorso fissili genu: quæquam lib. 4 de part. animalium, & de respirat. habetur non uti, sed uti de uisualium, id est ante cerebrum.

De delphino & phocæna.

Cap. CXCIII.

Delphinus.
Delphin.
Delpha.

Mansuetudine, amore, celeritate, forma atque robore, non in hoc tantum cetaceo, sed in omni marino genere, reliqua facile superat delphinus: plurima enim narratur indicia morum placidorum ac mitium, & amoris quoque in pueros. Ceterum habet uocabulum, inquit Solinus, quo accepto, uocant eis sequuntur nam proprie Simones nominantur: nomenque Simonis omnes miro modo agnoscunt, malumque ita appellari. Hominis amicum animal delphinus, obuiam nauigis uenit: alius exultans, centat etiam, & quantis plena præterit uela. Et, ut cecinit Ouidius,

Vndeque dant saltus, multaque aspergine rotant.

Emerguntque iterum, redeuntque sub æquora rursus:

Inque chori ludant speciem, lasciuque iactant

Corporatæ acceptum patulis mare natibus efflant.

Velocissimum omnium animalium, non solum marinorum delphinus, sed ocyor uolacret, acrior telo: ac nisi multum infra rostrum os illi foret medio pene in uentre, nullus piscium celeritatem eius euaderet. sed affert moram prouidentia nature: quia nisi resupini atque conuersi non corripiant. Certe est delphinus: neque branchias habet ut pisces, neque ouum, sed animal generat, & fissulam ad dorsum gerit. Dorsum illi repandum, rostrum simum. In dorso cultellata inest penna, qua uel crocodilum interimit uel, ut inquit Solinus, aculeate sunt spinae dorsuales: cum ira subiacet, inhorrescunt: cum animi conquiescunt, quibusdam receptaculis operiuntur.

Falcata illi nouissima cauda est:

Quæ dimidiæ sinuantur cornua linae.

Lingua, contra aquatilium naturam, libet absolutaque & mobilis est, brevis atque lara, haud differens suillis. Pro uoce gemitus humano similis: careret enim labris quibus uocis aliquem possit articuli afformare. Audit quidem, sed nullis cauernis quæ uicem præsentent aurium. Voces hominum aquilonis flatu celerius haurit: contra, auditu spirante, auditus obstruitur. Et cum olfactus quoque nullam partem sensoriam habeant manifestam, tamen sagaciter odorantur delphini. Mammas habet sex: una & lac, (animal enim concipit illico & creat, ut modo diximus) quas continet non parte superiore, sed in ima aluo prope genitale: nec modo quadrupedum, papillas conspi-

Delphinus, inquit, Aristoteles, sed, stridet, non mox, uel ita.

Aenas habet, sed uelut alioscolos quosdam humoris duos paulo in obliquo perrectos, utroque de latere singularem, è quibus lac fluit, quod ore cana-
 lorum sectantibus parentem excipiat, idque iam à nonnullis manifeste
 perspectum est: nec tamen aliud animal, inquit Plinius, in cursu lambi-
 tur. Testes habet mas ultima conditos alio perlongos, & penem à testicu-
 lis ad externa perrodentem, ut bos. Pulmonem habet delphinus & arteria:
 proindeque respirat, & nō nihil uocis, uti modo diximus, potest promoue-
 re, & dormiens rostrum fistulāq; exierit supra mare, ut spiret. Et iam qui-
 dem delphinum sterentem etiam nonnulli audire, quamobrem delphu-
 nus retibus apprehensus, breui tempore suffrangatur, ut qui spirandi facul-
 tatem amiserit: & foris uero diutius uiuere potest moriens & anhelans mo-

Bdo carcerum spirantium. Delphinus inter ea, quæ mare excipiūt pulmo-
 nēque habent, unus sille priuatus est. Mentas seminatios eodem modo
 habet delphinus, quo pisces serpentesque. Non spinas ut pisces, sed ossa ha-
 bet delphinus. Cocunt delphini admodum supinis partibus, ut pisces: sed co-
 rum coniunctio diuturnior est. Gestatur uterus decem mensibus. Partus
 ætate fir, nec alio ullo tempore alio parit: singulos magna ex parte, inter-
 dum tamen & binos. Adolefcit celerius proles delphini: quippe qui annis
 decem ad summam perueniat magnitudinem. Sola carne uescitur delphu-
 nus, uiuit annis compluribus: cōstitit enim nonnullos uixisse annis triginti
 quinque, alios etiam triginta: quod cognitum est præcisa à piscatoribus
 euidens, quos ea reddidissent mari, capios item agnoscerent, & temporis

Cspatium scirent. Delphinus in Ponto magnus non est: quamquam extra ubi
 aliquantam processeris magnus habentur. Abdūt riticenis diebus circa ca-
 nis ortum, occulanturque incognito modo. Coniugati degunt delphini, *Albi, neri, fla-*
 mares cum feminis. Solent in terram erumpere incerta de causa: & statim os-
 tellare tacta moriuntur, multoque oculus fistula obcurata. Cum male se ha-
 bere sentiat delphinus, simia marina remedio illi est. Cū delphinis pugnant
 hamis. Hominē non expauescit ut alienum: nec tantam hominis amicum
 animal delphinus, uerum & mulcentur musica, gaudent cētib; tibiarum;
 ubi cumq; symphonia est, gregibus adhaerant. Circa Tapeobanem autē duo
 delphinorum genera nasci feruntur: alterum serum & inexpiabili immani

Draze piscato ribus infestum: alterum natura mansuetum. Delphini trāquil-
 lo mari lasciuientes statum prælagiunt, ex qua ueniunt parte: idem spar-
 gentes aquam turbato, tranquillitatem. Delphini & hippocampi cinis ex
 aqua illius, lichenas & lepras tollit, exulcerationē loqui debet curatio, quæ
 perducit ad cicatricem. Quidam delphini locut in fictili torrēt, donec pin-
 guitudo similitudine olei fluat ac perungāt. Febrim circumsistit tollit inces-
 delphini gustati ante accessiones. Hydropsicis medetur adeps delphini il-
 quatus, & cum uino potus: grauitari saporem occurrunt tactis naribus un-
 guento, aut odoribus, uel quoquo modo obstrata. Delphini adipe unamē-
 ta accensa, excutit uulnū strangulatu oppressis. Nascitur in Ponto phoca, *Phoca, neri, fla-*
 na delphino similis: sed interest, quod minor phoca est, dorso amphoro,
 colore cartuleo. Partus quoque illi delphino similis: & lac habet ut delphi-

DE DIFFÉRENTIIS

nus complures uero genus esse delphini opinantur. Delphinorum, inquit E. Plinius, similitudinem habent, qui uocantur tursiones. distans & tristura quidem aspectus: abest enim illa lacinia maxime tamen costis canaliculatum mallicentia assimilati.

1. De delphini mariscutidie amorique & affectibus id generalis legas apud Aristotelem, Plinium, & hanc, Solinum & alios. 2. Hæmon aucto hæc. Delphini quædam mulus exemplis exprimitur à Plinio. 3. Dorsum illi repandum. Ouidius, Corporaque & pectus spæz circumfusa flecti loquitur. Etiam idus sunt. 4. Tursiones. Phocænam Theodoros tursionem interpretatur.

De balena, orca & phylætero.

Cap. CXC.

Balena.
Balea.
Baleen.

Cetus quoque balena est: & fistulam non à dorso, sed à fronte gerit, per quam humorum, quam ore acceperat, reddit: qua & summa aqua intrantes in sublimi nimbos efflat. Balenæ musculus quandoque prægrua superfluum pendere, obrutus eni oculis, insectis ita magnitudinem uada perueniens demonstrat, uelut uniusque uoce fingitur. Mammas habet balena & lac. & mammas nutrit fetus, ut delphus & pulmoenem, ideoque & respicit, edensq. per summa æquoctis fistula dos mit, sicuti & cætera quæ fistulam gerunt: non uero etiam desinit in certam, solem passura calentem. Parit balena cum plurimum binos, magnæque ex parte singulos. balenæ coagulo in lethargia uergentibus, ad ossiculum utuntur. Balenæ in nostra maria penetrant, inquit Plinius. in Gaditano oceano nō ante bru G. man cōspici eas tradunt: cœdæ autem æstatis temporibus in quo-dam sinu placido & capaci, mare gaudentes dæ parere. Hoc scire orcam insectam: has balenæ: cetus imago nulla representatione, inquit Plinius, exprimi possit alia, quædam earum immensa dentibus tru coluntur. Et Festus, orca, inquit, cetores sunt atque uniformi specie. utnaopunt ergo in secrota, æ bale natam unalob & fortis etiamnum grandis lacerant moris incurisq. seu libentia cum costis fodiunt. Utræd sic eum immobilis, ad repugnandum inertes, & pondere suo onerata, tunc quædam & utero graues, pariendū pectus munda, solam auxiliam nouere in alio profugere, & si roto defendere oceano. Contra orca occurrete laborat, seseque opponere, & causum angustis trucidare, an uada urgere, satis illidere. Spectantur ea prelia seu mari ipso sibi traso, nullis in sinu nēris: fluctibus uero ad anhelus ictusq. H. quætos nulli turbones uoluunt. ingentis magnitudinis orcam à Claudio principe in portu Ostiensis oppugnatam narrat Plinius. Maximum animal in Indico mari pultrix balena est: narratur enim balenæ quaternum iuge a rura: pultrix ducentum cubitos um. In Gallico oceano maximum animal phylæter est, columnæ modo se attollens, aliorque narium uelis, diluocem quandam erodans, ut nimbosa illa alluue plerumque deprimat alucos nungantū. Phylæteres cum flatum efflant, (ut inquit Strabo) apparet longius 4. intuentibus nebulosæ caudæ columnæ similitudo. Tubarum sonitu, multiplex pluit, strepitūque id genus ingens terrentur maxime.

Orca.

Balea.

Orca.

Balena.
Orca.
Pultrix.
Pultrix.
Pultrix.
Pultrix.
Pultrix.

Orca.

1. Orca, hæc dæper habet Strabo inter cetaceas: an idē sine cum orca, an si libet intendat

Amendofuit 2. Iugerum coniacet pedes ducentos quadraginta. 3. Pultrix, & Prifles Antioeli & Oppiano cete eſt idem fortitan qui pultrix. Et in Vergiliano alio, de Scylla monſtro, (-Poſtrema membra corpore pultrix.) In quibuſdam exemplaribus habetur priſtes: apud Oppianum habetur *επιφει*, ſed legendum arbitror *επιφει*. 4. Phyliscina, *φεισκη* ab Oppiano licet cete numerantur idē qui *φεισκη*? *φεισκη*.

De aliis quibuſdam marinis beluis & monſtroſis. Cap. CXCVI.

1. **S**unt & in mari beluæ, qui dromones uocantur: & qui melichini, & Ser- *Dromones.*
Melichini.
Serra.
Arctos.
Rosa.
re, materiæ ſeræ ſimilitudinem gerentes. Sunt & effigie inſolēti nō-
nullæ in Gaditano oceano, arbor intanti ualtis diſpanſa ramis, ut ex ea cau-
ſa fretum nunquam intrare credatur. Apparet & tota appellatæ à ſimilitu-
dine, quaternis diſtinctæ radiis, modulos eorum oculis duobus utrinque
B claudens: adeo longis ſunt hieſute ſpinae, ut hæ extra mare emineant,
reſerſiones in orbem faciunt, unde nomen traxere. Graſſatur aries ut latos
& nunc grandium nauium in ſilo ſtansium occultatus umbra, ſi quæ nan-
di uoluntas inuiter, expectat: nūc elato extra aquam capite, piſcantium cyr-
2 bas ſpeculantur, oculiſque adnatans mergit. Sunt & alypiſcium forma a-
rietes in beluarum quoque numero. In Saronum litore beluas nōnnequā
3 reciproans deſtituit oceanus, inter reliquas elephantos & atietes candore
tantum cornubus aſſimilatis. Circa Corticum & Sardoū ſrenam hybernant
atietes, atque ex aqua eminentes ſpectantur: ſimul & delphini circa eos na-
tant. Mas aries frontem alba uitta redimitam habet, diadematis in formā
at ſcemina quæmadmodum gallinæ, quidam uelut barba appendicu-
C las poſſident, ſic ipſa citro ex imo collo pendentes habet. In Indico mari ex-
eunt in terram pecora ſimiles beluæ, paſtæque radices frontem, tementē &
quædam eorum, aſinocum, caurotum capitibus, quæ depaſcantur ſara.
Leo quoque in his & pãthera, atque hyena longe ferociiores, quàm ſint ter-
reſtres feræ. Cornuta etiam natuna belua attollit cornua è mari ſequipe-
dalia fere, quæ ab his nomen traxit. Panthera in mari rubro naſcitur, ſimi-
lis terreſtri panthere, colore & maculis orbicularis. Caſtoridas Opplianus
4 inter cete recēſcit, uocem hæ quetulam morſi amq. in litore dicuntur ede-
re: quàm ſi forte audierit quiſpiam, mortem illi breui imminere prænun-
tiat. Tyberio principi nūciauit Olyſſiponenſium legatio, ob id maſſa, uſiam
audiriſque ut quodam ſpecu concha canentem tritonē, qua naſcitur for-
D ma: cui Vergilio auctore,

Frontis hominem præfert, in piſcem deſinit alius.

Narrat autem Pauſanias ſe tritonem in ſpectaculis Romanis uidiſſe, cuius
caput coma, & colore, & quod diſcrimari non potuiſſet, ranaſum palu-
ſtrum ſimilis uidebatur: reliquum corpus ſquamis tenuibus inhorreſce-
bat branchia ſub aures, naſus humano ſimilis, os amplum, dentes ferini,
oculi glauci apparebant: manus habuit & digitos, unguesque cochlearum
teſtis non diſſimiles: cauda eidem infra pectus & aluum, loco pedum
5 erat delphino ſimiliter. Nereidum falſa opinio non eſt, ſquamis modo hi-
ſpido corpore, etiam qua humanam effigiem habent: namque harum uſa
in Olyſſiponenſium ſpectata litore eſt: cuius mortem garrulitas tristem

*Beluæ mari-
nae, æque, quæ,
tanta.*

Leo.

Panthera.

Caſtoridas.

Hyena.

Cornuta.

Caſtoridas.

Triton.

Stridula.

DE DIFFERENTIIS

accolat audire longe. Et diuo Augusto legatus Galliarum complures in litore E-
examines Neretidas scripsit. In eo quoque, quod circa Taprobanam insulam
mare est, esse existeri muliebri facie fertur: usque pro crinibus spinas esse.
Auctores habeo, inquit Plinius, in equistri ordine splendentes: usam ab
his in Gaditano oceano marinum hominem toto corpore absoluta simi-
litudine, ascendere nauigia nocturnis temporibus, itatimque degravari: quas
infederat partes, & si diutius permaneat, etiam mergi. De differentiis an-
imalium habentium sanguinem, quas communes, quasue proprias singula
habent genera, dictum iam est.

*Flumini mari-
na.*

*Flumini inter be-
llos marinos
nauis est. Plu-
mon.*

*Dromas
Carpas.*

*Epithema,
Ovis.
Proas.
Leipha.*

1. Dromonem hunc Plinium diuersum esse arbitramur à dromo de Astrologico,
quem Theodorus ceteros vocat: & gregalis potius est: quamquā alio loco uideatur genus
quoddā pīnā significare potius, quam speciem. 2. Auctores reserunt hanc, id est eam
uel pecus (opinor) uocat Oppianus, qui in alto mari in latibulis lare degunt, locū ra-
ro mutantes. Auctus quoque meminit idem Oppianus, uideri uocat. 3. Elephas
& arietes, &c. Ab his uocantur *leiphae*, id est salimorum elephasium dictum a lu-
tore. 4. Tittonem Neretidas & hammeti quoque marinum, beluas marinas uo-
cat Plinius. 5. Neretidas fingunt portæ Neris & Doridis filias, quas hoc modo de-
pinxit Ouidius.

-Quarum pars nascitur uideri,

Pars in mole sedent uirides siccat capillos,

Piscor uchi quondam facies non omnibus uide:

Non diuersa tamen, qualem decet esse sororum.

DE ANIMALIUM DIFF- FERENTIIS LIBER IX

Continet animalium exanguium differentias, & pri-
uationem insectorum.

De animalibus exanguibus.

Cap. CXCVII.



*Amphipod,
Exomphala.*

*Tria haec ubi-
que praeter, po-
tissimum uocantur
Pala.*

Consummata iam disputatione de toto ani-
malium genere, quod sanguine praeditū est,
que reliqua nobis pars superest, absoluamus.
Nunc igitur ordinem persequemur eorum, H
que sanguine carent: indeque *amphipod*, id est
exanguia dicta sunt: continent enim haec
non sanguinem, sed humorem alium qui san-
guini proportionem respondeat: qui in hoc a-
nimalium genere sit ultimum corporis ali-
mentum, licuti sanguis in his qui sanguine
praediti sunt. Porro genera in hoc ordine plura sunt: primum genus inse-
ctorum est: secundum eorum que *molles*, id est molles appellamus: tertium,
que crustis tenuibus operiuntur, id est crustacea aut crustata di-
cta, ut cancerorum genus & locustarum, quarum, que silicea testa conclu-
sa

- A**lia coniunguntur, *ἁπλοῦς* ut dicuntur: quale genus concharum & ostrearum est. Cum animalia quæque sanguinea partes tum interiores, tum exteriores suis quasque appellatis nominibus habeant, genus quod sanguine caret, pluribus uarietatem enim uiscera quæ cuiusque sanguineo insunt omnia, nullum exangue quod habere nouimus. Partes tamen ad uictum pertinentes omnia necessario habent, quanquam uarie, propter loca quibus cibum recipiant communes enim omni animalium generi partes sunt, os, uenter, intestinum. Caput nonnullis indifferetum est, ut cancri & his quæ molli adiciuntur: oculos habent maxima ex parte, exceptis testaceis, omnia: linguam quoque & dentes, sed uarie, ut in unoquoque genere explicabimus. Horum etiam genus omne, quæ quidem pedibus fulciuntur, multiplex est, nec ullū
- B** fere quadrupes habent: & crustacea omnia, exceptis extremis, à latere affiguntur: & partim sursum uersus flexū habent, partim uero retrorsum subflexi subortus uergunt: medij namque pedes subinde ambigui sunt, (quod Græci *ἡμιποδία* dicunt) atque amplius in latum flexuntur. At uero tum priora cetera tum posteriora retro flexunt. Omnium uero motus per diametrum agitur, quomodo etiam subsistere solent. Neque sanguis (ut modo diximus) neque omnem uiscerum naturam ullum ex his obtinet: nihil etiam corum, quorum gratia uiscera habet animalia sanguine prædita, datum eiusmodi animalibus est: non enim uenas hæc habent, non uelicæ, non uisum spirandi: sed tamē unū quod cordi proportionetur, id habent: necesse est. Hoc in mollibus quidē & crustaceis ea pars est, quæ à nonnullis *σπέρμα* *Μέτρησι, Μόδι.*
- C** tisque appellaturum testaceis minus quidem patet, attamen in medio semper querendum hoc principium est: in insectis uero inter caput & uentris aliquid est. Sanguis etiam quanquam is deest, quod sanguinis tamen proportionale est, quodque eandem fere in genere exangui obuenit uisum, quam sanguis in corpore illo sanguinis, habet. Nullum ex his quæ sanguine carent uel adipem habet uel sebum: quandoquidem sanguis is deest. Osse carent exangua omnia, sed neque spinam habent ut pisces: aliud tamē quod proportionale ossium est, & quod sua duritie molliorem corporis partem, hoc est, carnem seruare possit, habent: uerum hoc præsidium aliis intus est, aliis foris: nam quæ crusta operiuntur, ut cancri genæque omne locustarum, & quæ testacea dicuntur, ut ostrea, his omnibus caro intus: tertium autem il
- D** lud quod continetur & conseruet, foris est. At uero animalia insecta & mollia contra quàm hæc, & modo inter se opposito constant: nihil enim ossis, nihil terreni habere discretum uidentur, quod dignum effatu sit: sed mollia fere tota, carnosa & tactui cedentia sunt, naturā inter nervorum & carnē obtinentia: mollis enim ut caro est, sed intendi potest ut nervus. Habent etiam intus quod piscium spinis proportionetur, ut sepia: quod sepium uocant: olliginis quod gladiolū: at polypi nihil eiusmodi habent. Insecta contra quàm hæc constant, ut modo diximus: quippe quæ nihil habent durum aut molle discretum: sed dura toto corpore sunt, duritie tali, ut ossē carnosiore, carne magis ossēa terrenaque magis consent. Quæ sanguine uacant, animalibus non idem membrorum ad generationem pertinetium modus:

DE DIFFERENTIIS

sed tum inter seipsa, tum etiam cum sanguine diffident. Et plurima qui-
dem coire aptam esse: ista vero an ulla coeant, incertū est. meatus au-
tem siccū excrementi atque coitus omnibus quæ ova parit, adē ut in reli-
quis ovi patis habetur. Quin & interior ille meatus idē excremētū & uul-
uæ est, tum in mollibus, tum etiam crustaceis: exanguium enim quidam
ita sexum habent utrumque, mare in scilicet & feminaam, ut sobolem eius-
dem generis procreare possint: alia procreant quidem, sed non sui generis
proleunt quæ non ex coitu animalium procedunt, sed per se vel in anima-
li, uel in terra, uel in stirpe, uel etiam in eorum ipsorum partibus, uel excre-
mentis creantur: eadēque maris ac femine sexu distincta sunt iis coeti-
tibus gignitur quidem aliquid, sed ex quo nihil amplius gigni possit: uerbi
gratia, coitu pediculorum, lendes dicitur procreantur: Pulicem genus uer-
miculorum ovi speciem referens ex quibus nec ea quæ generantur, proce-
nunt: nec aliud ullum animal, sed id quod sunt, sordes tantum perficiunt.
Quod autem in uniuersam dixerim, eorum alius toto genere sexus uterq;
est, ut mollibus, ut crustatis: alius maxima ex parte, ut generi insectorū. Eo-
rum autem ipsorum quæ ex coitu cognatorum animalium gignuntur, ipsa
quoque sibi cognata progenerant. At uero quæ non ex coitu, sed putri ma-
teria oriuntur, ea generant quidem, sed genus diuersum: quodque produ-
cit nec mas est nec femina, talia sunt nonnulla in genere insectorum. In exan-
guum genere, in iis quæ ex uermibus gignuntur contrā euenit, quā quæ
ex ovo, ut scilicet pars inferior maior inter uicia sit dum generantur: oculi G
& caput postea augeantur. Quæ sanguine carent ex aqualibus, nec natu-
ra calida sunt, ea nati in lacu non possunt: minus etiam in salis aquis quæ
non sunt potulentiore, gignuntur, ut testata, ut mollia, ut crustacea: sed sta-
guis marinis & iuxta annuum ostia gigni solent. Quod uero ad sensus at-
tinet: quæ mollia sunt, & quæ crusta operiuntur, atque etiam insecta sensi-
bus prædicta esse omnibus constat: nam & uisu & olfactu & gustu: procul e-
nim quandoque sentiunt, & odore escarum partim allectatæ capiunt, par-
tim uero odorum quorundam suffius fugiunt, ut insecta quædam. Gustus
etiam similis ratio est: interdum enim cibum persequuntur diuersim: nec
eisdem saporibus omnia delectantur. Tactu uero sentire, (quod etiam an-
te dixi) omnibus datum animantibus est: quæ autem sibi eo tegmine ope-
riuntur, olfactum gustumque habere constat, argumento escarum. De ui-
su & auditu, quamquam nihil certi manifestique habemus, quibusdam ta-
men hos sensus inesse apparet: ungues enim ad strepitum se subtrahere cer-
nuntur, quoties sarramentum sentiunt admo-
to digito dehiscunt, mox comprimunt se ut cernentes: e charis autem & re-
che atque glandes olfactum minime habere uidentur. Et generatim quidē
de exanguibus animalibus satis dictum est.

1 Minus enim, &c. Ita Theodorus uel *τὸ ἀπὸ τοῦ αἵματος ὡς ἀπὸ τοῦ οὐραίου*, uel *τὸ ἀπὸ τοῦ αἵματος*, &c. Verus interpretis ita habere neque erit aliquod animal in quo uires salido in aqua dulci, nisi parca, sicut dicitur testis, &c.

A

De insectis.

Cap.

CXCVIII.

Est inter exangua insectorum genus amplissimum, ut quod plures quam *descripta, deditur.*
 alia complectitur species. Insecta uoco, quæ (ut nomen ipsam declarat) incisuras parte sui uel supina uel prona, uel etiam utraque habent: nec osseum quicquam discretum aut carneum, sed quoddam inter hæc ipsa medium continent: quippe quæ corpore pariter utrasque foris quoque consistens. Hoc genus multas & uarias complectitur species, ut modo diximus, quarum nonnullis quantum cognatis, nomen nullum commune est inditum, cuiusmodi sunt apes, & reliqua similes formæ insecta: crabrones scilicet & uespæ eiusdemque generis alia quædam item quibus penne uagina incluse continentur, (*uasi* uocant) ut galeruca, carabus, cantharis, & reliqua generis eiusdem. Sunt item alia ex his pennata, ut apes: alia pennis carent, sed pedibus gradiuntur, ut centipedæ alia utroque modo, ut formicæ: aliqua pennis & pedibus carentia, ut uermes terrestres. Omnium autem tres illas partes haberi constat, caput, uentris aluam, & quod inter hæc situm est, quale in cæteris pectus dorsumque habetur: unum id quod interiacet magna ex parte est: quæ tamen sunt longa & multipeda, usque fere totidem sunt quæ interiacent, quæ incisuræ: quæ nunc ceruicem loco, nunc pectorum atque alui præcincta separant membra tenui modo fistula coherere sua: aliquibus uero non tota incisura eas ambiente rugas, sed in aluo, uti diximus, aut superne strium, implicans sterilibus uertebris. Oculi dantur in omnibus fere patens, sed nullum ex his palpebris habet. Ex cæteris uero partibus sensoris nulla manifesta est, præterquam lingua: olfactus tamen sensum ea habere perspicuum est. cibum namque sibi peculiarem uti seminus odore sentiunt, ut apes & culices quas *uocant*, mel. Sentiunt autem præcincti ipso (*uocant*) odore: & natus quodam sui corporis spiritu, qui à natura infusus est, non adueniens. Linguam habent, quæ & gustant & cibum attrahunt: hæc in nonnullis mollis infirmisque est, alia dura & valida: omnium enim quibus non in aluo aculeus est, linguam eiusmodi ueluti arma gerunt. Nec dentes habet quibus iuncta ea est, exceptis quibusdam paucis: nam & muscæ ea pertingentes cruorem mouent: & culices *uocant* dicti eodem acutus pungunt. Dentes autem quædam insecta habent, quanquam alios, neque aliorum animalium dentibus similes, ut apum muscarumque.

D genus quædam non habent, eorum scilicet quæ cibo utantur humido. Insectorum enim complura non uictus tantum, sed armorum grana dentes possident. Quibus igitur non in ore est aculeus, hæc dentes habent, cibo scilicet aut conficiendo aut capiendi adinueniendi gratia, ut formicæ, & id genus alia. Ad hæc antennæ, ad est, cornicula ignota nonnullis ante oculos prætenduntur, ut papilio & carabo: quæ autem in hoc genere, uolucrum fortuantur naturam, his præter cætera membra, penne quædam membræ sunt: sicut annexæ sunt, quibus uolant, quæ neque fissæ sunt neque caulem habent ueluti auium penne. Sane autem alius bane, ut muscæ, alius quæternæ, utroque scilicet latere bane, ut apibus. Quaternæ gerunt, quæ aut grandiora sunt, aut aculeo in aluo armantur: quæ scilicet pabuli causa necesse

*Formicæ
 & uespæ
 ueluti uocant.*

*Antenna.
 Cornicula
 ignota
 & quaternæ.*

DE DIFFERENTIIS

habeant euagari, quæ & corpuscentiam habent leuiorem, ut apes, & reliqua E generis eiusdem. Binæ uero habent quæ aut maiora sunt, aut aculeum in priore parte gerunt, ex his scilicet quæ pobuli causa uagantur, ut musca, tabanus, culicæque autem parua sunt & uitam stabilem agunt, multus quidē fulcuntur pennas ut apes, sed crassa pennas obteclas gerunt, uelut melolonthæ, & cætera id genus insecta, scilicet ut pennarū uires integras teneantur. Ex uolucris itaque ipsi alia membranas ipsas quibus uolant, crassa (quam *uagæ* uocant Græci) superueniente quasi uagina inclusas gerunt unde & *uaginipennes* id est uaginipennes dicuntur, ut scarabeus: alia deteclas habent, *uagæ* dicta, ut apes. uaginipennis illius ordinis nullum est, quod aculeum habet: sed neque ulli aculeus in alio cui pennæ binæ. Geritur etenim aculeus alius parte anteriore, alius posteriore: aut enim ore aut alio extremitate aculeos habent pleraque insectorum: & uel intus conditos, ut apes & uespæ, uel extra prominentes, ut scorpion: europigium eandem non habet fere (præter unum scorpionem inquit Plinius) idque in causa est quod quæ uolucres sunt, tanquam nauigium remone priuarum in uolatu agitentur, & quocumque fors uulerit, impingant. Multipeda sunt omnia, quæ saltem pedibus fulciuntur uarie tamen pedum numerum formant: quæ enim corpore sunt longiore & plures habent incisuras, ea numero præcipue superat, ut uolutorum genus: quibus autem pedes pauciores, hæc uolucres fere sunt, ut pedum inopia adiumento pennarum compensetur. Pedes priores notanulla ex his longiores habent, quibus abstergant oculos incidentem molestiam atque arceant: quod & muscas facere uidemus & apes, & reliqua generis eiusdem, quæ scilicet oculos habent duriores. Posteriores etiā medius longiores, ut ambulent melius, & attollantur facilius de terra cum uel uolare uel salire libet: quæ nanque saliant, hæc uel crura posteriora habent maiora, uel gubernaculis quibusdam saltui accommodatis fulcuntur retro curuatis, ut crura quadrupedum. Atque his omnibus pedes sena, ut etiam quorum nixu saliant connumeratis. Quæ hunc numerum pedum excedere, ut plerique ut mures, non infra duodenos habent: aliqua uero & centenos numerus quidem impar nulli est. Partes corporis prout in his omnibus differunt à supinis, sicut uel in cæteris animantibus est: cæte omnia circumdantur, sed admodum tenui. Partes insectorum exteriores has esse, atque in hunc modum se habere constat.

H

*Dispositio
et uolucris,
Pierisipennes,
et uolucris,
et uolucris,
et uolucris,*

*Maiora, uolucris
longiora uolucris
Theodorus.*

*Propter, et
et uolucris.*

I. Quæ in hoc genere uolucrum sortuntur naturam, et uolucris dicuntur, & uolucris non uolucris Anthoni.

De partibus insectorum interioribus. Cap. CXCI.

Quod autem pro carne in his habetur, id nec testis naturam imitatur (*et uolucris* dicunt) neque illi simile est, quod in testacris genus carnis continetur: sed in eadem quandā inter hæc refertur naturam: nihil enim habent dum aut mollis discretum, uti diximus, sed dura toto corpore sunt duritie rali, ut ossa carnosiora, carne magis ossa terrenaque magis consistant. Quamobrem his non spinam, non os, non aliquid sepio simile, non restam

A

A rectam ambientem, neque terrenum aliquod durum, quod illi proportionē respondeat, natura dedit: ipsum enim corpus se sua duritia tueri potest & seruire, nec est quod aliunde muniri desideret. Plinius hæc ita testatur, Insecta non videntur nervos habere, nec ossa, nec spinas, nec cartilaginem, nec pinguis, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, ut quidam marina, nec quæ surc dicatur cutis, sed modicæ cuiusdam inter hæc omnia naturæ corpus, arcti simile, nervo mollius, in reliquis partibus siccius uerius quàm durus. Et hoc solum his est, nec præterea aliud: nihil intus, nisi admodum paucis, intestinana implicatum. Hæc Plinius. Partes autē quæ ad cibum admittuntur, non pari ratione datur omnibus sunt: alia enim linguam intra os continent, ut formice: alia foris gerūt uelut promiscidum fungosam & cauam, ut ea simul & gustare & cibum trahere possint. Patet hoc in muscarū genere & apum & omnium in generis eiusdem: necnō asili & tabani eodem spectant: atque is quidē lingua, siue promiscus pro aculeo habetur: omnia namque quibus non in aluo aculeus est, linguam eiusmodi ueluti arma gerunt. Linguam hanc in quibusdam excipit intestinum rectum simplex ad ostium ulque extremū porrectum: in quibusdam hoc reortum in anfractum est. Sunt etiam quæ uentrem ori adiunctum, intestinūque à uentre reuolutum habeant, ut quæ cum edactora maiorisque sint, conceptaculum cibi obtineat copiosioris. Viscus nullum in his, nullum pingue, sicut neque in cæteris quæ sanguine carent. Pars uero illa quæ cordi proportionē respōdet, inter caput & alueum est: quæ etiam magna ex parte simplex est, tamē in nonnullis multiplex est, ut iulis & similibus prælongisquo sit ut præcisa uiuere possint. For minus in hoc genere membrum quod pro uulua habetur, fissum iuxta intestina positum est, in quo fortis generatur. Patet hoc in locustis & reliquis quorum magnitudo aliqua est, & natura eorum recipiat maxima enim pars generis insecti per exigua est: adeoque & eorum uteri incerti ignotius propter corporis exiguitatem. Feminae inter ea quæ coeunt insecta, maxima ex parte maiores suis maribus euadant, ut Phalangia.

1. Præcisa, &c. Insecti duo sibi inquit Aristoteles, alium cum pedore tum caput tantum alium & sine eo caput nullum uiuere non potest.

De insectorum generatione & inscitu.

Cap. CC.

Procreatur insecta quædam per coitum & ex animalibus generis eiusdem, ut phalangia & aranei ex phalangis & araneis ut bruci, locustæ, cicadæ. Sunt autem quæ coeunt quidem & generant, quædam etiam animal, uerum non sui generis animal, sed uermiculos tantū, ut muscæ & genera papilionum: neque eadem hæc ex animalibus procreantur, sed ex putrescente humido aut sicco ut pulices, muscæ, cæcharides. Quædam nec ex animalibus nascuntur neque coeunt: ut culices & uermiculi nonnulli, & plura eiusmodi genera, sed sponte procreantur. Horum uero alia ex rore qui in frondibus est, uidelicet uerno tempore, ut natura fert, sæpe tamen & hyborno quoties tranquillum australēque tempus diutius constitit. Item alia ex otino aut fimo putrescente oriuntur: alia in lignis aut stirpium aut cæsi

DE DIFFERENTIIS

alia in animalium pilis, alia in excrementis, aut iam excretis, aut adhuc in-
 tra animalium concentus, ut quæ lumbrici appellantur, quæ etiam in his quæ
 putredinem nullam posse recipere existimantur, nasci animalia nominas,
 ut culicium genus quoddam ex fere aceti, & vermes in nave vetustiore: o-
 mniibus autem prope diximus, quæ sponte procreantur, vel siccis humefec-
 tibus, vel humidis succulentibus nascuntur. Insecta auerſa coeunt, deinde
 id quod minus est superuenit maior, hoc est, mas formam inter ea enim
 quæ coeunt insecta, formam maximam ex parte maiores suis maribus cas-
 dunt, uti modo diximus, nec mas in formam genitale ullum inferere me-
 brum, more animalium cæterorum videtur, sed formam sursum in ma-
 rem meatum quendam reflectere consuetum in pluribus est, qui in non-
 nullis maior quàm proportionem totius corporis esse videtur, cum ipsa par-
 ua admodum sit: sed sunt etiam in quibus minor existit. Plenum hoc fuerit
 si muscas coitu uenero copulatas diuiseris. Tardo etiam quæ coiuuerit se-
 iunguntur digestis diu namque copulatio eorum durat, quod in his quæ in
 nostro conspectu uersantur facile patet: uerbi causa, in muscis & scarabæis,
 phalangis & si quæ eius generis coire solet. Insecta hyberno tempore co-
 eunt, & serenis austrinisque diebus nascuntur ea quæ se abdere non solent
 ut muscæ, formicæ: breui à coitu parient maxima sui parte quæ solet coire.
 uermem autem omnia faciunt, excepto genere quodam papilionum, quod
 durum quiddam simile cartamo, id est crici femini producit, sed minus flui-
 dum. E quibusdam qui ex coitu prognati sunt uermibus, neque ea quæ ge-
 nerantur proueniunt animalia, sed nec aliud ullum animal: sed id quod sunt
 sordes tantum persciliunt, ut pulicum & pedicularum sortus: è uermibus ue-
 ro ipsa ex quibus gignitur animal, non parte aliqua sicut ex ouis, animal
 eratur, sed totus uermis accrescit, & particulatim discretus formatur in
 speciem destinati animalis. Eadem uero gignendi ratio omnium est: quæ ex
 uermibus ortum habent, siue ex coitu animalium uermes, siue sine coitu
 prodire uerbi gratia: nascuntur papilioes ex erucis. Erucæ ex uirentibus
 foliis, maximè quæ ex brassica. Primum minus quid malio consistit in folio:
 mox uermiculi inde contrahuntur: aucti deinde intra triiduum, erucæ par-
 uæ affirmantur: postea uero auctæ motu cessant, suæque forma immutan-
 tur, appellanturque cæterper chrysalides, quasi aureas dixeris, & dato in-
 recte putamine sunt: ad tactum autem immobiles araneosis quibusdā ob-
 ductæ: quæ etenim ex erucarum numero è uermibus gignuntur, aranea in-
 uoluit magna ex parte principio erucæ: non os, non aliud ex membris quod
 conspicuum sit, possident. Vermium uero ipsorum alij hoc intra se habent
 unde in excrementis ipsis nutriendis accedat, ut uermes, apum & uesperti:
 alij desoris capiunt, ut erucæ & cæterorum nonnulli uermium. Itaque pri-
 mum dū erucæ sunt, cibo alitur atque excrementum emittunt: uero cum
 in aureas dictas transierint, nihil uel gustant uel excernunt. Longo post
 tempore, putamine obrupto euolant inde animalia pennigera, quos papi-
 liones uocamus. Omne autem hoc uermiculi genus, ubi suæ magnitudi-
 nis finem receperit, cum scilicet aurelia appellatur, quasi ouam efficitur, &
 cui

*Expi. G. M. H. G.
 Aurelia.*

Papilio.

H

Aqui obtinet facultatem indutefcit enim putaminem eorum, & tamisper immota redduntur: quod etiam in uermiculis apum & uesp darum nō secus atque in erucis apertum est: & in ceteris quoque omnibus quæ non costu gerantur, uel in lanis uel alijs huiusmodi, atque etiam in aquis. Omnia enim post uermis naturam, motu cessante, & putamine obarescunt: mox ita pro putamine erit ueluti ex ovo animal, tertia mutatione finem accipiens generationis, idque pennatum magna ex parte est: colorem uero à sua eruca trahunt quæcumque ex erucis ortasunt. Hæc eadem gignendi ratio (ut dixi) cæterorum etiam est quæ ex uetinisbus consistunt, ut apum, uesp arum & crabronū, scarabeorum atque aliorum id genus omnium. Eorum quæ ex uermibus gignuntur contrā quàm eorum quæ ex ovis, pars inferior maior inter initia sit, oculi & caput postea angentur. Tempus generationis insectorum à principio ad finē usq; maximè fere parti septenariis tennis describitur aut quaternis. Calicum & uermiformis generis parti plurimè, ut septeni dies attributi sunt: iis uero quæ sui generis animal procreant quater septeni magna ex parte: septem ex his ab initu, coactio uermis & consummatio uendicat sibi: reliquis tribus septenis incubant atque excludunt, ea scilicet quæ suo procreant sars ut araneus, aut id genus aliud: mutationis uero & transitus in figuras alias, trinis aut quadernis diebus, parti maximè peraguntur, sicuti in morbis quoque dies decretorias enunt. Tales insectorum generatio est. Percunt striatis contortisque membris, ut senectute genus maiorum animalium moritur, quæ pennata ex iis sunt, pennæ etiam contractis autumno fere moriuntur: tabani quidem uel aqua intertunt: oculorum cæci nascuntur.

De uictu insectorum, uoce, ualenadinæque & alijs quibusdam affectibus.

Cap. CCI.

Insecta animalia quibus dentes omnino sunt: quibus autem lingua tantum, humore uelique eliquando sua lingua uelutur: quorū alia etiam omnino sunt, quibus scilicet gustus omnium saporum est, ut muscæ. alia sanguinora, ut tabani, a silualia succis plantarum & fructuum alunt. Apis una nullis potidus assidet, nec utitur alio cibo quàm dulci. Formicæ nihil uenantur, sed ab alijs iam parata colligunt. Aranei nihil conficiunt neque recondunt, sed cibum solo uenatu sibi acquirunt. Apes nihil uenantur, sed ipse sibi cibaria faciunt atque recondunt in el enim cibus earum est. Insecta humore non potus, sed cibi gratia assument. Omne insectorum genus minimo alimento contentum est, & prope sibi ipsa sufficiunt, non tam corporis exiguitate quàm frigiditate, uti Aristoteli placet. Insectis animalibus neque uocis, neque locutionis ulla facultas, sed sonus tantū ns spiritu interiore mouetur, non exteriore: nullum enim ex iis sperat: omnia uero in eo genere membrana septo cincturæ: qua inclosure est subdita, sonant atritu spiritus interioris. Insecta pene omnia hyeme conduntur, præter ea quæ uitam in domiciliis cum hominibus agant: quæque prius intereant quàm annum tempus excedant. Latent hæc hyeme, alia dentius, alia quidū al-

DE DIFFERENTIIS

gor uehementis est, ut apes. Condantur autem quæque locis apricis abdita, & ubi sibi cubile constituere tutius soleat. Senectutem etiam exiunt insecta quædam, ut salpha, & ea quorum penne uagina continentur, ut Scarabæi. Et omnia quidem ubi iam factum est quod gigni debuere, exiunt, ut iam dictum est. Nam ut partui ouiparo cortex, sic uermicularæ proli operculum circumrumpatur, æque & apibus & locustis & aliis nonnullis. Insectorum maxima pars eo tempore ualeat quo gigni solet, uide licet cum annus humidus & tepidus est. Intersunt omnia insecta tacta ex oleo: sed celerissime si capite illi exponantur soli. Conglomerantur ex eis nonnulla ut sese tuto in se uo seruire possint: quæcumque scilicet prolixo corpore sunt. Quæ autem glomerari nequeant, contrahunt se in incuturas, quod pariter eum rînguntur, uelut ea quæ canthari uocantur: ubi enim meruerunt, mori cessant, & totòque corpore indurefcunt.

De insectorum generibus, quæ fauos sibi extruunt, ut de apibus,
atque id genus aliis. Cap. C C II.

INsectorum genus quoddam est nomine adhuc uacans quo uno comprehendatur, sed formam suarum partium cognatarum omnium referens, adeliect ea quæ fauos faciunt, ut apes & reliqua similis formæ insecta: quorū genera nouem numero sunt. Sex illa ex his gregalia, apes, reges apum: fuci qui inter apes degunt, æt spæ, crabrones, & teuthredones: solitaria uerò reliqua trāsirenas maior, sirenas minor, & quæm bombylium uocant. Sed inter insecta omnia principatus apibus, & iure præcipua admiratio, solis G ex eo genere hominum causa gentis, inquit Plinius. Mella contrahunt suc cūmque dulcissimum ac saluberrimum, fauos confingunt & ceras, reipublicam habent: concilia priuatiem, ac duces gregatim: & quod maxime mirum sit, mores habent. Genera apum plura: opimum, quæ breues, uariæ, & in rotunditate compactiles sunt: secundum, quæ longæ & crabronibus uel spæue similes: tertium, quæ æt, id est fur nuncupatur: quartum, fucus: (nam H hæc inter apes numerantur.) Duo item principum regūmque genera: alterum rufum saluūmque, (ωἰσθὶς Græci uocant) quod præstantius est, alterum nigrum magisque uariam. Duplo amplius hoc genus ape utili: & pars à præcincto inferior longitudine proportionem habet sesquialteram: uocanturque à nonnullis matres apum, ut ipse originis auctores. Aculeum H apes possident, fuci eo carent, reges ducēque habent, sed non utuntur: quocirca eos carete aculeo nonnulli existimant. Hæc Aristoteles. Tria ducum genera fecere quidam, ut refert M. Varro, nigrum, rubrum & uarium. Menecrates duo statuit, nigrum & uarium: melior nigrum uariis, ita ut expediat mellatio cum duo sint eadem aluo, interficere nigrum, quæm scit cum altero rege esse seditionis, & corrumpere aluum. Sunt reges apum, ut Collemella prodidit, maiores paulo & oblongi magis quàm cæteræ apes, rectioribus cruribus, sed minus amplis, pinnis pulchri coloris, & nitide leuiffique, ac sine pilo, sine speculo, nisi quis forte pleniorē quasi capillam quæ in uentre gerunt, aculeum putet, quo & ipso tamen ad nocendum non

utiturque

A utuntur: quidam etiam infusci atque hirsuti reperiuntur, quorum pro ha-
bitu damnabilis ingenium,

Namque dux regum facies, duo corpora, plenis
Alter erit maculis auro squaleatibus ardens,
Et rutilis clarus squamis, insignis & ore.

Atque hic maxime probatur, qui est melior: nam deterior sordido spuro
similis tam sordus est, -quàm pulchre ab alio

Cum uenit, & sicco tortam spuit ore uiator. Et,
-Ille horridus alter

De sedia, lati inque trahens inglorius alium.

Regibus omnibus, inquit Plinius, forma semper egregia, & duplo quàm ce-
B teris maior: pennæ breuiores, crura testæ, ingreditur celliorum fronte macu-
la quodam diademate candicans: mulnum etiam nitore à vulgo defferunt.
Muta plebei circa eum obediētia: cum procedit, una est totum examen: cir-
cūque eum conglobatur, cingit, protegit, certum non patitur: & se quæque
proximam cupit esse, & in officio conspici gaudet. Reliquo tempore cum
populus in labore est, ipse opera intus circuit similis exhortanti, solus im-
munus. Procedit fortis non nisi migraturo examine. Non unus in quoque
examine dux tantummodo est, sed plures, ut Aristoteles auctor est: peritq;
examen, si duces uel non satis habeantur, uel plures quàm satis: distrahunt
enim examen. Plinius uero, Reges, inquit, plures inchoant ne desino po-
st-

C cant, ne distrahant agmina. Reges nunquam procedunt fortis, uel, ut pascan-
tur, uel alia causa, nisi uniuersa cum plebe, ut cum migratur: tunc enim reli-
quæ omnes circa ipsum glomerantur, uti modo diximus. Et ubicunque il-
le confedit, ibi cum illarum castra sunt. Et si cum pergunt, rex ipse sorte aber-
rant, omnes inquirere odoratiq; sagaci persequi ducem donec inueniāt,
accepimus: gestari etiam eum à plebe, cum uolare non potest: & si perierit,
omnes intente: uel si aliquandiu manserint, saucos quidē conficere, sed mel
nullum nec fieri posse, quin breui omnes pereant. Sempiternq; duce prehen-
so totum tenetur agmen, amisso dilabitur, migrantq; ad alios. Esse utique
sine rege non possunt: nutu autem interimunt eos cum plures suere. Fuci
magnitudine duces emulantur, inquit Aristoteles: quod si aculeum quo-
que haberent, duces utiq; essent: & Columella, Fucus, inquit, genus est am-
plioris incrementi similitudinem apus. Plinius quoque, Maiores sunt apibus
fuci, & sine aculeo, uelut imperfectæ apes. Quamobrem cum ea sine ma-
gnitudine, alio eis aliqui intertexunt nonnulli, quo apes subire possint: fuci
autem ut grandiores nequeant. Manent fuci magna temporis parte in al-
ueis: (neque enim hoc genus nisi uere conspicitur) cūque exeunt, effe-
runt sese fusim in sublime gyrōque uolitant, & quasi exercitum faciunt:
quod ubi satis iam secerint, redeunt domum & epulis perfruantur. Gigni
fucos seorsum dicitur, si dux uiuit: sed si obuit, in apum loculamentis ori-
ex ipsis apibus, atq; hos fieri animosiores: quocirca aculeatos uocari, quan-
tus aculeo careant: animo namque ferienda, non potestate hoc meruerunt.

*Alia deterio-
rior.*

*Fuscum, inquit
Plinius, huius
re similitudini
uolubus fucos
est ex toto per-
tinet.*

Fucus, ut pascit.

*Aculeosus,
non fucus.*

DE DIFFERENTIIS

Faci, inquit Aristoteles, nullum est inter apes munus, sed, ut ait Vergilius, E
 ignavum fucus potus & unumque, sine industria faus assidens: nam neque
 alimenta congruit, & ab aliis inuenta consumit: verum si pauci adsunt fu-
 ci, nonnihil præstant commodi: reddunt enim apes in opere sobetitiones.
 Sunt tamen qui fucos & per se fingere fauos eodem in alveo, & cum api-
 bus negotium conficiendi sui partem dicunt: verum mellificandi nullam
 habere facultatem: sed vesca tum eos, tum eorum pullos melle quod apes
 fecerant. Hæc sere Aristoteles: verum tamen, ut Columella auctor est, ad
 procreationem sobolis cōferre aliquid hi fuci videntur: insidentes semini-
 bus, quibus apes figurantur. Itaque ad fovendam & educandam novā pro-
 lem, famularius admittuntur: exclusis deinde pullis extra recta procurban-
 tur. Et Phnius, Sunt autem fuci, inquit, sine aculeo imperfectæ apes, novif-
 simæque à fessis & iam emeritis inchoant, serotinus ferus, & quasi servi-
 ria veterum apum. Quamobrem impetrant eis, primòsq; in opera expel-
 lunt, cardantis sine clementia puniant: neque in opere tantum, sed in for-
 tu quoque adjuvant eas, multum ad calorem conferente turba: certe quo
 maior fuerit multitudo, eò maior fiet examinum proventus. Cum mella
 ceperint manurescere, abigunt eos, multæ singulos aggressæ trucidant. Et
 si proventus desperatur, tunc & fucos abigunt. Proprium fumbus genus est
 se aliqui existimauere, inter apes grandissimus, sed nigris, alioque quàm a-
 pes utilis ampliore, ira appellatus, quia furum deuorant mella. Furis sicuti
 & fuci nullum est in apum opere munus, sed ceteris quibuscum uiuūt, in-
 iuriam faciunt: nam fur ipse si quādo in alienos fauos surripere ingressum
 potuerit, adeo in satietatem repletur ut nequeat auolare, sed ante alucum
 uoluntur. Itaque non impune semper hæc faciunt: nam deprehensi inter-
 dum à bonis apibus occiduntur, sicuti & fuci. Apes ut colores magis satur
 quàm crabrones aut uespæ. Optima breues uantæque & in rotunditatem
 compactiles: deteriores longe, crabronibus uespæque similes: etiamnum de-
 terrius ex his pilosæ. Minores illæ officiosiores maioribus sunt: pennæ his
 detrita, color nigricans, & quasi combustæ essent. At maiores nitidæ uo-
 nultæque sunt more otiosarum mulierum. Penpatenice scdæ cōdior Ari-
 stoteles in iis libris quos de animalibus conscripsit, apum siue examinum
 genera complura demonstrat: eandemque alias uarias sed glomeratas, cal-
 dæque nigras & hirsutas alas habentes: alias minores quædam, sed æque
 rotundas & insulsi coloris, horridæque pili: alias magis exiguas, nec tam ro-
 tundas, sed obesas tam è & latas, coloris meliusculi: monnillas minimas gra-
 cilescque & acuti albei, ex aureolo uarias atque leues. Eandemque authorita-
 tem sequens Vergilius, maxime probat paruas, oblongas, leues, uindas,

Ardentes uero, & paribus lica corpora gattis,
 motibus etiam placidis: nam quanto grandior apes, atque etiam rotundior,
 tanto peior: si uero & senior, maxime pessima est. Hæc Columella. Diffe-
 runt inter se apes parentibus natæ urbanæ, & quæ rustico montanæque ui-
 ctu educatas prodierint: sunt enim syluestres horridiores aspectu, & iracū-
 diiores & minores, sed opere ac labore præstantiores. In Ponto sunt quardā
 albæ,

444, fur.
 Fur, inquit
 Varro, qui in-
 caturo alio
 fauos, lico ut-
 tre.

445.

Albae, quae bis in mente mella faciunt. Apud Themisciram circa Thet modicentem annem apes tam in terra quàm in alueis faciunt fauos, qui parvi admodum cere coniungunt, & mel crassius reddant. Fauus ipse levis atque aequalis est, quem non semper, sed hybernis temporibus tantum construunt: copia enim in eo tractu est hederæ, quæ hyeme floreat, unde apes mel capiunt. Ad Amyssum urbem conuehitur à locis superioribus mel cæcidium, crassiusque maiorem in modum, quod aper faciunt in arboribus sine fauo, quale etiam fieri in Ponso cognitum est. Sunt etiam apes quæ fauos sub terra triplici ordine faciunt, in quibus mel est, uetris nullus: uerum nec faui omnes eiusmodi sunt, nec apes ita omnes confingunt.

Mel cæcidium.

Bis notis tribuere regibus apum, quas Vergilius apibus ipsi. 1. Quasi combustis, Theodorus dordum repandum legit. sed nos hunc locum ita reddidimus tam ex Gæta lectione, tam ex ueteris interprete consententibus.

Ratio operis & uita apum.

Cap. CCIII.

Sed perquam uaria in earum operatione & uita, ratio est: apes enim fere cum alueum receperint mundum, primum fauos cõstruunt, ceram fingunt, hoc est, domos cellasque faciunt: deinde sobolem, postea mella. Primum itaque construere incipiunt fauos, deferentes ex floribus, atque etiam ex arboribus lachrymas, salice & ulmo, & aliis quæ glutinum pariant. His-

Cque pauimentum & alueum ipsum intus totum, ut quodâ testorio illant, ne bestiolæ nocuæ subeât. Vocant hoc opus apiarum *oikos*, id est testorium: aditus etiam si ampliores sint quàm pro fabricæ ratione, obstruunt coar-

oikos, uel oikos.

1ctant. Fauos deinde effingunt multi cauatos è cera primum in quibus ipse gignantur: deinde in quibus reges dicti & fuci (quanquam sunt qui fucos, ut dictum est & per se fingere fauos in eodem alueo, & cum apibus negotium conficiendi sui parturi dicant) suos certe semper componunt apes: sed regum cum scetus largior est, fucorum autem cum copia mellis operatur. Fauos regum suis similes faciunt, qui parui sunt: fucorum autem maiores quàm suos: & quandoque finguntur testium per se sua fucorum: sed magna ex parte inter fauos apum inferuntur. In fauis cellæ omnes (quæ & loculamenta dixeris & loculos) tam mellariz quàm sobolariz gemino sunt o-

fauus, regum.

Dstio: uno enim eodemque intersepto, & bali duæ sibi iunguntur cellæ modo poculi gemini, altera intus, altera foris. Sicutque loculi ipsi fucorum ampliores. Cellam facit apis ex angulis totidem, quot habet ipsa pedes (quot geometriæ *apices* fieri in orbe rotundo ostendunt) ut plurimum loci includat.

*cellæ.
Loculamenta.
Loculi.
Ovis, ac.
Kistagm.*

3 Cellæ quæ parietibus principalisue fauoræ proximæ sunt, arctiores & melle uacue gemino aut triplici uersu plenes autem sunt faui, quibus plus cere obducitur. Ad ostium ipsum aluei, prima aditus pars illa est ex mixto, quod uelut exitum tantum purgantissimum certe est, bene nigram acrisque odoris medetur hoc plagis, & huiusmodi suppurationibus. Proximâ ab eo testoreâ crustâue pelloccrasi: leuius hoc quàm mixtis, minusque medica-

*mixto.
Cremagis.*

*Purgantiss.
Poculus arctus*

Alcyon. Prima fundamenta operis murem vocant peritis: secunda pifloceron, tertia E propolin inter coria cerasque, magni ad medicamina usus: murex crusta est 4 prima saporis amari: pifloceros super eam venat picanum modo: ceras dilu-
Pifloceros. 5 tior, ceræ autem plerumque è minori gummi: propolis crassior iam ma-
Propolis. 6 terie additis floribus, nondum tamen ceræ, sed sanctorum stabilimentum
Alcyon. qua omnes frigoris aut immitæ aditus obstruunt, odore etiamnum graui,
ut quæ plerique pro galbano utantur. Propolin vocant, inquit Varro, è quo &
faciunt ad foramen introitus protectum in aluum maxime æstate: quam
reta etiam nomine eodem medici utuntur in emplastris: propter quam
rem etiam carius in sacra uia quàm mel uenit. De propoli Dioscorides hæc
produit, In aluorum foribus inuenitur propolis, sua natura ceræ aspectu 7
similis. Eligenda est flaua, odorata, & styracem referens, in uehementi an- 8
ditate mollis, & mastiches in modum ductilis. Fenos itaque primum in-
rus, ut dictum iam est, conficiunt apes: mox collocant forum ore emitten-
tes suo, uti si placet qui censent aliunde prolis primordia conuehi (de ge-
neratione namque eorum uaria sententia est.) Deinde cibi causa mellifi-
cant, ore euocantes in cellas: mel enim apibus tum æstate tum hyeme in
cibo est: sed præter hoc conuehiunt reconduntque alteram quoque cibi-
Santhoglia. 9 rij genus, cui durities ceræ proxima, quod Sandaracan nonnulli appel-
Erihacen. lant: alij Erihacen, alij Cerinthum. Hic erit apum, dum operantur, cibos,
Santhoglia. qui sæpe inuenitur in flororum manicatibus sepelitus, & ipse amari so-
Cerinthum. 10 poris, ut Plinius docuit. Gignitur autem rore uerno, & arborum succo G
gummi modo: Africi minor, Austri flaua nigrior, Aquilonibus melior &
Cerinthum. 11 rubens. Erihacen uocant, inquit Varro, quos fenos extremos inter se con-
glutinant: quod est aliud melius propoli, itaque in hoc uim esse illicendi.
Quocirca examen ubi uolunt confidere, eum rasmum aliamque quam rem
obtinunt hoc, admissio apiastro. Cerinthum Aristoteles melle quidem de-
torem esse scribit, at dulcedine prope sicus. Congerunt hoc apes suis cru-
ribus, ut & ceram. Carnem nullius animalis tangunt apes, nec opsoni ap-
petunt: mortui ne floribus quidem, non modo corporibus insidunt. Apes
insectorum una nullis putidis assidet: nec utitur alio cibo quàm dulci: aquam
etiam libentissime haurit, quæ sine nectariis que fontes secanturunt. Gau-
dere plausu atque sonitu apes uidentur, quæ propter tantum æris aut si-
ciliis conuocari eas in alueum aunt: quanquam incertum est an audiant & uo- 12
Cerinthum. 13 lunt, an formidine ita faciant. Hyeme conduntur, adeo ut nec cibum
sibi appositum gustare uideantur. Et si quæ creperint, æterna spectantur uentre
translucente, nulloque penitus contento quod in arsissum sit. Cõstuntur
à Vergiliatum occasi usque ad uer inquit Aristoteles: Plinius autem, Iacet
ultra exortum, ait, adeo nõ ad ueris instum, nec ut quisque in Italia de al-
ueis existimat: ante fabas floresque non exiunt ad opera & labores. Colo-
mella, post confectam, inquit, biuam diebus fere quadraginta, quicquid
est repositi mellis (nisi liberalius à curatore relictum sit) consumunt apes:
& sæpe etiam uacuas ceras usq. in ortu Arcturi, qui est ab idibus Februa-
riis, ieiunæ suas accubantes torpent more serpentum, & quiete sua spiritum
conseruant.

- A** conferunt. Post hoc tempus cum dei permittit hilaritas, procedere audeat in pascuam ab æquinoctio uerno sine cunctatione iam passim uagatur, & idoneos ad scenam deserpunt flores atque intra tecta comportant. Duo-decimo quinquagesimo die ab æquinoctio uerno, cum sit uergiliarum exortus, circa v. idus May incipiunt examina uribus & numero sugere. Singulis deinde muneribus se distribuunt apes, ut alie ex floribus conuehant alie mel, alie erichaceas, alie extuant & poliant fauosalie aquam importet ad cellas, & cum melle temperent. Gerule secundos flatus captant iuxta uero terram uolant in aduerso flato uepribus hebetato. Nullum his tempus certum consuetumque est quo operari incipiant: sed si rebus abundant necessarii, benèque degunt, æstiuo potissimum tempore opus aggrediuntur.
- B** & quando serenum sit assidue operantur: nullasque cum per celum licuit, otio perit dies. Socias quoque ciosas & desides ac minus parcas pellere, in more apibus est. Apum seniores intus operantur: hirtioresque morte domestice ratione sunt: adolescentes foris negotium exerceant, & ea que res exigit portant, leuiorèsq; sunt, labore hirtutis detrita. Prælagiuntque apes & hyemem & imbres: cuius rei indicium est, quod non uolant: sed ferreo adhuc, in alueo uolunt: quo apiarum hyemem expectant. Tempore matutino omnes silent, donec una gemino aut triplici bombo exciet omnes: tum uniuersæ ad opus prouolant. Cùmque redierint, primum item tumultuant, paulatimque matius subinde strepunt, dum una circueolant.
- C** do susurret, quasi docuendū præcipiatum repente omnes contricecunt. Dignoscitur examen ualere susurti frequentia, & exarandi ingredien dique agilitate: hirsutius præterea & tutore sanitas æstimatur. Cum migrandum est, uox solitaria & peculiaris quardam aliquot ante diebus intus mittitur & bi duo aut tri duo paucè circa alueum uolant. Ab exortu autem uergiliarum ad solstitium, quod sit ultimo mense Iunio, ut tradit Columella, fere examinantur alui quo tempore uehementius custodiri debet, ne noue soboles diffugiant. Vita apum anni sex: nonnullæ etiā septem possunt complere. Quod si examē nouem aut decem annos durauerit, prospere actum esse existimatur. Efferunt foras uita in alueo defunctos: & cætera mundissimum omnium hoc animal est. Amoliuntur omnia è medio, nullasque inter opera sperantiae iacent, quin & excrementa operantium intus, ne longius recedant, autem congesta in locum, turbidis diebus, & operis otio egerunt. Septennumero & cum alui necessitas est, auolant: & in feces illas reddunt excrementum, quoniam male oleat. Oderunt autē non solum fædus odores, sed etiam unguentorū delicias: ex quo fit ut homines his delibutos percutiant.

1 *Edomus* an *uénar* potius? Melliginem, ni fallor, hoc uocat Plinius. 2 *Fauos* *Ateliga*, dēinde, &c. *Fauos*, inquit Varro, est quæ fingunt multo cauatum è cera. 3 *Celli* faciunt apes, Plinius, Hæ, inquit, cellarum minime, sed ipsi (faciunt scilicet) maiores apibus. *Ant* fortasse fauos intellige, non loculam tæta ipsæ. 4 *Myris*, alia, communis, atque *Commefia*, ita uocat Theodorus pro myre, inter conaserisq; id est, inter priores illas cardias & fauos. 5 *Prima*, alia, nigra, uita hic notatur lectio pliniana. *Populi*, inquit Plinius, ferunt in folijs guttam, ex qua apes propolim faciunt. 6 *Propolim* uocat. *Vadit* Varro hoc nomine duplici illa Aristotelis, aut triplici Plinii fundamenta cō-

DE DIFFERENTIIS

plecti. Hæc Clajmond. 7. 46m cap. ubi, id est (ut equidem arbitror) substantia ce-
re similia, vel stipedu similia cere. 8. 46. 36m, 37. 26m quandoque vocantur, nisi men-
dosa sunt Aristotelica exemplaria.

De generatione apum.

Cap. CCIII.

DE generatione apum varia sententia est: magnæque inter eroditos &
subtilis quæstio fuit: alij enim eas parere & coire negant (apum co-
ritum cotus utilis est nunquam) sed ex floribus quibusdam deportare fortu-
ram existimant. Sûr qui fucorum quidem fortunam comportari è floribus,
illis arbitrentur, sed apum generi ortum præstari à ducibus hoc argumêto
referunt, quod fucorum fetus editur etiam sine duce, apum nunquam. A-
liqui per coitum agi opinantur, marèsque esse fucos, feminas vero apes ef-
se contendunt: alij contrâ, apes mares esse, fucos feminas opinantur. In ista
rei humane ambiguitate, cum non satis adhuc explorata, quæ in earû ge-
neratione eveniant, habeamus, rationi interim fides adhibenda est præter-
tum cum quæ afferantur, conveniant cum his quæ sensu percipiuntur. Du-
ces uel abique coitu generant & seipsos & apes: apes deinde fucos procreant,
ipsi uero fuci nihil insuper generant: sed in tertio numero finem gene-
ratio recipit. Et cum ceteræ in concubis uniusque fauorum proveniant, do-
ces subter ad fauum pendentes oriuntur. Fiant autem schadones optimæ
(sobolem dico) cum mellificatur fortu posito, apes incubant autem more.

Schadon.

*Res, si aff mel-
li coloris, in-
que Plinius:
Stacim pueri-
gor, Plinius.*

Fortis apum & fucorum, ex quo uermiculi fiunt qui in apes fucosque trās-
eunt, candidus est, primæ ordium regum colore. Cernitur fuluo, corpulentia
mellis crassioris, magnitudine dico proxima suæ sinæ: sobole nec peimû
ex eo uermiculus gignitur, sed statim apis, ut aiunt. Vermiculus dum par-
uus est, iacet in fauo obliquus: post deinde, sua ipsè facultate se erigit, ci-
bèmq; capet, & fauo ita adhæret, ut retineri uideatur. Schadonibus dum
membrana inuoluuntur, & pedes & alæ innascuntur: atque sub ea specie,
cum scilicet formæ huiusmodi receperint, nymphæ appellantur: iam neq;
cibum præterea capiunt, neque ullum alui reddunt excrementum: sed coer-
cti & contracti quiescunt, nec ullo pacto se mouêt, usque dum species de-
stinata perficiatur. Et cum iam ad finem generationis uenerunt, rupta qua
cinguntur membrana, euolant. Peragitur autem fortis intra x. v. diem:

Nympha.

Nympha.

non apem tantum, sed & crabronû & uespærum fortis cum iam formæ li-
niamenta experint, eodem modo nymphæ dicantur. Stercus quando sit,
uernis emittit: postmodum non nisi perfectæ, (ut modo dixi) prodierint.
Nouellæ istæ tertio quam prodierint die, statim negotium incunt, si cibus
suppetat. Humido uere melior scæus, ut sicco mel copiosius.

1. Variâ sententia est, &c. Ambiguitatem hanc quæstionemque pluribus uerbis
explicat Aristot. lib. 3. de generat. animalium. 2. Sunt qui fucorû, &c. Plinius, Sunt
qui apes in totum amissas reparari putant, uentribus bubulis recentibus cum fimo ob-
runt: Vergilius, iuuenecorû corpore exanimato: sicut equorum uespæ atque crabro-
nes, sicut asinorum scarabeos.

De mor-

A De morbis apum, & his quæ aliis inimica sunt apibus.
Cap. CCV.

Pereunt apes tum a liis easibus, tum utro cum mali principes orti partē quisque secum quod libuit, abducant: nascuntur aliquando in extremis fa-
mis apes grandiores, quæ cæteras fugiunt, æstus uocatur hoc malum, ab eo
quod exagitet, neque patiatur examina conquiescente. Quin & morbos su-
apee natum sentiunt: index eorum tristitia torpēs, sicut hilaritate & nitore
sanitas æstimatur, ut modo diximus: ægrotant potissimum cum sylvas flo-
res æruginosos tulerint, atque etiam temporibus siccis. Aliud morbi genus
quasi ortum quoddam & ueterinitas apum incidit, cum fetido alui odore.

Ogletoni

Sanitas aut
morbositas in
apibus signa
explicat. P. 100
Incubentur.

Vitiant fauos aiant ex aranea, nisi suis fauis lucubent apes & concoquant:
quod si ita se cōtinere poterint, ut incubitu perseverent, efficietur aranea
illis uelut alimentum sin minus, pereunt toti faui. Gignuntur in his quæ ui-
tiantur uermiculi, qui mox penitus subnatis euolant. Apibus etiam bestio-
la quædam in alueis irascuntur, quæ fauis efficiantur uermiculus, quem

Clerus, alijs et
Pyramis,
uermiculus,
Hepidius.

1 alij clerum, alij pyramum uocant: hic uelut araneam facit in fauo. Nascun-
tur hi in pauimento, è quibus crescentibus, uelut aranea alueo toti obducit-
tur, & faui carie pereunt. Obest & alia quædam bestiola similis hepato-
lo, qui lacernarum luminibus aduolat. Hæc lanuginosum quiddam parit, nec
aculeo ab apibus stimulatur, sed tantum fumo abigitur. Eruct quoque na-
scentur in alueis ceredines dictæ, quas apes non indestantur. Papilio etiam

Teredines
T. quidam.

Cignatus, inquit Plinius, & inhonoratus luminibus accitis aduolans, pesti-
fer: nec uno modo. nam & ipse ceras depascitur, & relinquit excrementa,
quibus teredines gignuntur. Et Columella, Papilionem enecentur, inquit,
qui plerumque inter aluos morantes, apibus exitio sunt: nam & ceras ero-
dunt, & stercore suo uermes progenerat, quos alio eorum tineas appellamus.
Inter canucule & arcturi exortum cauendum erit, ne apes intercipientur
uiolentia crabronum, qui ante a lucariis plerumque obfidiantur prodeuntibus.
Cum eximuntur mella, apes abigi fumo utilissimum, ne irascantur,
aut ipse audiat uocem.

Teredines.

Tinea.
Et Virgil. lib.
4. Georg. Al-
mea uocat.

1 Quem alij clerum, &c. De clero ita habetur apud Plinium. Est in suis qui-
busdam qui uocatur clerus amara duritia cere, cum fixum inde non eduxerit morbo
aut ignia, aut infœrenditate naturali, hic est abortus apum: iterum, Sunt & operti
morbi cum fauos non expleat, clerum uocant. Verum aliter utrumque loci legi Clai-
mondus ex uetustis exemplaribus consuetudinibus: in peior loco, clauum: in peior
more, clarum, non clerum.

De melle. Cap. CCVI.

Ex floribus ceras fieri prodidere Aristoteles atque Celsus, ex maritimo
ore mella. Quæ ubi colligere apes, ore euomunt in cellas: & melle, u-
no alteroue ad summam diæ cellas replent omnino ante uergiliarum ex-
ortum, anel non fit. Crascescit autem mel, concoctum iam tempore. initio
enim ut aqua dilutam est, & primis diebus sine crassitudine cernitur, &
feruet ut multum, seque purgat: quod si exemplum eo tempore sit, crassius

Arel. lib. 1.

Hh

DE DIFFERENTIIS

dine caret: tunc utiesimo maxime hoc spissatur, mox obducitur tenui mem-
brana, quæ feruoris ipsius spuma concreuit. Indurum perfectionis in sa-
pore potissimum est: dulcius etiam quod crassius. Porro inuenitur in plan-
tarum foliis floribusque, quod neque succus eorum, neque fructus, neque
pars, sed eiusdem sit nature cum rore. Non tamè assidue hoc nec copiose,
ut ille, prouenit: sed maxime sydenam orta, præcipueque in ipso syrio ex-
plendescence fit: nec omnino prius uergularum exortu (ut diximus) subla-
eantis temporibus. Itaque cum prima auro-ra, folia arborum melle rosida
inueniuntur: ac si qui matutino sub diuo luere, unctis liquore uiscites, capil-
lümque concretum sentiunt. E fronde ac pabulis potus hic liquor, & in u-
terculos congestus apum: (ore enim uomant, ut diximus) ad hæc succo flo-
rum corruptus, & aliis maceratus, totiesque mutatus, magnam tamen cir-
lestitis nature uoluptatem affert. De apibus, inquit Seneca, non satis con-
stat, utram succum ex floribus ducant, qui protinus mel sit: an quæ colle-
gerunt in hunc saporem mixtura quadã & proprietate spiritus sui mutant.
ut quibusdam enim placet, non faciendi mellis scientia illis est, sed colligē-
di. Hoc uero nobis cõstat, materiam ex qua mel gignitur, eiusdem cum ro-
re generis esse: uidentur autem ex plantis è quibus colligitur, nonnulli ad e-
ius probitatem utilitatem accedere: talio quoque meliore qualitatem cape-
re mel, quanto iucundiore sit materia cera confecta. In quodam Ponti tra-
ctu, & in Sardinia, ubi ex absinthio apes mel colligunt, amarum gignitur.
Tannümque pabulum refert, ut quibusdam in locis mella quoque uene-
ta fiant. Heracleæ in Ponto, quibusdam annis, perniciosissima existit: nec
dicere auctores è quibus floribus ea fierent. Nos trademus, inquit Plinius,
quæ comperimus. Herba est absinthio & tumentorum quidem, sed præci-
pue caprarum appellata. Egolet throne huius flores concipiunt noxiã ui-
rus aquosã uere marcescentem: ita fit, ut non omnibus annis sentiat hoc
malum. Aliud genus in eodem Ponto, gente Samnorum mellis, quod ab
infantia quam gignit mammonem non uocant: id existimatur contrahi flore
rhododendri, quo scærent syluæ. Et in Perside, & in Mauritanie Cæsari-
ensis Getulia, consermina Massæalis uenenati fani gignantur. Præstantissi-
mum gignitur mel, ubi thymi copia est, aliarumque tum herbarum tum fru-
ticum, quæ natura calida sicci que consistunt. Quod ex huiusmodi generis colli-
gunt plantis, tenuioribus partibus constat: quo fit, ut & facile in hilem uer-
tanar, in calidis saltem corporibus, & acrimoniæ quiddam in se habeat, quæ
aliuam citet. Summa quidem bonitatis, natione constat optimum hybicum
ex Sicilia, Thasiam aut certe Anticum: mox quod è Cycladibus affertur &
Lithimo. Mel quoque & in aliis regionibus optimum conficitur: sed quod,
cum ab incolis ob eius exiguitatem absumatur totum, in alia loca non per-
fertur: atque fit, ut manus celebre scriptoribus habeatur. In quocunque ta-
men tractu terna sunt mellis genera: uernum, ex floribus constructo fuso,
quod ideo uocatur anthimum. Alterum genus est mellis æstiu, quod ideo
uocatur hortum à tempestiuitate præcipua ipso syrio explendescence, post
solitium diebus triginta scere: nam ab exortu syderis cum incunquæ, sed no-
billum

*Mammonem
mel.*

Mel anthim.

Hortum mel.

A bilium maxime, aut celestis arcus si nō sequantur imbres, sed ros tepescat
 solis radiis, medicamenta non mella gignantur, oculis, ulceribus, interitū-
 que ulceribus, dona celestia. Quod si tractetur hoc symo oriente, calisque
 congruat in eundem diem, (ut scpe) Veneris aut Iouis Mercuriusue exortus
 non alia suauitas ulique morum malis à morte uocandis, quàm diuini
 mediarum fiat. Tertium genus mellis minime probatum, syluestre, quod *Mel syluestre.*
Mel ericam.
 ericæum uocant: conuehitur post primos autumnii imbres, cum erica so-
 la floret in syluis, ob id arenoso simile. Gignitur id maxime arcturi ex-
 ortu, à prædictis idus Septembris. Hæc Plinius. Varii quoque, Eximendo-
 rum, inquit, saniorum primum tempus esse putant, uergiliarum e eortum.
 Secundum altare exacta antequam totus exortatur arcturus. Tertium post
 uergiliarum occasum. Præstantissimum, ut ait Dioscorides, uernum, dein-
 de æstiuum: hybernium uero determinunt effut quod iusto crassius est. Ari-
 stoteles uero mellis cōficiendi duo tempora prodit, uer atque autumnium.
 Sed uernam, inquit, suauis, candidius & omnino præstantius autumnali
 est. Rustum de formis fani uicio redditur: quippe quod perinde ut uinum
 à uase uicetur: probatur mel, cui est color aureus. Quod autem albacat, nō
 synæro thymō cōfectum est: sed id oculis atque ulceribus cōmodius ap-
 plicatur. Mellis natura, inquit Galenus, acrimoniā dulcedini cōiunctā
 habet, ut præstantissimum id indicetur, quod nois hinc dactylis insigni sit.
 Colligitur enim & mel tum ex plantis albis, tum etiam ex Cytiso, quod dul-
 cedine uel cum Anico certet, aut etiam superes, acrimonia tamen carat,
 statimque gustantes auertat: atque si paulo liberalius capiantur, nauicam cō-
 citet: præcipua igitur bonitatis argumenta hanc fununtur. Sequēs proba-
 tio à colore, substantia, & odore. Quod enim colore fuluo est, & odore sua-
 ui, tum purum adeo ut totum pelluceat, ac gustanti subacre, tum subtilitas
 nec plane crassa nec liquida: præterea tam sibi cohærens, ut si digito attolla-
 tur, continuū sibi nec interitum ad huiusmodi dehisce longissima quasi li-
 nea sibi continuata, id omnium est optimum. Si uero abruptatur, nec
 demissam ad terram usque continuitatē seruat, id crassius iusto est, aut te-
 nuius, aut partes habet non usquequaque similes: deprehendas autem id si
 diligentius inspicias, aut crassitudines aut humiditates habere innatantes,
 quæ nec inter se sint similes, nec etiam totæ. Itaque ad cere naturæ propius
 D accedit mel quod & crassius est, & cui tales quædam partes innatant cras-
 siores. Excrementosum uero ac perfecti concoquique difficultus, tum quod
 totum humidum est, tum in quo mular in partibus sparæ apparêt humo-
 ris gutta. Porro in quo uel cere qualitas uel propolis, uel id genus alia gu-
 stu deprehēdatur, adeo non est optimum, ut etiam malum sit. Quippe nul-
 lam penitus alie rei cuiusquam rei insignem in se continere qualitatē de-
 bet. Quocirca quod thymum plane redoleat, non probatur, inquit Galenus
 quanquam non ignoro à quibusdam id laudari: eoque fieri ut nonnulli us-
 ditiores in ea thyma possit illa inticant, quo id redoleat, uideturque optimū.
 Ipse tamen quod tam improbe thymum olet, non laudo: multo que minus
 si in ea thymum sit: quod tamen exigua quandam qualitatē emodo-

DE DIFFERENTIIS

re gustus præfert, id nō vitupero. Malum item mel iudicatur, quod inter E
coquendam multam egerit spumam: quo etiā diutius coqui debet. Opti-
mum vero, ut breuissimo tempore coquitur, ita minimū spumæ euomit.
Non omnibus similiter hominibus, æqualis ex melle gignitur bilis copia:
siquidem qui iam in flore sunt, potissimū si calidior natura sint, ac unam
degant laboriosam, in his totum mel uertitur in flauam bilem: senilibus uero
& quibuscumque puerilem naturam habentibus, admodum est accom-
modum ut pote quibus non in bilem, sed in sanguinem conuertatur. Postu-
lat namque quò in sanguinis naturam mutetur, naturam hominis frigidam,
ætatemque frigidam: sicuti in iis qui calida natura sunt, & ætate florētibus
proempe in bilem uertitur: nō ab re igitur censuit Hippocrates mel bilio-
sis naturis non esse ex usu, ut pote qui calidiorē sint temperie. Ad eundem F
modum morbis quoque quæ amara exciunt bilis, mel inimicum esse, nō
solum Hippocrates, sed etiam omnes medici affirmant: sicuti & iis qui ex
pituita nascuntur amicum: nōque uerbo, calidis quidem corporibus, siue
ea natura ratione, siue morbi, siue ætatis, siue temporis anni, siue regionis,
siue conditionis uite talia sint, bili generandæ causam præbere. Abstinen-
dum itaque quoad fieri potest in heclicis febribus à melle est: atque adeo
etiam à melle: quippe prodius uertitur in bilem, & faciores acriorisq;
caloris febres reddit. Aliis uero, ubi uenter siccus frigidusque sit, dandum
uberius unā cum lacte mel est, sed detracta prius spuma, quo & minus sit
excrementosum, & magis nutriat. Quin etiam mel ipsū despumatū per-
coctumque per se, optimū nutrimentū frigido uentriculo est, ita ut calido G
aduersissimum: adeo ut tūc frigido corpori melle potius expetere, neque
ad calidum magis respicere oporteat. Ergo plurimum huic affectui, uentri-
culo inquam frigido, pro nutrimento mel optimū est: sed quod prius si-
per primas ex queru uiscē ad summum candētes, aut ligna omnino ari-
da: quæ etiam acapua Græci uocant) fuerit decoctum, & accuratè despu-
matum: quod ipsum tamen (quod omnium dulcissimum est) si plurimum
percoquere uelis, ex dulcissimo reddideris amarissimum: coctione namque
amarefcit mel, sicuti & uetustate: nō inueteratum mel amarius redditur.
Proinde quod humum est uetustiori præfertur, sicuti & recēiori. Exsiccat
mel calidiusque secundo ordine insignem habet abstergendi uim, aluum
ciēt, ora uenarum aperit, in sordida ulcera sinūsque utiliter infunditur. Co-
ctum minus acce mordaxque efficitur: minus aluum mouet, carnem gla-
tina. Et mellis præterea natura talis est, ut putrescere corpora nō sinat: tui-
eibus, tonillis, anginis, omnibūque oris de sideris, collutū gargarizanti-
ue unguentum. Iam uero peripneumonici, pleureticis, decoctum auxilia-
tur tussī, urinam ciēt, à serpente percussis medetur: & contra uenena fungo-
rum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit. Cnadam tamen
abrum infiat, tussim laceffit, salidum creat: quam obrem despumati usus
aprior est. Mel auribus instillatum, cum rosaceo, ut inquit Plinius, ut uero
Dioscorides cum fossili sale trito, aurium sonitui & dolori prodest. Lendes
& sceda capitis animalia necat: & oculis per se inuelle aliqui arbitrantur:
rursus

*Adel despumata
fit.*

*Quomodo co-
qui debeat mel
docet Galenus
lib. 4. de simi-
tate terenda.*

G

H

A rursus quidam angulose mulceratos melle tangi suadent. Diximus mellis uenienati genera contra quod utuntur melle in quo apes sint mortue. Idem potum in uino remedio est uisiosum, quæ cibo piscium gignunt. Mel item utilissimum oculis & auribus, in quo sunt apes mortue. Est in iis quæ circa Hircaniam sunt regionibus bestiola quædam uolueris (archedonæ appellant)ape paulo maior, cætera multum similis, quæ in montanis plurimum uidetur, floribusque omnis generis alitur. In cauis autem fixis, aut arborum latebris fuos sibi construit, sacculumque nobilissimum ibi cogit, qui dulcedine mellis postro haud multum cedit.

Archedonæ.

1 Aliter quoque cum herbarum tum fructuum, &c. Quæ herbe, quæ fructus, quæque arbores ut aptius consideranda sint, ut mel fiat quàm probatissimum, docet re multos scriptores, ac ut primis Palladius. 2. Optimum hyblæum, &c. Plinius: Atticæ regionis hic, & Siculæ, Hymetto, & Hybla ab locis, mox Calydne. Mel coricū, inquit Plinius, asperitum habetur. 3 Aliter lib. 7 histor. animalium habetur: melius mel aurum acile est, nisi forte mendoso sint exemplaria.

De cera & propoli.

Cap. CCVII.

Mellis naturæ adnexa cera est. Fit expressis fauis, sed ante purificatis aqua. Omnis cera mollit, calfacit, modicè quoque explet corpora, recens melior. Ut uero Galenus docet, medium habet temperaturam calfacientium, refrigerantium, humectantium & exsiccantium. Atque aliorum medicamentorum calidorum frigidorumque ueluti materia: crassiorum est partium, æque emplastica, foris quoque imposita concoquendi uim habet exiguam quandam atque imbecillam & calidam. Et ut Paulus tradit, uim habet abstergenti. C. d. Datur in sorbitione dysentericis: fauisque ipsi in pulve alice prius tollit. Aduersatur lactis naturæ ac nulli magnitudine x. grana cera hausta lac in nutritibus non patitur coagulari, uti tradit Dioscorides: ut uero Plinius, non patitur coagulari lac in stomacho. Cera optima (Dioscoridi) est subfusa, subtinguis, odorata, & halitum quandam melleum referens. & puræ natione Pœnica aut Cretica. Secunda bonitas clidida, & quæ sua natura pinguis est. Hæc Dioscorides. Plinio uero auctore, optima est quæ panica uocatur, & medicinis utilissima: proxima quæ sulua, odorisque mellei pura, nationisque Pontica: deinde Cretica (plurimum enim ex propoli habet) post hæc Corica: quoniam ex bazo fit, & habere aliquantulum uim medicaminis D. putatur. Nigrescit cera addito chartarum cinere: sicut anchusa admixta rubet: uariosque in colores pigmentis trahitur, ad reddendas similitudines & innumeros mortalium usus. De propoli diximus in natura apum: calfacit secundo ordine, aut inchoante tertio, leuiter abstergit, euocat aculeos, & omnia infixæ corpori extrahit. In ueteri tussi suffita iuuat, lichenas adnota tollit, dura concoquit, dolores neruorum mulcet, ulceraque desperata cicatrice includit. Deligenda propolis, uti modo diximus, flaua, odorata, Syracem referens, & in uehementi ariditate mollis ac quæ mastiches in morem ductilis sit.

Cera, apule.
Quomodo fiat
ex fauis cera,
docet Plinius
lib. 22.

Propolis.

1 Candida, &c. uti. Cera candida quomodo fieri debeat, docet Dioscorides: & quomodo Pontica, Plinius.

Hh ij

DE DIFFERENTIIS

De uespis, crabronibus & renthredōne. Cap. CCVIII. E

*Vespa, quædam.
Crabronia.
At Spilæ.*

Cognationum apud animalium, ut uespârû crabronûque, quod ad generationem pertinet, similis quodâmmodo ratio est: generatione uero coeundo inter se iunguntur matrices: uisus est enim saepe eorum coitus. Crabrones & uespæ si duce amisso aberrauerint, fauos sicut proli constituunt, crabrones in sublimi, uespæ in cauernis: sed si habent duces, sub terra nascuntur. Cellis saxangulis fauos extruunt omnes, ut apes in cera, sed ex materia coriacea quâdã & arenosa, longe tamen magis solutus fauos crabronum quam uespæ est. Non in omnibus cellis simul est & æqualis. Non in æqualis sed inæqualis & barbarus (inquit Plinius) & in aliarum grandiusculis, ut uel queat uolare, alii in nympha est, alii adhuc in uermiculo. Excrementum utrimque tantum, ut & in apum genere est & minime scetus immobilis cum in nympha est, & membrana uelut in apes, unicolores sunt ma-

*Vespa, quædam.
Vespa ferax.*

gis quàm crabrones & uespæ. Porro uespæ duo sunt genera, alterum ferum, alterum placidius. Ferum illud genus rari est, nascens in montibus, & pariens non sub terra, sed in quercu, grâdus, porre citius, nigrius, uariam etiam aculearumque estiaculeo enim maiore quàm ex portione sui corporis spicatur. Viuit hoc genus toto anno: & quidẽ repore hybernus, quercu cesa euolare spectatur. Exigit hyemem in labea, & semper in materie arboribus uersatur. Sunt eius alie matrices, alie operariæ, ut & in altero genere quod placidius est. Sunt enim huius quoque duo genera alterum duces,

Vespa minor.

quas matrices appellant, alterum operariæ, maiores matricesque duces sunt. Aetas operariarum annum non cõplet, sed omnes hyeme inualeſcente moriuntur: quodea re constat, quia hyeme incipiente stupeſcunt: bruma autem nulla omnino apparet: duces uero qui matrices uocantur, tota hyeme uisuntur, atque sub terra latent. Plerique enim cum per hyemem ararẽ aut foderent, matrices uiderunt, operariæ nemo. Est autem matrix laxior, potius derosior, crassior & maior quam uespæ: uolarumque haud plurimum ualent præ pondere enim sui corporis, uolare longius nequit: quo fit, ut semper in uespæ sedent effingentes fauos, & munere fungentes cellario. Infant porro matrices nuncupantur in uespæ plurimis: sed aculeatæ sunt, necne ambigitur. Videntur tamen & ipse, ut apum duces, gerere quidẽ aculeum, sed non extingere aut ferire. Vespæ autem alie carent aculeo, ut suæ, alie habent: minores imbecillioresque sunt quæ carent, neque se quidẽ repugnantes. Contrâ, quæ habent maiores, robustæ atque pugnaces, quas nonnulli mares appellant: feminas uero eas quæ carent. Plerique ex his quæ aculeum gerunt, acutere cum putantur hyeme instare: sed nobis hæcenus uidere non contigit. Si uespæ ex pedibus exieris, bombilareque si ueris, adolant quæ aculeo carent: quod non faciunt quæ aculeatæ sunt. Itaque argumento quidam hoc utuntur, ut alteræ mares sint, alteræ feminæ. Ex ferarum nonnullæ coire uisæ sunt: & alteram gerere aculeum cõstuit: sed de altera incertum est. Ex cæteris quoque coire nonnullæ uisæ sunt: sed an ambe aculeo careant, an habeant: uel altera habeat, altera careat, nondum exploratum est. Sed fortis tamen non partu prouenire uidetur:

*Matris, uel
dux uespæ.*

Partu uespæ.

sed non extingere aut ferire. Vespæ autem alie carent aculeo, ut suæ, alie habent: minores imbecillioresque sunt quæ carent, neque se quidẽ repugnantes. Contrâ, quæ habent maiores, robustæ atque pugnaces, quas nonnulli mares appellant: feminas uero eas quæ carent. Plerique ex his quæ aculeum gerunt, acutere cum putantur hyeme instare: sed nobis hæcenus uidere non contigit. Si uespæ ex pedibus exieris, bombilareque si ueris, adolant quæ aculeo carent: quod non faciunt quæ aculeatæ sunt. Itaque argumento quidam hoc utuntur, ut alteræ mares sint, alteræ feminæ. Ex ferarum nonnullæ coire uisæ sunt: & alteram gerere aculeum cõstuit: sed de altera incertum est. Ex cæteris quoque coire nonnullæ uisæ sunt: sed an ambe aculeo careant, an habeant: uel altera habeat, altera careat, nondum exploratum est. Sed fortis tamen non partu prouenire uidetur:

- A detur. Itarum enim antioch quam parvis uestipatiatur, erisibit. Vespae tem-
poribus sicca, locisq; uel asperis potius oriuntur: ostas sub terra agitur, uti di-
ximus. Est autem ortus uestiparum talis. Duces ubi locum sibi sub terra op-
portunum delegerunt, fauos inuente astate consingunt: & uestipa siue cel-
lulas paruas (apocellae uocantur Graeci) constituunt quaternis foriculis aut prope,
in quibus uestipae, non matricibus nascuntur: quae cum increuerint, rursus
altera ampliora effingunt: quorum item proles eum creuerit, alia faciunt:
ita ut postremo maximum plurima simplicissimaque uestipa condita habeant
eius in quibus duces, quae matrix uocata est, non insuper uestipas, sed matricibus
iam procreant, quae quidem superne per summa uestipae uerticis specie mul-
to grandiorum gignantur in cellulis coetivatis quatuor numero, aut pos-
sio pluribus: alioqui increfcenti ratio ducibus, eadem quae uestipae est. Cate-
rum utrum duces anni superioris, nouellis iam procreatis ducibus, intereant
una cum uestipas nouellis, ad quae simili modo semper eueniat, an amplius e-
uam temporis possint uiuere, nondum exploratum est. Pungunt fauos fauos
ex congerie terraeque incipientes ab uno scilicet primordio, quasi ab radice
unum queneque fauum consiciunt. Cibaria autem & ex floribus quibusdam
& ex fructibus petunt, sed quamplurimum ex carne uestipae serpentes aut
de uestipantur, inquit Plinius, quo alimeto mortiferos scitus faciunt. Matricibus
aestate procedente apud uentos colligunt lentam quandam & gummo-
sam materiam. Sunt uestipae quaedam ichneumonones nuncupatae, quae mino-
res quam ceterae sunt phalangia ueniantur & perimunt, (unum genus ara-
neorum hoc est) & in nudos suos ferunt in parietinas aut aliquid tale fora-
mine peruium: deinde illinant luto, atque ex his incubando suum genus pro-
creant. Talis uestiparum ratio est. Crabrones quoque magis uario colore
sunt, quam apes. Cum in genere apum careant aculeo & fuci & rege, atq;
etiam uestiparum nonnulli inaculeate sint, ut ante dixi, crabrones omnes
aculeo armantur: sed de eorum duce considerandam accuratius est, an ac-
uleum habeat: duces enim more apum uestiparumque crabrones habent, qui
proportione ad crabrones, maiores quam uestiparum ad uestipas, & apum ad
apes sunt. Degunt hi quoque intus, ut uestiparum duces: sed duces non plu-
res uno in singulis eorum alueariis oriuntur. Faciunt sibi alueum sub terra
crabrones, terra egesta for micarum more: examinis enim emissio, ut apum,
nulla eorum aut uestiparum fieri solet: sed qui subinde oriuntur nouelli, ibi-
dem manent: & alueum terra egesta, faciunt ampliorem. Amplificant ma-
iorem in modum fauos, & iam ex ualentiore quodam examine quasi tres
aut quatuor fauorum pleni excepti sunt. In cellis crabronum paululum mel-
lis, quantum gutta e regione proli paratur. Sed si qui crabrones suo alueo
aberrant, colligunt se in aliquam arborem, fauosq; ibi consciunt in subli-
mi, qui uel sepe conspicui apparent, in quibus unum procreant duces: qui
cum adoleuerint, agmen abducit, & secum in alueo collocat. Crabronum syl-
uestres, inquit Plinius, in arborum cauernis degunt hyeme ut cetera in-
secta conduntur. Vita bimatum non trahit, istas eorum haud temere sine fe-
bre est: auctores sunt ter nouenis punctis interfici hominem. De coena cra-

*Pipera,
et quatuor.*

*de uestipae
non nisi.*

*Alia, serpente,
Matrix.*

*Ichneumon ues-
pa.*

*Crabro.
et quatuor.*

brorum, nihil adhuc exploratum habeo, nec unde fortificet. Generationis E. uero rano quodammodo similis atque in apibus est, ut modo diximus. Cuius crabrones non ex floribus colligunt, ut apes, sed carne magna ex parte uiuant: unde fit, ut uersari uel in stercore saepe soleant. Veniunt enim muscas maiusculas, quas ubi corperint, abscesso capite, reliquum corpus gestantes amolant: sed pomum etiam dulce appetunt. Et inter canicular & arctum exortum crabrones ante alocaria plerumque apibus obsidianur prodeuntibus. Nec uero cibum rito apum sibi recondunt: sed ieiunium latent per hyemem, quo tempore plurimi moriuntur: an etiam omnes, nondum certum est. Tenthredo non dissimilis crabronibus est, sed uaria, & latitudine P similis apibus gregalis est. Cupediola hæc est, & ad culicem & pisces, & huiusmodi delicias, singularis hæc aduolat. Scitum sub terra edit, ut uespæ, in F fauis, amplum huius quoque tenthredenarium est, & luge amplius quam uespæ atque potterchus. Et hæc quidem gregalia sunt.

1 Plinius in habet, Vespæ (in sublimi) & luto nidos faciunt, & in iis ceras crabrones in caernis ac sub terra, r illi forte codices sint mendosi, uel Pliny uel Aristot., ut infra uideas, in crabronibus. 2 Vespæque Varro, uocatur quæ similitudinem habet apum, neque socia est operi, & nocte solet mori, quam apes à se fecerunt, secundum genus apum forsitan intellexit. 3 Pseudosphecen uocant, inquit Plinius, uespam quæ singularis uolet. 4 *vespa* hinc ab Aristotele, misallor, dicta est, id est uespæ amara. 5 Duces. Nec uespæ nec crabronum groin reges sunt, atque Plinius. 6 Incipit a stare, *sed* hinc *si* Xpou, Theodorus opere actius dixit. 7 *ole* uespæ, *si* hinc *si* hinc *si* hinc, id est quærens foriculis fore. 8 Crabro nam sylvestris, &c. Idem forsitan cili quos Aristoteles suo alio aberrasse scripsi. 9 Tenthredo, &c. Tendo, perit Theodorus, *mad* hinc *si* hinc dixit Nicander in cheniæ. Hermolitus anthredon as uel anthredon as parius uocari censet, non *si* hinc *si* hinc, quemadmodum corrupte legi dicit apud Aristotelem. De anthredon: supra diximus, sed in idem sit cum tenthredone nondum constat.

De sirene, bombylio, & bombycio.

Cap. CCIX.

*Sirena, apud.**Bombylio.**Bombylio.**Apud ipsam**terram, id est**ipsa, non super**ipsam terram.**Bombyx.**Bombyx.**Bombyx, Plin.**Bombyx.*

Ex eorum autem genere quæ fauos sibi faciunt, & si sirenis uterque minor, Equi fuscus tonas est: & maior, niger & uarius: uerum minime gregales sunt, sed solitarij. Minime gregalis & bombylius est ut apes & uespæ, sed solitarius ut sirenis uterque uerum inter hæc, maximas hæc est. Sub facis apud ipsam terram fortificant. Bombylij binus aut paulo pluribus cellulis: H mellis etiam prami cuiusdam inchoatio in his reperitur. Bombycem uocat Nicander, aculeo ferit ut uespæ, & corpore nigro est. Aliud inter hæc genus est bombycium, in Assyria proueniens magis quam supradicta. Nonnullæ ex bombycium genere (*si* hinc *si* hinc uocat Aristoteles) nidos in acutum excun- a tes in luto fingunt, salis specie applicatos lapidi, aut alicui tali, tam crassos durisque ut spiculis perforari uix possint. Patiunt in his & uermiculos produ- cunt candidos membrana obuolutos nigrescentiumque à membrana, cetâ in luto faciunt, quæ multo pallidior sit, quam cera apum. Ita Aristoteles. In iis natis, inquit Plinius, & ceras largius quam apes faciunt: deinde maiorem uermiculum.

A 1 Gorgalis & bombyliis, &c. Theodorus bobyceus vocat. 2 *capitulum* quod Bombyx. Plinius, suis specie, dicit Theodorus, quasi uitro illius reddidit. *capitulum*. 3 Patitur in his & uermiculus productus, &c. Et alia hori orago, inquit Plinius, & grandioris uermiculo gemina prodegens sui generis cornua eructa inde deinde quod uocat bombyliis (uel bombylium) ex ea necydalis, & hoc in sex mensibus. Bombyceatelas aranearum modo reorant, ad uertem huiusque scissuram, que bombycina appellatur. Hæc Plinius ex Aristotele ferre sed mea certe sententia, bombyceum hoc genus, quorum aliam esse originem à priore, dicit Plinius, non ex hoc genere uolucrum insectorum est, que saepe sibi faciunt sedes cruciarum postea genere, (de quibus infra dicemus) uel saltem *prodegens*, que ex eructis sunt.

De formicis & scorpionibus.

Cap. CCX.

Vere & formicæ, ut apes, laborem communicant: Et sepe iunguntur inter se uiuentium solis præter hominem. Et ciuile animal formica est nulli- *Formica nigra* ramen imperio subditum. Dentes habent formicæ, & aculeum gerunt, non in ore, sed parte posteriore. Formicarum negotia omnibus in præceptu habentur: uique eadem semita semper ambulant, & cubaria recondunt uel in annum, & cellas promptuarias faciunt, nec interdiu solum, sed etiam noctibus plena luna laborem exercent, imperlunio quiescunt, nemo est qui nõ uidcat. Gerunt onera mortis: maiora uertis postremis pedibus moluntur, humeri obnixæ. Silices inuicem earum attritos uidemus, & in opere semitara factam: leguntur & contra industriam suam formicæ absconditæ, uel concursantes, aut oia progerentes pluuiam præfagiunt. coeunt formicæ atque ex animalibus sui generis oriuntur: coeunt autem hyberno tempore. Vermiculum paruum nulli annexum, qui accrescens ex minutulo & rotundo, longiusculus fit, formamque accipit debitam. ortus eorum uertens tempore agitur. Formicæ origani sulphurisque puluisculo misperso relinquunt cauernas, aliisque migrant. Et contra formicas non minimum horrorem exunam si non sint rigui, remedium monstratur limo marino aut cinere obturatis earum foraminibus: sed efficacissime heliotropio herba necantur. Quidam & aquam diluto lacte crudo inimicam eis putant. Est autem formicarum pars pennata, pars uero impennis. Non sunt in Sicilia pennatæ, inquit Plinius: Aristoteles uero, in Sicilia non sunt hippomyrmeces. Inuenio & formicas herculanas appellatas: quibus *Formica pennata* tritis adiecto sale exiguo, plora, lepra, & lentigo sanantur. Formicæ quim- *Herculana formica* per se ouis formicarum ad aurum grauitatem: namque & hac animali est medicina: consilique urfos ægros hoc cibo sanari. Ne sint male hirsute, formicarum oia pueris infusata præstant. Est formicarum genus uenenum, non eas nouere in Italia: Solifugas Cicero appellat, salpugas betica. Animal est perexiguum (ut Solinus refert) aranæ specie, in Sardinia, in metal- *Salpuga* lis argentearius plurimæ occulte in reptat, & per imprudentiam superiorem- *Salpuga* tibus, pestem faciens solifuga dicta quod diem fugat. Sardinia est quidæ ab- que serpentibus: sed quod aliis locis serpens est, hoc solifuga lardous agris. Telephus Cretensis mortiferum genus quoddam formicarum esse dicit, quæ sacra nuncupantur: eodem nomine uelpas quasdam appellant. *Le-Lardæ*

- Solfagaria* in *gumminibus*. gumminibus innascuntur bestiole uenenatae, quae manus pungit, & periculam aures afferunt, solfagarum generis. Adversus has omnia eadē medentur, quae contra araneos & phalangia demonstrantur. Formicarū poruarum 4 generis sunt quae *arimae* aut *arimae* uocantur. Mel appetunt ut apes, quod uel ē longinquo olfaciunt. Galenus nō formicas, sed uermiculos *arimae* uocat, qui uerbis incute uere innascuntur, cum germinare uires incipiunt: earumque germina (quos oculos uocant) depascuntur: quamobrem agricolae, ut hos interimant, oculorum radices inungunt ampelide uocata terra. A enipe scripturae auncula quaedam *arimae* aut *arimae* dicitur. Serphum quoque uocant animalculum formicę speciei, quo & uelantur aurigulae. Aculeum habent apes uel quae intus conditū, & scorpis extra prominenter gerit: & in cauda unus inter insecta longo armatur aculeo: is & chelas habet, id est brachia bifurcas dentata forcipibus. Sēper cauda in istu est, nullōque momento meditari cessat, nequādo desit occasione, sent obliquo istu & insensu. Aculeus illi perforatus est, qua ueneni effunditur: quod si forte hominē salua imbuatur, hebetescit redditurque inualidū. Veneni ab his candidum fundi, Apollodorus author est, in nouem genera descripsit per colores maxime super acuos, quoniam nō est scire quos minime equales praedixerit: Geminos quibusdā aculeos esse, marēsque (suntissimi: inelligi autem gracilitate & longitudine. Maculas item habet scorpis mas in uentre chelisque & aculeo. Mas uenenō habet infestus extrema mitius. & Nicander octo describit genera. Primum albicat, & minime est letale. Secundum ore rufescente: ex cuius istu uehemens sequitur ardor & sitis intolerabilis. Tertium nigrescens istus inconstantem efficit mēbronum motum, & risum uanam inducit, qualis solet esse iustorum. Quartum colore est ad uiride inclinante. Hic simul ac quem prae percussit, frigus atque horror inuadunt, adeo ut uel in calidissimo tempore, grandine se obrui percussus existimet. Plura habet hoc genus eundē in modum, septena scilicet. Quantum huido pallidū colore est, amplo uentre distentoque herba nāq. uelicitur & inextinguibilis est: qui ab hoc percussus fuerit, illi bubo intumescit. Sextum marino cancro littorali simile est: septimum paguro: chelas quoque habet grādiorez, ut pagurus, gigniturque hoc genus ex paguris, in sicco caernā aliqui ingressus quibus in locis si forte moriuntur, gignitur inde huius generis scorpionēs: uel ut elegāssime de hac re cecinit Ouidius, H
- Concreta litoreo si demas brachia cancro,
Cetera supponas terra: de parte sepulra
Scorpis exibat, caudāque minabatur unca.
- Niduloron*. Octauum genus melichloron est, à colore mellico dictum: summae caudae nodos in hoc genere niger cristas habet locustae similes, obliquus hinc incessans hominibus infestissimum est. Constat, inquit Plinius, eos quibus septena caudae internodia, sūsiora esse: pluribus enim sena sunt. Venerunt quonibus medio die, cum incandescere solis ardoribus arēneque cum frigus inextinguibilis pota. Pestis impotuna, & quae graui supplicio, ita per tridū morte cōcitat: uirginibus letali semper ista, & feruens sese in uocem uirginum

Autem in maritimo exanthes caulis, priusquam aliquo fortuito ictu egerant uenenum. Proprium scorpionum, quod manus palmam non ferunt, nec nisi pilos attingere. Scorpiones in totam nulli animalium nocere putant, quibus non sit languis. Vermiculos quorum specie paruos & incubant: mox ut prolem perfectam, pelluntur ab ea ipsa, sicut & araneis accidit, & intermuntur à suis liberis, magno quidem numero. Serpens etiam undenos parit. Quidam & ab ipsis scorum deuorari arbitrantur: unum modo reliqui solertissimum, & qui se ipsius matris clunibus inponendo, uitas & à cauda & à morfu loco fiat. Hunc esse reliquorum uisore, qui postremo genitores conficiat superne. Hoc malum Africæ uoluerit etiam Aulstri facit, pandentibus brachijs ut remigia subleuant. Apollodorus plane quibuldā uelle pennas tradit: quod & Nicandrus confirmare modo diximus. Et Paulus quoque refert nonnullis in locis scorpiones alas habere, quales sunt locustas. In India apud Prasios, pennatos, magnitudine insignes, prodidit Megasthenes. In Africa quoque & pennati sunt, & alij unipēnes, septenis in cauda intermodijs. Saepe Pysylla in Italiam hos quoque importare conati sunt: sed uiuere intra Siculi eadē regiones non potuerunt. uisuntur tamen aliquādo in Italia, sed innocui, multisque alijs in locis, ut circa Pharam in Ægypto. Tertia uisunt scorpionessin Alkemio Carij monte Aristoteles tradit à scorpionicibus hospites non ledi, indigenas interimi. Scorpionibus cōtrarij in maxime inuicem bellio traditur, ut uisū quoque pascorē us afferat: & scorpionitas bellionum ueneno aduersatur: scorpionem trinum & unipolē, hux plagæ moderi tradunt. Ad eadem quoque estur affatus aut bibitur in meri cyathis duobus. Conuenire etiam aiunt iis quos uisera memorderit: & homini icto à scorpione, putatur esse remedio ipsorū cinas potus in uino, aut oleo meris. Cinerem scorpionum in pane sumi habent ad calculos pellendos: et si quis cum locusta edat.

an scorpiones pennatos inter leuēt hoc in loco Plinius, an importent

1 *Inter salpugas, id est, formice quæ equites appellantur. Theodorus.* **2** Nouere in Italia, &c. Alijs, non fere in Italia. **3** Solifugas, &c. Alijs, solipugas. *Solifuga salpuga dicta, quod dem fugiat Solius. Salpugum uocat Locutus. Salpugum Plinius. et salpuga dem opinor, intelligit.* **4** *Quæ uisunt aut uisunt, &c. Culices multos uocat hos salpuga, Theodorus, & nonnunquam culices.* **5** *Unus inter infesta, &c. Plinius: infesta uel solus scorpio brachia habet, & in cauda speculum.* **6** *Sunt qui duo prima genera unum faciunt: ut sit unum genus quod colore sit candidior, aut quod et illi rufescat.* **D** cuius istiusmodi efficax intolerabilem ardoremque, quod tamen minime letale sit.

De araneis & phalangijs.

Cap. CCXI.

Aranecorum his non absurde iungatur natura. Plura autem horū sunt genera: omnibus in eadem terra in crutibus, Et quæ caput minimum, toto quoque corpore paruo est: In latere exiles digni pro crutibus habent,

*Aranearum
signum
Aranæ.*

Cætera uener habet, de quo tamen illa remittit

Scamina.

*Phalangium
quæ dicitur.*

Phalanga ex his appellantur, quorum nonij morfus. Phalangium uero mor-
dax in duo distinguitur generatale nam simile iis quos lupos appellant, est
paruum, uariis, acuminatum, assultim ingrediens, *id est, pullex nō
cupatum*

*Phalangium
Phalangis
trita,
Pulex.*

cupatam. Alacrum manus, colotis nigri, cruribus prioribus longis, tardum E
& lente ambulans, nec uariis ualens, neque saliens. Reliqua propter hæc ge-
nera, partim nullum, partim certe exilium inferunt morsum. Aliud aranei
genus est, quod lycei, ad est lupi nomen accepit, & hoc uim inani non terunt:
quod uero manus est, asperam praelumque telam apud terram aut scæpes or-
ditur, cæuernarum exigua vestibula præpandens, & telarum primordiis in-
tus positus obseruat, dum aliquid in tela offendens commouerit, mox accen-
dit ut capiat. Quod autem in hoc genere uarium est, parum uilèque te-
lam sub arboribus facit. Tertium araneorum genus, quod sapientissimum
lautissimūque est, & erudita operatione conspicuum, textit primum fila
quoque uersus distendens in orbem, & stamina ducat, in medio à medio acce-
pit nec certe inficite medium ipsam accipit: deinde subtegmina infert te-
xitque stipans. Cubile uero & caput repositorium alibi sibi constituit, ue-
nationem in medio sui operis obseruando. cum enim bestiola eò incidit,
motu modice scurus accurrit, deninque primum obuoluit araneis, dum
defatiget infirmamque faciat: tum tollit ac desert. & si forte fame tenetur,
exugit (araneis enim erugete succū mos est.) Et hæc quidè fruitio eas est
sui nimis, recondito quod cepit in repositorio, repetit uenandi negotiū:
sed prius constat quod per uenatum lacessitū est. Si quid uero inter me-
dium & extrema incidit, primum ipse in mediū curret: inde ad id quod
incidit, uelut à stato initio properat. Si quis telam lacetari, texete nerū
incipit oriente sole aut occidente: quoniam bestiolæ temporibus his potius
finem offendant. Araneorum istorum lautiorum duo sunt genera, alterū G
minus, alterum maius. Quod dignum longioribus est scribere, pendens sub-
tus obseruat, ne bestiolæ præformidine sibi eueant, sed incaute incidit in
partem superiorem: non enim facile occultari potest, propter sui corporis
magnitudinem. At alacrum, quod moderatius est, superne obseruat latens
in quodam exiguo sub telæ foramine. Formina, ut opinatur quidam, & te-
xit & uenatur: mas comes fruendi, non laborandi est. At alij forminam
putant esse qui textit, matrem qui uenatur, ita patia metita. Coniugio ara-
nei conueniunt cruribus, sed a uersis clunibus. Phalangis quæ texunt coi-
tus agitur hoc modo: cum femina deductam araneam traxerit, mas eandem
mutuo trahit: quod ubi sæpius fecerint, coeunt, & a uersis clunibus co-
pulantur: nam propter aluam orbiculatam, modus hic coniungendi eis co-
H
gruit. Pariunt aranei uermiculos primum paruos ouis similes, propter fi-
guræ scilicet orbiculatam speciem: nam & totundū iam inde à primo ortu
proveniente cum pepererint, incubant, & in duo peragunt. Pariunt omnes
in tela, sed alij in subeli & parua alij in et alio: & alij penitus in specu or-
biculari alij in tenui aliquatenus tela obducta sit. Præter araneis in tela &
pariunt, & incubant eadem in tela atque uiuificant. Phalagia in rete quod
7
et alium confecerint, pariunt, atque incubant magno numero. Cùmq; ipsa
proles increuerit, matrem amplexa interficit & euicit: sæpe etiā & partem
si cepit: adiuuat enim feminam incubantem. Pariunt autem & uacentos.
Cæteris lautioribus illis partus minoris numeri est. Aranei iusta sibi reci-
piunt

*Lupus, nomen
lycei.*

*Alacrum, crassa
per asperam,
mox.*

Aranei laute.

*Præter arane-
os, Phalangis
in rete,
Phalagia.*

A piunt incrementa diebus quater septenis, à paruo sui ætas initio ad finem.

Aranei non statim cum editi sunt, fila mittunt inque intrinsecus tanquam extrinsecus, ut Democritus ait, sed extrinsecus de suo corpore ueluti corticem, more corû quæ suis uillis tæculatur, ut hæsticis. Maiora etiã animalia inuadit irretisque nonnunquã suis filiis. Nãque & lactatariũ canulos paruos aggressus circũdar os & filiis obducit, donec colubeat: mox accedens, morsum defigit. Libeat & araneus se filo in caput serpentis porreclat sub umbra arboris suæ, tantisque ei morsu cerebrum apprehendit, ut stndens subinde ac uertigine rotata, ut filum quiddẽ desuper pendens rûpere, adeo non fugere queat, nec finis ante mortẽ est. Sunt & ex araneis auguria: quippe incremento annuum futuro telas suas altius tollunt. Iidem sereno nõ texunt, nubilo

*Aranea,
& spinæ.*

tenenti deoq; multæ araneæ imbrium signa sunt. Ruinis quoq; imminenti-
bus aranei cum telis primi cadũt. Est quoddam aranei genus, ut author est Dioscorides, quod candidũ, tenuem densamq; telã necit: hunc in aluta ligatum & brachiũ adalligatũ, quartanis circuitibus moderi narrat decoctũ ex rosaceo & infusum, aurium doloribus auxiliari. Et aranei genus quoddã est, cuius morsum continens dolor in modis illis comitatur: unde & rubor, & urinae emittendæ difficultas sequitur: quandoque uero & suffocatio. Est

Araneus marinus.

Araneus quidam marinus, atque pestiferum animal atq; lepus marinus, spinat in dorso acaleo noxius. Araneus quem *δωρ* alij lupum uocant, inquit Dioscorides) subactus & linteis illitus, frontisque & remporibus impositus
8 tertianis circuitus per sanat. Tela eius sanguinẽ sũlit imposita, & à uulneri-
C bus quæ in summa cute consistunt, inflammationes arceat. Fractio capiti, Plinius ait, aranei tela ex oleo & aceto imposita, non nisi uulnere sanato absce-
dit hæc & uulneribus conditrinarum sanguinem sũlit. Aranei muscarij tela, & precipue spelunca ipsa imposita fronti ad duo tempora mirabiliter
epiphoras moderi dicuntur. Albugines quoque dicitur tollere inunctione
araneus candidus, longissimis ac tenuissimis pedibus, concitus in oleo ue-
tere. Sed is etiam cui crassissimum textum est in cõgnationibus fete, ad-
alligatus patino, epiphoras sanare traditur. Linguarũ ulcera & lithorum sa-
niant aranconum tela candida, & quæ in trabibus paruq; texuntur. Araneus
qui filum deducit ex alio, trans atque ad mortas inhabet muliebres purga-
9 tiones. Aranei in oleo putrefacti contra omnium phalangiorum morsus

10 auxiliantur. Phalangium est Italice ignotum, inquit Plinius, plurimum gene-
Drum: unum simile formicæ, sed multo maius, nudo capite, reliqua parte cot-

*Phalangium
græca.*

poris nigra, albus intercurrentibus respersum guttus: acerbior huius quàm
ut ipsa ichthys autem maxime circa furnos & molas. In remedio est si quis eius-
dem generis alterum percussio ostendat: & ad hoc seruantur cum morui
inueniuntur. Aque phalangion Græci uocant inter genera araneorum, sed
distingunt lupi nomine: uel, ut Nicædro placet, agrestes uocantur alius, ly-
co araneo, qui muscas uenatur similis umbellæ plagam infert, & quæ do-
loris sit expert. Tertium genus eodem phalangii nomine, araneus lanugi-
nosus, grandissimo capite quo dissecto, inueniri dicuntur intus uermiculi
duo, adalligatque mulieribus cernina pelle ante sobolis ortum, præstat ne

*Araneus lanu-
ginosus.*

<i>Rhagion.</i>	conciplant, ut Cicilius in commentariis reliquit: uis ea annua est. Vocatur E. & rhagion acino nigro similis, ore minimo sub aluo, pedibus brevissimis, 1
<i>Sciger.</i>	tanquam imperfectis, incensu tamen uelocissimo. Dolor à morfu eius, qua- 1
<i>Cicilius.</i>	lis à scorpione, uisus similis araneis textis. Idem erat asferon, nisi distin- 1
<i>Sciger.</i>	gueretur uirgulis albis. Maius morfu genua labefactū: sopor hominem 1
<i>Cicilius.</i>	corripit pariter & horror. Peior utroque est cicilius lanugine nigra hirs- 1
<i>Sciger.</i>	utus, caliginem cōcitans, & uenit ut araneosus, etiamnum deterior, à cra- 1
<i>Tetragnathus.</i>	brone penna tūcum differens, hic & ad maciem perducit. Tetragnathij duo 14
<i>Tetragnathus.</i>	genera habentur: peior, medium caput distinguente linea alba, & trāuersa 1
<i>Cicilius.</i>	altera. Hic oris tumorem facit. At cinereus posteriore parte candidus, len- 1
<i>Cicilius.</i>	tior: minime autem noxius, eodem colore, qui telas muscis in parietibus la- 1
<i>Cicilius.</i>	tissime pandit. Vt uero Aëtius tradit tetragnatus phalangij species est, cor- 1
<i>Cicilius.</i>	poris latiore & subalbedo, pedibus scabris: duo illi in capite prominent ta- 1
<i>Cicilius.</i>	bercula, alterum rectum, alterum latum, ut uidet aut quidem ora habere 1
<i>Cicilius.</i>	duo, & maxillas quatuor. Locus ab hoc percussus suballescens est, & uehe- 1
<i>Cicilius.</i>	mens in eo dolor: mēbrum uero ipsum ad articulos usque gracilescit. Cor- 1
<i>Cicilius.</i>	pus denique totum, ex alimentis nullam sentis commodum: & post adeptū 1
<i>Cicilius.</i>	quoque sanātem, immodice infestant hominem uigilant. Dylideri uocāt 1
<i>Cicilius.</i>	aliij, alij sphecium, phalangij genus uehementer rufum, uespæ simile: huius 1
<i>Cicilius.</i>	morfus tumorem excitat, genua labefacta, nonnunquam & tremorem af- 1
<i>Cicilius.</i>	ferens, quandoque & mortem. Inueniuntur messis tempore in legumini- 1
<i>Cicilius.</i>	bis, cum manibus colliguntur, phalangia quædam parua, specie canthari- 1
<i>Cicilius.</i>	di similia, colore flammeo. Ab huius morfu excitantur pustule, quas Græ- 1
<i>Cicilius.</i>	ci φάλαγγες uocant: mens perturbatur linguaque incondita profert, & ocu- 1
<i>Cicilius.</i>	li subuertuntur. Nascitur phalangia in eruo, inquit Plinius, bestiola aranei 1
<i>Cicilius.</i>	generis, si hyems a quodā sit. Inuenitur & in Persæ arbore phalangium, cui 16
<i>Cicilius.</i>	nomen cranocolaptes. In Persæ arboris frondibus (inquit Nacander) gi- 1
<i>Cicilius.</i>	gnatur animalculum, phalangis papilionis specie, capite semper nigrabundo, 1
<i>Cicilius.</i>	& uentre graui, speculum in summo collo gestat. Hoc si quem percusserit, 1
<i>Cicilius.</i>	non longo post tempore certasequitur mors. De phalangis uero ita pro- 1
<i>Cicilius.</i>	didit Aëtius, Plura quidem sunt phalangiorum genera: sed quæ sere ab alijs 1
<i>Cicilius.</i>	qui theriaca scribere traduntur, sex numero existūt: rhagium scilicet myr- 1
<i>Cicilius.</i>	mecium, lycos lapusue, cranocolaptes, sclerocephalus, & scoleceum. Quod 1
<i>Cicilius.</i>	rhagium uocatur, figura est rotunda, colore nigro, aut nigræ acino similis, H 1
<i>Cicilius.</i>	unde & nomen accepit rhagiū: pedes habet utrinque breuissimos, & os sub 1
<i>Cicilius.</i>	modio uentre. Qui uero lopus appellatur, inter araneosū telas inuenitur, 1
<i>Cicilius.</i>	ubi muscas uenari solet, quibus pascitur. Corpus illi latum & rotundum 1
<i>Cicilius.</i>	quæ circa collum partes sunt, incisuram habent, & circa os tubercula tria 17
<i>Cicilius.</i>	enascuntur. Myrmecion prægrandi formicæ simile, maximum est colore fuligi- 1
<i>Cicilius.</i>	noso atrouē. Huius corpori inserta sunt quasi astra, maxime uero circa dor- 1
<i>Cicilius.</i>	sum. Cranocolaptes oblongus & colore uiridante aculeum in collo gestat 1
<i>Cicilius.</i>	quod si in quem incidit, ferit eas maxime quæ circa caput sunt partes. 1
<i>Cicilius.</i>	Sclerocephalon caput habet, saxi duritie, & totius corporis lineamenta aut 18
<i>Cicilius.</i>	malculis illis quæ lucernas circumvolant similia. Scoleceon longiusculum 1
<i>Cicilius.</i>	est,

A est, & maculis quibusdam, præsertim circa caput, uarietatum. Phalangiorum species è quibus periculum præcauere expedit, hæc sunt. Quæ autem eorum morsum sequuntur accidētia, eorummoda sunt excessu desectisq; dis-
 19 corpantia. Morfus tenuis est, & qui conspici uix queat: namor cum luore, nonnullis & cum rubore, frigus circa genas lumbisq; & scapulas: nonnū quam & totus corporis grauitas. Hæc Aëtius.

1 Acuminatum, &c. ἀκμῶν. Theodorus, acutum, siliæ, sed ita quidem son-
 tenetia, rectius atque apertius Plinius acuminatum assulimque ingreditur, reddidit.

2 Varrum est, &c. Verus Aristotelis inceptus ita habet: Et incensum genus macu-
 larum in uere sub arboribus. Hoc, ut arbitror, genus aranei præcise uocat Aristoteles.

3 Aranei filii lauiore & strigiosiores in uis uisceribus ingeniosiores sunt, inquit
 Aristoteles.

4 Tentipitum, &c. Placuit hæc ita explicare. Terebrans medio incipit,
 circinato orbe subopimus aduersens, maculisque paribus semper interuallis, sed sub-
 inde descendit, ex quo gesto dilatas, indissolubili nodo implicat. Larum de re sepe
 inter duas arbores cum exerceat artem & desit exere. Longitudo filii à culmine, ac ut
 sua à texta per illud ipsum uelut reciprocatio, subique pariter ac fila deducit, cum uo-
 so caput in uide, licet extremas hæreat plaga, semper in medium eunt, ex quo sic ma-
 xime totum cōducendo implicet. 5 Araneorum filiorum lauiorem, &c. Araneo-
 rum lauiorem & telam spissiore reuocatum: ita reddidit Theodorus ex Græca le-
 gione, (πυκνῶν) uetus autem interpret, quæ textura textura debita, & lo specu or-
 biculari, &c. τριῶν, Theodorus in filia orbiculari. 7 Pharus hæc ita red-
 didit, Paruus ita in tela expansa, qui saluat atque ita emittitur: Phalangia tan-
 tum in ipso incubat, magno numero. 8 Tela eius sanguinem, &c. Hoc Ga-
 lenus acribus scribit araneorum telam genere. 9 Phalangiorum, &c. De his
 phalangiorum generibus, uide Hermolaum in Corollar. 10 Aliter ista expectat
 Plinius ipse. Myrmecion formice similis capite, alio tunc, genus istius dilata-
 guentibus, uel parum dolores torquet, 11 Rhagion, &c. ῥαγῶν à Nicandro (οἰκνοῦν)
 uocantur. 12 Dolor à morfu, &c. Signa morfus huius leges apud Nicandum. 13
 Affertion, &c. Αἰσθητὴν apud Plinium affertion uel aitionem. 14 Hunc locū Her-
 molans aliter distinxit, ut intelligantur hoc septimum genus esse, & aliud à ceteris
 à crebre pennis uicinis different, de uenis etiam minus certulo, ut quod macie consti-
 cuti se percussit. 15 Terragnathum, &c. Terragnathum Hermolaus ex Aëtio
 ita nobis descēdit, modice lato & sub albo corpore, pedibus asperis, duabus incisum
 in eoque, pedes una, per obliqua altera, ut quædam buccas habere uidentur, unde no-
 men. In Ethiopia (inquit) tam frequens, ut regionem in ea quondam prope Sillos
 Acridophagisq; deseri coegem. 16 Cranocola pter, &c. κρανοκλῶν ita etiam à
 quibusdam appellatur. 17 Corpus, alius os, πῶς, uocandū, πῶς, ὅστις unde in men-
 dosi sunt hoc loco Aëtii exemplaria. 18 Aliter fortasse, lineas habet toto corpore,
 19 Alia quoque præter hæc signa uideat apud Dioscoridem lib. 8, & Paulum & ipsum
 Aëtium.

De scolopendra & aliis quæ multipede dicuntur.

Cap. CCXII.

Scolopendra item morfu perniciofa est, quam & ophioctenam uocant,
 1 & centipedam: & alij sepa, ex uolotū genere. Iulum autem uoco infe-
 sti genus prælongum & multipes, illam habens partem non simplicem sed
 multiplicem, quæ est inter caput & alium, in qua continetur quod cordi
 proportionale est, quo fit, ut præcisum hoc genus unire possit. Mallepedæ,
 2 quæ & centupedæ & multipedæ alij uocant, duorum generum. Animal

Scolopendras
 Ophioctenas.
 Centipeda.
 Sepa.
 Iulum.
 Mallepedæ.
 Centupedæ.
 Multipedæ.

DE DIFFERENTIIS

[illegible]

⁴ Si quis modo comitatus illum

Attingit, feruet fœda prurigine corpus.

Qualem uirilem facit cognomine dicta doloris.

Oleo in quo scolopendra marina sit cocta, nonnulli ne pili euulli renascan-
tur, uſi ſunt. Verum alij cetaceum genus quoddam eſſe ſcolopendræ ma-
rinæ arbitrantur, a ſpectu horrendum, & à ſpectari emenſum è ma-
ri, & marium pilos magna excellitate apparere: eius euuldæ ſimiliter atq;
locuſtæ latam perſpici. reliquumque corpus conſerri poſſe cum triſime iu-
ſte magnitudinis, atque per multis pedibus utrinque ordinæ tanquam ex
ſcalmes appendis per ſummum mare natæ. Millepeda centipediæ, quam
modo & oniſcum uocari diximus, & tilon, efficaciter ſanat auris dolores,
inquit Plinius, in cortice punici mali decocta & poti ſucco, addunt & ro-
faceum, & in alteram aurem inſundunt. Millepedam oniſcum bibiſſe pro-
deſt urinæ. Medentur ſuſpicioſis millepedæ, ita ut ter ſeptem in Attico H
melle diluantur, & per arundinem bibantur: omne enim vas earum nigre-
ſcit contactu. Quidam torrent ex his ſextarium in patina donec candidæ
ſiant, tunc mel immiſcent: alij centipedam necant, & ex aqua calida dant u-
bent. Oniſci, qui & oni dicuntur, ſati prodidere Dioſcorides & Galenus)
ſub aquariis ualidis reperi, ana malicula ſunt multis pedibus nitentia, quæ cõ-
tacta manu contrahuntur in orbem, ſiutq; ubi ſe contraxerint, ſabſe eſcu-
lentis non diſſimiles, & proinde à nonnullis *ſiſum*, id eſt ſabſe uocati, colore
fulſeo. Hi ex uino poti, inquit Dioſcorides, urinæ difficultati, quæ deſuria
dicitur, & regio morbo auxiliantur: cum melle anginis illinantur. Triti &
in malicorio unâ cum roſaceo caſſacti in aurum doloribus uulſer inſtil-
lantur.

Antipoda
 Cepipoda
 Oxyura
 Tiro
 Balaenodes

Chen, H. and
Wang, J.

Eligible, false.
Chloro-furc.
amph

Alantur. Hæc Dioscorides. Et Galenus, quidam his usi sunt, inquit, ad aurum dolores, in oleo coctis.

1. Iulus uermis est multiper mille nanque pedibus utitur, ut scolopendra. Quidam & ipsi scolopendras uiles uocant. Hæc Theon. 2. Animal est, &c. Iulon hanc speciem (ut opinor) uocant Nicander in Themas. interpretis uero uocem & appellat. 3. Paulo minoris. Suspectus mihi certe uidetur hic Aristotelis locus: uetus interpretes habet, quod est in mari, est minus agreste. 4. *den mōm hē* forsitan Aristotelis, ut prior *den mōm hē* multipeda?

De his quæ promuscidem & ueluti aculeum in ore gerunt: ut,
de muscis & culicibus. Cap. CCXIII.

- I**nguam siue promuscidem habent muscæ, quæ uel crocorem ex assimilata- *Atque, &c.*
lium corpore extrahant: aqua & gustum habent omnium saporum, & **B** omniumque sunt hæc euidens fistula est. Cocunt quidem ut & alia insecta, & generant muscæ, uerum non animal sui generis, sed uermiculorum: & muscæ ubi pecorum ulceribus insederunt, uermes creant, inquit Columella. Neque ab animalibus ipsi generantur, sed ex uermiculis ex sorde humida aut sicca putrescente generis. Principium autem ipsorum uermiculorum exiguum est, atque ex immobili quasi hærens adhuc, moueri incipit: mox uer maculus immobilis redditur: qui cum postea motus est, rursus immobilis fit: demumque generatur muscæ, quæ flatus aut solis beneficio moueatur. Nullum animal minus docile existimatur minorisue intellectus quàm **C** muscæ. Mons est Carina in Creta, 1. nulliū passuū ambata, intra quod spatium muscæ non reperiuntur: atque ibi mel nusquam attingunt. Hoc experientem singulare medicamenti eligitur. Alopecias replent muscarum capita recentia, prius solo siculneo aspersas: alij sanguine muscarum utuntur, alij decem diebus cinerem earum illinunt cum cinere chartæ uel nucum, ita ut sit tertia pars è muscis: alij lacte mulierum cum brassica cinere muscarum subigunt, quidam mel tatum. Apud Macedonas circa flumina Athrum, qui inter Beroeam & Thessalonicen medius fluit, uolunt muscarum genus, quas, cum ad summam aquam accesserint, pisces quidam qui in eo flumine gignuntur, partem distincti coloribus, arripiunt atque deuorant, indeque uictum sibi comparant. Has equitiles uocant indigenæ: quæ *Equitiles.* **D** atque, nihil simile habent. Nec apum uespærumue similitudinem gerunt: harum tamen euiusque aliquid referunt, uespærum colorem reddunt, magnitudine apibus æquales: & simuliter atque apes bombitatione strepunt: atque in audacia quidam simile cæterarum muscarum habent. Ex culicibus lingua fistula est: & ad suctum, & aculei loco ad pungendum. Corpus his minus humum, alius fere ictu, crura prælonga, & a ore pro corporis ratione maxima, animalculum sanguinis & potissimum humani audissimum. Insestant in lices hortos, inquit Plinius, riuos, præcipue si sunt arbusculæ *Arbus.* aliquæ. Hi galbano accensio fugantur: culicum uaria sunt genera. In culicum genere, muliones non amplius quàm uno die uiuere feruntur. Apesim pugnant (ut scribit Plinius) è culicum genere muliones. Apes quoque ex-

Acanthides *hypocistis* dicitur Aristophanes in anibus, *hypocistis*. & in *tragis*, *sonorus* esse
aspicitur an. Qui in feces, &c. Theodorus modo culicem minorem dicit, mo- *Culex minor*.
do culicem. Plinius: Culicis acida perit, ad dulcia non adducunt, dicitur & genera cu- *Culex*.
licum acedificis natura gignit.

De cicadis.

Cap. CCXIII.

Cicada ex omni animalium genere una, ore caret: uerum membrum *Cicada*
quoddam quod uisum nam oris nam lingue præster in pectore consili- *Tab.*
rum aptissime habet, quo ueluti radice, cibis ex humoribus trahit. Pro-
lixum hoc compactum, indurissimumque genus, simile ei quod lingue spe-
ciem refert in iis quibus aculeus in ore est: eoque ipso rorem haurit, ali-
mentum unum & peculiare. Oculos Nigidius cicadis inesse negat: uerum
oculos habent, inquit Aristoteles, sed hebetes: & si quis digitum contrahens
ac remittens subinde appropinquet, magis sustinent quam si illico extollar.
Et quod idem transire in dignam alliciuntur: quod enim oculis hebetes sunt,
quali si frons aliqua moueatur, digitum ita ad motum conficiunt. Penna-
rum illis natura quæ apibus, sed pro corpore amplior. Isdemque solis nul-
lum ad excrementa corporis foramen: neque enim excrementum cicadis
ullum in alio reperitur. Nam cum omnia insecta minimo alimento con-
tenta sint, omnium maxime cicadarum genus ieiunium est. Excitantur cum
subuolant, quædam reddunt humorem modo aque: quam obrem rustici
eas mungere, & excremento non carere, rosæque aliis asseuerant. Nasci non
possunt cicadæ ubi arbores desunt: loca etiam frigida aspernantur. Est quæ-
dam & in his locorum differentia: in Mædici regione paucis sunt locis: sed
in Cephalonia annis quidam penuriam earum & copiam dimittit, cuius ci-
tra alterum in laris est cicadarum copia, ultra alterum nullæ. In Rhægino a-
gro silent omnes, ultra flumen in Locris canunt. Procreantur cicadæ ex ani-
malibus sui generis: & coeunt tam maiores quàm minores supinis admo-
tis partibus: unâque insectis in feminam, non sicut & cætera insecta agunt.
Genitale fermina habet reclusum, quo recipit id quod à mare iniicitur. pa-
riunt in aruis cessantibus, terram excavantes parte sui posteriore quam a-
curam habent. Quinetiam in arundinibus, quo adminiculo uires eriguntur,
nidum sœpe excavant, & in casilibus squallæ interdum parant: prove-
niunt large copia imbrum. Crescit primo in terra uermiculus, deinde sic
D ex eo quæ tertigometra uocatur, (quo tempore suauissimæ sunt ante quàm
cortex rumpatur:) postmodum circa solstitia noctu exeunt cicadæ ex ma-
trice illa cicada, quam modo tertigometram dixi, nigræ protinus & du-
ræ scutæ & maniculæ. Vbi uero eruperunt, oleis aut arundinibus insidunt:
& cum rupto operculo exeunt, parum quiddam in eo relinquunt humoris:
nec multo post uolant & incipiunt canere. Marcs sunt in utroque genere,
(tam scilicet maiorum quàm minorum) qui canunt, feminae quæ silent.
Cicadarum genera uaria sunt, quæ magnitudine & paruitate differunt: &
præterea quod aliis incisura est sub septo præcinctuæ, membranæque in
aperto gerunt, quæ sonus edunt, ut iis quas achetas appellant: alæ non ita
habent, ut quæ tertigonia, id est cicadæ itæ uocantur. neque enim ita diui-

Tertigometra.
Tab. p. 103.

Cicadarum
genera.
Tertigonia.
Tab. p. 103.
Tertigonia.
Cicadæ itæ.

Cicadumete.

sum illis corpus est, neque membranas habet adeo manifestam. Sunt ita- **E**
que cicadarum duo generaliter minores quæ primæ proveniunt, quæque
sunt mutæ, & novissima pereunt: sunt autem multæ alie maiores, quæ ca-
nunt, præcinctu duntaxat, ut modò diximus, siue maiores, siue minores sunt.
Quæ autem non canunt, individuat constant. Vocant nonnulli grandiores
illas & canentes, *achetas*: minores *tettigonia*, id est cicadas mutæ. Sed can- **3**
te uel in hoc secundo genere possunt paululum quæ præcinctæ prodierint, **4**
sed priores illæ magis canoræ sunt. Mares citant in utroque genere, femi-
næ silent, uti modo diximus. Quidam duo alia genera faciunt earum: *fur-*
culariam, quæ sit grandior: frumentariam quam alij *asenariâ* vocant: ap-
petet enim simul cum frumentis æscētibus. Genes persequuntur in ad orie- **F**
tem, etiam *Parthi* opibus abundantibus ante coitum mares præferunt, à coi-
tu fortunas: quippe quæ ovis candida gustus habeat grata. Cicadas dant nō-
nullis is qui colico dolore afficiuntur, cum paribus numero gravis pæpetis,
tribus scilicet aut quinque aut septem. Cicadæ, inquit *Dioscorides*, si assatæ **6**
edantur, æscēt doloribus auxiliantur. Est & *cercopæ* animal cicadæ simi- **7**
le, ut *Pseudo*ppus auctor est. Est etiam cicadarum genus marinum, quarum
maxima parvi carabæ speciem habet: uerū tamen cornua nō similitur atq; ille
magna, nec aculeos habet. Pinnae ipsius exiguae, terrenarū alis similes sunt.

*8 Ap. idem.**Cicada mari-
na.*

1 Plinius: Pro eo quiddam aculeatum linguis simile, & hoc in pedore, quo totum
lambit. **2** Quam acutum habent. Theod. asperant præterea quam parvo habent
possessione. Ex Plinio forficem. Plinius *Aspernis* peracuta in dorso quæ excutunt for-
ture locū in terra. **3** *Achetæ* Theod. inguis uertit. **4** *Apernis* atq; magne ex-
plicitate ita legitur apud *Anthemas* quidē lentis, ut positis acerbis, *quidē d. y. thos*
et p. p. d. y. p. d. y. m. **5** Quæ ovis candida, &c. Plin. Quæ corū coarctare quædam can-
dida. **6** Si assatæ edantur, &c. Cicadas in parcella tollas edisse, prodest uelice dolo-
ribus, inquit Plin. **7** Cicadæ simile, &c. *quæ sit q. d. y. m.* (inquit *Achenarū*) *ut q. d. y. p. d. y. m.*
ubi fortasse legendum erat *ut q. d. y. p. d. y. m.*

*Argemone
da.*

De locustis.

Cap. CCXV.

*Locusta,
Lepus.*

Cum insectorum maxima pars perengua sit, locustæ magnitudinem
Caliquam habent effatu dignam. Crura habent parte posteriore ad gu-
betraculorum effigiem condita, & mediis longiora, quibus salunt pulicum
more. Oculos *Nigridius* nullos locustis inesse docet. Ventrem intus habent
& intestinum replicatum. Maribus feminæ maiores sunt, quatum caudæ **H**
adnascitur cauliculus, quo in terra fixo pariuntur mares uacant. Procre-
antur locustæ ex animalibus sui generis: & creunt eodem modo quo cetera
insecta quæ cocunt, mare scilicet feminâ superueniente, & in eum femi-
næ ultimo caudæ reflexo, ratiōque digressu. Pariuntur feminæ in terra fixo
cauliculo illo qui caudæ adnascitur: ac uniuersum, & loco eodem fortis de-
ponunt, ita ut quasi fauus esse uideatur: hanc uermiculæ speciem ovis geren-
tes oriantur: qui terreno quodam prætenui tanquā membranula ambiun-
tur: quæ dissoluta, emergunt locustæ ac euolant. Tam mollis fortitudo hæc est,
ut ad tactum lenissimum cōcitantur: non summa telluris partus committit-
ur, sed paulo altius: durasque hyemæ sub terra. Hac concoctione peracta,
subsequenti

*Spinæ caules
uocat Plinius.*

- A** subsequenti anno exiit ueris, creunt ex illo terreo amiculo parua locustæ & vagantes, ac sine cruribus pennisque reptantes: deinde maiores statim efficiuntur. Pariunt exiis æstatis, & statim à partu moriuntur, uermiculis *Prole autem tempore. Plin.* circa collum in nascentibus tempore partus, qui eas strangulens. Tam irruolantatione momentes, serpentiem cum libuit decant singula, faucibus enus apprehensis mordicus. Vernis aquis intereunt ova, in sicco uere magnus proventus alij duplicem earum sortem, geminūque exiit tradunt, uergiliani esorta parere: deinde ad canis ortum obire, & aliis renasci: quidam arcturi occalu renasci. Est & alius earum obitus, gregariū sublatu uento, in maria aut stagna decidunt: lōgiqua quoque maria ab eis trāsiri feruntur, continuata plurium dierum pī olēdione. Nāque & grandiores cernuntur, & tanto uolant pennarum stridore, ut alii alites credantur, **p** solēque obumbrant. Italiam ex Africa magna cohorte infestant, omnia morsu erodentes, & fores quoque tectorum. Locis montanis aut tenuibus locustæ non sunt, sed planis timosisque: pariunt enim in uasis sua ova. In India ternum pedum longitudinis esse traduntur, cruribus & semoribus ferrarum uisum prebentes cum inaruerint. Locustæ suis gubernaculis atereutes sonant, inquit Aristoteles: uerum Plinio uox earum proficisci ab occipino uidetur. Eo in loco in commissura scapularum habere quasi dentes existimant: eosque inter se terendo stridorem edere, circa duo æquinoctia maxime, sicut cicadæ circa solstitium. Pars quedam Æthiopum locustis tantum uisum fumo & sale duratis in annua alimenta, atque ob eam rem scridophagi nomen habent. urinae angustus quas disurias uocant & stranguria, maxime mulierum, suffusa profunt locustæ. Est quoddam genus locustæ, atracus aut axirachus dicitur, aut *axir*, id est asellus, *Asirac.* sine alis, crassioribus cruribus: recens hic & exsiccatus contra scorponis morsus magnopere iuuabit si ex uino bibatur. Hæc in frequenti ca- *Asiracus.* *Asirachus.* *Exir, asellus.*
- 1** bo uiuantur Atri, qui Leptra incolunt. In locustarum genere cecidit ar- *Arctelabos.* telabos, siue brucus, atraces, ophiomachus, mastace, moluris, & par- *Brucus.* nops. Artelabi (ut Aristoteles prodidit) pariunt in aruis cessantibus, quo *Atraces.* modo & cicadæ. Pariunt autem, & cum pepererint moriuntur, pari modo *Ophiomachus.* atque locustæ. Intereunt ova eorum aquis autumalibus cum namis inces- *Mastace.* seruntur sicco autumno largior proventus artelaborum est, quoniam mi- *Arctelabos.*
- D**ius ova intereant. Est autem artelabos locustarum minima sine pennis. Est animal, inquit Plinius, locustæ simile sine pennis, quod tryxalis græce uocatur, Latium nomen nō habet, ut aliqui arbitrantur auctores: nec pau- *Tryxalis.* ciores hoc esse quod gryllus uocatur. Ex his uiginti non eti iubent, ac bibi è *Arctelabos.* multa contra oethopnoas, sanguinēque expuentibus. Tryxalidum cinis illitus cum melle, purgationes mulierum adiuuat. Margines quoque ulce- *Gryllus.* rum duras aufert cum melle. Magnam auctoritatē gryllo pertubet Nigidius, maiorem magi, quoniam retro ambulet terrāque tenebret, & stridat noctibus. Veniantur enim formica circumligata capillo in cauernam eius coniecta, efflato prius puluere ne sese condat, & ita formicæ complexu extrahitur. Auribus prodest gryllus cum sua terra effusus & illitus. Lenit *Gryllus.* *Alia, arctelabos.*

DE DIFFERENTIIS

& confillas gryllus intricatus; aut si qua manibus quibus eum contineris, E confillas attingat.

1 Crassioribus cruribus, ac pedibusque, ad est, per albugis cruribus, ac semis Roellia. Hunc Paulus apteron vocatum, quia pennis carent. Hermolaus. 2 In locustarum genere, &c. In Leuitica legimus quæ crura habent ad saltem ido nea, numerantur Brucæ & quæ illi similia sunt atroxes, & quæ illi similia sunt ophiomachus, & quæ illi similia mallo locusta, & quæ illi similia. Locustarum speciem istam, quam non appellant, etiam breuium vocari putant, ut refert Hermolaus, rodentem fœces. Et atroxem in sacris literis appellatam, Nicander mallorem appellat pro bruceo, Aristoteles atelabon. Ciliarchus in Amblicia locustas omnes mallorem dei voluit, ut moluam, quæ frumenta depopulatur. Medander in pratis uisitant, ut uidetur ex Nicandro, locustis similes. Iouis locustas à numero pennarum centipylidas nominant alij coenopas & parnopas aut potnopas unde cognomen Herculi & Apollini quoque in Asia, quod locustas abigit, *supra* videtur. Hæc Hermolaus fuit. Parnopas Apollo ab Admetaribus dictus est, (ut scribit Pausanias) quod parnopas eorum agro insectas propulsauerit. Iones (ut Hesichius auctor est) breuiam locustæ speciem dixere, Cypri locustam virentem, breuium vocarunt, Turcicum atelabon nunc *loquax* vocatur. Est autem atelabon locusta parua. Hæc Hesichius. Parnopas locustas species est, ut scribit Aristophanes interpres, quæ de manu facile resistendum potest. Marcellus Vergilius de locustis ita posuit, Varnique admodum affligo locustas natura: quæ enim hoc primum in eodæ corpore colentes facile descriptæ quæ tum diuersas corporum formas quæ ingressas, salubres, uolantes earum: Sunt enim quæ uirides, quæ nigre, quæ lutescentes, quæ aliqua parte hunc aliquis illum colorem ostendant. Sunt quæ uoluntatem, literatam antea colorem aliquem proficiunt. Sunt quæ simplicibus, quæ pluribus alis uolentes: quæ alie cætenos saltant: quæ utroque hoc motu prius ingrediantur naturam. Sunt quæ longioribus, quæ breuioribus cruribus sunt: & in his pluribus breuioribusque, & paucioribus locustisque inter nodis. Sunt quæ canant, quæ muta sint: quæ per diem, quæ in tenebris tantum audiantur. Sunt quæ nihil hominum in re rustica noceant, innoceantque à partu se capi putantur. Sunt contra quæ pestem & calamitatem fœcorum omnium tota regionibus afferanturque plura sunt in nomina genera, sed etiam pene infinita ueteribus earum nomina fuerunt. Hæc Marcellus.

De uaginipennibus, quæ Græci *μασπίδες* uocant.

Cap. CCXVI.

E Volucris insectis quedam membranas ipsas quibus uolant, crassa superueniente quasi uagina, tutelæ gratia inclusas gerunt, unde *μασπίδες* dicuntur, quasi uaginipennia dixeris. Horum tenuior fragilibusque penachas negatus aculeus est. hæc & senectutem exuere solent. In in scarabeis est, cuius plura sunt genera. uolitant enim alij magno cum murmure aut H uagitu alij fœces & præter crebris foraminibus excruciant, nocturno stridore uocales. Quoddam rursus eorum genus, quod è fumo ingentis pulas azer si pedibus uolunt: paruosque in ias cœtera rigorem hyemis uermiculos frenos in melancur. Hæc Plinius. Propter hunc scarabeum qui pululas uoluit, Aegypti magna pars scarabeos inter numina colit, cum sola Apionis interpretatione, quæ colligit Solis operis similitudine hunc animalis esse ad excusandos genus fuit ritus. Scarabei, inquit Theophrastus, notam odore necantur, Græci cācharam uocant. Canchari, inquit Aristoteles, in fumo, quæ uolunt, conduntur per hyemem, paruosque uermiculos panis, ex quibus ipsi progrediuntur. ubi inuentum, hi motu cessant, totoque corpore indure-

Apteron.

Tetrapylidas.

Coenopas.

Parnopas.

Potnopas.

Atelabon.

Atroxes.

Ophiomachus.

Mallo.

Nicander.

Medander.

Ciliarchus.

Amblicia.

Atroxes.

Atelabon.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Atroxes.

Ascunt sese contrahentes id quod patet maxime cum tanguntur. Melolonthæ (quas scarabæos urides & galerucas uocant nonnulli) uermibus simo-
 bouis aurumenta creatis gignuntur: & inter uolandum sonitum edunt. Scarabæi uridis natura, inquit Plinius, conuestium uisum exarant itaque gym-
 marum sculptores contritu eorum acquiescunt. Carabo (quem Theodo-
 rus modo taurum uocat, modo fullonem) antennæ ante oculos præte-
 dunt, ut papilioni. Gignitur hæc ex uermibus qui in lignis aridis nascuntur.
 Et primum quidem uermes ipsi immobiles sunt; mox disrupso putamine
 carabæi erant, aliorum more qui ex uermibus gignuntur. Tauri uocatur sca-

Melolonthæ.
Scarabæos urides.
Galerucæ.

Carabus.
neglegens.
Taurus.
Fullo.
Taurus.

rabæi terrestres, inquit Plinius, ricino simile senomen cornicula dedere: alij
 pediculos terræ uocant. Ab his terram egestam illinunt strumas & simili-
 bus uitis, & podagris, triduo non abluunt; prodèstque hæc medicina in an-

*Pediculus terre-
 stris.*

num. Fullo scarabæus uocatur albis guttis. In quodam genere scarabæorū
 grandi, cornua prælonga, bifurcis dentata foras pibus, in eadem cum li-
 buit coeuntibus. Infantum remediis etiam ex ceruice suspenduntur. Luca-
 nos uocat hos Nigidius. Scarabæorum cornua denticula adalligata, ad in-
 fantum urinam cohibendam, amuleti naturam obtinent. Fodunt ruti
 & prægrandes scarabæi tellurem aridam, fauorūque parues & fistulosæ mo-
 do spongiæ medicato melle fungunt. Eriphiæ herbam multi prodidere
 scarabæum hæc in aena habet; sursum deorsum decurrentem cum sono
 hæc di, unde & nomen accepit. Ex è leguminum uermiculis nascuntur ani-
 malia pennata. Est & cantharis ductus scarabæus paruus frumentæ rodens.
 Coeunt quidem cantharides & generant, uerū non sui generis animal,
 sed uermiculos tantum: neque ex animalibus procreant, sed ex putrescente
 humido aut siccato. nascuntur etiam ex uermiculo in spongia cynothodi cy-
 nacanthæus, id est, sentis canina, quæ sit in caule ex crucis item fici, pini, pi-
 ni, fraxini & rosæ. Fiunt etiam in his omnibus uermes, sed forcanthidione in
 fraxino in alba rosâ minus efficaces. Ad medicamenta cæuetis præstant è
 tritico collectæ. Potentissimæ inter omnes uariæ luteis lincis, quas in pen-

Fullo.

Lucanus.

*Scarabæus ru-
 tilus.*

*Scarabæus in
 eripha herba.*

Cantharis.

Csed uermiculos tantum: neque ex animalibus procreant, sed ex putrescente
 humido aut siccato. nascuntur etiam ex uermiculo in spongia cynothodi cy-
 nacanthæus, id est, sentis canina, quæ sit in caule ex crucis item fici, pini, pi-
 ni, fraxini & rosæ. Fiunt etiam in his omnibus uermes, sed forcanthidione in
 fraxino in alba rosâ minus efficaces. Ad medicamenta cæuetis præstant è
 tritico collectæ. Potentissimæ inter omnes uariæ luteis lincis, quas in pen-
 nis transuersas habent, oblongo corpore crasse, ac blattarū modo pingues
 præsertim si super acetum per lintecolum uaporentur. Iniores minuter,
 late, pilosæ: inuicissimæ uero unius coloris inactæque uis earum adutere
 corpus, & crustas obducere: uel, ut Dioscoridi placet, erodere. caulectaræ q-

*Quæ i frum-
 tu colligantur,
 inquit Diosco-
 rides.*

*Adulterum pen-
 nis, inquit Pl.*

De calore incitare: qua de causâ admiscuntur medicamentis quæ lepras fe-
 rāsque lichenas, & cancri naturam habentia sanant. Ad ungues itaque plo-
 rodes cum ceratis aut emplastris idoneis imponit, ita illos auferunt ut to-
 ti cadant. Admiscuntur quoque iis quæ clauos auferunt alij alopecias can-
 tharide trita illinūt cum pice liquida, nitro præparata eunt. caustica uis ea-
 rum, cauendumque ne exulceret alie. Postea ad ulcera illa facta, capita mu-
 rium, & fel murium & simum cum elleboro & pipere illini iubent. Can-
 tharides mixta calce puros scalpelli uice auferunt: nonnulli paululū quid-
 dam earum inungere solent in medicamenta, quæ urinam ciunt: uerum in
 uis magna quæstio, quoniam ipsæ uenena sunt potæ, uelut cum cruciati
 perpetuo. Collinum equitem Romanum amacina Neronis principis no-

tum, cum is lichene correptus esset, uocatus ex Ægypto medicus ad hanc E
uadenadinem eius à Cæsare, cum cantharidum pocum preparare uoluisset,
interemissum illum illius prodesse non dubium est cum serco taminæ uix
& serco ouis uel capræ. Ipsarum cantharidum uenenum in qua parte sit, nō
constat inter authores: alij in pedibus & capite existimant esse, alij negant.
Conuenit tamen pennas earum auxiliari in quacūque parte sit uenenum,
quibus demptis lethale est. Hæc Plinius. In medicamenta quæ utinā ciēt,
nonnulli solas alas cum pedibus iniiciunt, quæ alexiteria esse dicunt iis qui
corpora ipsarum cantharidum ebiberint alij contra. At nos, inquit Gale-
nus, totas cantharidas iungere solemus. Menses ciunt & utinā: idē & Hip-
pocrates hydropticis dabanit Plinius. ut uero Dioscorides, Menses ciunt F
peffarius emollientibus additæ. Aliqui cantharida uandotis impositis hy-
dropicis auxiliari prodiderūt, ut quæ urinam moueant. Olfactū picem li-
quidam referunt: gustū cedrum, ut Nicæder prodidit. Easdem uires habet
& buprestis, animal cantharidi simile: uel, ut Dioscoridi placet, è canthari-
dum genere buprestis est animal rarum in Italia, similitum scarabeo lon-
gipedi, ut Plinius tradit. Fallit inter herbas bonem maxime, unde & nomē
inueni de uoracum quæ tacto felle, ita inflammatur ut rumpat. Hæc cum har-
cino seu lichenas illius ex facie tollit sine cura ui. Reponuntur eodem mo-
do buprestes quo cantharides. Eadem quoque uis quæ è cantharidi, & ptyo-
campis est, erucis scilicet in picea nascentibus. Pinorum quoque erucas pi-
tyocampus uocant: è quibus uermiculi postea nascuntur, qui acceptis alis G
euolant, quemadmodū & in ficu & cynothodo siue camina sentit, cantha-
ridum genus, uti modo diximus. Ptyocampus in oleo coquuntur, quo utun-
tur nonnulli, ut ne pili renascantur euulsi. Hippocampus marinum ani-
mal est exiguum, cuius cremati cinis cum pice liquida aut a xungia seu a-
maracino unguento illitus, alopecias replere fertur: uimque habere dige-
rentem pariter & extenuantem. Leporis marini ueneficiū restringunt poti;
hippocampi: lateris dolores leniunt hippocampi tosti sumpti: & utinā in-
continentiam quoque hippocampi tosti, & in cibo sepius sumpti emen-
dant. Alopecias replet hippocampus cinis, nitro & adipe sulfo mixtus,
aut syncretus ex acetto. Lachenas & lepras tollit hippocampi & delphini ci-
nis ex aqua illitus. Hippocampi necantur in rosaceo, ut perungantur agri
frigidis febribus: & ipsi ad alligantur agria.

H

Scarabeus pi-
bitans.
Cephus.
Lucanus.

1 Cantharum uocant. Scarabeum pilularium uerit Theodorus, ception ab Hip-
pocrate uocatur. 2 Nomen cornicula dedere. Scarabeum quendam dux esse Plinius,
cursum cornicula reflectit an hunc forsitan intelligat, an illum qui Lucanus uo-
catur, an alium quempiam? 3 Si super acetum, &c. Quodam modo ita parentur
cantharides, docent Dioscorides, Plinius & Galeus. 4 Hippocampus, &c. Nar-
rantur à Plinio Nomades à scopis in marmore sculpi, supra delphinos & cetæ & hip-
pocampus sedentes, ut uideatur forsitan hippocampus grandis esse animal. 5 Post
hippocampi, &c. Hippocampi quemodo sint ueneni: & utrum quemodo saluta-
res, ad eam talis morsum, legas apud Aelianum. lib. 2.

De erucis,

- A De crucis, & quæ ex his gignuntur, ut papilionum generibus, & de pennatis quibusdam aliis quæ ex uermibus gignantur.

Cap.

CCXVII.

- E Rucæ, dirum uel ipfis arboribus animaleroduntque aliæ frödem, aliæ *Eruca.*
florem: ac de ipsam arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc ma- *Nascent.*
lum repote humido & lentioraque in primis ex rore. Insidet hic uarentibus *Aliis, pennis.*
foliis maxime brassicæ, raphanise, ut Plinius tradit. Primum minus quid
nullo consistit in folio spissum sole. Mox uermiculi inde contrahuntur &
accrescunt: de inde intra triduû erucæ parue afformantur: quæ auctæ mo-
tu cessant, siusque forma immutantur, appellanturque tantisper chrysal-
lides, quasi aurelias dixeris, duro inrecte putamine, ad tactum mobiles, a-
raneolis quibusdam inuolutæ: non os, non aliud ex membris quod conspi-
cium sit, possident. Longo post tempore, putamine obrupto, euolant inde
animalia pënata, quas *Phæga*, id est papiliones uocamus. Itaque primû dum
erucæ sunt, cibo aluntur, atque excrementum emittunt: at uero cû in chry-
salidas dëctas transeunt, nihil uel gustant uel excreant. Erucas Ouidius
tineas agrestes uocauit,

Quæque solent canis frondes inercere filis

Agrestes tineæ, res obseruata colonis

Ferali mutant cum papilione figuram.

- Papiliones antennas ante oculos præuenias habent: papiliones & quæcum- *Papilio.*
que ex crucis orta, sibi colorem à sua eruca trahunt. Sunt & erucæ quæ uol-
ent ingressu parte enim innocentes priore, contrahunt sese adductes po-
steriorem, arcuatimque incedunt ex his generantur quæ uocantur *uola* &
uolæ, id est acie & superæ. In brassicæ caule gignantur uermiculi quidam:
ex quibus immutatis orisodactis creatur quas mordellas appellem. Erucas
è rithymalo nascentes, aculeatas esse prodidit Hippocrates. Erucis quæ in
oleribus nascuntur cum oleo perunchi à uenentis bestias letiri negantur.
Papilionæ qui luminibus accensis aduolant, Nicander phalænam uocat: alas
habet membranosas, siccas, & quæ tangenti uelut cinere asperse appareant.
Hæc & pîota nuncupatur, & à posterioribus *uolæ* uocatur: quæ lucernarum
luminibus aduolat, Aristoteles hepiolum uocat. Papilio, inquit Plinius, lu-
cernarum luminibus aduolans, inter mala medicamenta numeratur: huius
D contrarium est iecur caprinum. Hippanas flumina apud Cimeriû Bospho-
rum, sub solstitio defert uelut sollicitos acinus maiores, quibus quadrup-
des uolucres erumpunt: quod genus animalis in postmeridianum usq; dici
tempus uiuit & uolat: mox descendente sole macrescit & languet, donec oc-
cidente moriatur, uita non ultra unû diem peracta: unde hemerobion, id est,
diarium appellatum est. Quatuor pennis totidémque pedibus mouetur: at-
que ita simul & quadrupes & uolucris est. Fit ex quodam uerme grandiore
qui uelut cornua gemina protendit, siusque generis est, primû toto immu-
tato erucascente quæ bôber aut bombalis bombalinsue appellatur: ex quo
necydalus. Quæ uaria formarum successio in sex mensibus completur. Ex
hoc animalis genere bôbocina illa mulieres nonnullæ torquendo in filum

Kk

*Alia, Plinius
Pamphila Pla-
tus filius.
Bombus.*

deducunt deinde texunt. Prima textisse in Co insula Pamphila Latoi filia di-
citur. Bombyces & in Co insula nasci tradunt: cupressi, terebinthi, fraxini,
quercus florem imbribus decussum. terræ halitus animante. Pieri autem pri-
mo papilionem paruos n udsque: mox frigeum isopatiæta, uillis inhorre-
scere, & aduersus hyemem tunc as sibi instaurare densas, pedum asperitate
radentes foliorum lanuginē in uellera: hâc ab iis cogi subigique unguum
carminacione: mox trahi inter ramos, tenuari ceu pectine: postea apprehē-
sam corpore inuoluai nido uolubili. Tunc ab homine tollit: stilibusque ua-
lis tepore & sarfurum elica nutriti, atque ita subnasci sui generis pilomas,
quibus uisibitos ad alia pēsa dimitti. Quæ uero corpta sunt lanificia, humo-
re lentescere, mox in fila tenuari tunceo fuso. Nec puduit has uestes etiam
uiros leuitate usurpare, propter onera æstiuæ: in tantū à lorica gerenda dis-
cessere mores, ut oneri sint etiam uestes. Lucem ignium modo noctu late-
F
rum & clauium colore lampyrides, id est, cicindela, nunc pennatum hiatu
refulgentem nunc uero compressu obumbrata (fulgor nanteque ille igni simi-
lis alarum compressu tegitur) non ante matura pabula, aut post desecta cō-
spiciunt, pygolampidas uocat Aristoteles. Earum alæ pēnatæ sunt, alæ im-
pennez, non aliter atque in formicis. Erucis etiā quibusdā corpore piloso
3 non grandi, primum pygolampides fiunt, non tamen uolucres: quibus de-
inde mutatis, pennigeta animalia gignuntur, quos *αεττα* uocant, hoc est
cittos. Nascitur uermiculus quidā, cui nomen xilophthoto (scilicet ligniper-
4 dem appelles). Caput suo putamine exerit uarium, pedes in suprema parte
cernuntur: reliquum corpus tunica arancosa integitur, subque tegumento
hærentes festucas gerit, ita ut sorte eas cassique sibi contraxille dum ambu-
G laret uideantur: uerum ipsæ natiue hærent tunica: & ut limacibus testa, sic
totum id uermiculo huius adhæret: nec decedit unquam, sed euellitur ut na-
tuum. Quod si hanc eius tunicam detrahas, expirat pauci modo, atque limax
testa detracta hebetescit: processu unque temporis id quoque in chrysalidē
transit, ut eruca, atque immobile urit. Sed quidā ex eo animalis pennati
oriatur, compertum non adhuc est.

*Lampyridæ,
Cicindela.*

*Pygolampidæ,
Ac, & uermi-
gines dicitur.
Perrhædæ,
Perrhægæ.
Cittos.
Xilophthoto,
Ligniperda.*

1 Papilionem habet Plinius inter morbos apert (uti suprà diximus) ignatum &
inhe notatam, qui luminibus accensis adulescet, apibus ad uno modo pefliferum: sed
an eodem intelligat cum Nicandri phalaena, considerata lebet. 2 Alii. Lucem ue-
spere per astra cicindela ita appellant: nulli scilicet uolantes. Greci uero lampyridas. H
3 Erucis enim, & illa legit Theodorus: uerū exemplaria Græca nostra ita habent,
Erucis quibusdam nocte corpore piloso. &c. 4 Nascitur uermiculus, &c. Plinius
hoc animalculum in uermi genere reponere uidetur, sed absque nomine. 5 Pedes
in postremo habet, uerū Theodorus. (scilicet *αεττα*.)

De Bestiolis quibusdam que in lignis aut arboribus nascuntur.

Cap. CCXVIII.

*Acari,
Cossæ,
Cossæ.*

I N ligno gignitur animal candidum, quod omnium animalium esse na-
tuum existimatur, nomine acari. Sunt & cosses in uermiū genere qui
in ligno nascuntur: hos & cossos quoque uocant nonnulli. Vermiculantur
enim magis manusue omnes fere arbores: idque, cum corporis sono ex-
petantur.

- A**periuntur. Iam quidem & hoc luxuria esse cepit: pregrandesque roborum
 delicatiorē sunt in cibo, colles vocant, atque etiā in tartaro saginati, hi quo-
 que alites sunt. Maxime autem arborum hæc sentiunt, pyn, mali, ficē, mi-
 2 nidsque que amaræ sunt & odorant. Colles qui in ligno nascuntur, sanant
 ulcera omnia: nonis vero combasti, cum pan pōdere anisi & ex oleo illiti. *Vermes rēvi.*
 Vermes ex arboribus rubri cū oleo tritæ xulceratis & ruptis auribus pre-
 clare medentur. Eorum autem vermiū qui in ficis existunt, ali ex ipsis na-
 3 scuntur arboribus alios parit qui vocatur cerassten: pe culiar: eum est quod
 de eo notatur quem cerassten appellant. Cum enim vermium magnas pars
 specie formæ inter se differunt, discrimen tamen precipuum in his est,
 quod in alia arbore fructuū huius, translati in aliud genus feruari nequeūt.
B Cerassten autem & in olea nascit, & in fico parere assuevit. Habet itaque
 & ficus suos vermes: & illos quoque emittit, quos alienos receperit omnes
 tamen in cerassten figurantur, sonūmq; edunt cū parvula stridentis. Et for-
 bus arbor infestatur vermiculis rufis, pilosis, atque ita emoritur. Mespala
 quoque in senectū, obnoxia ei morbo est, vermiculatione scilicet. Aliqui
 4 uolucem appellant animal prædicens pubescentes uvas. Involucrum vo-
 cat Plautus nequam bestiam & damnicam quæ in pampini foliis intorta
 implicat se elq; erōdit. M. Cicero tradit animalia byturos vocari, qui vites
 in Campania rodant. Genus est animalis, inquit Columella, volucra appel-
 latum id fere prædicit teneros adhuc pāpulos & uvas. Apud erithæros mi-
 5 liuntis incolas (inquit Strabo) ipoclonus colitur, quod dicitur, qui uinibus infe-
C stissimi sunt, interdictat: nam ex erithæis omnibus solum inter illos hæc be-
 stiola non gignitur. Olea ubi quercus effusa sit male ponitur: quoniam ver-
 mes qui rana vocantur in radice quercus nascuntur, & transeunt. Anima-
 6 lia quedam ex illa in cūculis nascuntur, appellanturque galba. Materiæ ex-
 sum infestantium quatuor genera. Tereidines capite ad portionem gravis-
 simo, rodunt dentibus, perforantque robora, uel sono teste. Hæc tamen in
 mari sentiuntur, nec aliam putant tereidinē propriè dici. Terreſtres, sine-
 7 az vocat xulicibus uero similes, triphas. Quisnam est & è vermiculorū ge-
 nere. Hæc Plinius: Theophrastus uero ita habet, Quæ mari putrescere apta
 8 sunt, erodi à tereidine solent (tereido enim non nisi in mari nasci potest)
 9 quæ autē terra, uermiculis quos *in dionius* uocant, & his quos thripas est autē
D ipsa tereido corpore parua, capite magno & dōtib. Qui uero thripes dicitur
 4 tur, uermiculis similes consistunt, quibus paulatim materies perforatur: sed
 hæc cutari facile possunt. Nam si offensa materies trahatur in mare, durare
 nimirum ualeat: quæ uero tereidinē senserit, curari hæc nōtine potest.
 Vermium autem qui nasci in materie solent, alij potesce: nec ipsa materia
 generatur alijs parientibus aliis uermibus. Partium enim uel in carſa mate-
 5 rie uermes (quemadmodum in arboribus, qui cerassten uocantur) cum scilicet
 eret tam erolint atque excauerint, ut se circumagere possint. Fugit uer-
 mes ligna odorata, amara, durāque: quoniam hæc erodere nequeant, cum bu-
 6 xum & eypressum. Laricem in maritimis nauibus obnoxiam tereidini tra-
 dunt: & omnem materiem tereidinē sentire affirmant præterquam olea.

DE DIFFERENTIIS

strum atque oleam, quas amaritudinis causa, neque teredo neque vermiculus
 rodit. Decurrit & pinum plusquam absterge corrodi à teredine posse: hanc
 enim esse amarum, pinum vero dulcedinis nonnihil habere. Tunc, quæ
 græce *σιν* vocatur, in lanis & quibusvis lanio confectis, præsertim pul-
 verulentis, oriuntur: atque etiam magis si araneis unâ includantur: siquid
 enim humoris inest, hic absorbens exsiccat. Nascitur autè & in tunis hoc
 vermiculi genus: & in cæta quoque vetusta. Necnon in chartis libræque gi-
 guntur bestiolæ perquâ paratæ, partim similes his quæ in ueste: partim ve-
 ro scorpionis, sed sine cauda. Gignitur enim in libris bestiola scorpionis simi-
 lis, quæ & chelæ brachiæque scorpionis bifidis dentata habet.

1. Sicut & coffer, Acc. *antiquae* & *fr. Anselm.* Theodorus Coffer nunc. Paschas Picea
Matris collige. Cum coffer ornatus, tam acriter excusare, ut fierent arbores
dicunt. Hinc & coffer nunciam & Galenus inter alimenta, lib. 1. De aliment.

2 Theophrastum, &c. Trium tantum genera possint Theophrastus. 3 Quos Theophrastus addiderat, apud Theophrastum, Theod. uermiculos & uicinas uermi. Plinius: Tinea & chirpa; uermis & culicibus similes chirpas dicit; chirpas etiam uermiculos significare uidentur qui radices focos erodunt uide radices. *Spadix* dicitur a spad Theophrastum. 4 Nam si offensa materies, &c. Grece na habetur *uermis*. Nam *apud Theophrastum* *uermis* dicitur, &c. 5 Terredinum, &c. In uerbis quoque & in carne sunt terredinum. Plinius lib. 8. cap. 48 de Seruij Tully prætoris. Murum nec terredini minas sensibile, &c. lib. uero 11. cap. 11. Carne nullas terredinis sentire, inquit, luno de cretete induratas sale. 6 In laeis quibusdam, &c. Tinea lanaria recte dicitur, ut aliorum humana. mea certe somone.

De nonnullis quæ in aliis stirpibus, aut fructibus creantur.
herbosis. Cap. CCXIX.

Cap. CCXIX.

Non in arboribus solum atque lignis aliisque quæ inanimata sunt, animalcula gignuntur specie uaria, sed in fructibus quoque his qui bestiolas creant (nonnulli enim quia sicci sunt, uel quod æ amaritudinem quâdam aut acedinem habent, nulla animalia contrahunt) singula pro suo humore peculiare animal creant: cœu triticum atque ordeum *et cetera*, id est curculionem: fabæ, quod aliqui *phæa* & simili modo lens, lenticula, & pisum, & alia. De curculione hæc tradunt. In reponendo tritico cutiæ, inquit Varro, ne humor aut aër tangere possis, nisi cum promittis ad usum: quod enim spiritus non peruenit, id non cœtat curculio. Sic conditum triticum manet, uel annos quinquaginta milia uel plus annos centum. Pura frumenta, inquit Columella, si in annos reconduntur, reputari debent: nam quanto sunt expoliuora, minus à curculionibus exceduntur. Multi tamen frumenta uentilare quoque uetant, quia magis nascuntur animalia totis aceruisque si non moueantur in summitate intra mensuram palmis, subfissentque, ultra prædictam mensuram noxia animalia posse generari aiunt. Et guttalionem, inquit Plinius, non descende infra quatuor digitos tradunt, nec amplius periclitari frumentum. Factis granariis, amurca luto mista parietes linuntur: hæc res, inquit Palladius, guttalionibus & cæteris noxiis animalibus inimica est. Est in sare uermiculus terre dinus similis, quo cauis dentium cetera incluso, cadere uicari dicuntur. Vermiculationem poma

ipsa

100

Figure 1 consists of two bar charts. The top chart is titled 'General population' and the bottom chart is titled 'Respondents who are currently struggling financially'. Both charts show the percentage of respondents for different levels of agreement with the statement 'The government should do more to help people who are struggling financially'. The x-axis represents the level of agreement, with categories: Strongly agree, Agree, Disagree, and Strongly disagree. The y-axis represents the percentage of respondents, ranging from 0 to 100. In the general population chart, approximately 75% of respondents strongly agree, 20% agree, 3% disagree, and 2% strongly disagree. In the chart for respondents who are currently struggling financially, approximately 85% of respondents strongly agree, 10% agree, 3% disagree, and 2% strongly disagree.

Practical Remarks

E.G.
 Circum-
 stances
 Consider

Parula americana
and
Myiarchus cinerascens
in song.

DE DIFFERENTIIS

tum in mari, tam etiam in fluminis stagnisque, putredinis maxime ratione, E
sed in mari quæ alge sunt: in stagnis autem & fluminis iuxta ripas. Terreni
vermes trini præciles nervos glutinant impositi: uulnera uero rectia adeo
conglutinant, ut nervos quoque abscessos illitis, solidari intra septimū diem.
De moctitis perfractis: itaque in melle seruandos censeat. Cinis eorū mar-
gines ulcerum duriores absumat cum pice liquida uel simbio melle. Qui-
dam arefactis in sole ad uulnera ex aceto urineur: nec soluit nisi baduo in-
termissio. Igni sacro terreni uermes ex aceto illiti medentur. Capilli ne ca-
nescant, eorum cinere præstari, admixto oleo tradunt. Ad aurium uicia uel
deplorata, terreni uermes adipe ansetis decocti infunduntur. Ad dentium
dolores in oleo decocti, infusi: que auriculæ cuiusq; parte doleant, præstant
lenamentum: uel si in contrariam aures infillennat, uti docet Dioscorides.
Eorundem cinis ex his dentibus coniectus, ex facili cadesit: eos cogit: inte-
gros dolentes illius iuuat comburi autem oportet in testa. Prosumt & cum
mori radice in aceto scyllite decocti, ita ut colluantur dentes uermes ter-
reni illiti in ceruicibus & scapulas, ne nervi doleant, præstant. Gravidis se cum
das pellunt in passio potu. Iidem per se impositi mammarum suppuraciones
concoquunt & aperiunt extrahuntque, & ad cicatricem perducunt. Lac de-
uocant poti cum mulso: podagras lenit eorum cinis cum melle, ita ut ter-
tio die soluantur: & petronibus impositur eorum fauilla cum oleo. Cla-
uos pedum sanāt uermes terreni ex oleo. trini & ex passio. e poti urinā ciunt.
Iubent & uermes terrenos bibi ex uino aut passio ad comminuendos calcu-
los. Morbo regio resistit in aceto mulso cum myrrha tertianas dascuntur
decocti cum ansetino adipe & illiti. Multa & alia ex his remedia sunt, pro-
pter quæ in melle seruantur.

Sub. In. Ros.

1 Pyralis, &c. Pyralis hunc uocat Aelianus. 2 Tæ. & tæta, &c. In. Ros. uocat;
nichos Numerius. 3 Corpus, hoc est corporis formam, opior.

De bestiolis quibusdam, quæ intra animalia aut eorum partes
gignuntur. Cap. CCXXI.

*Lumborum.
Equi.*

IN excrementis adhuc intra animalia concentris oriuntur lumbici, (Quædam
Græci uocant) aliotum uel uilum more, qui ex putredine ortum habet,
ex cruda scilicet & crassa pituita. Tria horum genera, latum, teres, & quod
ascarida appellatur. Sum potro ascaride paruali quidā lumbici, qui parte
posteriori inferiori plenioris intestini, quæ podici proxima est, gignun-
tur, uehementem prurium loco afferentes: apparetque plerumque in iumen-
tis qui male cibum concoquunt. Sentiant hoc malum homines præcipue
ante pubertatem: uehementiorq; medicamenta ad eorum curationē de-
siderant, quā lumbici teres. Ex ascarida nihil aliud procreari potest: la-
tum autem genus solum intestino adhaerens, parit simile cucumētis semi-
na: quo indicio medici id genus lumbici inesse intelligunt. Est uero latū il-
lus genus ueluti pellicula intrinsecus intestina cōregens, in corpus quoddā
uinum permutata. Longissimus hic lumbicus, & qui sepe per tota potest
diuis intestina. Egetiturque nonnunquam integer, rictum pedum, ali-
quando

*Ascarida
in equis.*

*Lumborum la-
tar, Quæ
in uermis.*

- A** quando & plurium longitudine. Nonnunquam particulatim efficitur. Dicitur & *angia* & *maia*, quod faciens infestisae similis sit. Rarior hac uisitur. At lumbricus teres frequentior, ac proinde nulli non cognita forma eius est. In superioribus maxime intestinis gignuntur teretes adeo, ut ad uentriculum ipsum nonnunquam ascendant, & per os quandoque aut nares effertur. In pueris multi, & frequentius quàm Ascandes procreantur faciliusque medicamentis amarus deuicuntur quàm alij. In erubris frequenter, nonnunquam uero & in brachiorum musculis, lateribusque ipsis nascuntur uermes qui dracunculi uocantur specie teretibus similes, quâdoque magni, nonnunquam uero minores. In Æthiopia. Indiâque, & quæ supra Aegyptum sunt locis, frequentius hoc malum contingit. Estque eorum generatio lumbricis uentris quos latos uocant, non dissimilis sub cute nâque mouentur unus, nihil dum afferentes molestiæ: procedente deinde tempore, ad alterum eius finem suppuratur locus, cutisque aperitur, & dracunculi caput exeritur: quem si in curando traseris, dolor uehementis excitatur, præsertim si intra trahendum rumpatur dracunculus: quod enim relinquitur dolores affert molestissimos. Hæc Leonides. At Soranus animal esse dracunculum hunc negat: sed nervosam quandam substantiam esse affirmat, quæ non mouetur, sed motum quandam habere uidetur. Est uermiculus in lingua canis, qui uocatur à Græcis lytra: quo exempto infantibus catules, nec rabidi fiunt, nec lassidium sentiunt. Quem infestat uermiculus, qui in ipso discrimine ungulæ nascitur, cum idem locus tuberculum habet, cuius media fere parte, canino similis extat pilus, eoque subest uermiculus. Ferro caustissime tuberculum circumsecari oportet, ne dum amputetur, etiam quod infra est animal uulneremus: id enim cum fauciatur, uenenatam sanie mutitur, quæ respersum uulnus insanabile facit, ut totus pes amputandus sit. Piscibus (ut supra dictum est) innascuntur quædam minuta animalia quæ partium expellunt. Narrant & bestiolas quasdam uelut lumbricos intra spongas consistere atque ali, quos & ualsis spongiæ pisciculi faratiles deuorât.

1. Intra animal, &c. Intestinarum animalia uocat hæc Plinius. 2. In iumentis qui male, &c. Solent uisitare, inquit Columella, uocere lumbrici, qui fere erudantibus nascuntur. 3. Dicitur & *angia* & *maia*, &c. Plinius: Tineam uocat, nisi codices sint mendosi: pro tinea.

- D** De iis quæ carnis uiuæ humore aluntur, ut pulice, pediculo, tinea, & similibus. Cap. CCXXII.

QUæ ex numero infestiorum, non carne uiuante, sed carnis uiuæ humore aluntur, ut pediculi, pulices, cimices hæc per coitum generant ea quæ lendes uocantur, ex quibus nihil præterea nasci potest. ex uis enim neque ea quæ generantur, proueniunt, nec aliud ullum animal: sed id quod sunt, sordes tantum persistunt. Unda maris lendes capiti deducti iniquas, inquit Serenus. Gignuntur pediculi in uiscentium hominum capillo (ueluti in capite) non in superficie ubi furfures consistunt, sed in profunda cute, ex humoribus quibuldam calidioribus quidê, sed qui minus acres sunt. Pediculi etiam ex ipsa carne oriuntur, quibus saturis emergunt oculi pa-

stule quidā sine pure exigua, quas si pungas pediculi creant. Accedit mor-
bus hic nonnullis hominibus præ nimia corporis humore: & quidem ali-
quos hac fœditate obuisse prodium est, ut Alcmanem positam: Phœrcidē
Syrium, & Scyllam præterea dictatorem. Diodorus pediculos facere œcy-
ma cibum prodidit. Gignuntur & ex uestis genere pediculifunt enim oues
quas lupus occiderit uellera, & facta ex his uestis, lōge quā cetera aptio-
ra ad pediculos procreandos. In quibusdam item morborum generibus, co-
pia nascitur pediculorū. Genus pediculi ferum uocatū est, durus eō quod
in plurimas gignitur, & corpori detrahi difficilis. Puens pedicali in capite
magis proueniunt, uiris minus: omnino foeminae magis quā mares pe-
diculum sentiunt. Quin & ex ceteris animalibus complura pediculo infē-
stantur, ut aues & phasiani quidem ex eis intereunt, nisi se puluerē. Pilos
habentium, aliam tantum immunitatem hoc malo credunt: qui non pedicu-
lo tantum, uerumetiam nemo immunis est. Boves utrumque id habent co-
nes & capre ricinos habent, pediculi uacantibus quoddam pediculi ge-
nus grande ac durum familiare est: canibus propriū est ricinus, qui ab eodē
animali nomē cynorhastus accepit. Est uero ricinus (quoniam Graeci uocāt) 3
animal, ut inquit Plinius, fœditissimū, infuso semper sanguini capite uiuens
atque ita in omnes, unum animalium cui sibi non sit exitus, dehisceque
namia facietate, alimento ipso moriens, cum diutius in fame uiuat: sepius
ita diebus durasse tradunt: ut in facietate paucioribus dehisce. Nunquam
in numentis gignitur: in bubus frequens: in canibus aliquando: in quibus
omniam in ouibus & capris hoc solum. Genus unumquodque pediculi ex
corpore ipso sui animalis enascitur. Proueniunt largius pediculi mutatio-
ne aquarum, quibus lauare se solent ea quorum natura pediculam pariat.
In mari etiam pisces hoc malum infestat: uerum nō in piscibus ipsis, sed in
limo gignitur simile aellis multipedibus, nisi quod eadem hoc amplius-
culam habeat. Genus pediculi marinum usum est ubique proueniens sed
maxime in foraminibus & caernis. Quibusdam uero piscibus ipsis inna-
scentur, quo in numero chalcis accipitur. Vocant & in mari pediculos, in-
quit Plinius, eosque tunc insillari ex aceto auribus habent. Item, rigor cer-
uicis mollietur cum marinis qui pediculi uocantur, drachma una pota. Pi-
sces uel manu caperentur dum dormiunt, nisi pediculis & pulicibus appel-
latis sollicitarentur: uero si somno dati immoerentur, noctu ab inu-
mera multitudine illarum bestiolarum occupati absumerentur. Gignun-
tur hoc in profundo maris tanta fecunditate, ut etiam escam de pisce emo-
litam, si diu in imo manserit, totam corrodat acque absumat. Et quidem
sepenumero piscator escam demissam, glomeratis undique his bestiolis,
perinde ut pilam recipit. Habent thumi & gladij circa canis enormem cir-
ca pinnas, seu uermiculū quem ostium uocant, effigie scorpionis, magni-
tudine aranei. Infestat hoc tāto dolore, ut interdum gladius ē mari exiliat:
unde fit ut sepenumero in nauigia incidat. Pulices minima quadam putre-
dine gignuntur: sed eamq. sui osus, sordes obtinent aridas. Lendes procreāt
& ouis speciem referentis: crura habet posteriora mediis longiora, quibus sa-
liunt.

*Pediculus fer-
vus.
uulgo Apus.
Pediculus
grosci.*

*Cynorhastus fer-
vus.
Ricinus.
Apus.*

*Pediculus mari-
nus.
uulgo Insillari-
um.*

*Pulco mari-
nus.
uulgo Insillari-
um.*

*Ostrina.
Copeus.
Aster.
Pulco, uulgo.*

- A** liunt. Cimices genus animalis foetidissimum, & dictu quoque fastidieñdū, *Cimex* utaque Plinius, ex uapores quodā humidiorē ab animalium corporibus *Cimex* foris collecto gignitur. Cimices qui in lectis nascuntur, acri facultate prædicti sunt: & cum uino aut aceto epositi, adherentes bitudines abigere dicuntur. Fabarum cavis inclusi profunt, si ante accessioneñ septeni deuorentur, iis qui febre quartana laborant. Percussis uero ab aspidē, etiam circa fabas sumpti: olfactu, strangulationibus uulnē concidentēs reuocant. Trici & urinarie fistulæ impositi, urinz angustiam, quam disuriā dicunt, leuant. Hæc Dioscorides. De cimicibus, inquit Galenus, prodidere nonnulli, quòd si ex aceto bibentur, hirudines epotas euacuant: uero, cum eas perpetuo
- B** ex alij cū abegitimus, maxime opus cimicibus fuit. Quæ de cimicū natura dicuntur (ut Plinius refert) tanta authorum assenatione cōmendantur, ut quauis pudenda dictū, ea præterire fas non sit. Hæc contra serpentum morsus & præcipue aspidū ualere dicitur: item contra uenenā omnia: argumento quòd dicunt gallinæ quò die id ederint, nō interfici ab aspidē: carnes quoque earum percussis plurimum prodesse: ex his quæ tradunt humanissimū est, allinere moribis cum sanguine testudinis. Item suffitu eorum abigere sanguifugas adherentes, huiusq; ab animalibus restinguere in potu dātos. Quamquam & oculos quidam his inungunt tritis cum sale
- 7 & lacte mulierum: aurēque cum melle & rosaceo ammixtis. Eos qui a *Cimex* greffes sint & in malua nascuntur, crematos cinere permisso rosaceo, infundunt auribus. Cetera quæ de his tradunt, uomitæ & quartanarum remedia, aliorūque morborum, quāquam ouo, aut cera, aut faba inclusos essent deuorandos, falsa nec referenda arbitror. Lethargi tamē medicinz cū argumento adhibent, quoniam uincant somnificā uis, septenos in cyathō aquæ dantes, puerilibus annis quaternos. Ex stranguriæ fistulæ impositū: adeo nihil illa rerum omnium parens, sine ingentibus causis gentit. Cimicibus aduersatur scolopendra, suffituque necat.

- 1 Carne onuntur. Nascuntur quoque, inquit Plinius, in singulis ipso hominis animalis exsiccata corporis. Pusillæ, uide. 2 Cynostictæ, à quibusdam cynomys dicuntur, et notat Hermolaus. 3 Eximius Theodorus rōdium uocat, forsitan ex Columellæ authoritate lib. 6. Verum considerandum ne deprauata sit quidam Columellæ exemplaria, redui pro cicini habeant, ut in aliis legitur. 4 Crocones *Rodum* in gramini oriuntur, inquit Aristoteles. An idem sit animalis genus an corrupta sit littera. 5 Sordes aridas, *arides* sordis. Generantur sordibus a radi solis, inquit Plinius: in quibusdam exemplaribus Pliniani, non aridi soli, sed à radii soli, legitur. 6 Pullex apud Columellam in horro, pro uermiculo aut cruce quadam accipitur, herbas erodente. 7 In malua, *dec*. Plinius. E malua cimices infunduntur auribus cū rosaceo.

De blattis.

Cap.

CCXXIII.

Hoc quoque animal inter pudenda est: sed propter ammirationem naturæ præconiumque curam, totum in hoc loco explicandum. Tenebrarum alimnæ blattæ sunt, lucēque fugiunt: in balneis maxime humido uapore progener. Est quidam pinguetudo blattæ si caput appellatur hanc tritam uñā cum rosaceo, auribus mure prodesse dicunt: sed lanam quā inclu-

DE DIFFERENTIS

serine, post paulum extrahenda. Celerissime enim id pingue transire in animal, sicut uermiculum: alij benas tornasse in oleo decoctas efficacissime auribus mederi scribunt, & tritas in hircocolo imponi conatus. Blatte quæ in pultrinis inueniuntur (ut scribit Dioscorides) in ratibus tritas cõ oleo aut decocta, aurium dolores insillati mitigant. Galenus totum animal in oleo coctum hæc efficere nonnullos affirmare prædicat. Plura earum genera fecerunt molles, quas in oleo decoctas uerrucis efficaciter illini experti sunt. Alterũ genus, mylæcon appellauere, circa molas fere nascens. Hæc ea pice detracta atritas, lepras sanare Musa & Pigeon in castis reliquerunt. Tercium genus, & odoris ardido inuisum, & acuta clune, cum pisceleo sanare ulcera tradunt, alijs insana bilia: strumas, penos, dichas & r imponitas, percussa, conuulsa, cacochæ, scabiem, furunculosque detractis pedibus & penis. Nos etiam hæc audiri fastidimus: ut Hercule Diodorus & morbo regio & orthopnoicis restituisse tradit cum resina & melle: humanissimi eorum, cancerem cotinatarum referuadum ad hoc usus in cornea pyride con-
fuere: aut tritas clysteribus infundendas orthopnoicis aut rheumaticis. In-
fira utique corpori illitas extrahere cõstat. Cumula tertium genus est quæ à
Graecis mascula, à nostris cumilago uocatur: manipulo eius abiecta, omnes
etiam à tota domo blattas conuenire ad eam tradunt. Est similis uerbasco
herba quæ sepe fallit pro ea capta. Hæc abiecta, blattas in se cõtrahit: adeo-
que Romæ blattariam uocant: & insectorum quidam ratio talis est.

Blatta malle.

Myllæcon.

Myllæcon.

Myllæcon.

1 Blatta. *Myllæcon*. Blatta interpretatus est Theodorus. Verum eo in loco mendosa esse opinor exemplaria Græca. Neque *Myllæcon* eo in loco, neque *Myllæcon* legendum cenlet Hermolaus, sed *Myllæcon*, ut in *Myllæcon* *Myllæcon* in bractea pignat apertum est, quæ & ipsa pennas sunt. Vocantur autem pennæ (ut ille ait) uermiculi porcos, bracteam, lastræque instantes, & alia quædam olum. 2 Myllæcon, alijs myllæcon.

G

De his quæ molliā dicuntur.

Cap. CCXXIII.



1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**

Barb's
Barb's
Cher.

complectens, quem pinnula ambiunt in orbem: caput cum nonnulli manus recte appellantur. Caput uero omnibus contra quam ceterorum animalium inter crura. A polypo differunt cetera infolia, eo quod alucus polyporum paruis breuisque & crura praelonga, ceteris eductis, alucus amplius & procerior, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediendi: sunt itaque crura omnia in priore corporis parte, circum caput, infra oculos, circa os & dentes. Sed cum cetera animalia, quibus pedes, aut parte priore posterioraque eos habeant, aut laetere, ut ea quae multis pedibus innutantur & sanguine carent, hoc unum genus pedes parte, quam proceram in eo capimus, omnes continet. Pedes octonarij omnibus, modo tamen dissimili sepe enim atque loliginis pedes habent supra dentes semos caiguos & breuiores, eorumque nouissimos duos maiores: reliquos autem octonorum duos infra dentes, omnium maximos: polypus longos obtinet, & medios quatuor habet maximos. Promusculides habent binas praelongas & asperas sepiæ & loliginis, quibus ueluti anchoris innutantur, seque stabiliunt, ne aestu maris tempestatæque exarberentur faxis: uelque de longinquo cibum ori admovent: talis polypi carent, quoniam pedes ad eundem usum commodos habeant. In crinibus geminum habent acetabulorum ordinem, i capite in extremos usque citros cetera omnia prater unum polypi genus quod hederota uocant, quod unum ex mollium numero simplicem acetabulorum ordinem habet. Caput omnibus (ut modo diximus) inter crura continetur. Huius pars os est, in quo dentes duo. Lingua nullis in hoc genere data est sed pro lingua carinolum quoddam, quo uice lingue utantur: quo scilicet uoluptatem efculentorum discernant. Supra hæc oculi bini grandisculi

DE DIFFERENTIIS

quibus discrimen tangua quodam præstat cartilago continens cerebrum & parvulam. Fistulam ante alucem, supra caput & brachia gerunt, qua mare & transmittunt, quantum suo admiscetur aluco quoties ore aliquid capiant, eâque modo in dextram partem transferunt, modo in sinistram. Et hæc eadem fistula polypi suum quoque atramentum fundere assolent. Pinnulam habent hæc omnia circumdantem alucem, ut natem & se dirigant, (quemadmodum pisces sua cauda pene cartilaginata) sed non omnia eodē modo. Natant mollia cum pedibus ipsis tum pinnis. Quantum vero ad interiora attinet, omnibus mollibus cerebrum datum est, quod tamen minime cerebrum dicitur, nisi per proportionē. os gula excipit angusta & longa, quam sequitur *stomachus*, id est, ingluviens ampliuscula, non absimilis autibus cuiungitur ventriculus tanquam abomaculum, forma claviculae buccinorum. Intestinum ab eo tenet (quod crassius tamen quam gula est) partē repensens su periorē, ad locum fertur ori vicinam, sed paulo infra sunt nāque in hoc mollia turbantia similia. finis enim ad principia flectitur, contrario quā in omnibus alius modo, ut in descriptione conspicitur. Viscera mollium nulla, sed habent quam *vesicam*, id est, mutem appellant: & præterea utrum quendam humorem habent sibi peculiarem, cui nomen *Mucus*, id est, atramentum, tunica contentam membrana, quod plurimum in seipia est. Et hoc sane perfidij salutisque gratia possident, effundunt enim suū id atramentum omnia metu percussa, sed præcipue sepiā. hoc enim effuso humore, aquam insulfant, sibi que nigrorem velut sepiū præponunt & turbulentiam, quasi quo se abscondant. Accrescitque hac humor denuo postquam emiserunt, ut nunquam copia desit atramenti. Mutis in mollium genere, id est, quod ei parti proportionatur, quæ in sanguine genere cor appellatur, id membrana continetur humidi, sub ore, & per eam gula in ventrem perpendit, ad motu potius tergo. At vero atramentum infra continetur, tunica etiam contentam membrana: polypis quidem & lolliginibus prope mutim potius posuim, sepiæ vero infra ad abum & qua intestinū petere incipit superiora: meatumque suum eadem obvolutum habet membrana qua intestinum atque idem foramen emittendi atramenti excremēti que est ea scilicet parte quæ fistula vocatur, quæ in spinis posita est. Habere feminas omnes in hoc genere membram vuluale apertum est membranas scilicet in quibus ova tanquam in ualua continentur. habent enim ouem primo indiscrētum, mox discrētum in plura: & pariunt omnia imperfecta more oviparorum piscium. In sepiis & lolliginibus vulua ita articulata est, ut befida cernatur ut polyporum ovum simplex videtur, ob uteri formam, quæ specie rotunda conglobatāque est. Differunt formæ a maribus, quod in mare incatus quidam subdinus gulæ à cerebro in ima aluci pendenda, adque ipsam ad quod fertur speciem mamme imitatur in femina duplex idem illud supraque positu habetur. utroque tamen in sexu corpuscula quædam subrubra parti eiusmodi subiuncta spectantur. Mollia sepe tota carnosā & tactui cedentia sunt tñbal enim ossis, nihil fere terrene habere discrētum videntur, quod dignum effatu sit: ne tamen corpus totum facile



Mollus.
Aluco.
Stomachus.
Intestinum.

Mutim.
Mucus.

Atramentum.
Vulua.

- A facile peteat, naturam inter carnem & nervum obtinent. mollis enim ut ea
 ro, sed incedi potest ut nervus. Fissilis autem caro eorum est, veram nō per
 directum, sed in anfractum: cutēque omnibus intersecta est, uti modo dictū
 est: quaedam etiam veluti capillamenta in corpore omnium habentur. Sepi-
 pax quoque & lolligini & lollio partes duræ & solidae intus per dorsum &
 corporis prona continentur, quas non eodem appellant nomine: sed quod
 inferum sepius est, sepium vocāt, quod lolliginibus & lollis, *sepioides* est, gla-
 diolum, uti infra explicabitur. Ac polypus nihil huiusmodi solidū intus,
 sed circa caput cartilagineum quiddam est, quod senescētibz indurefcit.
 Mollia omnia eodem modo coeunt: onibus enim inuicem admoēs, com-
 plexūque mutuo brachiorum libidinem implent. sic enim coniungi neces-
 se est, quoniam natura exitum excrementi prope os inflectēdo adduxerit,
 ut antea dictum est. Patiunt ea sui corporis parte, quę fistula dicitur, qua &
 coire ea nonnulli arbitrantur. Polypi in terram verſo capite coeūt. reliqua
 mollium tergo, inquit Plinius, ut canes. Verno tempore pariunt, & sepiā
 in primis, pariunt autem ova imperfecta: quæ ut roscantur, plurimam len-
 toris unā cum fetu emittunt. augentur ova oransum, & accrescunt more
 uetrum. Ovum habent omnia candidam, quod tempore arendum eva-
 dit, veluti & illud quod crustata edunt. Sed cum genus omne crustatam si-
 bi iuncta contineat ova, atque foueat, polypus & sepiā & reliqua generis
 eiusdem, ova quæ pepererint, absoluta fouent. Huius generis mas sub par-
 tu ova quæ formina ediderit, persequitur suum semen aspergens: reddun-
 tūque eorum ova tanquam glutino coherentia, (id quod non nisi in sepiis
 visum adhuc est, uerum in reliquis easdē generis id fieri ratio est.) & quæ
 vitale id vitis congerunt, ex his enascuntur animalcula, quæ modum
 de piscibus dictum est. Mollia sensibus prædita esse omnibus constat: iam
 enim sepiæ & polypi odore escarum allectari capiuntur: neque easdem sa-
 poribus omnia delectantur. E genere mollium nullum est, quod uel nocē
 uel sonam emittat naturalem. Mollia omnia carnuora sunt, & sola carne
 uescuntur. Lolligines nanque atque sepiæ pisces uel maiores euincunt. Po-
 lypi conchulis maxime uescuntur. Præstant mollia cum grauida sunt, ut
 lolligines, sepiæ, polypi. Duræ carnes hoc genus est, concoctu difficile, non-
 nihil salfedinis pariterceps. At si probe concoquantur uberius alimētum cor-
 pori præbet, sed crudi humoris plurimam creat: succūque crassum &
 tenacem. Venerem concitare mollia in cibo, prodidit Diocles, maxime
 uero polypos.

1. *Fissilam, etc.* Videtur Theodorum in hoc Aristotelis loco, utque etiam Plinium,
 fissilam hanc polypo tantum uti uocari, & sane perobscure pronuntiat hoc Aristoteles:
 sed longe apertius eadem in lib. de respiratione explicat, ubi aperte mollibus omnibus
 fissilam ante crebram inesse ostendit. 2. *Hanc humorem pro sanguine has in-
 fecti sunt Plinius.* 3. *Admota potius tergo, etc. ut supra uidetur.* 4. *Concoquitur
 tunica, etc.* Tunicam hanc in polypo uisam vocat Archenus.

Mollia.

De polypo.

Cap. CCXXV.

Polypus.
Palaemon.

Polypus ē mollū genere animal, ab aliis mollibus hoc præcipue differt,
 quod eius alueus (quem caput polypi vocāt nonnulli) paruus est & cru-
 LI

DE DIFFERENTIIS

ra per longitatem ceteris eductior, alius amplas est, crura breviora. Hæc po-
 lypo, ut & alius, octona (sed quatuor quæ in medio sunt maxima) quibus ma-
 nuum loco pedumque utitur. Nam duobus quæ supra os sita sunt, cithi os
 admoventiulimo uero, quod & acutius & solum albicās est, & parte sui ex-
 trema bifurcatum dorsiūque adnexum in costis utitur. Polypus enim itas,
 ut nonnulli affirmant, in hoc suo brachio, in quo duo amplissima habentur
 acetabula, id genus quod genitalis speciem refert quod quasi nervo consistat
 album, porrectum ad medium usque brachiam. Proculdubio carent poly-
 pi, quoniam pedes ad eundem usum commodos habet. Pinnulam quæ al-
 ueum circumdat parvam habent minimeque conspicuam. Fistula his caua,
 ut & alius in anteriore alui parte sita supra brachia geritur. Caput polypo
 quādiu uiuit prædurum est, & quasi inflatum. Tangunt ac tenent brachus
 supinis membranamque pedibus interiectam totā extendunt. Polypus ni-
 hil solidum intus, quemadmodum se pis sepium est, sed circa caput carti-
 laginosum quoddam est, quod senescentibus durefcit. Membranam illam
 quæ atramentum polypi continet, *albus* uocit quidamque in polypo su-
 pra uentriculum apud motum sita est: continet humorem in se nō nigrum
 ut in sepiis, sed subrufum, quo, ut diximus, in meta utitur. Mas à semina
 discipat cō quod capite est prodestiore: & quod generale piscatores appel-
 lant albedum illud suo in brachio continet. Vescuntur maxime conchylio-
 rum carne polypi, quorum in conchas complexu crināum frāgunt: quo fit ut
 eorum cubilia cognoscant qui uenantur, congerie testarum. Tribus quo-
 que Nigri prosidit, auarissimos esse concharum polypocillas ad tactum cō-
 primi præcidentes brachia eorum. Insidiantur ergo polypa apertis, imposi-
 tōq; lapillo extra corpus, ne palpitans euclatur, ita securi grassantur, extra-
 hantque carnes alie se contrahunt, sed frustra discurrunt. Tanta solertia
 animalium hebetissimis quoque est. Hyeme tempestuosa in cœcenis lan-
 tæ polypus, & cœca sibi ipsi erodit, ut tradit Oppianus. Aristoteles autem
 falso hoc à nonnullis creditū affirmat: id enim à congris euenit ei: nam cō-
 gri polypos superant & edunt: unde fit ut aliqui capiantur qui brachia à cō-
 gris corrosa habeant. Polypi odore escarum allectati capiuntur: ita enim
 quandoque adhærescunt, ut auelli inde non possint, sed truncari potius pa-
 riatur: ut uero pulicaria herba adnota, protinus ab odore eius resiliere dicū-
 tur. Fronde quoque oliuæ capitur polypus: & in terrā oliuæ delideno egre-
 ditur. Polypis coctus cum alter capite uulgo appellato in terram uerso ni-
 tibundōque explicat, porrigitque sua brachia, alter superuenit, passimq; bra-
 chus singulis ad singula subiacentis acetabulorum complexu mutuo adhe-
 rescit. Marem nonnulli adiungere, quod genitalis speciem refert uno bra-
 chiorum, ut modo diximus, in quo duo amplissima acetabula habentur:
 idque quasi nervo consistat, porrectum ad medium usque brachium con-
 sistit manet totūque nati foemina adnecti. Hyberno tempore coit polypus,
 uero parit. Latet circiter menses duos. Ouum edit uel in cubili suo, uel in
 figulino, simile labruscæ racemulis, aut fructus arboris populi albes: quod
 foris quidem unū, simplexq; incomptum & grande est: intus hamorū can-
 dicantē

polypus.

*Alia, comple-
 xus crināum.*

G

H

- A** dicentem concolorem totam, atque æquabilem continens. Perquam fecundum hoc animal est: nam de eo quod ediderit, copia immo mora provenit. Tantæque fecunditate pendunt ova per cubile, ut collectis nas impleatur longe amplius quàm caput sit quo continebantur. Polypus semina modo incubat ova, modo in ore sui cubilis affidens, brachium super ova exporre-
ctum tenet, vel ut Plinius refert, modo in cavernis sedet, modo cavernam cancellato brachiorum implexu claudit. Polyporū itaque ovis diebus post quinquaginta maxime ruptis, polypuli modo atraneorum perquam multi exserpunt, quorum natura sigillatim nondum in omnibus membris cōspici-
a est, quanquam forma satis nota apparet, sed ob circūgitatem imbecillita-
tēque copia interit. Iam nonnulli adeo spectantur exigui, ut nulla par-
tium consistat distinctione, quanvis ad tactum moveantur. Dum sœvit po-
lypi ova, deterrimi efficiuntur: haud enim passum prodire patiuntur. Hi-
eno non amplius vivit polypus magna ex parte sua enim natura tabi obno-
xius est: indicium autem ne bimatum complecti esse viderur, quod ab ortu
eorum (qui a stare fir) ad autumnum, non facile grandem polypum videns,
cum paulo ante id tempus prægrandes spectentur à partu ita senescere de-
bilitarique tam marem quàm feminam ferunt, vel ut à pisciculis deuorē-
tur, & facile à suis detrahantur cubilibus: cum antea nihil tale his usu eue-
niat: tum vero paruos nouellōsque quanvis recens natos, tamen nullo effu-
sio modo malo affici narrant: quoniam ualidiores esse quàm grandes confir-
mant. Polypus satius quidem est, cum ad manum hominis demissum acco-

C dard sed prudens rei familiaris, cum omnia colligat, & suo in domicilio re-
condat: cumque consumpserit quantum utile sit, abigit restas, & cicorum
ctustas, & putamina conchularum, & spinas pisciculorum. Sui etiam mu-
tatione coloris venatur: si detrahit enim colorem similem is quibus ap-
propinquarit facit: quod idem etiam cum metuerit facit. Marum quod de
hums ingenio prodidit: Quidius polypum hamos appetere, brachijsq; cō-
plecti, non morsu nec prius dinartare quàm escam circūroferit, aut ar-
dine leuatum extra aquam. Trebius niger prodidit, nullum esse atrocius
animal ad conficiendum hominem in aqua ductum: enim cōplexu, & sor-
bet acrabulis, & multo fuctu detrahit eam. In naustagos utinam tēte
impetum capitis si inuertatur elanguescit uis: exporrigunt enim sese re-

D supina. Morsu non ledit polypus, sed sanie quadam noxia quæ è corpore
eius effluit, ut prodidit Oppianus. Mollum unus polypus exit in siccum,
graditur per aspera, uitat letia. In cibo datus, tenerem cōstat omnium
mollum maxime iuculeus alium reddit buxudam, si uehementer co-
quantur. De polypo & hæc traduntur: auria ipsam ex sese emittere, & ideo
non debere adhi in coquendo: secari a iundine: ferro etiam infici uirrumque
trahere. Polyporum genera plura sunt: utrum cōspiciat & maximum: cu-
ius generis qui prope terram degunt, maiores sunt quàm pelagij: alterum
corpore exiguo uariōque est, cibo ineptum: aliud quod heledonam uocāt, *Helodina*,
crurum prolixitate diuersum (crura enim habet longa) & quod unum ex
mollum numero simplicem in brachijs acrabulorum ordinem habeat.

DE DIFFERENTIIS

Bolites.
Oxyle.
Oxyle.
Oxyle.

Micula.
Nautilon.
Quam polyp.

Peter duo pri-
ma brachia.
Plinius, ut so-
lva.

Micula.
Pomplon.

Nauplium.
na.

Naupli.
Hirundo.
Naupli.
Naupli.

Ad hæc polypii generis est quod alij bolitenam, alij ozolim dicunt, Plinius o- E
zenam dictam à graui capitis odore paratior hoc maxime murenis ei cõ-
fectantibus. Pollax & oxynâ & oxynthiam uocari tradit, polypii generis quod
inter caput & cirros brachiosque, fistulam gerit, qua tetrum emittit odorem:
quod manus se piolâsque uenatur, ut inquit Aristophanes. Duo item ui-
suntur genera conchas indita, quorum alterum nautilon & nausicum uo-
cant alij ouum polypii forma polypo simili. Testa is ut pedunculis conca-
ua, nec ita tam in deltinata ut ei insisterent. Saepius hi iuxta terram pascun-
tur: unde euenit ut fluuiis uacti in aridum elidantur, testa dilapâ nudi
captantur, aut in terra emolitur. Constat exiguo corpore, facie simili bo-
litenis: polypus hic nausicus, natura & uitæ muneribus singularis est nauigat
enim per maris summa clasus de imo gurgites effert se testa inuersa, ut
ascendere possit facilius, & inani scapha enauigetabi uero emergerit, con- F
cham reuertit. Habet inter sua brachia membranulam quâdam annexam
similem eis quæ digitis inferæ palmipedum continentur: uerum illæ cras-
siores sunt, hæc prætenuis est, & araneæ speciem imitatur: hac uelificat
cum aura inspirat: cirrósque pro gubernaculis utroque demittit latere: si
quid inuenit, concham protinus mari replet, atque ita demergit. De gene-
ratione incertum: quæ eius cõcha, nihil adhuc exploratum habemus, in-
quit Aristoteles: uidetur tamen non ex coitu gigni, sed ut ceteræ conchæ
prouenire: nec uero in concha solutus uiuere possit, certum adhuc est. Est
& alius polypus, qui cochlearum more siliceo tegmine ita muniat, ut
nunquam egredi solear, suâque interdum brachia exeat. Hæc Aristoteles
Nautilon Plinius ab aliis pomplon uocari tradit. Supinus hic, inquit, in G
summa æquorum peruertit, ita se paulatim subrigens, ut emissâ omni per fi-
stulam aqua, uelut exoneratas sentina, facile nauiget: postea duo prima
brachia retorquens, membranam inter illa miræ tenuitatis extendit qua
uelificat in auras, ceteris subremigans brachiis, media cauda ut guberna-
culo se regit: ita uidit alio liburnicarum gaudens imagine: si quid pauori
interueniat, hausta se mergens aqua. Nauigerâ similitudinem & aliam
in Propontide usam sibi prodit Mutianus: concham esse acuij modo cari-
natam, inflexa puppe, protra rostratam: hac condi nauplium, animal sepe
simile ludendi locustæ: solædoobus hoc fieri generibus: tranquillo enim
uestrorem demissis palmulis ferre ut remis: si uero flatus inuisent, easdem
in usâ gubernacula potrigi, pandique conchatam sinus auræ: huius uolu- H
ptatem esse ut ferat, illius ut regat: simulque eadem descendere incluso si-
nu, fluuii hausto terram uisu forte trita. Polypo similis chelidõ est, id est, 7
hirundo, inquit Diphilus: humentibus membranis uolare in mari hirundi-
nes, ut siccas inter recta uespertilio. Volat hirundo sane perquam similis uo-
lueri hirundini, ut inquit Plinius: Sublimisq; ad eam uolat: cum maiorem
piscem meruerit, ita haud quasquam mare attingat: aliusque in uolans sese
anollis quâdam mibus, non tam alte tam en quam loligo. Ex pennis stridere
sciuntur hirundines in uolata: sunt enim his pennæ latæ & longæ. Acu-
leum quoque gerit hirundo uenenosum, inquit Oppianus: In cibo humo-

A rema corpori prebet chelidon, qui colorem reddit bonum sanguinisq; excretionem mouet, ut author est Diphilus. At Xenocrates chelidonas uiroso sapore esse proddit, malumque procreare succum.

1 Crura breuia, &c. Crura polypo, crura uocat nonnunquam Plinius. 2 Vltimo uero, &c. Hunc polypi pedem, si fallor, Plinius caudæ uocat. lib. 9. Cauda, inquit, uocat, quæ est breuila & acuta in coita. 3 Fistula hinc, &c. Est polypo fistula in dorso, inquit Plinius. 4 Polypus sepiant, &c. Oppianus quoque describit pugna polypæ & murentæ & polypi, & carabæ. 5 Pendens eua, &c. Parient eua torali cubita pampino, inquit Plinius, tanta fecunditate, ut multitudinem uocorum oculi non recipiant cauo capite, quo prænantes uolent. 6 Eadem in eua, &c. Si non eadem sim, ut certe similiter nauigare uidetur conchæ quæ ueneræ dicuntur. De quibus Plinius: Nauigant ueneræ, prætereaque concanam in partem, & autæ oppositæ, per summa æquorum uelificant. In monullis eodæmodò habetur, nauigant ex utroque, &c. 7 Chelidon est, &c. Sunt qui existimant chelidona, hirundinæ uel Aristoreli & Plinio piscem significare. Athenæi uero chelidona alienas esse gentis eia quod mihi quidem nullius ueteris scriptoris authoritate coarctat. Præterea quo modo piscem intelligi potest, si uolenti hirundini perquam similis uoluerit & ubi Plinius. Satis itaque uisum nobis est hirundinæ polypæ conuigere, quæ piscium generibus maxime cum Aristoreli ipse hirundinem a piscibus separare uidetur eam, quæ sublimis uolat, & uolara stodo tem emittit.

De sepiæ.

Cap. CCXXVI.

E Mollium genere sunt & sepiæ, loligo, & lollius, quæ à polypo differunt, eo quod eorum alueus amplius sit, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediendi. Ipsa autem inter se discrepant, quatenus loligo longior, sepiæ labor est: lolligine uero longe grandior, qui lollius nominatur: sed sepiæ quoque aliquas in bina augeri cubita notum est. Sepiæ, lolligini, & lollio datum quiddam, ut diximus, ac solidum intrus per dorsum & corporis prona continetur, quod non eodem appellant nomine sed quod insertum sepiis est, sepium uocatur: quod lolliginibus id ipsum, ad est, gladiolum. Diffe sunt enim quæ sepium robustum lanamque est, inter spinam & os mediam præ se ferens nanarum, fungosam intra & complectens & friabilem corpulentiam. Gladiolus arctior & cartilagineosior est. Forma etiam discrepat, pro alueorum modo quibus inserta continentur. Sepiæ quoque lolligines & lolly peculiare binas sortiuntur promusculas, longas, alperiusculas, quibus capiunt & ad ora admovent cibos: ut etiam quociens rempessates urget, ad laxa aliqua adhaerentes, se ueluti anchoris iactis stabiliant. Non simili ut polypæ modo constant, quoniam uim nandi tantummodo habent, cum polypæ uel ingredi possint: habent enim pedes exiguos & breues, supra dentes, semos, eorumque duos nouissimos maiores reliquos autem octonorum duos infra, omnium maximos. Pinnula quæ alueum circumdat, sepiæ angusta, quæ lolligini latior est. Inter marem & feminâ tam in lolliginum quam in sepiarum genere, hoc interest, quod femina intestina continet duo ueluti mammas, quæ si alio disiecta inspectes, facile uideris: mas omnino us caret. Et præterea sepiæ mas uariis magis quam femina, dorsumque anteriore est: & partes omnes alperiores habet quam forma, & lincis interuenientibus uarias, & caudam quoque acutorem. Mas quoque iunior est & fortior est,

DE DIFFERENTIIS

constantiaque maioris. cum enim sepiæ ista est indente, mas formidã adiu E
uati formata mare percusso, fugam arripit. Perminæ uulua ita articulata est,
ut infida cernatur, & propterea oua gemina apparent. Oua habet sepiæ can-
dicantia, grandum similia, multa atramentum quod uocant, sepiæ plurimū
habet quod in sepiæ aliter atque in aliis, infrā continetur ad aluum, & quā
intestinum petere incipit superiora: ne animque suum eadem obusolatum
habet membrana quā intestinum atque idem foramen emittendi atramē-
ti excrementique est, ea scilicet parte quæ fistula uocatur, quæ in supinis po-
sita est, uti antea dictum est. Coeunt sepiæ & lolligines ora applicantes, &
brachia inter se compledentes natantique in aduersum mare etiam di-
ctam in narum inferunt. Parit formidã ea sui corporis parte quæ fistula di-
ctur, quæ & coite eas nonnulli arborantur. Fert utrum sepiæ ueruo tempore,
& cum primis ueruo tempore parit. Parit & omnibus anni temporibus, F
perferuntque in edendo ororum numero dies quindecim. Quociens
autem ediderit oua, mas è uestigio sequens humorem fortificum ouis super-
infundit, atque ita efficitur ut solidescant: nec dere nanque conuagatim so-
lent. Parit sepiæ iuxta terram sere inter algas & arundines, & si quid agge-
ssum tale iniectum sit, ut firmenta aut lapides, aut quolibet alia materiei
congeries. Et quædam piscatores de industria fiscores firmentorum disponunt.
Enitetur aluum per intervalla reprimens, inspergitque atramentum inter-
posita quiete, utpote cum non nisi cum labore emittat. Oua quæ sepiæ e-
dunt, magnitudinem myriorum magnorum, aut acinorum uicè minorum
mox intra idem decemum capiunt & nigrescunt: emasso enim atramento
parentis inhaerunt. Cohærent etiam inter se ad speciem racemæ cuncta, nec G
facile alterum detrahi ab altero potest: mas enim humorem quendam mu-
cosum mittit, cuius lentore tenaciter oua sibi cohærescunt, ac crescunt etiam
ex hoc, cum prius edita candida sint atque exigua: mox atramento per-
fusa, nigra maioraque redduntur. Cum proles iam intus conspiceretur, tū ru-
pta ouis membranula, sepiolæ excluduntur: quæ si quis prole iam perfecta
disciderit ouis membranam, siccum scutulum emittunt, suumque per metum eo-
lorem immutant ex candicante in rubriusculum. Sepias uiuendi spatium
breue unam, exceptis paucis, biennium non complent. Sepias tamen non-
nunquam in bina augeri cubita notum est. Mollium astutissima sepiæ est.
sola hæc suo utitur atramento non modo cum metuit, uerum etiam abscondendi causa: & cum progressa paululum se ostenderit, redit in atramentum:
uenatur etiam suis illis parolongis prætententis, non solum paruos piscicu- 3
los, sed mugiles etiam sepius: & maiores quoque nonnunquã euincit. Sūt
qui sepiam quoque polyporum more, colorem sibi contrahere similem lo-
co in quo uersatur, conspiciunt. Morfu non ledit sepiæ, sed noxia quædam
sanies è corpore eius effluit. Sepia, inquit Diphalus, elixa, tenera efficitur, o-
ri grata, concoctu facilis & aluum leuiter mouet. In cibo dicitur sepiæ, cum
oleo & sale & farina decoctæ. Succum gignit sepiæ, qui sanguine extenuet,
& hæmorrhoidum fluxum proritet. Sepiæ coctæ atramentum, inquit Dio-
scorides, ægæ concoquitur, & aluum emollit. Oua sepiæ urinam movent,
renumque,

*Sepiæ,
quæ uisq.*

Arenamque pituitas extrahunt, ipsosque rennes purgant. Sepium quod in his durum & testaceum est, auribus simile est ostrearum testis, sed parvum magis tenuis, ut efficitur itaque & abstergit. Quocirca collyriis ex eo formatis palpebrarum scabiebus quæ sycoses vocantur, perscricitur. Dentes quoque splendidos reddit. In alopecus præparant eum sepium crustæ farina medicamentis. Oculorum tumorem ruboremque sepiæ cortex cum lacte mulieris illinis sedat, & per se scabiebus emendat. Inuertunt itaque genas id agentes, & medicamentum auferunt post paulum, rosaceoque inungunt, & pane imposito mitigant nocte. Eadem cortice & nyctilopes curantur in farina trita, & ex aceto illita. Vltro sepio utitur, inquit Galenus, ad
Buntlagines & ephelin, fursutes & scabiem: salis uero fossili admixtum, ungues oculorum eliquat, uel, ut habet Dioscorides, elotum in medicamenta oculorum additur. Contra albugines, in oculos humidorum efficaciter insusilla tam pericigia oculorum absumit cum sale fossili tritum & impositum. Medetur lenigini cæterisque uitis ex ossibus sepiarum cinis. Idem carnes excrecentes tollit, & humida ulcera.

1 Intestina duo, scilicet, internas partes duas, breues, quasi belluina. 2 Sepia maritima. Sepiarum generis maris, uarij & nigriores, inquit Plinius. 3 Veniunt etiam, &c. Quibus artibus capres pisciculos sepiæ, explicat Oppianus. 4 Vltro sepio, &c. Dissoluit Vltum in sua testis donec id quod crustosum est absterdat, postea tritum.

De lolligine & lollio.

Cap.

CCXXVII.

ET nigrum nunc portans in corpore uirum
C Lolligo. E mollu genere, sepiæ fere similis est, sed discrepat, quod
 sepiæ lator est, uti modo diximus, lolligo longior, & toto corpore mollior
 quàm sepiæ. Præterea gladiolus, qui in lolligine est arctior & catulagino-
 sior est quàm in sepiæ, quod sepium uocari diximus. Pinnulam habet non
 angustam adeo, sed latiore quàm polypus aut sepiæ: neque per totam al-
 ueum circumactam, sed de medio orsam. Promuscidem habet eam quæ in
 dextra parte est, longiorem. Bana habet uentris conceptacula, ut & alia, sed
 altetum minus in gulam imitatur. Attramentum illud suum supra conti-
 net apud mutum, cum sepiæ infra ad aluum habeat: idque non atrum, sed
 subrufum potius habet. Hoc metus causa emittit ut polypus. Quin & me-
 dus causa uolat lolligo, & longius atque extra aquam sese effert. Lolligi-
 nes euolat ex aqua traduntur, tanta nonnunquam multitudine, ut navi-
 gia demergant. lolligo uolitans, tempestatem prænūtiat. Inter lolliginem
 matrem & feminam hoc interest, quod femina intestina continet duo ut
 luti mammas, quæ si alio dissecta inspexeris, facile uideris: mas omnino his
 caret. Coeunt lolligines, ut de sepiis dictum est: pariūneque in alto, sola e-
 nim ex hoc genere pelagia est lolligo: confertūneque ac continuum his ouis
 quale sepiæ est. Et uiuendi quoque spatium, ut sepiis breue: nam, exceptis
 paucis, biatum non complent. Lolligo, ut Diphilo placet, concoctu faci-
 lior est quàm sepiæ, atque ori grata. Lolligine uero longe grandior est, qui
 lollus nominatur: quippe qui uel in cubita quinque excreseat. Facie quo-

Lolligo,
 tab. 34.

maxilla, & in
 testibus supra.

Lollus,
 tab. 34.
 Testis autem
 maxilla, & in
 testibus.

DE DIFFERENTIIS

que à lolligine diffidet: pars enim lollij que extrin̄ acutum, lantior eſt: pin-
nula etiam circumdantes ille totum in lollio ambeunt, iunctis perperazq̄,
cum in lolligine partem aliquam relinquunt. Colore ſubruſo eſt: denſum
habet utrunque nigrum, & accipitis roſtro figura non diſſimilem, maiorē
ſuprà, infra minorem. Diſciſſo aluco utrūcūq̄ ſuſſo ſimilis uidebitur pe-
lagius eſt non alio modo quàm lolligo.

1 Hoc in loco uidebatur, non uidebatur in exemplaribus Græcis. 2 Lollus
à lolligine an ſpecie diſſeruat, an ſolo ſexu, quod ſcilicet lollus mas ſit, lolligo ſemi-
na, conſiderandum: uidebitur certe eadem ſpeciem ex Aſtorele ciliſſo. huſſo. 4, quàm
quanto de part.

De lepore marino.

Cap. CCXXVIII.

F

*Lepore marino.
Sunt in Indis
mar.*

Lolligini parax ſimilis eſt lepus marinus, ut Dioſcorides author eſt: ut
uero alij, ſpecie ſimilis eſt cochleæ tegmine nudaræ. animal paruum, ſe-
re inter lolligines aut lollios, aut certe ſepias reperitur: & pe etiam unā cum
apuis capitur, odore tetro. In noſtro mari, inquit Plinius, oſſa informis, co-
lore tantum lepori ſimilis: in Indis & magnitudine, & pilo duriorē tantū.
Magni maris lepus (nam alterum qui in alio mari naſcitur, antè dixi, in-
quit Aelianus) ex omni parte ad terræ ſimilitudinem accedit, præter pi-
los. Nam terreſtris pili & molles ſunt, & ad tactum haudquaquam reſiſtē-
tes: contra huius ſpinoli & creſti, hūc qui terigere, & dunt. In ſumma aqua
natæ ipſam, non in altitudinem denſergetur dicunt: ceteri autem & cōcinata
natatione uti ad capiendum eò diſſicillimum eſſe, quod neque in rete inci-
dit, neque ad lincæ eſcam accedit: cū morbo afficitur, natæ nequit, ſim ul
& ſanditus expellitur atque eiſcituri quiſquis eum manu ad eum admo-
uer, niſi medicamen adhibeatur, perit: ac ſi hunc bacillo terigerit, hoc idem
periculum ei procreatur, quod baſileuſi baculo tactus affert. Quem lepo-
rem marinum uocant, ut prodidit Apuleius, cum ſit cætera exoſiſ, x it
micro oſſa ad ſimilitudinem talorum ſuſſorum in uentre eius connexa &
catenata ſint: quod ſoli illi, quod ſciam, proprium eſt. Venenum eſt aliis
in cibo datus lepus marinus, & rodendūque inter ſimilitudinis etiā uſus. Siqui-
dem grauide ſi omnino aſpexerint ſemina duntaxat, conſeſum nauſea
& reduntatione ſtomachi uitium ſatentur: ac deinde abortum faciūt. Re-
medio eſt mas ob id induratus ſale, ut in brachialibus habeant. Eadem res
in mari & tactu quidem nocet: uſcitur eo unum tantum animalium, ut H
non intereat maſſus piſcis, & teneret ſcit tantum: & ingrator uſuſque ſit.
Homines quibus in paſſu eſt, piſcem olenti hoc prius argumento benefi-
cium id deprehenditur. Cætero moriuntur totidem diebus quor uixerit le-
pus: interuſque temporis ueneficium id eſſe author eſt Licinius Macer. In
India affirmant non capi uiuentem: inuicemque ibi hominem, illi pro ue-
neno eſſe: ac uel digito omnino in mari tactum mori eſſe autem amphorē
multo ſicut reliqua orbis eius animalia. Oleum in quo incoctus ſit mari-
nus lepus, ne pili renaſcantur efficere nonnulli prodidere. Ita Galenus. Dio-
ſcorides hoc efficere leporem ipſum marinum, aut per ſeſe ritū atque im-
poſitum,

*Diſſoluit pro-
diderit, ſcit pi-
ſcem moriuntur
quor marinus
lepus paſſu.*

A positum, aut cum urtica marina, prodidit. Lepus marinus, inquit Plinius, ipse quidem uenenatus est: sed eius ei in palpebris pilos inutiles euulsos cohibet: & ad hunc usum utilissimi minimi. Enterocle lepus illinunt trinus cum melle. In leporis marini sanguine & felle uis pilothri est: uel si in oleo lepus hic necetur. Sed de mollium generibus satis dictum iam est.

De crustatis.

Cap. CCXXIX.

Crustata in genere animantium exagui sunt, quæ cutis loco crustis tenuibus, duriusculis tamen & testæ similibus, operiantur: intus autem ^{Crustati} ^{nonnulli} molle carnosumque continent, durumque illud eorum tegmen non tam ^{est.}
B fragile quàm collisile est: quale cancerorum genus & locustarum est. Summa eorum genera quatuor numero sunt. Genus unum *scorpiæ*, id est, locusta est: alterum, quem *carabum*, id est, gammarum uocant: tertium genus squilla est, *scyllæ* appellant: quartum cancer, *crabum* Græci dicunt. Ita Aristoteles uerum aliter alij crustatorum genera enumerant. Plinius, Cancerorum genera (hoc etenim nomine, arborum, pro crustatorum genere abutitur) caraba, astaci, mæzæ, paguri, heracleotici, leones, & alia ignobiliora. x x x nanque eorum species esse tradit. Galenus malacostraca, inquit, id est, crustata, astacus, pagurus, cancer, carabus, squilla, cammarides. Speculippus similes esse dicit, astacum, carabum, cancerum, pagurum, nympham & arcton, id est, ursum. Diphalus ostracoderma uocat astacum, carabum, carida, id est, squillam, cancerum, leonem. Singula hæc crustatorum genera, inquit Aristoteles, in plures species distinguuntur, quæ non modo forma, uerum magnitudine etiam multo inter se differant: alia enim magna, alia parua admodum sunt. Genus igitur cancerarium & locustarium (quod *scorpiæ* dicunt) similia inter se sunt, eo quod utrumque brachia forcipibus denticulatis habeat, ^{Crabum} ^{uocant} sed hæc non ingrediendi causa habentur, sed ut his quasi manibus capiant & retineant: utique quod ceperint, admovent. Quamobrem contrà quàm pedes ea flectere solent hos etiam in caudam, illa in ostem flectunt & circumagunt: sed inter est, quod caraba caudam habent, cancri non habent. Squilla à cancro genere differunt, eo quod caudam habeant: à locustario uero, quod forcipe careant, & plures habeant pedes. Crustatorum partes supina & quæ circa caput sunt, ita se habent, Dur ad recipiendam reddendamque aquam branchiarum specie conditur
2 sint. Filis etiam his data est, quæ humore quoq; unâ cum cibo admissum reticiant. Quæ uero inferiores sunt partes, in locustario præsertim genere, feminis rabellatiores sunt, in quas & ova deponunt cum paruant, ubi & ova ipsa feruantur: at cancerorum feminæ operculum illud applicabile (quod *ostium* uocant) in quod ova deponunt, & quæ egerint excrementum, amplius & interioribus parubus magis hirtum quàm mares habent. Crustata omnia ingredi possunt, itaque pedes complures obtinuerant: pedes omnibus in obliquum flectuntur, eodem quo insectis modo: at denticulati illi forcipes, quibus saltem adfunt, interne flectuntur. Oculi illis omnibus duri, & apti tum intro tum foras, tum etiam in obliquum moueri: pal-

DE DIFFERENTIIS

pebrum uero ex iis nullum habet. Aquam omnia eius generis ore accipiunt, & quam per partes illas asperiusculas, quas branchiarum specie conditas esse diximus, rursus egerunt: quæ partes omnibus quidam infunt: sed locustæ plures habet. Denique omnibus primores bini, & in ore caruncula quædam linguæ effigie constituta est: tum stomachus oris continuo iunctus, exiguus pro portione suorum corporum magnitudinis, & in cæcis brevis adeo, ut proclius uenter os excipere uideatur. Hunc excipit uenter, in quo locustæ & caeterorum nonnulli dentes alios habent: quoniam superiores illi non satis locare queant. Mox à ventre, intestinum simplex rectum, quod locustæ & squillæ recta in caudam finit, quæ extremita emittunt, & oua pariunt: cancri autem, qui operculum illud applicatum gerunt, in medio applicaminis ipsius uerum iis quoque parte exteriori quæ oua parit delinunt. Habent in hoc crustaceo genere mares tenues genitales incanas formæ uulvas membraneas ad intestinum, bifidas fissis que hinc at que inde, in quibus gignitur ouum. Feminis enim huius generis, locus ovis deputatus, iuxta intestinum omnibus est. Et quam æm, id est, motem appellant amplius parciusue habent hæc omnia genera. Humida copulenta que ea pars est: tenditque per eam medium stomachus siue gula: eique pari proportionatur, quæ in sanguineo genere cor appellatur. Quæ crusta operiantur, etiam olfactum sensus habere constat: odore enim eicæque allectata, nonnumquam capiuntur: nullum crustarum uel uocem, uel sonum aliquem emittit naturaliter. Cocant crusta aperta, ut locustæ, astaci, & squillæ & huiusmodi reliqua, more quadrupedum retro mungentium, scilicet ut femina caudam superiā exponat: mas suam superponat & applicet. Coire solent incunte uere iuxta te tramiā enim coitus omnium id genus uisus est: interdum etiam cum sicus maturefcunt, coire incipiunt: cancri autem parte priore copulantur, sius illa opercula mutua confectione componentes: ambobus autem quædam mas in feminam inferat, nulli omnino habetur. Crustata ueluti locustæ cum per costum conceperint, oua gerunt fere tribus mensibus his, Maio, Iunio, & Iulio tum deinde sub alio in rugis oua deponunt, putamine dum uisculo intactas quo in loco more uenturum augentur: incrementum enim coram oua fortis recipiunt, sicut piscium. Fit igitur locustarum ouum arenidum in partes octo deductū: totiusque quali species uix consistit: sunt autem oua maxima, non quæ iuxta meatum, sed quæ media sita sunt: minima quæ nouissima continentur. Magnitudo minimis quæta grana sicca sunt: nec meatum ipsam ulla contingant, sed per medium hærent cartilagineis quibusdam appendicibus quæ per id tempus augentur, atque oorum capaces redduntur: partus enim in eis quasi in fardentis quibusdam recipitur. Locustæ ad hunc parium modum: mox ubi ea sui corporis parte intra diem vigesimum maxime oua concoxerint, abigunt uniuersa, in idemque glomerata eodem modo quo fors congesta apparent: tum ex iis locustæ proueniūt, intra diem maxime decimum quintam, & sæpe minores quàm ut digiti magnitudinem expleant, capiuntur. Excludant igitur oua ante arcturum: abigunt iam concocta atque absolunt ab arcturo.

Squillæ

De his plura
vident lib. 4.
hystor. animal.
lib. 1. & 2.
relin, & 3.
M. 1. 1. 1.

A Squilla gibba uterum menses circiter quatuor ferunt. Locustæ asperis saxosisque procreantur: astaci leuiores. Neutrum genus limosa amat. Litora potius uernis hybernisque temporibus expetunt: conferunt se in altum æstate: uidelicet eum aliàs calorè, aliàs frigus persequuntur. Natant omnia suis caudis, celeritè quæ & retrorsum, pinnarum caudæ adiunctarum beneficio. Conduunt hyberno tempore: & locustæ quidem & cancri crusta sua exuuntur per uer, quemadmodum angues membrana uernationis quam senectutem uocant: cum uero exuunt, mollis admodum crusta subnascentur. Crustacea omniuora sunt: quippe quæ & lapillos & limum, & algam deuorant, atque etiam sterqus (ut cancri strantes) & carnes etiam nimirum appetunt. Omnia eius generis hyeme hibernantur, autumno & uere pinguescunt, & plenilunio magis. Quæ crusta insecta sunt, tunc optima sunt cum grauida, ut in locustaceis & reliquis eiusmodi patet. Duram omnino carnem habent, ut testacea, & quæ concoctu difficilis sit, malumque nutrit, nec facile corrumpatur. Non parùm salis in se continent succi: ut testacea, minus tamen quàm illa, quin & caro eorum non aliter atque testaceorum in aqua si coquantur, succum illum salis exurit, alius inque si sit: assa tamè, ut Mnesitheo placuit, elixis meliora sunt.

1 Fragile, *aperte*, collisile, *fragile*. Pin. uero locustæ: crusta fragili manu dixit.

2 Fistula etiam, &c. Locus hic apud Aristotelem mihi quidem suspectus est: tum quoddam neque in libro De respiratione, ubi hæc a perna uel ad situm, nec usquam alibi (quod equidem meminerim) nullam crustæ asperitatem fistulam: tum etiam uerba interpretis hoc in loco nihil habet de fistula. Perpende lectos.

C De locusta. Cap. CCXXX.

1 Crusta interiorum genus unum locusta est, *ἀσπερά*. Græci dicunt: cui simile genus alterum est, quem astacum uocant. Differtis à locusta, che- *Locusta*
lanum uarietate, atque etiam quibusdam aliis discriminationibus, quanquàm non *ασπερά*
multis. Locusta omnis forcipem dextrum grandiorè ualentiorè inque ha-
bet: astaci uero non ceruum, sed alterutrum atque (ut fors ualerit) forcipè ha-
bet grandiorè, tam mare quàm femina. Pedes locustæ utroque ex la-
tere quini, utrimus illis adnumeratis, qui in forcipem erant denicula-
tum. & in his, quæ brachia chelæ dicantur longa sunt, pedes uero par-
ui. Corpus totum his longum est, & cauda quoque, & in cauda pinne
D quinæ adstant. Hæc natat, & in natando illi quasi remus innititur. Cornua
ante oculos bina, longa & aspera, quibus alia minora & leuora cornicula
3 subiacent: corpus denique totum aculeatū habet, & asperum. Differt magis
locusta à femina: quod femina primis pes bifidus est, nam simplex. Pin-
næ etiam quæ in his parte superiora geruntur, femina, maiores, & quæ collo
proxime sunt minores habent: ut utrumque omnes æque minores, nec usquam
per diminutionè dissimiles. Ad hæc mari in nouissimis cruribus uelut cal-
caria minutula prominēt acuta, quæ femina parua habet & leuora. Par-
tes illas quæ branchiarū species referunt, locustæ plures habent quàm alia.
Dentes in ore locustæ primores bini, magni & cani, in quibus & humor cō-
tinetur. Carapacula est inter dentes, linguæ representans effigiem, quæ &

DE DIFFERENTIIS

dentibus adnectitur: & gula ante ventrem exigua est: sed quam habent cō-
 spiciam, soli in crustatorum genere. Mox à ventre rectum intestini, quod
 rectū in eandem finit, quā excrementa emittunt, & ova pariunt. Locustis
 meatus quoque à pectore pēdens, ad extētiōis ostium pertinet, qui semini-
 nis pro uulua est: maribus pro genitālis seminis receptaculo sufficit. Mea-
 tus hic ad carnis partem eandem continetur, intestinum uero ad deorsum,
 ita ut media cāso interiaceat. Nulla maris meatum ac formā differentia
 distinguit: quippe cum uterque tenuis sit & albus: & humorem intra se
 continens pallentem: uterque etiam ex pectore pendet. Maribus sane prae
 feminis propterea in pectoris carne bina quidam candidantia constant dif-
 ferentia: ceteris partibus, colore seminaque, promiscuū sepiarum proxima:
 uerum haec tota in ueriginem sunt, more papaueris buccinarii: quorum
 origo est ab acerbulis, quae subdita partibus nouissimis ordinantur. Hic
 quoque caro est, sanguineo colore rubra & tactu lento, nec simili carni (est
 autem locustae caro copiosior quā in cancro). Ab hoc qui in pectore est
 anfractu, alter crassitudine linear lortus sese porrigit: sub quo duo quidam
 seminis genitālis cōceptacula, intestino annectantur. Haec in mare femi-
 na autem ouum rubidum parit, membrana obuolutorum praetexti, uētri &
 utriusque intestini lateri annexum, atque ad carnem usque adherens. Partes
 has habet interiores atque extēiores. Cocunt locustae, uti modo diximus,
 more quadrupedum retro mīgentium, scilicet ut femina caudam superi-
 nam exponat, mas suam superponat & applicet. Oua gerunt feminae tri-
 bus mensibus his, Maio, Iunio, Iulio: deinde sub aluo in rugas deponunt, **G**
 quas *stygia* uocāt. Crusta sua exuunt & locusta & affaci, aut uete aut au-
 tumno post partum, quicquid modum angues per uel membranā quam
 senectutem uocant: non tamen similis atque in anguibz exuto sit, iam e-
 nim captae sunt locustae mollem habentes superiorem thoracis partē, quod
 crusta iam circumrupta detractāq; esset: inferiore autem durā, quia nō-
 dum esset disrupta. Latent locustae menses circiter quinque. Proueniunt lo-
 custae asperis saxosisque locis, ut circa Sigeum & Arborea affaci: leuioribus
 neutrum genus limosa a mar locustis omnibus uita diuturnior data est. Pa-
 sciuntur locustae uenarū pisciculorum circa sua cubilia, quae in alio locis as-
 peris saxosis caernodisque faciūt. Pisces enim uel maiores euincere pos-
 sunt, ut murenas, ut congros: nam elabi non queunt propter crustae asperi-
 tatem. Contrā, locustae polypi superiores euadunt: & adeo, ut si uel eodem **H**
 in reti senserit locusta polypū, prae metu emoueat. Tardius super terram
 reptat locusta: nec diuque sua natura ante cum nihil mentit, demissis in la-
 tera cornibus: ut ubi metu it fugit recto, longēque sua cornua porrigit. Car-
 tetā in aquis natant, anquit Plinius: Locustae reptantium modo stant: &
 in panore oblique in latera procedunt: pedesque his dant natatus potius q̃
 gressus causa, ut Aristoteles prodidit. Dimicant inter se more anatum, cor-
 nibus: quae exto lentes uibrantesque ferunt aduersarium: unum hoc ani-
 malium nisi unum seruēti aqua incoquantur, fluida carne non habet cal-
 lum. Inter marina sunt elephanti locustarum generis nigri, pedibus qua-

*Formis, ubi
 uentis ad est,
 atque subli-
 na.*

*Ubi ubi
 de alio, ad
 est, ad carum
 asperis illa pro-
 trahit.*

*Ubi ubi
 Plinius locustae
 est, sic, longi-
 in uolantur.
 Plinius locustae
 est, ubi.*

Elephant.

quarta

A terribis, bifidulis. Præterea brachia duo, binis articulis, lingulisque forticulis denticularis.

1 Carabus, Aſtacus dictus eſt ab Archeſtrato, & à Diophilo *καράβος*. 1 In can- *καράβος*.
da pinna, &c. Caraba, inquit Plinius, à cæcis canceris cauda diſtin- 3 Corpus de-
mus totum aculeatum, &c. Hinc crudele Tiberij Caſſius facinus apud Sæcronicum,
qui locuſta os piſcatorum eundem lacerat iuſſit. 4. Maiores emicere poſſunt, &c. Lo-
caſte diminutionem eam mutena deponit Oppianus, lib. 2. De piſcibus.

De aſtaco ſive cammaro.

Cap. C C X X X I.

- 1 **A**ſtacus locuſte ſimilis eſt, uti modo diximus: diſſert autem à loco- *Aſtacus*
ſtatum alius quibuſdam diſcriminationibus, quanquam non multis, cum
chelarum brachionumve forma. aſtaci enim non certum, ut locuſte, ſed al-
B terutrum æque, (ut ſors tulerit) forcipem habent grandiorē, tam mares
quàm feminæ. Pectus hiſ corporiſque totum lenge eſt, nõ more locuſtarum
a aculeatum & aſperum: in pedibus tamen illis magnis, partes exteriores a-
culeos habent maiores. Color, quod ex toto dixerim, nitet, nigriſque macu-
lis diſperſis, euanat. Pedes inferiores ad grandes uſque diſpoſiti octo, quo-
rum pars ſciſſa in extremo bifurcata, pars deſine indiuſa. quatuor enim
bifurces ſunt, reliqui quatuor ſimplices ex toto pertendunt. Tum grandes
ipſi, longe maiores, extremæque parte latiores quàm locuſte habentur: ſed
nec hi eade in ſpecie: dexter enim extremum ſuum latum, oblongum & te-
nue habet, ſiniſter craſſum & rotundum: interque tamen ſciſſus in extremo,
perinde ut maxilla tam infra quàm ſuprà dentatus eſt: uerum dexter puſi-
C los ſerratoſque dentes continet omnesque primos, & qui extimi ſunt, ſer-
ratos: iminos uelut maxillares, parte ſcilicet inferiore quatuor & conti-
nuos, ſuperiore autem tres non continuos: uterque tamen partem mouet
ſuperiorem, ad inferiorēque deprimit adſtringitque. Bleſus item uterq;
ſinu inferiore, tanquam nau ad capiendū premōdūque. Suprà uero gran-
des illos habentur alij duo hirtiſculi, paulo ab ore inferiores, quos etiam
in os adducit. Mox ueluti branchiæ os circumdant frequentes & hirtiſte,
quas aſſidue mouet: ſurculi etiam appendicēſue graciles geruntur à pedi-
bus, qui ori proximi habentur. De his huc quoque duo, ut locuſte: ſuprà
quos cornua, breuiora tenuioraque quàm locuſte. Quatuor ite in alia ad-
ſunt cornua, ſpecie quidem duobus illis ſimilia, ſed tenuiora & breuiora.
D Suprà hæc oculi conſtituti ſunt, parui craſſiſculi, non ut locuſte maſcu-
la. Suprà oculos erat deinde quaſi frons quidam acuta & aſpera, maior
quàm locuſte. Denique facies acutior & thorax latior multo quàm locu-
3 ſte: totūque corpus mollius & carnoſius. Quod autem collum appellat;
(Græci *καρδιον*) quinque partium foris eſt, & ſextum latius illud ſumam lo-
co nouiſſimo habetur, tabellis cōtinuatum quinque. Interiora uero in que
feminæ ſoras pariunt, ouaque deponunt, hirtiſcula quædam quatuor cō-
tinent. In ſingulis autem eorum quæ ſoris eſſe diximus, ſpūte ſingula bre-
ues rectæque eminent. Feminam hoc in genere nullum diſcrimen à mari
diſtinguit: nam & mari & feminæ forceps alteruter grandior more incer-
to eſt: parem uero utrunque, neuter habere uſus eſt. Exuunt ſene *Chytem* &

DE DIFFERENTIIS

affaci, aut uere aut autam no, & leuioribus locis proueniunt, ut apud Hel-
leſpontum & circa Thafum, ſicuti locuſte aſperis faxoſiſque: neutrum ge-
nus limoſa amat. Gignuntur & in fluminibus affaci quidam puſilla.

*Aſſacus, ſuaſis
ſila.*

Gamma.

Cancer.

1. Aſſacus, &c. *Lexicon* gamma-
rum latine dici genera quidam magiſtri, id eſt, ſquillarum ſcribit. Columella quoque
& Plinius ſere canmarum uocant, non gamma-
rum. 2. *ασαφής* & *γάρμα*, con-
color in noſtra canmare laeet rubet, inquit Martialis. 3. *τρίγλα*, id eſt, collum,
(ut uidetur) eam partem ſignificat, quam caudam ſuper in locuſtis uocant. Ariſto-
teles, niſi forte locus hoc ſit mendoſus. 4. His ſimiles eſſe tradit Ariſtoteles, beſſioles
quaſdam, qui in coſchleis quibuſdam reperiuntur, ſed quae per mollem habent carā.

De cancrorum generibus.

Cap. C C X X I I I

*Cancer,
Κράβη.*

C Ancris inter cruſtacea ſolis corpus rotundum eſt, & cauda deſt: cum
locuſtus ſquilliſque oblongum corpus ſit. Pedes his omnes cum ſorci-
pibus dens. Omnibus uero magna ex parte grandior ac ualidior ſorceps
dexter quā leuius eſt: & ſuperiorem ſorcepis partem mouent, non inte-
riorem. Crura uis breuiora, quia parum mouentur. Aluius rocius corporis in-
diſcretus eſt: nec etiam caput diſtinctum, nec aliud quicquam. Oculi uero
omnibus, ſed aliis è latere ſupra, continuo ſub pronio, amplo diſtantes diſ-
criminati ſunt in medio, breui diſcrimine, ut heracleoticis & maiis. Os oca-
lis ſubditum, in quo dentes duo ut locuſtus: uerum non rotundi, ſed longi:
& tegmina hos operiunt duo. Inter haec talia interiacent quiddā, qualia lo-
cuſtarum de dentibus adnotā diximus. Humorem quem ore accipit, tegmi-
nibus illis depellit. E mitit uero meatibus quibuſdam ſuperioribus, qui ſta-
tim ſub oculis poſiti ſunt. Quoties ergo aquā acceperit, utroque tegmen-
to os obturat, ut quae ita reſpuat humorem. Gula poſt dentes breuiſ
admo-
dum eſt, ita ut protinus uenter os accipere uideatur. uenter biſculus gula
ſubiungitur: culus ex medio, inteſtinum ſimplex & tenue procedit, quod
ſub operculo illo exteriore applicato deſinit, quod cauda loco habetur: in
quod & forminae oua parant. Humor intus in aluo palidus, & minutus
quaedam oblonga aſſida continetur: ruſa etiam alia, maculis diſperſis. Diſ-
fert à formina mas, magnitudine, craſſitudine, & applicatili illo operculo:
id enim amplius in formina eſt & diſtanti-
us: & interiora habet hirtiora am-
pliorſque, in quae & oua pariat: aliā cauda haec in cancris miniſtri eſt uſus:
quandoquidem prope terram uitam agere cauernāſque ſubire ſolent, nec
plurimum natare. Et qui ex illis pelagij ſunt, illi pedes habent longe cardiores
ad ambulandū: ſunt etiam ceteris ipſi natiuiores, ut maii, & qui heracleo-
tici appellantur. Forminae quoque primus pes, inquit Plinius, duplex eſt,
maſ ſimplex. Ex omnibus animalibus cancrorum genus unū, non in prio-
rem mouetur partem, ſed in latera. Et cum cetera animalia duobus uis
pedibus incedunt, cancer unus quaternis regi ſolitus eſt. Cum cetera cruſta-
cea aucta coeant, cancri parte priore copulantur, ſua opercula loculoſa il-
la rugoſique munda conſertione componentes. Latent cancri quāuis men-
ſibus, & cruſta ſua ueris principio exiunt, quae admodum locuſte: mol-
liores quidem perſpicue, & denam duriores exire auiunt, ut maias: & tunc
quidem

*Longi, alia
parui, paucol.*

*Vetus interpre-
tis non ſunt op-
ercula ſicut
maſ opercu-
la.*

A quidē p̄t̄ tēneritate non satis ambulare possunt. Ostrea venatur cancer,
 1 iniectioneque interestas lapillo, exedit. Cancroꝝ genus multiplex, nec fa-
 cile enumerandum maximum quas manus appellat. Durior his crusta est, *Asie, p̄m̄*
 & crusta exiliora oculisque paruo distant intervallo, sicuti in heracleonicis.
 Secundum magnitudinis locum paguri occupant. Qui heracleonici vocē- *Paguri*
 tur, crusta quoque firmiore muniantur ut manus: & oculos habent paruo
 distantes intervallo, sed crusta illis breviora sunt quam manus. Aliud genus
 2 est fluviatilium cancroꝝ: ceteri minutiores, & nullis pene nominibus *Cancer fluvia-*
 3 notari. Genus cancroꝝum in litoribus Phœnice fert, tantæ velocitatis ut *tilis.*
 uix conat qui sitande ierit, id est, equites illos appellarent ut nihil fere in- *Equites*
 tus propter inopiam pabula. Genus item aliud est, quod magnitudine can- *Equites*
Erum non excedat, facie asacis simile. Edulium graue cancer est, & egre *Cancer.*
 concoquitur: contra serpentium ictus medetur. Cancri fluuatiles triti cru- *Cancri fluvia-*
 di potiusque ex asinino lacte remedio sunt contra serpentium phalangiorum- *tilis.*
 que morsus & scorpionum ictus. Elisi & cū suo iure in cibo sumpti phibi-
 scis tabidū que proliunt, & iis qui leporem maximum hauserint. Nihil æque
 aduersari serpentibus autē q̄ cæcros suisque percussas, hoc pabulo mederi.
 Rupta cōuulsa cœci fluuatiles triti in asinino lacte maxime sanā: tui ue-
 ro cū oeymo atq; admori, scorpiones necat. In cataplasmatibus modū imposi-
 ti aculeos infixos extrahant. Cancroꝝ fluuatiliū succus cū fatina oideacea
 aurū vulneribus efficacissime prodest. Exulsoꝝ cancroꝝ fluuatiliū cinis
Con aliter atque echinorum cochlearūque exsiccandi facillime pollet.
 Subsistunt autem proprietate, mirū quā canis tabidi morsibus prodest,
 & solus, & multo magis cum gentiana, & thure, ut sit thuris pars una, gen-
 tianæ quinque, cinis cancroꝝum decem. Bibendum hoc medicamentum
 dant, alij quotidie diebus quadraginta, cochlearij magni mensura, aut (si
 non statim detur, sed aliquot post dies quā vulnus acceperant) duorum
 cochleariorum aquæ admixtū. Alij cineris duo cochlearia, uno radice gen-
 tianæ adiecto, et iduo cum uino exhibent. Cinis hac cum decocto melle, pe-
 dum sedisque rimas, pertiones & carcinomata mitigat. Aduersus canis
 morsum minime ualete matinos cæcros alij prodidereat Dioscorides ma-
 rinos eadem omnia posse, uenam minus efficaces esse predicit: utuntur &
 cancroꝝum cinere ad dēniū dolores: & ad lepras cum oleo Andreas usus
Dillo est. Quem cancellum & *capinus* appellari, principio ex terra limoꝝque *Cancellus.*
 confictum, mox conchulas ingreditur uacuas: ubi cum excreuerit, transit in *Equatilis*
 concham ampliorem, uidelicet aut nerites, aut turbanas, aut alicuius simi-
 lis sepe etiam patam buccinam subit: ingressūque amphorem illam, ge-
 nit pari modo, & uiuit in domicilio capaciore: urfusque excrefcens, thum
 petit amphorem. Specie similis locustaceus est, nascique seorsum per se so-
 litus uerum quod testam deinde petit, utramque in ea traducit, hunc simi-
 lis testā contēdis anā alibus est: quapropter is in anicipiti esse, genūq; sibi
 uendicare utrunque uidetur: forma tamen, quod simplicius descriam, simi-
 les araneis est, nisi quod partem capiti & pectori subditam, amphorē quā
 aranei habet. Cornicula duo rufa tenuia gerit, quibus oculi eodem subia-

DE DIFFERENTIIS

cœqui nunquam intro recedant, ut cancrorum, neque claudantur, sed semper eminentes appareant. Os sub his est, quod uelut capillamentis quibusdam pluribus circumdatur. His pedes subacti duo bifurci, quibus etiam ori admoventi bini item utrique adherent lateri, & tertius parvus. Quod sub thorace est, molle rostrum est quod dissecto pallidum intus cernitur. Meatus unus ab ore ad ventrem pergit: foramen extremi perspicui nullum potest. Pedes ac thorax duritiem præ se ferunt, sed minus quam cancri nerui nullo adheret restæ purpurarum modo & buccinarum, sed absolutus liberque uagatur. Pinnothara hunc uocat Plinius, Pinnother, inquit, uocatur minimus ex omni cancrorum genere, ideo opportunus iniuriæ. Hunc solentia est inaniam ostrearum restis se condere: & cum accreuerit, migrare in capaciores. Genus cœlli diuersum est, quod in nerite degit, ab eo quod in rubineo oblongior enim est qui in rubineo uiuit: qui uero in nerite, ex tera quidem illi non absumilis: sed dextram bifurcaram pedem, paruum habet, & leuam grandiusculam, & ingredi eodem ipso grandiore porissimum solet. Hic nunquam in rubine hospitatur, sed in neritis tantum. Sane inter cochleas quæ in rase bestioles habent similes affacis pusillas, qui uel in flumine gignuntur: sed ea differentia, ut præ mollem intra solum testam carunculam habeant. Cancelli, qui perquam exigui inter pisciculos reperiuntur, pedes nouissimos latiusculos habet, ut ad nandum ualens sint, quasi pro pinnullis aut remis pedes haberentur. Inter spongiarum cubilia bestiola gignitur a canci similis, quæ pinnothylæ dicitur, & squilla parua. hæc concham ingressa, apertendo claudendoque pisciculos capin aperit autem antequam ingrediantur, claudit & coarctat: cum ingressi sunt. Nascuntur & in nonnullis testa operi generis cancelli, colore albedo, corpore admodum parui: & plurimi quidem in mineralis, qui in alto gurgite degunt: mox in pennis, quos pinnotheras uocant: quinetiam in peccinulis atque ostris: uerum nullum conspicuum capiunt incrementum. Piscatores cancris eius modi nasci confirmant: unâ cum illis quorum restam inhabitant, & ex eodem quasi semine gigni. Er in pinna quidem carni eius ita adnascitur, ut ueluti carneam quandam radicem in eam demittere uideatur.

1. Ostrea uenans. Cancræ alaria in ostris excedendis describitur ab Opptano.

2. Flumanius cancrorum. Viuit cancri, loquitur Galenus, in utroque humore, marino scilicet & dulci. 3. Iuua, &c. Hippoc uocatur, inquit Plinius. Curiares cæcri, uti alij referunt, quod longe lateque uagantur, modo circum fissas errant, modo longius proficiscuntur. 4. Eundem hanc pinnothylacem Anistoreles, uitaque quoque uel anistoreles uocant, & uagatur. Theodorus pro utroque squillam parua reddidit, Plinium secutus. Hæc apertius infra explicatur in pinna.

De squillarum generibus, & cammaro, leone & arcto.

Cap. CCCXXXIII.

Squilla, uagris
Squillas (quas *uagris* Græci uocant) à cæteris genere differre modo diximus, eo quod corpus huius longum sit, & caudam habeant: à locustario uero, quod forcipe careant, & plures habeant pedes. Quæ tamē ex mari ueniunt,

DE DIFFERENTIIS

De cultuur is

Can CCXXXIII B

[illegible]

T^{estata} ea sunt quibus pars carnea intus est, nuda durum intra se habet, solida forte, testis aut lapidi similis, quale genus concharum & ostrea- rum est. Huius generis aut nullum in terra gignitur, aut omnino pauca, ut limacum genus, & si quod eiusmodi aliud sit, sed rarum et in mari similis, humore multa & uaria gignuntur. Haec inter se numerosa discrepant diffe- rentia tum testis, tum carnis rationalis enim in hoc genere nulla est caro, ut echinistalis est, sed quae penitus inclusa nec ulla ex parte conspecta est, excepto capite, ut limacibus, purpuris, buccinis, & reliquis turbinatis. Sunt uero turbinati generis, quod *capitula* dicuntur, alia quidem in anfractum inuoluta, ut buccinacea in globum tantum circumacta, ut echinorum gene- ratim: quoque testam habet totundam. Ceterorum quaedam duplici co- stant ualua, quaedam simpliciter genus alterum *Alia* aut bivalue alteru- F uniualue uel *uniuolue* possit nuncupari. Bivalue appello, quod gemina testa clauditur uniualue quod testa singulari continetur: cuius altera pars de testa carnem obedit, ut lepas. Bivaluis generis pars clausilis est & reteratilis, ut pe- ctunculi & manilueusmodi namque omnia, parte altera ligata, altera soluta constant, ut & concludi possint & aperiri. Alia binis quidem conclusa ual- uulis sunt, uerum utroque latere connata, ut unguis siue digitus. Sunt & quae testa tota occultentur, ita ut nulla ex parte carnem delecti habeant, ut quae testis siue uentribus appellamus. Ipsarum etiam testarum magna uarietas nam alia leues habent testas, ut unguis, mitili & concharum quaedam, quas alij galadas appellant alia scabtes, ut ostreae pinnae, & conchar nonnullae & buccina. Atque horum quaedam etiam pectinatum diuisas striatasque: ut pe- G ctunculi & conchar quaedam: alia non ita striatae, ut pinnae, & concharum nonnullae. Crassitudine quoque differunt & tenuitate tam totius, tum par- tis, uelut labrorum: alii enim labia tenuia, ut manilueusmodi crassa, ut ostreis. Item alia modo quodam se mouent, ut omne quidem turbinatorum genus mouetur & seipit & pectines, quos & uolare nonnulli aiunt: alia ita natu- ra inamabili sunt, ut nunquam sedem in qua haerent sponte ipsa mutare ua- leant, ut pinnae. Et quae ex testaceis loco moueantur, eo tantummodo moue- tur quo pedestris aliqua pedibus mutilata moueri docuimus, & parum admo- dum progrediuntur: uelut stabidia & haerentia mobilia sunt tunc progre- dien- na uero, stare uidentur atque adherere: sunt enim animalia uelut ma- H ca deprauique. Commune testaceis generis omnibus est, ut testa intus e- qualis laeuisque sit. Et caro bivaluis & uniualue generis ita testae adharet, ut nisi per uiam nequeat detrahi: turbinati laxior continentur & abfoluuntur. Cui generi peculiare est, ut testae ea pars quae a capite remotissima habetur in anfractum clauiculamque torqueatur. Moueantur eadem omnia parte dextra, non ad clauiculam, sed in aduersum. Operculum etiam eadem iam inde ab ortu naturae omnia sese gerunt. Est autem hoc crusta quaedam pre- tensa, qua tanquam operculo quodam congenito, carnis pariter apposito, sese quasi concludendo timent, ne facile offendantur ab us quae extrinsecus incidant. Testatorum corpus quibus paucissimis constat ex partibus: sunt enim

Fischer,
 & Joseph
 Fennel.
 1801. 30 pp.

100

Abstract

- A** enim omnia aut immobilia, aut parum omnino motus adepta, ut modo diximusque autē mobilia sunt, hæc plures habeant partes, necesse est: partes exteriores huius animalium generis differentia is uariatur. Interiorū natura similis quodammodo in omnibus est, maximèque turbinatoris. Differunt enim inter se magnitudine, & quæ excessu constant affectibus: nec uero multum dissident uniusalve & bivalve genus: quāquam longe ab immobilibus differant, quod latius postea patebit. Natura ergo turbinatorū *Turbinator.* fere similis constat, nec nisi magnitudine uariat, ut modo diximus: enim partes maiores atque euidentiores, aliis minores obliuioresque sunt. Quo enim maiora sunt quæcumque testatorum genera, eò partium conspectum
- B** præbent euidentiorē. Ad hæc discernit illud duritiæ, mollicitæ, ceterarūque generis eiusdem affectionum. Turbinatorum omnium caro penitus testæ inclusa est, nec ulla fere ex parte conspecta, excepto capite. Hanc primo extimèque in ore testæ, maxima quidem ex parte, omnia torosifculum habent, alia magis, alia minus. Caput eius ex medio partis prominulum extat & cornicula duo, quæ pro magnitudine animalis plus minus capiunt incrementi: in maioribus enim magna, in minutis uero animalibus admodum parua conspiciuntur. Exerunt caput more omnia eodem, idemque per metum retrahunt inero. Est illis & os: nonnullis etiam dentes, ut cochleis, breues, acuti, duri & tenues. Promiscidas item gerunt modo muscarum: quod quidem mēbrum partim linguæ effigiem præ se fert, & partim aculei. Venter os protinus excipit, similis autem ingluuiæ, habentque infra ventrem duo quædam albeda firma, & torosa, mammae simili
- C** lia, cuiusmodi uel in sepiis esse aduenimus, sed hæc torosiora sunt. Meatus à ventre duplicatus longas portigit se usque ad id, quod papauer appellatur, quod *papauer.* *Miscip.* *Græci* uocant, quod fundo commissum est. Hæc ergo in purpura & buccinis & *argenteis*, id est, umbilicis sunt conspiciua, & in clauicula testæ continentur, sicut & in reliquis turbينات omnibus. Est autem *papauer*, id est papauer, quasi extremitatum quoddam membrana contentū magna sui parte in omnibus testaceis generibus, quod uel osculum esse præcipue sentitur, quāquam in quibusdam echinis cibo maxime idoneum est. Meantem illam excipit intestinum illi concinnum simplèrque ex toto usque ad extremam: estque eius initium circa anfractum papaueris, quo etiam latius
- D** est: hanc sursum uersus replicans, carnosam illam partem repetit, sinitque ad caput, unde dicitur extremitatum ex meatu quodam ori uicino, quod in omnibus perspicitur turbينات tam aquaticis quàm terrestribus. Mēbrana in grandi uiculis umbilicis sub ventre, gula illi siue in eam attextitur continua, per quem meatus prolixior albicans, colore similis superioribus illis mammillaribus carunculis tendit. habet etiam incisuras, quales in ouo locastarum habentur: uerum hoc albidum, illud rubedum est: nullus exinus huic, nec foramen ullum patet, sed prætenus membrana cōtinetur, causam quoddam angustum in se habens. Tendunt ab intestino ad imum nigrescentia quædam alpera atque cōtinua, qualia uel in testudine uisuntur, sed minus nigra. Ceteræ quoque cochleæ umbilicæ hæc habent eadem: sed quo

DE DIFFERENTIIS

minores, & minutiora: & in iis ipsiſ alia explatius, alia obſcurius, ut di-
 ctum eſt. Uniusalve autem & bivaſ hoc genus, partim in ſimile eſt, partim di-
 verſum. caput enim & cornicula & os obtinent, atque etiam quod lingue
 ſpeciem gerant, verum hæc in mutationibus ſolum per ſua exiguitate efflu-
 giunt: nonnulla etiã in examinatis, aut non moventibus percipi nequeunt.
 Papaver illud omnia habet, ſed non loco eodem, nec partem ex quo ma-
 niſteſtum: ſed uniusalvia ſuo fundo, ut patelle bivaſum quã mutuo teſtarum
 complexu nodosè ligantur. Quibusdam etiam quali capillamentis, in ex-
 tremis oris, hæc omnia circundantur. Quod autem ovum vocatur tem-
 pore quo gigni ſolet, altero tantum latere, dextro ſcilicet, bivaſia habent:
 altero latere oſtium excrementi cõnſent. Sed errore ovum hoc vocatur, quippe
 quod nihil ad generationem conferat, ſed tale ſit quale eſt pingue
 in ſanguineo genere cum niget, & quod bona animalis nutritione alimen-
 tumque proveniat: quamobrem ſapore per id tempus præſtant, cibòque lau-
 dantur, ſcilicet vere & autumno. Laborant enim teſtata omnia per frigoris
 & æſtum, atque exſperantiam temporis ferre nequeunt. Eſt autem ovum
 hoc in teſtatis, quibus datum id à natura eſt, eam ipſi intumefcẽs, nullum
 habens ad eius exitum foramen, ſicut albidum illud in umbilicis: id enim
 illis ſimile intelligimus. Sed huiusmodi partes (ut dixi) cum conſpiciantur in
 magnis habeantur, in parvis tamen aut nullo pacto aut vix ſerviuntur.
 Quamobrem in magnis poſtunculus præcipue patet. Oſtium excrementi
 ceteris quidem à latere eſt: at vero patella ſexta parte una teſte excrevitur,
 quã foramen in teſta habetur. Et uniusalvia quidẽ atque bivaſia ita ſe ha-
 bere cõnſentunt. In univverſam autẽ, nullum ex teſtaceis eſt, quod capite ca-
 reat: ceteræ corporis partes nomine utantur, præter linguam, quæ omnibus
 etiam ineſt. Caput omnia teſtata inſtrã habent plantarum modo: ut quæ ci-
 bum de imo capiunt, ut plantæ radicibus ſuis hauriunt. In teſtatis omnibus
 id etiam eſt quod cordi proportionetur, eodem modo quo & in cruſtatis
 & mollibus, quod mutis vocatur, ſed minus patet: atramen in medio que-
 rendum hoc eſt, aut ſcilicet inter partes quæ cibum recipiunt, & quæ excre-
 mentum emittunt, ſi fixa degunt aut inter dexteram partem & ſiniſtram,
 ſi inoſſilia ſunt. Quæ ſiliceo tegmine operiuntur omnia, quibus ſaltem in-
 gradiendi facultas eſt, oſtiumque guſtũque habere conſtat argumento e-
 ſcarum: accedunt enim ad eſcam à longe, utpote odorantes. Senſus item ſa-
 potuenſis ineſſe hac eadem ratione patet. ſapore enim rerum earundem
 quæque delectantur, ad quas veniunt odoribus invitata. De viſu & auditu,
 quanquam nihil certi manifeſtũque habemus, inquit Ariſtoteles: ungues ta-
 men ad ſtrepiũ ſe ſubtrahere, inferiũque ſubſidere cernuntur, quoties ſer-
 ram in tum ſentiant admoventi: poſtẽnes quoque admoto digito deſciſcunt,
 mox comprimunt ſe ut cernentes. Neritas item qui capiunt, non ad herſo-
 ſitatem, ſed ſecundo ad eunt, quoties eſca perſequuntur: nec voce ulla, ſed ſilẽ-
 tio agunt, utpote cum & oſſaciant & audientie fieri poſſe vident, quin ſub-
 terſogant, ſi vox proferatur. Hæc Ariſtoteles. In marinis oſtreis, inquit Pli-
 nius, auditum eſſe non eſt verifiſimile. ſed ad ſonum mergere ſolent: adeo &
 ſilentium

*Uniusalvia
Bivaſia*

Ovum

*Conſiſ propo-
tionale*

A silentium in mari piscantibus. Vniuersum autem testaceorum genus, plantæ simile respectu gradentium animalium est. Sexus discrimen in usque testa integuntur nullum omnino perspicuum est. Ex plurima quidem non coire apertum est: sed an illa coeant & per coitum generent, incertum est: sed quemadmodum in genere stirpium, alie fructum ferunt, alie sterilem formantur naturam ita etiam in his quod quidē pariat & generet, est quod autem maris fungatur officio, deest. Vnum saltem ex his genus cochlearii coire perspectum est: sed an ortus earum per coitum sit verne, nodam exploratum satis habetur. Est sane totum hoc animalium genus modo quodam inter animalia & plantas ambiguum, & velut in ambobus constitutum.

B generibus munere neutrius fungitur. Nam ut planta, sexus maris & feminæ caret, nec in altero generat: & ut animal, nullum ex se fructū affert modo plantæ, sed consistunt & generantur ex terrena & humida quadam concretionē. E limo namque & materia putrescente, sponte naturæ oriuntur prope dixerim omnia diuersa tamen pro limi differentia: nam in cœnoſo, ostreis origo consistit, conchæ, chamæ: ungues & pectines locis arenosis *In cœnoſo, in* *est Argentea* *Ar.* sunt ortus initia capiunt. Ramis cauernisque laxorum tethya generantur & glandes, & quæ per stamina adherent, ut patellæ & nantes. locis enim natiscentur hæc uariis, ut alia uadis, alia gurgite, alia duris locis atque asperis, alia arenosis. Omnia uero id genus celerī incremento augentur. Quæ ex his fauificare solent (qualia sunt, inquit Plinius, quæ durioris testæ sunt, ut murices, purpuræ) non alio modo quàm cætera testis inclusa generantur: utrum melius atque uberius quodvis præstiterit aliqua quæ eisdem sunt generis. Conduunt enim aliqua, ut purpuræ uermis tempore eundem in locum sese colligentes, quàm *porrogo* aut fauiginem uocant, quæ uelut fa- *mutuæque* *Fauiga.* uis est apum: uerum non ita elegans, sed quali è putaminibus cicorum alborum multa inter se composita, struem unam sua cohesione coagmentarint. Nullum illis patet foramen, ne quæ ex his purpuræ ceteræ uel testacea enascuntur: sed coagmentatio illa fauo similis tanquam purgamentum illis est. emittunt enim, cum suos ordiantur fauos, mucorem quēdam (saluærum lentorem uocat Plinius) ex quo putamina illa coagmentata consistunt. Hæc ergo rupta dissilisque omnia, humorem quem cōtinebant, in terram demittunt: mox eo quo effuderint, loco gignuntur animalcula testacea, ut

D purpurulæ, æ ordio admodum exiguo. Buccina quoque & mituli fauificare solent. Itaque ne hæc quidem quæ inter testacea fauos saluant, alio modo quàm cætera generantur: sed sponte naturæ omnia è limo materiæque putrescentiæ. Quod ad generationem pertinet, res ita habet. Alantur autē quæ ex his immanita manent humore dulci & potulento, qui per spissa trāsmittitur. Quæ autem mobilia eadēque carne uescētia sunt, his uictus ex pisciculis est, ut purpuræ: alia uero illis quæ in mari pullulant, uescuntur. Latent testacea omnia, ut in mari purpuræ, buccinum, omnēque id genus, uerum non eodem modo, sed absolutorum latibulum euidentius eis: conduntur enim seccissima aliqua uero leuiore quodam tegmine superimposito delitescunt, ut limaces. At eorum quæ adherent, non est tam manifesta lanta-

tio. Quæ uero latent, non eodem tempore omnia latent, sed limaces hyeme, purpura & buccinae carus exorta diebus circiter triginta cœduntur. Pectines etiam tempore eodem: sed eorum pleruma sane latent, & algore urgente & aestu. Testaceo generi anni pluuji produnt, præterquam purporis cæteris, quales incommodus est, nam & minima redduntur & deteriora. Conducunt autem sis imbetes, propterea quod mare dulcius redduntur: sed frigas facit profecto, ne uel in Pôco uel in fluuijs gigni possint, exceptis bifloribus paucis. Genus namque uniusaloe potissimum rigore induitur & interit. Iam uero & lunati potestate ostentatum conchiliorumque & concharum omnium corpora augeri & rursus minui constat. In mari rubro testata omnia mira quædam magnitudine augentur. Quæ testa intacta sunt omnia, ut pectines, tunc optima sunt cum grauida: sed quinquam testa intacta grauida dicimus, tamen nullum corum, uel coctam uel partim uidemus. uetno tamen tempore & autumnos, ne dictum est, habere uermes ea quæ oua appellant, exceptis echinis qui cibo idonei sunt. Caro non æque omnium esculenta est: & excrementum quod papauer uocatur, quibusdam cibo idoneum, quibusdam non idoneum est. Modice collui debent omnia testacea in cibo, quia saporis gratia perit. Testaceis omnibus commune hoc est, ut salsum quendam in sua carne succum habeant, quo aluum citare nata sunt: id quod unicuique magis minusue datum est. Quæ enim dura carne cœstant, minus hoc habent quam ostrea, quæ sine omni molliissima habent carnem: parum uero chamae, siphondili, solenes, purpureæ buccinaeque & alia id genus, duram. Itaque ostrea minus quidem nutriunt, & aluum facilius mouent: quæ autem duriora sunt, uermes alunt, & difficilius concoquantur. Purpureæ buccinaeque duriores sunt carne, succumque efficiunt crassiores: sed caro in aliis, præsertim in ostreis humidior tenaciorque est. Præterea quæ duram habent carnem, ut concoctu difficilia, ita corruptioni minus obnoxia sunt. Quæ quidem ratione sæpius ea exhibere solemus his, quibus ex malorum succorum copia cibus in uentre corrumpitur: siue eò ex iccinore adfluant, seu in ipsius uentriculi tunicis contineatur. Dantur autem, inquit Galenus, his quibus cibus in uentre corrumpitur, in optima aqua bis tertio decocta, ita ut cū salia prior iam sentiantur, in altum quæ pura sit transferantur: ex his quæ duram carnem habent, succus procreatur quem crudum uocis, sicuti quæ mollem picuitosus. Quemadmodum uero ea quæ succum illam salis emittunt, carnem habent corripioni repugnantem, & quæ aluum sistat, ita si cum sale & garo condita fuerint, eorum ebiberis uiscula, uenter quidem abunde mouebitur, corpus uero nihil forte sentiet alimenti. ac caro ipsa solidior, & difficilior concoquitur, & crudum crassumque ac frigidum gignit si occurrat maximæque ex parte lentum ac picuitosum: quamobrem senibus maxime incommoda est ostrearum, & testaceorum omnium caro. Mnesichos: Atheniensis de testatis hæc prodidit, Ostrea, chamae & mituli ceteraque id genus, carnem habent, quæ ob salsum quædam in se continent succum, æque concoquantur: & si cruda edantur, alui cient. Quod si concoquantur, id in quouis humore, magnam.

Agnam falluginis partem in eo relinquunt: quo sicut eorum iuscula alium turbent: cito uero ipsa, salsi illius succi iam expers, minime uentrē perturbet. Quod si probe assentur conche, maxime tum salte euadēt, ut quæ suorum iam habeant ab igne ueluti succosum, & prope dixerim absumpsum. Ad alium utināque ciendam ceteris præstant: nuntii, ostreae, peccunculi & chamae, ut author est Diocles Carissus.

1 Sed et rose eorum hic uocatur, &c. Xenocrates humorem album uocat & la- *Lalessu ha-*
 2 rum Plinius enī lacus de ostreis, quod circa uentis effluit: sunt multo lassi pragdi- *mar.*
 3 na. 4 Eruntque enim, &c. Et nuper, inquit Plinius, cōpertum in ostreatus humo- *Loc.*
 5 rem us sensicam lassis modo effluere.

B De turbinatis. Cap. CCXXXV.

Sunt testacci generis, ut nuper diximus, alia turbinata, alia bivaluia, alia univaluia. Turbinato generi hoc fere peculiare est, ut testæ ea pars quæ à capite remotissima habetur in anfractum torquatur. Mouentur eadem omnia parte destra, nō ad clauiculam, sed in aduersum. Operculum etiam eadem iam inde ab ortu naturæ omnia fere gerunt: naturaque omniū, maxima quidem ex parte, in eorum partibus sinistis constat: nec nisi magnitudine uariat, ut modo diximus. Turbinati generis alia in anfractū incocta, ut cochlearum genera alia in globum circumacta, ut echinorum genera.

Turbinata.
 1 *Quadrata.*
 2 *15* *16* *17* *18* *19*

De cochleis. Cap. CCXXXVI.

Turbinati generis cochlea est, & in anfractum intorta cochlearum omnium caro testis penitus inclusa continetur, nec ulla ex parte conspici-
Cua est, excepto capite. Quod si testam detraxeris habere sciet cochlea atque expirat. Exerunt se domicilio, bināque ceu cornua pertendūt contrahunt: quæ oculis carent, adeo conicalis præterit iter. Caput in his modo quodam equinum specie per se fert. Os habent & dentes acutos, duros, breues: indicio est à minimis earum detrosas uires. Ex testatis, unum cochlearū genus coire perspectum est: sed an ortus earum per cornum sit necne, nōdum satis exploratum habemus. cochleæ pariter omnes, autumno & uere sua oua habere uidentur. Varia sunt cochlearum genera: sunt oblongæ quibus

Cochlee.
 1 *Explan.*
 2 *17* *18* *19*

2 tubæ loco utuntur: tibiacines (echinophoros uocāt aliqui, aut echinophoros)

Sunt & rotundæ in oleario usu, quibus scilicet oleum effunditur, & tor-
 3 detur, & quibus clauicula in acutissimum acumen intorquetur: iterum

D sunt aquatiles, sunt & terrestres. Aquatium alie marinæ sunt, stomacho utiliores: alie fluuiantales, quæ uirus habent. In terra gignuntur cochleæ terrestres, in testaceo genere penè solæ, quæ & limax dicitur. Sūt ex cochlearum generibus quæ aceratæ uocantur, latæ, multulariāque nācentes: sunt enim & è terrestribus quedā, quæ latæ & minutæ passim inueniuntur. Sunt etiam cochleæ quædam nudæ, in Africa maxime: & passim quoque obser-
 4 rantes minutæ quædam longæque & candidæ. Sunt & quos scissiles uocant, aut scissitas, genus syluestre uespribus frutetisque coherens, & quasi agglutinarum. Præterea sunt in Liguriæ alpiibus quæ inquectas ab operculo illo suo appellantur, quo ueluti regimine superimposito latent (quantū omnes etiā limaces leuiore quodā tegmine sili superimposito, hyeme latent.) Genus

Echinophori, aut
Echinophori
Cochlea nuda
quadrata
Cochlea terre-
stris
limax.
Explan. 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

*Cochleae co-
chleae.*

*Quae pectus co-
chleae propi-
tium oportet,
docet Plinius
lib. 30.*

hoc minus vulgare est. Adhæret operculo cuiusmodi testæ se operiunt, obru E
tq terra semper. Hæ circa maritimas tantum alpes quondam effossæ, excipere
iæruat & in Veliternis. In Balnearibus insulis vasatæ appellatur (quoniam
in speluncis nascuntur) non prorepunt è caulis terre, neque herba videntur,
sed ita modo inter se coherent. Cochlearum alia alius præstant maribus
Stomacho utiles sunt, & facile alio excernuntur. Flavianiles & alba viros
habent terrestres vero Stomacho utiles sunt. In his autem laudatissimæ sunt
Sardonicæ. Aphricanæ, & in his Solitanæ, Altipalestæ, & quæ in Chio gi-
gnuntur: & Siculæ, modicæ, quoniam magnitudo duras facit & sine succo. Ba-
learicæ quoque quas crassius vocari diximus: & quæ in Liguria albis
pomatiæ. Laudatæ & ex insulis Caprearum. Sylvestres autem, quas scilicet
appellamus, & ventræ & Stomachum turbant: uomitiones excitant, & al- F
uum solvunt. Illyricis magnitudo præcipua est, Aphricanis fecunditas, So-
litanis nobilitas, alba in Reatino agro nascuntur. Strabo cochleas prædicat
Lanustas. Cochleæ quoque acules ganeam implere: quæ in eam magnitu-
dinem perductæ sunt, ut octoginta quadrantes caperent singularum cali-
ces: auctor est M. Varro. Cochleæ crassam procreant succum: suntque duræ
& concocti difficiles. Quæ rotundæ sunt, earum maiores, carnosæ sunt,
virides habent, & choleram gignunt: at minores non nullis in usu cibario
sunt cum aceto multo cõditæ rutæque viridi & pipere. At vero qui eclino-
phori aut echinophori dicantur, pẽtadactylique, & quibus in acumen cla-
uicula intorquetur, graciliore quidem sunt carne, sed saturitatem citius q̃
alia pariant, Stomachoque iuuant. In cochleis marinis omnibus, quod colu- G
lum vocatur suavis est: suntque, si cum terrestribus conferantur, leues, fra-
giles, bonique succi, nec facile corrumpuntur. Terrestres vero cochleæ (quas
limaces appellamus) sicuti & alia, duram habent carnem, cõcoctioni re-
niscens: quæ tamen si recte concoquantur, uberrime alit, & mentis ex-
iguos obstruunt: de causa cum aceto & laesere ad esum cõdiri solent. Suc-
cus etiam ipsis inest, ut & alius testatis, qui ventrem citet: qui si coquendo
eximatur, reliqua caro aluum sistet, egregioq; alit, & Stomacho idonea est. 6
Et cochlearii cibus, inquit Plinius, Stomacho medetur: in aqua eas subfer-
uenti intacto corpore carum oportet: mox in pruna torreni nihilo addito,
atque ita è vino garoque sumi, præcipue Africanas. Nuper hoc cõpertum
plurimis prodesse. Id quoque observant, ut numero impari fumant: uirus
tamen earum gravitatem halitus facit. profunt & sanguinem excreantibus H
dempta testa trita, in aqua pota: appetitatem sanctorum & distillationes le-
nant: cochleæ. Coqui debent in lacte demptoque tantum terreno cõteri,
& in passio dari potui. Cochleæ crudæ trita cum aqua tepida cyathis tri-
bus si forbeantur, passim sedat. Et cochleæ in cibos ut quos inquit amarus,
aut quorum alienatur mens: aut quibus uertigines sunt, ex passio cyathis tri-
bus singulæ contrita cum sua testa & calefactæ in potu datæ diebus pluri-
mum novem. Aliqui singulas primo die dedere: sequenti duas, tertio ter-
nas, quarto duas, quinto unâs: & suspensa emendant & uomitas. Cochleæ
uiuæ corpus & præsertim Africanæ, cum aceto denotarum Stomacho dolo-

- A**res mitigat et si una cum testa uino & myrrha, si exiguâ inde bibatur, colli
ut sciatque cruciatus sanant. Et cochleæ nudæ (de quibus diximus) in Africa
maxime inueniuntur, antillimæ dysentericis. quinque combultæ cum dena-
rii pondere diuidi & catiæ, & quæ eo cinere dantur cochlearia bina in uino
myrræ aut quolibet austero, cû pari modo calidæ. Cochleas bibæ habent
exemptas testis tritisque tritis in uini cyathis sequenti die duas, tertio die
unam, ut illis leida urine emendent: testarum uero manuum cinerem, ad
calculos pellendos. Cochleæ in cibo sumptæ accelerant partum: utrum con-
ceptum impositis cum croco. Eadem ex amilo & tragacantho illitis proflu-
uis sistunt. Profundè & purgationibus sumptæ in cibo: & uulsum uersam
corrumpit cum medulla octuina, ita ut uni cochleæ denarii pondus adda-
tur & cypri. Inflationes quoque uuluarum discutiant exemptæ testis, tri-
terque cum rosaceo ad hoc. Astipaleiter maxime eliguntur alio modo Afri-
canæ bina cû sereno Græco, quod tribus digitis capiantur, additis mellis co-
chlearibus quatuor illuminatur, alio prius trino sacco perunctæ. Sûnt & mi-
nutæ longæque candidæ cochleæ passim oberrantes: ex aestuatis sole in te-
galis, rusæq; in farina, nascuntur lomento æquis portionibus: candorêq; &
leuiorem corpori asferunt. Scabendi desideria tollunt manutæ & latæ cû po-
lenia. Præcipiunt & cochleæ crudæ carnem tuam bibere ex aqua calida in tussi
cruenta. Quartatis cochleæ fluuiariles mederi dicuntur in cibo recentes.
Quidam ob id adferunt sale, ut dent tritas in pora. Istibus scorponum car-
nes flumatilium cochlearum resistunt crudæ uel coctæ, quidam ob id salis
quoque adferunt: imponent & ipsis plagis. Cochlearum terrestrium tritu
cero quamoptime trita adiectis uni nigri cyathis tribus, hepanens biben-
da datur calidæquam uini à totius substantiæ proprietate habere eas docet
Galenus: in febribus tamen cû aqua calida. Capitis doloribus remedio sunt
cochlearum, quæ nudæ inueniuntur nondum peractæ, ablata esparta, & his
duricia lapidea exempta (est autem ea calculi latitudine): quæ alligantur &
minutæ illuminat fronti trite. Item limacis inter duas orbitas inuenta of-
ficulum per aurem cum ebore traxerum, uel in pellicula agnina adalliga-
tum, idem præstat: quod remedium pluribus semperque prodest. Inueniuntur
in corniculis cochlearum harenacæ duritiæ: ex dentitione facillè præ-
stant adalligatæ. Limacis quoque lapillum suæ officuluti quod inuenitur
D in dorso adalligatum dentitioni prodesse confirmat. Cochleæ quæ sunt in
usu cibi cum myrrha aut turtis polline aurii dolores sanant. Item minutæ
& latæ fracturis aurium illuminatur cum melle naribus fluentem sangui-
nem sistunt cochleæ conuictæ fronti illitæ. Et recentis uulnera conglutinât
tula & imposita, & nomas sistit. Arûdines & tela, quæque alia extrahen-
da sunt corpori, cochleæ ex iis quæ gregarim lectantur contusæ im-
positæq; cû testis: & ex quæ manduntur exemptæ testis. Cochleæ una cum
testis tritæ aqua intercutit laborantibus, toti uentri, in arthriticis autem,
arueulis ipsis imponitur, quousque sponte decendant: agre nanque diuelli
possunt. Desiccant admodum, etiam si in alio crassas lentiusque infuderit
humor. Quapropter idem agendum quoque in iis quæ ex ictu orti sunt tu-

*Trita ex ac-
to, sequit Dru-
sardes.*

DE DIFFERENTIIS

moribus, etiam si egre dissolui possint, & autem coctionibus. Carnes Earum aut sole aut cum thure & myrrha illite, cum unguere alio, cum maxime quæ in nervis, etiam si cum coctione cohererant, conglutinant. Cochlearum humor qui *μύς*, id est, mucus vocatur, vel sola absque carne una cum thure, *άλος*, & myrrha, vel horum uno quopiam, vel omnibus simul usque ad certam consistentiam, medicamentum fit, quod tenaciter adhaeret, autemque tumores quibus mucosus humor inest, efficaciter exsiccat: frontisq; impositus oculorum fluxiones sistit. ubi vero muci copiam colligere uoles, cochlearum carnem stilo purgato ita nanque humoris plurimum emittunt, praesertim si nuper capte fuerint. Idem humor palpebrarum pilos agglutinat. Testem si descenderit cochlearum spuma illam uolunt. Cochleæ uita uehementer exsiccantis, & modice calfacientis sunt facultatis. Dysenteriae mitissime prostant, ubi locus nondum putredinem senserit: quatuor scilicet partibus cineris, adiecta pipæris albi parte una, & duabus gallarum. Tollit ex facie uicia cochlearum quæ late & manute passim inueniuntur, cum melle cumis. Et omnium quidem cochlearum cinis, inquit Plinius, spissat, calfacit sinectica un: & ideo causticis commiscetur, psoriasisque & lepris & lenigini illinatur. Te sitz cochlearum omnium, ut auctor est Dioscorides, cremate exsiccandi & urendi facultatem habent: purgant lepras, utiilgines, dentesque, oculorum cicatrices emendant, & uicia oris in facie *στέλε* uocant, albugines, ac uisus hebetudines, si una cum carne sua uita tritaque illinantur. Strombos turbinésue sunt, qui modo aquatiles cochleas, modo 7 marinas uocent. Stromba, inquit Orbisarius, duri sunt, concoctaque difficultes: & quo maiores, eo duriore emadunt. Cui sinapi eduntur, & ex aceto: at uero strombi in aceto putrefacti, lethargicos excitât odore. Prostant & car diacis strombi quoque carnes trite & in nullo tribus heminis, pari modo aquæ, aut si febres sunt ex aqua multa datæ proficiunt.

κοχλίας μύς.

*Αλως.
μύς.*

*στρώβη.
Τυρβη.*

*κίχλη.
Παλιόκω.*

*Πενταδάκτυλος.
Αντιόχλης.
vel Αλκωνό-
βηλος.*

*κίχλη.
κοχλίας.
Παλιόκω.*

*Εκαδάκτω.
Αντιόχλης.
Αλκωνόβη-
Λωτος.*

1. *κίχλη* & *αγκών*, Theodorus nōnunquam umbilicos uenitiquasi sit umbilicum genus quoddam testaceum aliud à cochleis, ad se autem Massianus uerum quodd umbilicum, quem Theodorus pro *αγκών* dixit lib. 3. *βελος*, animalis, id sit quod cochlea, uidetur ex Athenis lib. 2. Sed de *αγκών* & *αγκών* infra pluribus agitur. 2. Cochleæ, &c. Theodorus *αγκών*: hoc in loco umbilicos uocat. 3. *Πενταδάκτυλος*, *στυλ*. Hæc adduntur à Plinio melicembales, uel melicembales. 4. Sunt & quæ scilicet. *Ακ*. Hæc fortissim sunt de quibus Plinius lib. 30. Cochleæ ex his quæ gregariæ folia sectantur. 5. *Λινάρις*, ab agro cui nomen Lino est iuxta Priuonem. Hæc Hermolaius. 6. Qui sic coquendo, &c. Quoniam modo coqui debet cochleas conditq; docent Galenus & Orbisarius. 7. Strombos turbinésue, &c. Cancellus qui turbinem sibi, uelut Aristoteles, oblongior est *στέλε* uel *στέλε*. Strombum aliud esse a cochleâ, uel ex Plinio manifestum est lib. 31. Theodorus turbinem interpretatur. 8. Confunditur autem apud Græcos, uel ipsum Aristotelem, *αγκών* & *αγκών*. Sere tam *Αντιόχλης* *αγκών* umbilicum, id est, cochleam marinam significat: *αγκών* uero testacea cochlicum. *κοχλίας* nonnunquam etiam generale est, ut Pausanias in Laconicis *αγκών* ad purpuræ uoluum maxime idoneos seruit Laconicæ maxime. Est apud Aristotelem & *αγκών* & Athenæum *αγκών* (uisi in alio uero coctum indicem) cochleæ genus, & ex uero testacea genus testaceum, à limace diuersum. Abrotone, ut Hermolao placet, limacis genus est: quoniam sunt qui locustam putant item qui *αγκών* qui paratam eo uocabulo utiilgare. Limacem Hesiodus *αγκών* uocat, quasi denotant

F

G

8

H

A domiporcam dixerit. In Symposiis etiam pro porci solitam quæstionem habetis (301-
q-1 vocant) de Imaque scribit Aristoteles, *Idem enim, dicitur de, animalibus, et proinde de.* Ad
cuius exemplum, ut vult Hermodorus, Cicero Imaque ita finit. Terragrodæ, herbigradæ,
domiporcam, sanguine cassim. Tenet uero ita, Animal sine pedibus, sine spiritibus, sine
ossibus, crustatum

De muricum generibus, ut purpura, buccino, & reliquis.

Cap. C C X X X V I I.

- C**oncha turbinati generis purpura est, canaliculatim è testa procutrit il-
lis rostrum, & canaliculi laevis introitus tabulati seu leuiter est, quæ pro-
feratur lingua præterea clauata est ad turbinem usque, ac uicis in orbem se-
ptem fere. Totidem autem in testa clauiculae reperiuntur orbes quot ha-
bet purpura annos. Lingua purpuræ (quàm pronuscidem uocant) digito
longior, firma & torosa est, duritia tanta ut tum conchulas, tum etiam sui
generis testas perforare possit, quæ & pascitur. Florem illum sicuti tingen-
dis expetitur uel sibus, inter papauer dictum & collæ in candida uena con-
tinet, supra eam partem quàm ventrem appellans, in quibusdam nigrum,
in nonnullis rubidum attingit hic pressus cum extrahitur, & inficit manum.
Quodouum uocatur, semper habet purpura. Genera earum plura, pabo-
lo & solo differet. Lutense putri limo, & algense enutritum alga, utilissimū.
utrisque melius Tenense in Tenei maris ora collectum. Est & quod cal-
culosam uocatur, & dialuense aliud. Et nonnullæ magnitudine augentur
insigni, ut quæ ad Sageum & Lectron Idæ promontoria gignuntur. Ad Car-
ceiam inueniri traduntur & purpuræ & buccinæ *Aeschylus*, id est, quæ arum
testæ decem copularum sunt capaces: alie parue sunt, ut quas Euripus fere
& Caria. Pelagiae magnæ habentque sunt, parue ad litora & ora reperiun-
tur. Partes item aquiloniarum nigras, austrinæ rubras magna ex parte ferunt.
Capiuntur, inquit Aristoteles, tempore uerno cum fauos extruant: cancu-
le tempore fere nullæ capiuntur: non enim tantisper pascuntur, sed se ab-
condunt & latent circiter triginta dies. Plurimæ capi eas post canis octum,
aut ante uernum tempus utilissimæ censuit quoniam cum fortificauere
fluos habent succos. Fausificantes uerno tempore generant hyeme abeunt,
eo quo diximus modo. ceteri deinde incremento augentur, quippe quæ
anno perfici possunt: uirtute purpuræ annos circiter sex, uel cum plurimū
septem incrementum earum potest per orbes. Totidem enim, ut modo di-
ximus, in testa clauiculae reperiuntur orbes, quot habent purpuræ annos.
Purpurarum caro, sicuti & ceterorum testatorum, dura est: ac proinde eis
exhiberi solet, quibus ex malorum succorum copia cibus in uentriculo cor-
rumpitur. Et harum quidem & buccinarum caro durior est quàm aliorū,
succumque gignit crassiores, minus tamen glutinosum tenacemque: sed
in earum paribus discrimen est. Quod collum nanque appellatur, præ du-
ritie densius egre conficitur, concoquiturque difficiliter, nec faciliè corrū-
pitur: pariorumque succum generat & stomacho grauior est. Partes uero
inferiores, & quæ *uiscera*, id est, papauera uocantur, molles sunt ac facilius
quàm colla conficiuntur aluam mouent, & urinam sordidæque ac saluam

Purpura

purpure

Alia, conchula

luna, et con-

chula

Alia, tubula

testæ

Purpuræ testæ

procutit

Pelagia, et Idæ

et Idæ

testæ

Purpura maius

et dura sunt,

inquit Xenocrates,

testæ

DE DIFFERENTIIS

cient. Harum frequentior usus cholera gignit. Proprium his atque febribus hoc contingit, ut eorum iusculum cum coquatur, crassius reddatur. Purpuræ testa cremata exsiccandi uim possidet, dentes abstergit, carnem excrecentem reprimit, ulceribus malignis conuenit: & ulceribus quoque putridis si cum aceto aut posca aut uino mulso aut oxymelie imponatur. Purpurarum opercula in oleo cocta capillorum defluuium sistit: cum aceto epota lienis tumorem comprimit: suffocationes quæ ab utero oriuntur, suffitu prohibet, secundasque excutit. Buccinum concha etiam turbinata & 3 in anfractum inuoluta est, sed quàm purpura minor (unde & à quibusdà similis purpuræ dicitur) ad similitudinem eius buccini quo sonus editur: unde & causa nomini, rotunditate oris in margine incisa. Testa illi non est aculeis clauata quemadmodum purpuræ, sed scabra tamen. Et totidem etiâ F in clauicula testa reperiuntur orbes, quot habet buccinum annos. Promuscidem siue linguam habet, ut purpura, firmam & corosam, qua poscitur, qua etiam testas perforare potest. Quod in eo ouum uocatur, semper continet, sed aliis maius, aliis minus. Ad muricatum purpureum uel colore etiam ut purpura exquirunt, sed buccinum per se damatur, quoniâ phycam, id est, rubidi coloris splendorem, remittit. Buccinus etiam idem modus gignendi qui purpuris, tempusque idem est: his namque & fauiscare in more est, & nate generantur hyeme abeunte. Latitant etiam canis exortu circiter triginta dies: non nisi petris adhaeret buccinum, circiisque scopulos legitur. Buccina lunæ incremento sunt pleniora: aestate uero gracilescunt. alendi facultate purpuræ simile buccinum est, uerum durius est. Quod in his collum uocatur, aluum mouet, difficilius concoquitur: stomacho idoneum est, nec facile corrumpitur & mediocriter alit. Ex sinapi conditur in cibum, aut aceto, sacco cyrenaico, aut pipere. Totum uero buccinum si unâ cum papauere uocato coquitur, sistit potius aluum & sitim facit. Quod papauer appellatur à parte inferiore reperitur, mollius est, & facile corrumpitur. Oleum in quo decoctum fuerit uinum buccinum, dolores sedat auribus insalutem. Buccinorum testa cremata non aliter atque purpurarum, exsiccat egregie, & ut mordacitatis omnis experta, ulceribus malignis prodest, & putridis quoque cum aceto aut uino mulso, aut oxymelie. Eadem purpuris præstant concremata buccina (inquit Dioscorides) sed urhementius urunt. Si quis testam sale plenam sicili crudo comburat, dentifacio H conuenit, ambustis utiliter illinunt, ubi solui medicamentum minime oportet nam postea quàm ulcus cicatricem duxerit, sponte sua decedet. Maieum etiam generis sunt, quæ uocant Græci corychialia corychia uel coryphia, turbinata æque, sed minora multo, & oris halituum custodientia. Congenerum omni alium, quæcûque scilicet turbinati sunt generis suauissima iudicantur coryphia. Suntque & ori & stomacho grata, aliud inque & urinam cient, æque oris bonum reddunt odorem. Copiosius alunt iuuulenta, assa uero dura sentiuntur. Horum papauer buccinorum more aluum stringit potius.

*Buccinum
nâd
Murex.
Purpure filum.*

*Testella hoc
in loco uidetur
Corychy exorn
plura.*

*Colychia
Corychia
Coryphia.*

Aluere.

1 De muricam. Murex & si unam speciem significet, scilicet buccinum, generale tamen

Arimen est, ut testis admonet Hermolaus, sicuti & conchylium purpuram enim comprehendit murem & alia, ut infra videbunt. Muricem enim, inquit Plinius, denotavit est. Muricem vel conchyliorum testis cuius maculas in facie mulieris purgat cum melle illius, cuiusque ut erugat, extenditurque seipsum de his illustrata ut ostiauo, candido uorum foueatur. 1. Est & apud Athenienses & imperit, sed alia à purpura, uti saltem genus quoddam à purpura diuersum. 3. Buccinum & buccina etiam dicuntur instrumentum illud quo sonus edicuntur: cuius formam percellere descripsit Ouidius.

-Causa buccina sumitur illi

Tortilia, ut larum quæ uerbis crebris ab imo.

Conchylium.

Id est, uti supra.
Buccina.

De strabelo & nerita.

Cap. CCXXXVIII.

Strabelus concha est purpure & buccino similis, cuius testa idonea notatur, ut ex ea sonus edatur. Esturbinatorum genere nerites siue nates est magnitudine exigua: testam habet lauem, amplam, rotundam forma illi buccinis proxima est, papauere tamen non nigro, ut illa, sed rubro. Testis adnatum corpus medium eius firmiter est. Pascuntur natices mari tranquillo, absque saxis: quoniam status urgente, saxis adhærescunt more lepidum & apothridum, ac catætorum generis eiusdem nec siue tegmine dumoto adhærent, quod uelut operimentum sibi possident. Et modus hic idem est purpura, buccinis & omnibus generis eiusdem. In saxis ad imam maris sedem adhærescens nascitur nerites: & eò maris ubi sordium uacuas est & tranquillitas, urget. Olfaciunt natices & audiunt, adeo ut fieri nò possent aut, quin subterfugiant pastatores si uox proferatur. Concha est, quam Munianus muricem esse arbitrat, latiore purpura, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice, concha utroque latere sese colligente: quibus inhaerentibus plenam uentis stentis nauim portantem nautas à Peniandro, ut castrarentur nobiles pueri, conchasque quæ id praefluerunt, apud Guidiorum Venerem coli. Porro de conchis quæ ueneret dicuntur, ita refert Plinius, Nautant ueneres, præbentisque concanum sui partem & auræ opposcentes, per summam æquorum uelut hanc.

Id est, uti supra.
Id est, uti supra.
Nerites.
Nates.
Id est, uti supra.

Muricem.

Concha ueneraria.

1. An idem sit strabelus cum echinophoro, ut echinophoro cochleat de quo supra inter cochleas. 2. Nerites siue nates. Nerites uti inueniunt, uti inueniunt apud Athenienses, ut opinor. 3. Rotundam. Rotundiores esse nerites testam quam strabulus, hinc apparet oblongiorem enim formam recipit cancellus ille cochlearum: hebes à turbini testæ forma, qui turbiniem subit quam qui acutem. 4. Peniandra hystoria quoniam modo nobiles Cœcynobium pueros Sordas mellestis edendos, habent apud Herodotum lib. 3. 5. Nautant ueneres, &c. In nonnullis codicibus habetur nautant nerites, &c.

Id est, uti supra.
Id est, uti supra.

Testa.

Nerites.

De echinis.

Cap. CCXXXIX.

Echinus testatoorum omnium maxime à natura munitus est: quippe cui testa (quam habet in globum circumactam) undaque spinis frequentibus circumuallata celeretur quod soli inter testata peculiare est: atque hoc item peculiare echinis est, ut nullam intus carnem contineant: sed uice carnis nigra quedam circum ab ore fusim sparguntur, nomine adhuc uallo appellata. Quod caput echini appellant & os, uersum in terram est: quod ructo ad excrementi exitum deputatum est, id supra habetur. Denas quina

Id est, uti supra.

DE DIFFERENTIIS

echinus omnibus sunt, inquit Aristoteles, cuius intrinsecus, inter quosdam E
 runcula quaedam interi accens, linguae officio fungitur. Mox iungitur gula,
 deinde uenter in partes quinque distinctas, perinde ac si plures uentres, ef-
 fent, plenus excrementi: cuius meatus omnes in eum excrementi coeunt,
 quæ testa perforata est. uentri autem subdita sunt quæ oua appellant, mem-
 brana quadam obducta, eodem in omnibus impari quinario numero. Sūt
 uero omnibus oua, sed nonnullis exigua nec cibo apta. Echinosaurum nigra il-
 la quæ parte superiore ad dentium originem pendet, & amata sunt, nec
 esculenta. Genera echinosaurum plura sunt: primum quod cibo idoneum est,
 in quo quæ oua appellant, magna esculentique semper cōsistunt, & in ma-
 iore corpore & in minore: nam nouelli adhuc paruique pleniusculi illis con-
 stant, & maxime pleniusculi ductis quæ tepidis redduntur plenus res. Secun-
 dum ac tertium spatagi & brissi, quæ genera pelagia sunt, rarioraque inuenta. F
 Ad hæc quæ echinometra appellantur, magnitudine omnes superat. Echi-
 nometra appellantur, inquit Plinius, quorum spinæ longissimæ, calices mi-
 nima. Genus uero aliud est minutum, pelagicum, spinis grandibus, longis,
 prædurisque modo pene lapidis, gigni in alto gurgite solum, quo nonnul-
 li ad distillationes urinae medicamentum utuntur. Circa Toonem echina na-
 scuntur cædidi & testa & spina & ouo, augeri forma productiore solitis spe-
 na his patet nec rigida, sed mollior. Nigra autem illa oei proxima plura, &
 ad foramen exterius coeuntia habentur, sed disuncta inter sese. Echini o-
 mnes spinis loco pedum utantur: his enim nitibundi mouentur, sedemque
 permittant. Omnibus autē ingredi est in orbem uolui: testæ detritis sem-
 per aculeis innotuantur. Mouentur agilibus & frequētiis qui sunt cibo ido-
 nei: cuius rei argumentum quod semper alget aliquid suis spinis impleant
 gerant. Tradant securitiam maris prælagire echinos, corptis que operiri la-
 pillis, mobilitatem pondere stabiliētes seseque suberrantes: nolunt enim
 uoluntatione spinas atterere. Quod ubi uidere nautici, statim pluribus an-
 choris nauigia infrenant. Ex echinis alij rasi sunt, alij flou: sunt & alius colo-
 ribus echina, sed hæc ceteris præstāt. Inter testaceæ omnia quibus facultas in-
 gredendi est, olfactum echini minime habere uidentur. Stomacho uen-
 trique idoneus est echinus, bonique succi, & urinam ciet. Exiguam corpo-
 ri præstat alimentum, neque plane crassum neque tenuem, sed modicærem.
 Contra dorycnium echini maxime profant, & iis qui succum carpathi bi-
 berint, præcipue eius iure sumpto. Echini cum spinis suis conuulsi calculos
 sanant: modus singulis hemina bibitur donec proficit: & aliis in cibis ad hoc
 proficiunt. Totum echini corpus uisum, cinerem facit extergentis digerē-
 tisque scutellari, quo nonnulli ad excrecentem in ulceribus carnem, & ad
 sordida ulcera sunt uisi. Echini testam crematam hæc efficere prodest Dio-
 scorides. Cutem in alopecus replet echini. unā cum carnibus suis crema-
 ti citius.

*Plinius. Quæ
 echini uentris
 partes numero*

*Spatagi.
 Brissi, uolui.
 Echinometra,
 echinometra.*

Echin cædidi.

*Quæ modo
 peruenit con-
 ditioneque ad
 usum, dicitur Ca-
 lina.*

*Echini uentris
 spatagi.
 spatagi.*

1. Dentes quini. Echinos quinos esse dentes, unde intelligi potuerit, inquit
 Plinius. 2. Oua appellant, &c. Quæ echinos hos uocat Hermolaus. 3. Spa-
 tagi brissi. Spatangus aut spatagus, Hermolaus dicit.

De

- A** De balano. Cap. CCXL. *Balanus. Balanus. Glans.*
- B** Alanus aut glans nomen habet à similitudine glandium quercinarum. E genere est testatorum immobilium: testa levis, offectus nullum habere cernitur. Nascuntur balani circa rimas cavernasque saxorum. Carnem habent duram: in cibo laudantur precipue qui us nascuntur locis ubi mariner admiscetur fluvialis aqua, saxis adherentes sunt namque ij dulces & habiores plenioresque copiosum præbent succum, quo & abunde nutriunt aliumque mouent: ori stomachoque grati: teneriorem habent carnem, & urinam eunt. Decoctum quoque eorum aluum citè epoumque: nero saxis non adherescunt, acres sunt & medicamentosi, magisque aluum perturbant, sed urinam minus citè. Hæc Xenocrates: Athenæus vero, Allocis, inquit, discrimina sortiti sunt balani: quandoquidem in Ægypto optimi gignantur & suauissimi: tenelli, etique ac uentriculo grati: qui & succum & alimentum præstant copiosum, urinam atque aluum mouent in aliis uero locis sapore macerantur magis salso.

1 Balanus, &c. Sphœdylus apud Galenum & Colubellam: Plinius nero siquam diversis animalia enumerat. Est apud Paulū sphœdylus concharum genus, fortissè idem. Sphœdylus.

De unialubus, ut de lepade & aure marina. Cap. CCXLI.

- E** unialubum genere lepas siue patella est, eorum scilicet quæ simplici *unio. unio. patella.*
- C** unialuba constant: singulari enim testa cõnectur lepas, & ea quidè liquet altera uero eius pars superficiei deorsum carnem ostendit. Saxis testa in dorsum data adheret: atque alieno septo quodammodo basalibus, ut eo modo se concludendo tueatur. Os habet, & post os uentræ esse in hoc etiam genere patet: illa præterea quæ oua uocantur: quod etiam papauer appellatur, in imo continetur. Excrementum quoque eius parte una testæ excernitur, qua foramen in testa habetur. Gignitur lepas circa cavernas rimasque saxorum. Et quævis saxis adherendo uiuat, saxis tamen quandoque etiam absolui, in palium que ferri solet, aliòque transire. Magna quidem ex parte, parua gignantur lepadæ: quæ tamen nonnunquam ostre arum magnitudinem æquant: maxime autem in Indico mari: ut & alia omnia inueniuntur. Carnem habet lepas duram, concoctu difficilem, paucique succo elix, condimento redduntur graniores. Eiusdè generis cum lepadæ & aporithæ est: & morte lepadum saxis adheret. Quæ *unio. unio. patella.*
- 4** sis adherent. Hæc neque palato neque stomacho grata sunt: fixa tamen eduntur: neque enim aliter placebunt: nutrimenta plurimum exhibet, nec facile excernuntur. Circa Pharum insulam Alexandriæ uicinam multa pro-
- 5** ueniunt: in Illyrico uero & sinu Ionico gignantur magna. Sūt & pholades apud Athenarum, quæ & nutriunt plurimum: sed uires olent, paucaeque succi sunt.

1 Aristoteles *unio* de *unio* de *unio* appellat, & de *unio* de *unio*. Theodorus patellam, patellam feram & aurem marinam. 2 Concoctu difficile, &c. *unio* de *unio* in Athenis, id est, concoctu facilis, sed facilius menda est in exsalaribus. 3 Aporithæ, aure marine. &c. Theodorus maricem interpretatur. 4 Quæ *unio*, &c. Vn. Antigonus Caristius *unio*.

DE DIFFERENTIIS

de ostrea
701.

crassitie, & aquositas vocatur *Stolice*. ¶ Videatur & *quadrata* apud Athenensem ex E
eodem esse genere cum his.

De bivaluibus, & primo de ostreis.

Cap. CCXLII.

de o-
streis.
de o-
streis.
de o-
streis.

E Bivaluum genere ostrea est, testa illi aspera scabraque crassioribus la-
bris. Quod ovum vocatur, non semper, sed uere habent ostrea: mox e-
nim tempore procedente, manitui: denumque totum prope aboletur in
ceruoso maxime limo gignuntur. Gaudent dulcibus aquis, & ubi pluri
institunt amnes adeo pelagia parua & tara sunt. gignuntur tamen in petro-
lis earentibusque dulcium aquarum aduentu. Gignuntur etiam quandoq;
& in fluuijs & paludibus stagnantibusque locis. uerum optima sunt ostrea
marina, quae prope paludem aut flumini nascuntur: maiora enim sunt &
dulciora, meliorisque succi. Quae uero ad litus aut inter saxa gignuntur ubi **F**
deest limus aut aquae dulcis copia, parua sunt, dura, & gustu amara atq; mor-
dacia, ideoque neque in cibo grata. Grandescunt hyderis quidem ratione
maxime, ut diximus: sed penatim circa initia aestatis, inquit Plinius, multo
lacte pregnantia, atque ipsa sol penetrat in uada. Hae uidetur causa quare
minora in quibusdam locis reperiuntur: opacitas enim prohibet incremen-
tum: & in tristitia minus appetunt cibos. Vete, inquit Athenaeus, & circa
aestatis initia optima sunt plenaeque & tumentia: atque una cum dulcedine
quadam marini referunt sapore: stomacho quoq; grata sunt. Variant colo-
ribus: rufa in Hispania, fusca in Illyrico, nigra & carne & testa in Circenis.
Præcipua uero habentur in quacunque gente, spissa & siliua sua lubrica:
crassitudine potius spectanda quam laticudine: neque in luto capta neque **G**
in arenosis, sed solido uado spondylo breui atque non caruoso, nec fibris
hæmioso, ac tota in aluo. Addit perimores notam, ambiente purpureo cri-
ne fibras: eoque argumento genetola interpretantur calliblephara appel-
lantes. Gaudent & peregrinatione, transferrique in ignotas aquas: sic Brū-
dusina in Averno compacta, & suum retinere succum, & à Lucrino adopescit
creduntur. Hæc sunt dicta de corpore. Discrimen etiam ostrearum fecere
nationes & litora, sicuti & in aliorum aquatiliū generibus: ut & ostrea ab-
ubi atque alibi meliora inueniuntur. Sergius opata Lucrina nobilitabat
ostrea, qui eorum uiuaria prius omnium inuenit, cum nondum Britan-
nica fruebat litora. At Mutianus Cyrenæa, maiora Lucrinis dulciora Bei-
tannicis pleniora Lucenisibus, teneriora Isthicis candidiora Circenisibus:
sed his neque dulciora neque teneriora esse ulla, auctor est. In Indico man **H**
Alexandri rerum auctores, pedalia inueniri prodidere. Necnon inter nos
quidam tridacna appellauit: tantæ magnitudinis intelligi cupiens, ut ter
mordenda essent. Est ostrei quoddam genus, quod pectoribus usui est: cras-
situdine plurimum excedit, & florent illum, non intra testam, sed foris ha-
bens: compotiri id genus locis Caris potissimum solet. Ostrearum dos in me-
dicina in hoc loco tota dicitur: nec potest uideri satis dictam de his, cum
palma mentarum duo iam tribuatur illis. Ostrea testatotum omnium mol-
lissimam habent carnem, sed glutinosam, stomacho idonea sunt, manus no-
truant, magisque aluum clement. Et cum cetera omnia elixa dantur aut assa,
ostrea

Calliblephara.

Tridacna.

- A** ostræa uel cruda mandi solent: quidam in sartagine frisis utantur. Contra leporis marini uenena ostræa aduersantur. Ostræarum testæ crematæ vires habent buccinaram similes, nisi quòd minus crassæ sunt partium. Faciei sordes abstergunt, splendidos reddunt dentes. Eloræ, humida ulcera cavâque replent, atque ad cicatricem ducunt: excrecentem in ulceribus carnem reprimunt. Stomachum, inquit Plinius, unice reficiunt ostræa, fastidias medentur, molliunt aluum leniter. Eadem cocta cum mulso, renasmo qui sine ulceratione sit, liberant uescicarum ulcera: quoque repurgant: in conchis suis cocta, uti clausa uenerint, mire distillationibus prosunt. Testæ ostræorum cinis uitam sedat, & tonsillas admixto melle. Eodem modo parotidas, paucos, mammarumque duritias, capiti ulcera ex aqua, & urânque mulierum extendit. Inspergitur & ambrosiæ & denusificio placet. Pruritus quoque & eruptionibus pituitæ ex aceto medetur. Cuiusde iun-dançur strumas sinant, & permoles pedum.

*Abiæ, strigæ di
pharæas.*

1 Ostræa, &c. *ôg-ôr* etiam quandoq; dicitur: quanquam *ôg-ôr* forte generale est omnia complectens quæ testâ integuntur, ut suis explicat Gælenus in lib. de simplic. medic. Et *ôg-ôr* quoque nonnunquam æque generale est ad omnia testata. Aliquando uero ea sola comprehendit, quæ sua natura immobilia sunt.

De chamis seu conchis.

Cap.

C C X L I I I.

- 1 **C**oncharum sive chamarum genera, chamæ trachæa, id est aspera: chamæ leuæ, id est leuæ. Glycymerides, uel, ut alij uolunt, glycymerides, & pelorides, binæque sunt, & generis uarietate inter se distantes, & figuræ rotunditate. Chamæ trachæa (quæ & à nonnullis glycymerides dicitur) ab aliis generibus differt, quòd non solum aspera scaberrimæque sit eius testâ, sed striata & quasi ungulas quasdam prominentes habens per testâ longinquantem extensas. Caro illi inus maris saluaginem sapore refert, & duriuscula est: & ut leuissus tradunt, nulli succi, parumque nutrit, & facile excernitur: ut
- 2 uero Diphilus, stomacho grata est: Ab hac differt chamæleios, quod testam habet leuiorem, latiore & pellucidior: carnemque inus suauiore, quæ concoctu facilis est, bonique succi, ubertius alit, stomachoque grata est. Huius suauitate præfertur glycymerides uerò à peloride uincitur. Pelorides reliquis magnitudine superant, sed glycymerides maiores sunt quàm pelorides. Glycymerides carnem habent duram, quæ non parum alimenti præstat: & trachæa succi bonitate superant, sed peloridibus inferiores sunt: urinam magis cient glycymerides quàm pelorides. Emolliunt aluum pelorides. Discrimen his etiam ex loco est, (quanquam chamæ omnes locis arenosis sui ornus inuis capiant:) quæ enim in Dicearchia sive Puteolis, aut Lucrino lacu, aut circa Alexandriam nascuntur in pulidibus, optimæ sunt. Quæ uero supra Diolcum & Pharon atque Pontem, quo Pharus Alexandriæ iungitur, oblongæ sunt glandium quercinarum instar, & hirtæ similiter atque fagorum glandes quos echinos uocant, & candidiores, carnemque inus duriorè pariter & acriorè. Chamæ, sunt quæ ita diuiduntur, ut alia chamæ trachæa dicatur, alia basilica regiusque, quæ & pelorides dantur. Quæ basilicæ à nonnullis dicuntur, ab aliis peloridæ, inquit Diphilus, copiosum cre-

*Χαλ.δ.
κίχγ.
κίχγ.
Cham.
Concha.*

*Χαλ.δ. Τριγ.δ.
κίχγ. Τριγ.δ.
Τριγ.δ. πελ.δ.*

Χαλ.δ.δ.

*Glycymerides
Chamæ trachæa
merides.*

*Pelorides,
Trachæa
Chamæ pelorides.*

*Χαλ.δ.
Χαλ.δ. Βασ.
Χαλ.δ.
Pelorides,
Peloridæ.*

DE DIFFERENTIIS

ant alimentum, (præcipue quæ grandiores sunt) bonamque gignant suc-
cam, & stomacho gratae sunt, nec facile excoriantur. Chamæ cum coquuntur,
duriores evadunt, & satius si rite condiantur. Chamarum, inquit Dio-
scorides, in exigua aqua coctarum sals album fiet, id cum vino affluatur.

Chama.

*Chama, scilicet
apud
Rufum,
Concha.*

Chama, scilicet *χάμα*, forsitan dicta *ἐπὶ τῷ ὑποβάθρῳ*. 2. Chama trachina. Mace-
donæ hanc *χάμα*, Apici vero *ἀπὸ* dixere. 3. Ab hac differ chamæleas, &c. Hæ,
infallor, Aristoteles galadæ vocavit, concham scilicet lævi testæ, an vero hæ gene-
ris concha sit 4. *χάμα* *ἐπὶ τῷ ὑποβάθρῳ*. 5. Concha nomen unum speciem si-
gnificat, nempe chamæm, ut apud Aristotem lib. 4. hist. animalium: sed & præstia
chamæm trachinæ, ut lib. 7. & apud Orisium lib. 2. Plinius conchas appellavit, non
quæ testæ adeo singulis clauduntur atque cochleæ, pectines, digitæ sed quæ fusciores,
ut purpureæ, buccina, pinna. Concha & quibusdam non minus generale est quàm os-
trea: cochleæ enim omnia quæcunque testæ intellæ sunt. Neminquam enim pro
testæ ipsæ accipiunt, ut Columella in hortis, Impletus concha limax: & Cicero libro
secundo de naturâ deor. & poma, Duabus patula conchis: & comprunt conchas.

De mitulis siue musculis & tellinis.

Cap. CCXLIIII

*Mitulus,
Mitulus,
Mitulus,
Mitulus.*

Mitulus qui & musculus è testaceorum bivaluiam genere est testas ha-
bens claudiles & reteratiles, quæque, labris tenuibus. Connectuntur
inter se mituli, frangunt & acervantur muricum modis nascuntur enim
more et parum, ut minores subinde octiantur iuxta principium. Vivunt in
algosis, gratissimi autumnis, & ubi multa dulcis aqua miscetur mari ob id
Ephesijs, & qui in Ægypto inveniantur, laudatissimi. Procedente hyeme, a-
maritadinem trahunt, coloris quoque rubrum. Iuba in his voluminibus quæ
scripserit ad C. Cæsarem Augusti filium de Arabia, tradit mitulos marinos
ternis heminis capere. Musculorum duæ sunt species: maiores qui saltem a
viris quoque respiciunt: adeoque gustui ingrati. Duri item sunt & concoctioni
resistentes, sanguinem procreant crassum, & pituitæ multum: & succum
denique non adeo probum. Copiose alunt, ventremque & urinam cient.
Hi si assentur sitim vehementem excitant: si vero dixerint, & acrioribus
quibusdam, ut insipi nassurioue condiantur, nõ adeo viris respiciunt. Mi-
nores, rotundi magis sunt, & externis testarum partibus hirti, tenuiori-
busque testis, carne & molliore & dulciore, bonique succiværum minus a-
lunt & urinam cient magis. Ora mandentium atque fauces acri mordaci-
tate vexant, gulam atque etiamque exasperant nullum quoque succum & ra-
cedinem efficiunt, uocem quoque obdunt. Deteriores sunt qui in locis ar-
gosis, aut inter testas siglinas gignunt, ut qui in algosis procreant. Mya-
ces, inquit Dioscorides, id est, mituli laudatissimi in Ponto: caro eorum ad
canis morsus utilissime imponitur. Crematis eandem buccinis effectum
prebent: priuatimque plumbi in morem elosi, oculorum medicamentis
cum melle utiles sunt: palpebrarum namque crassitudinem & albugines, et
terique quæ oculorum claritati officunt, exterrunt. Atque in alijs partibus
sordida ulcera capitisque pustulas sanant. Qui circa Ephesiam gignuntur
mituli, inquit Athenæus, pectunculis meliores sunt: chamæ tamẽ
inferiores: urinam magis quàm album citant. Mya cum ins, inquit Plinius,
traditur

*Hæc Plinius
mya, scilicet
scilicet mya, scilicet
est, musculorum
generis robustus.*

- A** traditur aluum & uiscas exinanire, interanea distringere, omnia adaperire, renes purgare, sanguinem adipemque mungere: itaque utilissima sunt hydropicis, mulierum purgationibus, morbo regio, articulari, inflationibus: item prodesse felli, parueque pulmonis iocineris splenisque uiciis, rheumatismis. Fauces tantum uexant, uocisque obteundunt. ulcera quæ seipantant sunt purganda sunt: item carcinomata. Cremati autem ut murices, & morsus eorum hominibusque cum melle, lepras, lentigines: canis eorum potus emendas caligines. Ginguarum & dentium uicia, eruptiones
- 7 pituitæ, & contra dorceniam aut opocarpachon antidoti uicem obtinent. Tellinem à Romanis mitulum etiam uocari existimauere nonnulli. Telli-
- B** ne circa Canopum insulam in Canopico ostio sitam frequentes sunt: & locis arenosis gignuntur, & in litoribus quæ sæpe fluctibus agitantur. Quarta quæ tenuiores exilioreque sunt, basilicas, hoc est, regias appellant. Quæ uero fluminales, ut quæ in Aegypto & Nili superioribus partibus gignuntur, maiores sunt & succi pleniore dulcioreque. In uere operunt sunt tellinæ.
- 8 Recentes bonam faciunt aluum, sed præcipue ius earum: salis uero tellinas uistas, ad co uentem efficere ciuem ferunt, ut si cum cedra mixtus inhiatetur, aut uillos palpebrarum pilos renasci non potiatur.

*Testina
tellinæ
basilicas
regias
fluminales*

- 1 Connescuntur inter se mirula, &c. Mirula, inquit Phinius, spēs natura in arenosa potuuntur. 2 Molluscorū species. Phinius ita: Degenerant myæccin deos species. 3 Hos Phinius mirulos, Orbalius myæccin, Athenæus *αἰνὰ μυῖα* & *αἰνὰ* uocat, *αἰνὰ* *αἰνὰ* & *αἰνὰ* in genere masculino. 4 Minora, &c. Hos Phinius myæccin, Orbalius & Athenæus, *αἰνὰ* in genere feminino appellat. 5 Mollior, ita Orbalius, & Athenæus. Phinius uero dicitur carne esse densior. 6 Hæc Phinius alteram myæccin generi tribuit, nempe priorem & quod reuius diximus, mirulos uocat Phinius. 7 Tellinam, &c. Romæ circumferri: narrat Hermolaus puellas quasdam cœcholas quas qui uendunt, tellinas pedicant, ualgaribus cœchis minores & leuiora, candidaque nec stratasque Venas pliciores à capitis similitudine cappas oculos appellant. 8 Quæ Diodorus tellinis, eadem Phinius pedunculis tribuit: nec quicquam *αἰνὰ* *αἰνὰ*, id est, de pedibus oculis apud Diodoridem habetur.

De pinna.

Cap.

CCXLV.

- P**inna concharum generis est, duabus grandibus patula conchis, scabris, *Pinna, pinnæ.* nec tamen striatis, labris tenuibus: nunquam sine comæ est, sed custodem intra se continet, aut squillam parauam, aut cancellum, pinnothereum. Duocant & pinnophylacum: quo quidem custode priuata, perit breui tempore: neque enim absque mutua opera uiuere possunt. Pandit se pinna, luminibus orbem corpus uitæ minutis piscibus præbens. Assultant illi protinus: & ubi licentia audacia creuit, implent eam: hoc tempus speculatus index, morsu leui significat: tum admonita squilla morsu pinna, comprimit conchas, & quicquid inclusit, exanimat, partemque socio tribuit. Nascitur pinna in limosis arenosisque locis ex bysso, id est, uillo sive lana quadam pinnali, subrepta, semper radice innititur, neque se demum unquam mutare solet, neque euulsa uiuere potest. Quod ouum uocatur, semper habet, sed aliis maius, aliis minus. Pinnæ copiosum præbent alimentum: uerum ægre & concoquantur & digeruntur: urinam ciunt. Pinnæ optimæ sunt te-

DE DIFFERENTIIS

Lincolns
ff. nam-
des.

nella, plene carnosæ ut, quæ in humosis herbosisque vadis gignuntur: & u- E
bi man dulcis aqua mactetur, & locis tranquillis ac uento carentibus; te-
nerrimos enim hic nascuntur, quàm ubi fluctibus agitantur. Grandioribus
parat: & quæ uere & æstare capiuntur, alius præstant: sunt enim & sesamo-
res & pleniores. Quæ magnitudine modica sunt, carnem quidem habent
mollem, candidam ac dulcem: collum autem durum concoctu difficilem,
corruptionique resistentem: collo nanque corpus reliquum facilius cor-
rumpitur. Elæx asie duiores euadunt, præsertim si uino fuerint aspersæ.
Earum autem caro quæ in uino & aceto macerata sunt, mollior est, sed fla-
uas generat. Pinnam esse concham illam celeberrimam in qua gignuntur mar-
garitæ nonnulli prodidere. Theophrastus in eo libro qui de lapidibus in-
scribitur, non pinnam, sed pinnæ similem esse prodidit. Androsthenes uer- F
ro, præter aliam, quæ apud Indos berberi dicitur. Hæc pectunculo forma
similis est, sed neque striata ut pectunculus, neque ita aspera: neque duas ut
luri auriculas habet, quemadmodum pectunculus, sed unam. Chares Mi-
tyleneus, ostreo similem concham esse prodit, sed oblongi & crassam, car-
ne intus ampla, candida & odorata. In nostro mari, inquit Plinius, reperiri
solebant margaritæ crebrius circa Bosporum Thracium, autæ ac paræ in
conchis quas myas appellant. ut in Acarnania quæ uocatur, pinna gignit.
Quo apparet nō uno genere concha nasci: nam & Iuba tradit Arabiæ cō-
cham esse similem pectini insecto, hirsutæ echinorum modo: ipsum unio-
nem in carne ipsa esse grandinæ similem. Indus maxime has mittit occa-
nus. In Britania quoque paruas atque de colores nasci certum est. Præcipue G
autem laudantur circa Arabiam in Persico sinu maris rubri.

1 Ex basso. ita legit Theodorus apud Auliolem. sicut etiam nos. habet exem-
plaria Græca. uerum Achenus, in 10. hæc habet, ad est, ex profundo. 2 Quo pa-
cto in concha & generetur, & incrementum capiat margarita, uariæ sunt sententiæ
sensu, ut uidere est apud Plinium & Achenum & Solinum.

De pectunculo.

Cap. CXLVI.

Pectunculus.
Pectus.
2. 104

Pectunculus testacci generis bivaluis est, testas habens fragiliores, sca-
bras, & quasi uargulis quibusdam striatas. & reseractile, ut quæ altero
latere nodo ligantur. Binæ in testis ueluti auriculas habet. Id quod ouum
uocatur, non semper, sed uere comit: mox tempore procedente minui-
tur, demumque totum aboletur. Pectunculi inueniuntur & nigricantes, & H
albæ, & rufæ. Nigricantes alij præferunt, ut cædidos alij: sed squalore trahunt
rufum colorem: & locis quibusdam etiam defecerunt propter siccitatem. Lo-
cis arenosis sui ortus initia capiunt: ceteri incrementis augentur: quippe qui 6
anno perfici possint. Latent aliquandiu in arena. Latent sere & circa canis
ortum, & magnis frigoribus: pectines admoto digito defrascant, mox com-
primunt ut cernentes. De ferramento quo capiuntur sipe exiliunt, ita ut
uolare uideantur. Plinius, extra aquam, inquit, uolitant sagittæ modo. Qui
candidi sunt atque lati, dulciore habentur: sed candidi duri, rufi, urosi: uar-
ij, mediocres sunt. Hæc Xenocrates: Sed candidi molliores sunt Diphilo
autore: neque uirosi quippiam habent, & alium citans. Ex nigris autē
& rufis

- A & rufis maiores, atque uerni sapore sunt iocundo. Pectunculi omnes facili'e concoquuntur, stomachoq; & uentri grati sunt, si cumino & pipere condantur. Pectunculi eò præstantiores sunt quo maiores, testâque magis cœcava, & colore nigrores. Vere optimi sunt & æstate: atque his potissimum temporibus augentur plenioreſque fiunt: sed pro lunari potestate maxime. Ceteris præstant & magnitudine & succi probitate, quæ Micylenæ capiuntur. Numerofos fert Pontus, sed exiles, & qui non temere in magnitudine crescant. Pectunculi alimentum uberius corpori exhibent quàm chamæ: sed fœcum & deteriores procreant, & qui non tam facili'e aluum faciat. Concoctionem facilius admittant quàm ostrea. Sapore sunt dulciores at nemiâ illam dulcedinem per cocturam exuunt. Aluum magis mouent iurulentis assis: & quo magis assentur, eò minus succi cœgeniti erit: reliquam, minâque aluum tentabunt. In suis testis assentur, magis nutriunt. Pectunculi in cibo urinam eient: & ea quæ circa uesicam sunt, ulcera uel sordida iuuant, etiam si citaram contraxerint. Purgatur uesica, inquit Plinius, pectinum cibo. Pectunculi salsi triti cum cedria pilos in palpebris mariles euulsos cohibent.

De dactylis siue unguibus, & pernis.

Cap. CCXLVII.

- Concharum è genere sunt dactyli unguësue ab humanorum unguentum *Dactylus* *a dactylis* *druf.* *Pignus* *gallid.* similitudine appellati. batis clauditur unguis ualutibus leuibus, fragilibusque, acrum utroque latere connexis. Exigua corporis parte exat: reliquo autem toto corpore, perinde ac in cubili occultur. Ad strepitû se subtrahit, inferendoque subdit, quoties ferramentum tenuiat. Permanet immobilis in locis arenosis, nulla innoxius radice; qui si è testa euellatur, uiuere nequit. Ex his mares alij donacas, alij aulos uocant: feminas onychas, mares luidas quasdam ceu uirgas in testa cœment, colorémque habent caelestè. Dulciores feminæ sunt, & unicolores: urinam mares mouet, calculosos iuuant, & quicumque aliis difficulter urinâ reddunt. Dactylis natura, inquit Plinius, in tenebris remoto lumine alio fulgore claresci: & quanto magis humorem habeant, lucere etiam in ore mandentium. Lucere in manibus, atq; etiam in solo atque ueste decidentibus guttis. proprium hoc solenibus atq; purpure est, quod cû in iufculo coquantur, id crassius reddant. Copiosam, *Donax.* *Aulos.* *druf.* *Cochlearia* *longa* *Perna* sed malum fœcum procreant solenes & glutinosam. Innoxii maxime si cum sale edantur & aceto nam cum oleo & sale deteriores sunt. Quo grâdiores eò præstantiores fiunt, uagant æstate maxime. Conche longæ carnes, inquit Plinius, ex multo potè cû aque part modo iocinentis doloribus profunt: aut si febres sint, ex aqua multa. Pernæ concharum generis circa Pontias insulas frequentissimæ. Stant ueluti fuisse crure longo in arena defixæ, hiantis que quasi limpidudo est, pedali non minus spatio uentantur. Dentis in circuitu marginam habet pectinatum spallatos, antus pro spondylo grâdas caro est. Testatorum genera hæc traduntur.

1. Conchas longæ carnes, &c. Dignos, ut ego sunt arbutos, conchas longas uocauit Plinius.

DE DIFFERENTIIS

De zoophytis, & primo de tethyis uertibulosis.

Cap. CCLVIII.

E

zoophyta.

Tethys.

Tethys.

Tethys.

Tethys.

Tethys.

Sunt animalia quæ diuclusa omnino sūt quæ in genera diuisas: quæ scilicet accipiti natura sunt neque enim in eis perfectū animal est, neque planta. Quæ enim holothuria uocantur atque pulmones & plura eiusmodi, alia in mari, parum à plantis differunt sua ipsa absolutioe carent enim sine nullo manifesto sensu perinde ac plantæ absolutæ. In his tethya parum à sua natura à plantis differunt, ut uideantur plantæ quæpiam marinæ, aut fungi propius tamen ad animalium naturam accedunt quàm spongia. In hoc certe cum plantis conuenit quia non nisi adhærente uiuit, sed cum aliquid habeat carnis, sensum aliquem habere uideri potest, sed olfactum tamen minime habere cernitur. Inter testacea, tethya peculiarem sortita sine naturam: has enim solis corpus totum tegumento includitur, nequaquam striato, sed leui cuius durities inter testam & corium est, adeo ut modo prædum bubuli uertoris soeatur. Adhæret id genus saxi sua testa: duosque seposita inter se foramina exigua admodum habet, & uisum uis patientia, quibus humorem cibo accommodatum accipit: & quantum humoris remaneat, reddit alterum scilicet & quasi os sit, alterum uero ueluti excrementi ostium: excrementum enim in eo nullum spectatur manifestum, quale in cæteris ostreis uel echineis, uel quod appellant papasæ cōtinetur: sed neque quod osum appellatur, in eo ullo tempore minuitur aperte aut augetur. Dissecto, primum membrana carnosum ambiens patet ostenditur, quæ uertibuli caro ipsa continetur, nulli è cæteris similis, in omnibus tamē sui generis eadem. Adhæret caro hac utroque ex latere membrane enchydanti & cortex & qua adhæret, arcibus utranque in partem est tethyon, uidelicet ad meatus illos duos, quorū alter crassior, alter tenuior est. Caupina utriusque ex quo quodam instrumente continuo, in quo uite principium continetur: humorq; in altero cauo consistere solitas est. Tota corporis eorum natura carnosæ est, nam pars alia quæ uel instrumentalis uel sensibilibus sit, nulla omnino percipitur: color tethyis aut pallidus aut rubidus est. Tangentium manus qualitate quadam ita afficiuntur, ut uix elui possit. Generantur in rimis aut cauernis saxorum, maxime uero in creta, & lientibus quæ phycoalgæ uel marinae abundant. Inueniunt & in musco marino, aut alius in herbis foliosis marinis. Præstantissima in Scyryna Asiæ: in Hægypto nulla inueniuntur. plurimum dant alimentum, renibus proferunt & stomachicis, tenuissimæque patientibus atque ischiadicis. Latens doloris leniunt tethya similia ostrea in cibo sumpta: torminibus & inflammationibus succurrunt: rachitidis quorum corpus macie confectum, tethya uisita sunt cum ruta ac melle.

Vertibulum.

Callus.

1 In his tethya, &c. Theodorus modo uertibulum uertit, modo callus. 2 Hæ (ut zoophyta alia) inter testacea numerat Aristoteles, non quod testa includuntur scilicet: sed (ut eadem artæror) quia minimum habent & sensus & moris, quemadmodum testacea. Propterea nihil dum inter se continent, quod aut osseum aut cartilagineum sit, sed molles peritus sunt omnibusq; similia à limbo solo habent ut testacea: adeoque testacea natura similita. Et quidem Plinius tethya ostrea similia dixit. 3 Inueniuntur

A. acinacae & in mulo marino, &c. lauentur terhya, inquit Plinius, in follis marinis fuprens, fungorum uerius genus quàm piscium. 4. Tenaſmūque panentibus, &c. Eadem & tenaſmum deſoluant, remūque uris, inquit Plinius.

De holothurio, ſtella, & pulmone marino. Cap. CCXLIX.

QUz holothuria uocantur, non ut teſhya adherendo, ſed abſoluta ui-
uunt: mouere tamen ſe nequeunt, ſicuti nec oſtrea uiuunt quidē ſine
ullo ſenſu, perinde ut plantæ abſolute (ut epipetron): ut eadem
ſorte ſit natura quæ fruticibus, à quibus parum differunt, ſua ſcilicet abſolu-
tione. Quæ ſtella uocatur, neque animal perfectum, neque plantæ, ſed am-
bigit atque ancipiti eſt natura, quæmadmodum & urtica. Forma eius ſtel-
la, adq.
lis quæ pinguntur, ſimilis eſt. Parua admodum caro eſt illi intus, extra du-
riore callo. Conchas aggregata eas exugit, omnimq; cibum ſtatim peragit:
adcoque natura calida eſt, inquit Ariſtoteles, ut omnia in mari cõtacta de-
coquant & adurat. Draconis marini ſcorpionūque ichas caribus earum
impoſitisatem araneorum morſus ſanantur. In ſumma, contra omnia ue-
nena uel potu uel icha uel morſu noxia, ſuccus earum ex rure decoctarum
efficaciſſimus habetur. Inter hæc & pulmo naturam habet pene ſuævis:
ſponte enim ptouenit, atque abſque ullo ſenſu: non tamen adherendo,
ſed abſolute, perinde ac plantæ abſoluta. Pulmo marinus recens, tritus at-
que illitus, podagris perſonibusque auxiliatur: atque pulmonem ma-
rinum decoctum in aqua calculolis prodeſſe eporum. Pulmonas marini ci-
nis adalligatus egregie mulierum profluua purgat.

C. 1. Quæ holothuria, &c. Tubera uocat Theodoſius. 2. Conchas aggregata eas exugit: Quæ inducitur aliſua in exugendo oſtrea, legas apud Oppianum. 3. Inter hæc, &c. Halipleumon, an falſus, eſt apud Plinium lib. 31.

De urtica.

Cap. CCL.

URTICA item ancipiti natura eſt, ambigens & plantæ & animalis. Nulla
huius teſta, ſed corpus omne ex parte carnem præ ſe fert: urtica etenim
ipla quaſi interna oſtrearum caro eſſe uidetur. Senit & manum admodum
corripit: adhæreſcitq; perinde ac polypus ſuis brachijs. Atque dum admo-
ueri ſibi manum ſenit, colorem mutat, inquit Plinius, & contrahitur. Os
medio in corpore cõinet: hoc in maioribus urticis euidentius eſt & de ſaxo
D. quali de teſta uiuit: & ſi forte in eam inciderint piſciſculi, eos excipit, reti-
nēque atque in hunc modò deuocat quæcunq; naſta eſt efculenta. Hæc
Ariſtoteles. Plinius, Contrahitur urtica ſe, inquit, quæmaxime rigens, ac
permatante piſciſculo ſronde ſuam ſpargit: (carnote nanque ſrondis his na-
tura) complectēſque deuocat: talis marcenti ſimilis, & iactari ſe paſſa alge-
uice, cõtactos piſces attrituque petra ſcalpentes prurientem inuadit. Ex-
crementum nullum in urtica eſſe conſpiciunt: ſed in hac re ſimilis ſturpibus
eſt. Maiores tamen in eam, ut oſtrea, quo excrementum ſecodat, reuiem
ſcilicet fiſſilam habet parte ſuperiore. urtica enim ipli, uti modo diximus,
quaſi interna oſtrearum caro eſſe uideatur: ſaxo uero utitur perinde ut teſta:
ſaxo enim adherere more nõnullorum teſta intercoarum ſolet urtica: & ta-

Co. ij

men quories libeat absolui, absolutumque uagari quoddam urticarum ge-
 nus notatum est, quod & echinos & pedunculos in quos offenderis, corro-
 dit. Quæ enim in cauis sinuosisque adherent, nunquam à facis absoluun-
 tur: quæ uero in latorum planis marginibus uiuunt, absolute scilicet us-
 gantur. Duplex genus percipitur urticarum: alterum corpore paruo, quod
 cibo aptum est: alterum manu sculo durior, quale circa Euboræ Chalcidem
 gigni scimus. Sunt omnes hybernis mensibus carne constanter atque rigi-
 diuscula: quamobrem per id tempus capiuntur, ciboque idoneæ sunt. At æ-
 stare deteriores fiunt: præmadent enim & marcescunt, ut si teneris, facile dis-
 cerpantur atque dispercant. Denique nulla tantisper euelli integra potest:
 ac æstus impatigria, sata labire interius solent. Vincis idem gignendi mo-
 dus est, atque iis quæ resta includuntur. Mordent urticæ non ore, sed tactu
 totius corporis: uis enim in his præter mordax, eademque quæ terrefactis
 urticæ. Urtica (ut auctor est Dioscoridus) & uentri & stomacho grata est, al-
 uum atque urinam ciet, paruique nutritur: nero Xenocrates tradit, urti-
 cæ gustu suaves, sed stomacho admodum ingratae sunt. Assæ elixis ad aluū
 mouendam magis idoneæ: quæ lapillis adherent, urinam magis cienti: quæ
 passo aut uino mullo condiuntur, facile concoquantur, aluūque mouent:
 quæ autem coquantur in passo unā cum oleo, lubricum quidem illud reti-
 nent, aluūque cienti: sed uentrem replent, & difficulter in uentriculo con-
 fiuntur. Urticam marinam in uino potam calculosis prodesse aiunt. In
 oleo coquantur urticæ: quo ne poli renascuntur, nonnulli sunt usi.

De spongia.

Cap. C C L I.

G

Spongia
quæ est.

Spongia nullam habet carnem, sed similis omnino plantis est: præsertim
 cum adhaerendo tantum uiuere possit, absoluta uero minima. At paruo
 aliquod discrimen est. Spongia namque sensum aliquem habere creditur,
 argumento quod multo difficilior abstrahuntur, nisi clanculum agatur, ut
 aiunt. Præterea ad auium accessum contrahitur, ita ut euelli difficile sit
 quod idem etiam faciunt quories flatus tempestisue urget. Plinius, Spon-
 giam, inquit, animal esse docuimus, croore petris inhaere neg. Aliqui narrat
 & auditu regere, contrahique ad sonum, exprimentes abundantiam hu-
 moris, nec auelli petris posse, ideo abscindi & sanem emittere. Quin & eas
 quæ ab aquilone sunt genitæ præferunt cærenæ: nec usquam diutius durare
 spiritum medici affirmant: sic & prodesse corporibus, quia nostrū suo mi-
 scant: & ideo magis rectes magisque humidas, sed minus in calida aqua,
 minusque unctas, aut unctis corporibus impositas: & pusillas minus adha-
 rescere. Oppianus quoque tradit, à spongiæ euellis distillare sanem, quæ si
 spongiatoris sorte naribus adhæreat, sepissime hominem suffocat. In laro-
 rum rimis & caneris oriuntur spongiæ, non aliter atque ea quæ tellis in-
 tecta sunt. Aluntur conchas, pisces, limo. Et uiuere spongiæ elca manifesto
 conchas in his reperit: ostendunt: & apertis claudendoque pisciculos ca-
 pit spongia. aperit autem antequam ingrediantur: claudit & contrahit cū
 ingressi sunt. Adhæret nec parte una nec toto: inter sunt enim fistulæ quæ-
 dam

- A**dam inanes) sed pluribus passim particulis hæsitæ, & quasi membrana ex-
tenta subellæ radicibus earum uidetur. Superne autem cæteri meatus con-
creti propemodum latent. At uto inferne quæterni aut quinquagenti, per
quos pasci existimantur. Color illotis unûsque nigricans est: candidæ autē
cura sunt. Spongiarum tria genera accipimus: sunt namque alie rariæ, alie
spissæ, alie quas nominant achallæ. In genere illo spisso quæ prædure sunt
atque asperæ, tirci nomine tragi nuncupantur: minus spissum & mollius
manos. Tertium quod achallæum vocatur tenuissimum & spississimum &
2 validissimum est. Genus hoc inuentu perquam rarum est. Ex hoc penicilli.
3 Mollissimum uero genus spongiatum penicilli. Trogius author est penicil-
los mollissimos circa Lyciam nasci in alio, unde ablatæ sunt spongiæ. Si e-
nim eueniret forte ut spongia cum euellitur, abtumpatur, relicto item na-
scitur & completur. Magnitudine amplissima sunt solo ut illæ & raræ spō-
gusæd mollissimæ spissæ & tenuissimæ, quæ scilicet altis tranquillisque na-
scentur gurgitibus: flacus enim ac tempestates, spongiæ quoque ut cætera
alutia, reddunt duriores, & incrementum impediunt. Genus item aliud est,
quod nomen aplysiæ inde accepit, quod elui non possit: habet hoc amplio-
res illos meatus, sed reliquo corpore densum est: nihilo tamē densius quàm
quæ ante numeravimus genera, quanquam lentius est, & ex toto palmotum
similis: pessimum omnium hoc genus est. Sensem id genus habere dūque
uiuere intet omnes præcipue conuenit: cognosci præ cæteris spongiis cō fa-
cile potest documento, quod cum illæ albicent, limo inter laundum subsi-
Cdense, ad semper nigrorem ostendit. Quidam spongiæ ita distinguunt, a-
lias ex his mares existimauere tenui fistula spissiorēque: quarum quæ du-
riores sunt, tragos appellant: alias firminas, maioribus fistulis ac perpetuis. Trogius.
Medici inscitta quadam ad duo nomina eas redegere: Africanas, quarum
firmius sit robor. Rhodiacasque, ad fouendum molliores. Nunc autē mol-
lissimæ circa maros Antiphele urbis reperiuntur. Spongia noua non sicut
lana aut linamentum materia duntaxat est, qua applicantur medicamenta
ad irrigationes idonea, sed & manifeste deficcet, uulneraque enzima con-
glutinat: si noua sit, & maris odorem adhuc referat: si eam cum aqua aut
uino aut posca pro corporis ratione imponas. Quod si uetus sit, & maris
odorem amisserit, non itaque deficcit immo inutile esse sentit Dioscorides.
D Mollissimum genus earum penicilli oculorum tumores leuant ex multo
impositicem abstergendæ lipitadini utilissima. Imponuntur spongiæ ipsæ
epiphonis ex posca: ex aceto calido ad capitis dolores. De cætero recetes dis-
cutiunt, molliant, mitigant: ceteres conglutinant uulnera, inquit Plinius.
Vtus earum ad abstergenda, fouenda, operiēda à foris dum aliud impona-
tur: alia quoque humida & sensilia impositæ siccant. Fracturæ & uulne-
ra spongiis utilissime fouentur: sanguis capitur in secando, ut curatio per-
spici possit. Et ipsæ uulnerum inflammationibus imponuntur, nunc sicce,
nunc ex aceto insperis, nunc è uino, nunc ex aqua frigida: ex aqua uero ex-
lesia impositæ, scdta recentia non patiuntur inrumescere. Imponuntur &
insegris partibus, sed fluxione occulta laborantibus quæ discutienda sit: &

lis, quæ apostemata vocant, melle decocto peractis. Item articulis aliis aceto salso madidatis, aliis è posca, in vulnera oratione & succida laxe incem implent. Differentia hæc, quod laxe emolliant, spongia coarctent, rapiuntq; vitia ulcerum. Circumligantur & hydropici sicca, vel ex aqua tepida poscæ. Imponuntur & his morbis quos vapotari oporteat, feruenti ex aqua persusa expressaque inter duas tabulas. Sic & imponitur stomacho prolant, & in febrî contra nimios ardores. Sed splenetici è posca, ignibus lactis ex aceto imponi oportet sic, ut sanas quoque partes spatioso operiat. Livorem ab ictu recentem ex aqua salis calida sepius mutata tollunt: testum tumorem doloremq; ex posca. Sanguis uisus acris est, uimq; habet digerendi. Cum bitumine aut pice cremata, sanguinis eruptiones in vulneribus cohibet, præsertim si feruens apponatur. Aliqui raras tantû ad hoc cum pice utunt: F& oculorum causa comburantur in cruda olla figulina operis, plurimum proficiente eo cinere contra scabritias genarum, excreta cæque carnes, & quicquid opus sit ibi destringere, spissare, explere: uelut in eo usi hanc cunctem.

1. Quod multis difficilior, &c. Quæstio cum difficultate, quamvis periculo colligantur spongiae & quibus modis assiluntur, ostendit Oppianus lib. 4 de piscibus. 2. Tenuissimum, uelut in forasle (minutum) uisum potuisset: quoniam Plinius tenues etiam dixit, uel assiluntur tenuissimâ, id est, tenuibus fistulis, ut legitur apud Dioscoridem assilunt. 3. Ex hoc periculi. Ex hoc spongarum genere debant periculi uulnera, quibus scilicet uulnera alioquin stipabant abspergebantque, ut clauissime explicat Plinius in Rudere. Ego iam te hac inde, quasi periculus nomen exgeret, in hunc amens, exagebo quicquid humoris tibi est.

Epilogus seu caput C C L I L

Phrygionia.

Hesper.

Protogæstia.

Tergæstia.

Sivulug.

Nolæ.

P Ræter hæc quæ diximus animalia, sunt peragenda aliqua reatu indigna, & ægis potius annumeranda quàm animalibus. Chrysippus quoque phalosophus tradidit phrygionem adalligatum remedio esse quartanæ: quod esset animal, nec ipse descripsit, nec nos inuenimus qui nouisset. Hæpes quoque animal à Grecis uocatur quo præcipue sanantur quartæq; serpunt. Protogæstia animalia sunt Indica, quæ gustû habet acutissimum. Tergæstia animalculum quod lictas uilloræ concutiat. Hæc dantaxat nominare auctores sicuti & siuulug, quod nec quale esset animal, nec ubi nasceretur, tradiderunt. Et Euphronon in commentariis scriptum reliquit, H in Samo bestias olim fuisse feræ maxime magnitudine nomine neades, quarum sola uoce terra discorderetur: ossa maxima, uel sua ætate extitisse. Sunt etiam in mari nonnulla animalia effigie insolenti & sui generis: quæ quoniam inuentu rara sunt, consilui in genus non possunt. Iam etiam piscatores uidisse se reuertunt quædam trabunculus proxima, pullo colore, peteti figura, pan ex toto crassamento. Item alia scurosum effigie, colore rubeo, pinnulis crebris. Ad hæc alia quæ genitale uisum imitarentur, cum specie, rursû in agnitudine, sed pinnis subiectis hanc loco testum. In magnitudine imitibus multa apparent animalium generâ, quæ ante uel nunquam uel raro uisa fuerint. His igitur missis satis admonuisse salte uideo, quæ de animalium

animalium

Animalium differentiis ab Aristotele, Dioscoride, Plinio, Galeno, aliisque veterum multis sunt docta. neque enim omnia in hunc librum transferenda censui, quæ ab illis accuratissime sunt scripta. Tantum uero de singulis solum dixi, quantum legentis ad antiquorum evolvenda scripta, nisi sint omnino rudes aut averti, excitet: ac quo facilius cum his uersentur, auxiliū præstet

1 Ad hæc alia quæ genitale. Est piscis nomen, inquit Hermolani, ædeon, quod ætænos genitale nescipamus manum, à nomine hælcyonem græce dictum. Quamquam hælcyonem sunt qui pro calyculino pisce capimus. *hælcyon* quoque *hælcyon*, *ædeon* uocant Epicharmus, et Nicander tradide.

Ædeon.
hælcyon æ-
hælcyon.
Genitale æ-
cyonem.
hælcyonem.
hælcyonem.

τὸ αἰὲν ἄνδρ.

IMPRIMEBAT MICHAEL

Vasconius Lutetiae Parisiorum,

Ann. M. D. LI.



ANIMALIVM, QVAE IN HOC OPERE CON-
TINENTVR NOMENCLATVRAE ET INDEX.

31

ET INDEX

[illegible]

ANIMALIUM NOMENCLATURAE

Canis Medus	60.f	Cantharides mannae	173.c	caprae	190.f
Canis Melmenis	61.e	Cantharides	173.a	Cervinae	190.d
Canis Melmenis	ibidem	Cantharides	173.c	Cervinae	190.e
Canis Melmenis	59.f	Cantharides	173.c	Cervinae	ibidem
Canis Melmenis	59.f.60.g.h	Cantharides	ibidem	Cervinae	67.a
Canis Melmenis	60.f	Cantharides	72.a	Cervinae	191.a
Canis Melmenis	ibidem	Cantharides	191.b	Cervinae	ibidem
Canis Melmenis	59.f	Cantharides	68.e	Cervinae	191.c
Canis Melmenis	60.f	Cantharides	210.e	Cervinae	191.d
Canis Melmenis	60.f	Cantharides	100.b	Cervinae	ibidem
Canis Melmenis	60.h	Cantharides	100.h	Cervinae	ibidem
Canis Melmenis	61.a	Cantharides	18.g	Cervinae	ibidem
Canis Melmenis	60.g	Cantharides	ibidem	Cervinae	79.c
Canis Melmenis	84.g	Cantharides	102.g	Cervinae	81.a
Canis Melmenis	192.b	Cantharides	ibidem	Cervinae	79.h
Canis Melmenis	192.b	Cantharides	192.a	Cervinae	123.f
Canis Melmenis	192.b	Cantharides	192.e	Cervinae	ibidem
Canis Melmenis	192.a.192.b	Cantharides	192.d	Cervinae	ibidem
Capella quadrupes	78.e	Cantharides	126.e	Cervinae	148.a
Capella auis	118.d	Cantharides	81.a.b	Cervinae	191.b.c
Capra	78.e	Cantharides	ibidem	Cervinae	142.d
Capra	160.e.d.169.f	Cantharides	ibidem	Cervinae	ibidem
Capra	77.b	Cantharides	102.a	Cervinae	191.b
Capra sylvestris	79.a	Cantharides	ibidem	Cervinae	ibidem
Capra ferre	ibidem	Cantharides	100.d	Cervinae	ibidem
Caprae	ibidem.b	Cantharides	122.e	Cervinae	72.h
Caprae	79.d	Cantharides	102.a	Cervinae	123.g
Caprae	118.d	Cantharides	ibidem.b	Chalcid	162.f.g.170.h
Caprae	ibidem	Cantharides	116.d	Chalcid quadrupes	74.e
Caprae	197.b	Cantharides	118.e	Chalcid auis	121.a
Caprae quadrupes	84.g	Cantharides	181.d.g	Chalcid pifcus	162.e.f
Caprae quadrupes	33.h	Cantharides	100.b	Chame	115.b
Caprae quadrupes	169.f	Cantharides	146.e	Chame leos	ibidem
Caprae	109.g.110.e	Cantharides	100.b	Chame glycymerides	129.e
Carabus carabicus	191.a	Cephalus	193.b.f.g.h.160.d	Chame pelorides	ibidem
Carabus emflatus	104.e	Cephalus fluminalis	160.e	Chameleo	95.e
Carabus emflatus	51.b	Cephalus fluminalis	193.b	Chameleo	ibidem
Carabus	146.e	Cephalus fluminalis	ibidem	Chameleo	90.d
Carabus	109.f	Cephalus fluminalis	ibidem	Chameleo	197.e
Carabus	106.d	Cephalus fluminalis	ibidem	Chameleo	ibidem
Carabus	105.f	Cephalus fluminalis	183.e	Chaonides canes	69.a
Carduelis	126.g	Cephalus fluminalis	178.e	Charax	193.g
Carduelis	ibidem	Cephalus fluminalis	181.d.g	Charadrius	129.f
Carduelis	106.h	Cephalus fluminalis	129.f	Charadrius	ibidem
Canis	169.b	Cephalus fluminalis	ibidem	Charadrius	145.d
Canis	103.b.106.h	Cephalus fluminalis	18.g	Charadrius	ibidem
Canis	106.h.128.b	Cephalus fluminalis	ibidem	Charadrius	ibidem
Canis	107.a	Cephalus fluminalis	193.a	Charadrius	144.d
Canis	ibidem	Cephalus fluminalis	100.b	Charax	62.h
Canis	71.h	Cephalus fluminalis	ibidem	Charax	197.e
Canis	129.d	Cephalus fluminalis	194.d	Charax	91.h
Castor	70.a	Cephalus fluminalis	126.e	Charax	69.g
Castorides caprae	59.g	Cephalus fluminalis	197.e	Charax	125.b
Castoria	ibidem	Cephalus fluminalis	18.d	Charax	192.g

ET INDEX.

χελιδόνες ποσειδονίας	100.h	Cicada frumentaria	ibidem	κόχλια	ibidem
χελιδόνες θηλαίας	ibidem	Cicada Aucularia	ibidem.f	Cochlea	132.f
Chelidonia lepus	67.h	Cicada maritima	ibidem	κόχλια	132.g.h
Chelidonia plicata	115.b	κόχλια	137.b	κόχλια	ibidem
χελιδόνες	91.d	κόχλια plicata	137.a	Cochlea semicircularis	130.d
χελιδόνες ποσειδονίας	91.d	κόχλια	137.b	κόχλια	ibidem
χελιδόνες θηλαίας	91.e	Cicindelidae	133.f	Cochlearia	ibidem
χελιδόνες ποσειδονίας	ibidem.h	Ciconia	139.g	Cochlear canaliculata	ibidem.c
χελιδόνες ποσειδονίας	91.f	Ciconia montana	139.g	Cochlearia repens	ibidem.d
Chelonophagi	100.d	Ciconia	135.b	Cochlearia candida	ibidem
χελιδόνες	139.b	Ciconia	137.a	Cochlearia longa	ibidem
Chelydron	98.d	Ciconia agrestis	ibidem.b	Cochlearia	ibidem
χελιδόνες	135.d	Ciconia e. malina	ibidem.d	Cochlearia	131.f
χελιδόνες ποσειδονίας	ibidem.c	Cinclus	139.c	Cochlearia	140.g
χελιδόνες	ibidem	Cinereus Tetragnathus	137.e	Cochlearia phalaenopsis	ibidem
χελιδόνες	135.d	Cinnamomum	134.h	Colas	132.f
χελιδόνες ποσειδονίας	ibidem.c	Cinnamomum	ibidem	Colas	132.f
χελιδόνες	137.f	Cinnamomum	ibidem	Colas	132.g
χελιδόνες	132.c	κόχλια	62.c.130.h	Colas	ibidem
χελιδόνες	132.h	Circus quadrupes	130.c	Colas	132.h.137.a
Chenopodex	ibidem	Circus	130.h	Colas	ibidem
Chenopodex	135.c	Circus	133.f	Colas	132.g
Chenopodex	91.b	Circus	135.b	Colas	132.h
Cheridonia	97.g	Circus	ibidem	Colas	134.h.135.b
χελιδόνες	79.c	Circus	130.g	Colostrum infans	91.a
χελιδόνες	ibidem.d	Circus	ibidem	Colostrum	94.g.95.a
Chirostylus	69.g	Circus	ibidem	Colostrum	ibidem
χελιδόνες	133.a	Circus	ibidem	Colostrum	8.d
Chlorous	135.c	Cichlasia	ibidem	Colostrum	ibidem
χελιδόνες	137.g	Cichlasia	135.g	Coluber	98.d
Chloron	132.f	Cichlasia	136.h	Colubra	ibidem
χελιδόνες ποσειδονίας	94.b	Cladonia	132.c	Colubus	135.b
χελιδόνες ποσειδονίας	93.e.g	Cladonia	135.e	Columba	ibidem
χελιδόνες	84.f	Cladonia	139.c	Columbarum	134.b
χελιδόνες ποσειδονίας	135.f	Cladonia	170.e	Columba agrestis	135.c
Chordus	79.g	Cladonia	181.b	Columba agrestis	ibidem
Chremes	134.b	κόχλια	ibidem	Columba domestica	ibidem
χελιδόνες	ibidem	Cladonia	135.c	Colostrum	132.e
χελιδόνες	ibidem	Cladonia	132.d	Colostrum	ibidem
Chromops	ibidem	Cladonia	132.e	Colostrum	130.a
Chromops	135.b	Cladonia	137.a	Colostrum	132.h
Chrysolites	139.h	Cladonia	136.d.137.e	Colostrum	135.g
χελιδόνες	136.g	Cladonia	135.h	Colostrum	ibidem
Chrysolites lepus	62.c	Cladonia	130.h	Colostrum	135.b.c
Chrysolites plicata	136.h	Cladonia	ibidem	Colostrum	ibidem.b
χελιδόνες ποσειδονίας	136.g	Cladonia	ibidem	Colostrum	ibidem.c
χελιδόνες	136.f	Cladonia	ibidem	Colostrum	ibidem.b
χελιδόνες	136.f	Cladonia	130.d	Colostrum	137.d
Ciboria	131.h	Cladonia	ibidem	Colostrum	130.a
κίβωρος	ibidem	Cladonia	ibidem	Colostrum	136.f
Cicada	130.a	Cladonia	137.f	Colostrum	134.b
Cicadastrea	ibidem.d	Cladonia	137.f	Colostrum	138.f
Cicadastrea	ibidem.c	Cladonia	137.f	Colostrum	138.f
Cicada fuscularia	130.d	Cladonia	137.f	Colostrum	138.f

ANIMALIVM NOMENCLATVRAE

[illegible]

ET INDEX.

Dracena	101.g	Elegnus	170.d	Equus marinus	173.f
Draco manius	ibidem	Eleas	170.d	Euca	181.g
Draco nerus	ibidem	Eleas	171.b	Eucacorus	181.g
Draco Epodaninus	ibidem	Eleas	ibidem	Eucacorus testaceus	ibidem
Dracunculus piscis	108.g	Elephas	106.f	Euphor	79.d
Dracunculus uermis	106.a	Elephantus	ibidem	Eurhrotaon	115.c
Dracunculus	ibidem	Elephantus marinus	108.f	Eurhrotaon	115.d
Drepanis	113.g	Elephantus	173.b	Eurhrotaon	115.g
Dromadus quadrupes	82.f	Elephantus crassus	104.b	Eurhrotaon	ibidem
Dromadus	ibidem	Elcatus	170.c	Eurhrotaon	117.f
Dromadus	140.c.173.f	Ellops piscis	104.g	Eurhrotaon	ibidem
Dromadus	ibidem	Ellops	105.g	Eurhrotaon	ibidem
Dromadus	173.a.e	Ellops	ibidem.b	Eurhrotaon	113.a.b.c
Drymus	108.d	Ellops	106.a	Eurhrotaon	ibidem.c
Drymus	115.f	Ellops	101.f	Eurhrotaon	ibidem
Drymus	116.b	Ellops	104.g	Eurhrotaon	117.g
Drymus	117.f	Ellops	ibidem.c	Eurhrotaon	117.g
Drymus	ibidem	Ellops	103.b	Eurhrotaon	ibidem
Drymus	ibidem	Ellops	108.g	Eurhrotaon	ibidem
Drymus	177.g	Ellops	109.f	Eurhrotaon	117.g
E		Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Eale	81.g	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	149.b	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	81.a	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	69.c	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	79.d	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	99.d	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	69.d	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	14.b	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	66.c	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	113.d	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem.h	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem.f	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	110.c.d	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	113.a	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	148.b	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	161.f	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem.h	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	111.f	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	1.c	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	167.g	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	79.c	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	101.f	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	105.b	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	117.c	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	118.d	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g
Echeneis	ibidem	Ellops	110.f	Eurhrotaon	117.g

ANIMALIVM NOMENCLATVRAE

Fringillago	127.d	Gallina secunda	120.f	Graculus alix	124.h
Fringillanus	122.e	Gallina Hadnana	ibidem	Graculus pifcis	128.e.g
Fringilla	123.a	Gallinago	127.g	Graculus pector	76.d
Fuca	129.e	Gammarus	105.e	regius	28.f
Fucus	128.c	Genale	124.b	regulus	105.a
Fucus vespertinus	129.g	Gans	121.f	Gnaphes	129.c
Fulica	129.f	Gans	ibidem	rela	ibidem
Felix	ibidem.f	Gans	126.c	Gomphana	129.f
Fulio pifcis	120.a	Gans	129.f	Gnus	ibidem.f
Fulio scarabeus	122.b	Genale	127.h.g.128.c	Gnomonius	128.a
Fulio aquila	129.f	Genale	121.b	Gryllus pifcis	128.f
Fur	128.f	Genale	129.b	Gryllus infolium	128.d
Fufanus pifcis	129.f	Genale maritima	120.a	Gurgulo	127.b
Fulca cornu	124.g	Genale	129.c	Genale	129.g
	G	Genale	129.d	rela	ibidem
rela	125.h	Genale	29.g	Gynol	24.g
rela	129.e	Genale	129.d		
Galba	124.e	Gibba squilla	127.a	H	
Galba quadrupes	68.a	Gibba pifcis	127.a	Hadriane gallina	120.f
Galba pifcis	146.a	Gibba	89.a	Hamasopus	121.b
Galba aquila	68.c	Gibba	129.a	Hamasopus	120.f
Galba genale	ibidem.a	Gibba	128.d	Hamasopus	ibidem
Galba	146.b.127.h	Gibba	129.b	Halcode	128.d
Galba	146.b	Gibba	69.a	Halcyon	ibidem
Galba	ibidem	Gibba	124.a.129.a	Halcyon	ibidem
Galba	ibidem.f	Gibba	129.e	Halcula	128.f.g
Galba canala	ibidem	Gibba	129.g	Halcula	ibidem.g
Galba genale	146.e.d	Gibba	ibidem	Halcula	127.h.129.a
Galba	127.h	Gibba	129.a	Halcula	129.g
Galba	24.g.129.a	Gibba	121.a	Halcula	ibidem
Galba	146.b	Gibba	ibidem.b	Halcula	128.c
Galba	ibidem	Gibba	69.d	Halcula	127.h
Galba	127.a	Gibba	129.f	Hamasopus	120.d
Galba	121.a	Gibba	ibidem	Hama	129.f
Galba	147.a	Gibba	129.c	Halacatus	127.g
Galba	ibidem	Gibba	ibidem	Haladema	120.d
Galba	126.g	Gibba	ibidem	Halops	124.g
Galba	129.h	Gibba	69.a	Halops	ibidem
Galba	129.g	Gibba	120.b	Hamasopus	129.d
Galba	ibidem	Gibba	129.d	Hamasopus	124.f
Galba gallinacea	ibidem	Gibba	129.h	Hamasopus	128.b
Galba Tanagra	120.f	Gibba	129.b	Hamasopus	129.a
Galba	129.a	Gibba	120.g.h	Hamasopus	121.b.129.c
Galba	120.f	Gibba	ibidem	Hamasopus	124.d
Galba Chalcedon	ibidem	Gibba	ibidem.b	Hamasopus	129.e
Galba Medea	ibidem	Gibba	129.c	Hamasopus	69.a
Galba Melba	ibidem	Gibba	ibidem.a	Hamasopus	120.g
Galba	129.g	Gibba	121.a	Hamasopus	129.g
Galba	ibidem	Gibba	129.f	Hamasopus	129.f
Galba	ibidem	Gibba	ibidem	Hamasopus	129.f
Galba	ibidem	Gibba	77.f	Hamasopus	129.f
Galba	129.c	Gibba	ibidem	Hamasopus	129.f
Galba Africana	ibidem	Gibba	71.e	Hamasopus	129.f
Galba Numidra	ibidem	Gibba	120.h	Hamasopus	129.f

ET INDEX

[illegible]

ANIMALIVM NOMENCLATVRAE

[illegible]

ET INDEX.

φάσκαβελος μαρίνα	172.f	Phycus	ibidem	Platanus	186.f
φάσκαβος παπilio	173.c	Phycus	170.d	Platycecus	80.g
Phalangium	186.d	Phycis pulcin	ibidem.c.f	Plecti	162.b
φάλαγγος	ibidem	Phyzox	172.h	Phlox	148.a
Phalangus	ibidem	φύσος	ibidem	φάλαγγος	160.c
Phalang	ibidem	Phyzilum pulcin	171.a	φάλαγγος	118.b
Phalangopodigenia	187.d.g	φύσος αετός	173.a	φάλαγγος θαλάσσιος	ibidem
Phalangia legumini	188.f	Phyzurus	170.d	Perphagus	38.h
Phalaris	113.h	Pica	149.g	πελάγος	2.a
φάλαγγος	111.c	Pica, ad est Gryphus	146.b	πελάγος πύξος	161.c
Phalaris	113.h	Picus major	145.b.146.b	πελάγος αυτί	116.f
Phalerica	161.f	Picus arboreus	145.c	πελάγος πύξος	146.h
φάλαγγος αφύς	ibidem	Pinna	116.c	πελάγος φάλαγγος	17.h
Phango	113.a	πίνα	ibidem	πελάγος φάλαγγος	2.b
φάλαγγος	114.d	πιννοφάλαγγος	ibidem.d.f	Polygus	139.d
Phaladon	113.g	Pinnoter	106.g	πολύγυς	ibidem
Phalana	113.d	πιννοφάλαγγος	ibidem	Polypt. eum	20.c
Phasianus	ibidem	Pinocci Plinij	106.c.g. 116.d	πολύγυς φάλαγγος	13.c
Phasianum	ibidem	πιννοφάλαγγος	ibidem.g	πολύγυς coebles	110.d
φάλαγγος	111.a	πιννοφάλαγγος	ibidem	Pecilio	46.c
φάλαγγος	114.d	Pipha	111.d	Pompilius	164.c. 100.g
Phataga	91.d	Pipo	116.d	Porca	83.b
φάλαγγος	110.a	πίπας	ibidem	Porcus quadrupes	84.f
Philomela	127.f	Piscus	116.c	Porcus pulcin	161.c
φίλι	110.a	Piscus facer	113.a	Porcus marinus	ibidem
Phocena	172.d	Piscus pelagij	161.a	Porcus fluminalis	ibidem.g
Phenicopterus	119.b	Piscus laxus	141.b	πόρκος	65.d
Phonix	134.f	Piscus trochilus	ibidem	πορκος φάλαγγος	1.b
φόνιξ	ibidem	Piscus trochilus	139.f	Poenops	121.f
Phonix pulcin	166.b	Piscus trochilus	140.f	πορκοφάλαγγος	111.a
φονοφάλαγγος	127.g	Piscus trochilus	ibidem	Porphyrio	110.a
Phox	119.f	Piscus trochilus	141.a	πορφοφάλαγγος	ibidem
φάλαγγος	114.d	Piscus trochilus	ibidem	Porphyrio	ibidem.c
φάλαγγος	16.h	Piscus trochilus	ibidem	Porphyrio	101.d
Pholis	160.d	Piscus trochilus	ibidem	πόρκος	75.b
φάλαγγος	ibidem	Piscus trochilus	ibidem.d	πορκοφάλαγγος	163.g
φάλαγγος	178.f	Piscus trochilus	147.d.e	πορκοφάλαγγος	167.g
Phoxinus	169.h	Piscus trochilus	140.d	πορκοφάλαγγος	167.c
Phryganio	119.g	Piscus trochilus	170.c	πορκοφάλαγγος	ibidem
φρυγανίος	121.a	Piscus trochilus	165.c	πορκοφάλαγγος	ibidem.c
φρυγανίος	91.g	Piscus trochilus	171.a	πορκοφάλαγγος	113.c
φρυγανίος	ibidem.c.d	Piscus trochilus	113.a	Pustil	100.a
φρυγανίος	ibidem.e	Piscus trochilus	ibidem	πορκοφάλαγγος	ibidem.b
φρυγανίος	ibidem.h	Piscus trochilus	172.h	πορκοφάλαγγος	172.h
φρυγανίος	ibidem	Piscus trochilus	172.h	πορκοφάλαγγος	164.b
φάλαγγος	196.d	Puyocampe	119.f	πορκοφάλαγγος	172.h
φάλαγγος	ibidem	Plancus	ibidem	Pustil	ibidem
φάλαγγος θαλάσσιος	ibidem.g	Plangus	ibidem	πορκοφάλαγγος quadrupes	71.d
Phoca	147.g	Plata	111.f	πορκοφάλαγγος marinus	171.f
Phycen	ibidem	Platanus	169.d	Prothopoda aut	131.c
φύκος	ibidem	πλάτα	117.h	Protopoda	119.g
Phycis	ibidem	Plata	111.f	φύκος	80.a
φύκος	ibidem	Platycos	117.h. 166.g	φύκος	163.f

ANIMALIUM NOMENCLATURAE

Aspidotus	109.f	Rala bellina	ibidem.e	Rubeta rosea	ibidem
Aspidotus	118.e	Rana	92.f	Rubecula accipiter	112.e
Aspidotus	ibidem	Rana	103.e	Rubetra	119.h
Aspidotus	189.h	Rana flammula	ibidem.g	Rubecula	118.a
Aspidotus	190.d.f	Rana aquatica	ibidem	Ruminans	121.h
Aspidotus	190.d	Rana lucaria	ibidem.h	Rupex	129.f
Aspidotus	124.f	Rana palustris	93.e	Rupicapra	79.h
Aspidotus	ibidem	Rana rubra	ibidem.d	Rustica perdix	117.a
Aspidotus	ibidem	Rana montana	ibidem.f	Rusticula	ibidem
Aspidotus	ibidem	Rana viridis	ibidem	Ruscilla	118.a
Aspidotus	190.e.d	Rana leucis	ibidem.g	Sacer	102.g
Aspidotus	191.e	Rana Dryphytes	94.f	Sacer serpentis	102.g
Aspidotus	191.e	Rana Diopetes	ibidem	Sacer agri	77.g
Aspidotus	191.b	Rana Callamoc	ibidem	Sacer piscis	119.a
Aspidotus	191.b	Rana ex arbore uociferans	ibidem	Sacer	84.g
Aspidotus	191.b	ibidem	ibidem	Sagittarius piscis	119.a
Aspidotus	191.b	Rana piscatrix	145.a	Salamandra	97.a
Aspidotus	186.d	Rana marina	ibidem	Salar	169.e
Aspidotus	190.a	Rana uermis	194.e	Salmo	ibidem.d
Aspidotus	171.a	Redius	107.e	Salpa	160.e
Aspidotus	67.b	Reges apum	177.h	Salpe	ibidem
Aspidotus	ibidem.a	Regulus	127.h	Salpe	ibidem
Aspidotus	99.a	Remora	149.b.c	Salpe	ibidem
Aspidotus	111.b	Rex canum	118.e	Salpyga	186.g
Aspidotus	187.d	Rex	ibidem.d	Salpuga	184.d
Aspidotus	186.d	Rhacurus	170.d	Salus aulis	116.g
Aspidotus	197.d	Rhagion	187.e.g	Sanguifuga	149.d
Aspidotus	196.g	Rhamphos	103.d	Sanguis	110.e
Aspidotus	196.f	Rhaphis	148.h	Saperdes	168.a
Aspidotus	181.b	Rhaphis	62.h	Sapo	77.h.16.c
Aspidotus	ibidem	Rhodo	169.e	Sarda	161.b.169.h.164.e
Aspidotus	111.a	Rhodes	190.b	Sardena	161.g
Aspidotus	ibidem.e	Rhina	144.e.f	Sardina	ibidem
Aspidotus	79.b	Rhin	ibidem.f	Sardinia	ibidem.b.g
Aspidotus	119.d	Rhyniaces	114.f	Sardinia	161.c
Aspidotus	193.f	Rhombus	144.g	Sardinus	ibidem.g
Aspidotus	199.e	Rhomboceros	71.a	Sargassum	191.e
Aspidotus	ibidem	Rhombus	ibidem.b	Sargassum	191.f
Aspidotus	181.b	Rhombus	ibidem	Sargassum	191.b
Aspidotus	ibidem	Rhombus	190.d.e	Sargassum	160.d
Aspidotus	117.h	Rhombus	196.f	Sargassum	191.d.e
Aspidotus	114.e	Riparia	113.g	Sargassum	169.g
Aspidotus	117.e	Riparia alba	ibidem	Sargassum	70.a
Aspidotus	191.f	Rodrum	103.e	Sargassum	ibidem
Aspidotus	114.b	Rosa capra	79.a	Sargassum	ibidem
Aspidotus	118.a	Rosa maximum monstrum	ibidem	Sargassum ex hominum genere	10.e
Aspidotus	171.a	Rosa	118.e	Sargassum finis	18.e
Aspidotus	118.e	Rubecula	127.g	Sargassum piscis	141.h
Aspidotus	118.a	Rubellio	192.h	Sargassum	93.h
Aspidotus	119.h	Rubet	ibidem	Sargassum	94.c
Aspidotus	119.h	Ruber	ibidem	Sargassum	167.g
Aspidotus	144.d	Rubra	93.d	Sargassum quadrupes	93.h

ET INDEX.

<i>Scorpius piscis</i>	17.a.166.f.167.f	<i>Scorpio</i>	183.f	<i>Silurus</i>	168.e.g
<i>Scorpius</i>	163.g	<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Sinus</i>	17.b.118.e
<i>Scorabeus piscis</i>	154.b	<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Smurram vulgus</i>	17.h
<i>Scorabeus mactium</i>	151.b	<i>Scorpius terrestris</i>	ibidem	<i>Sinus portaria</i>	18.g
<i>Scorabeorum mactium genus</i>	ibidem	<i>Scorpius 32-pedus</i>	ibidem	<i>Sinus Cynocephalo similis</i>	ibidem.e
<i>Scorabeus ulidis</i>	192.a	<i>Scorpius piscis</i>	ibidem	<i>Sinus marina</i>	18.f
<i>Scorabeus pulcherrus</i>	154.f.h	<i>Scorpius marinus</i>	ibidem	<i>Sinus</i>	170.e
<i>Scorabeus similis</i>	ibidem.b	<i>Scorpius Chalcidius</i>	ibidem	<i>Sirus</i>	118.e
<i>Scorabeus longipes</i>	ibidem.f	<i>Scorpius</i>	184.g	<i>Siren</i>	184.g
<i>Scorabeus in Amphibia herba</i>	ibidem.b	<i>Scorpius</i>	146.d.f	<i>Sirens</i>	ibidem
<i>Scarus</i>	171.d	<i>Scylla auge</i>	154.f	<i>Sirenes</i>	175.b
<i>Scarus</i>	ibidem.g	<i>Scylla piscis</i>	146.e	<i>Simulugus</i>	119.g
<i>Scorpius</i>	170.d	<i>Scylla crustacea</i>	207.c	<i>Sis</i>	195.b
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	146.f	<i>Sitace</i>	119.f
<i>Scorpius</i>	109.g	<i>Scylla</i>	ibidem.d.f	<i>Sitace</i>	116.c
<i>Scorpius</i>	119.b	<i>Scylla serpens</i>	101.e.e	<i>Smaydes</i>	119.a
<i>Scorpius</i>	156.d	<i>Scylla Chalcidica</i>	ibidem.d	<i>Smyrna</i>	170.a
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla piscis</i>	147.e	<i>Solea</i>	171.b
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla auge</i>	114.e	<i>Solen</i>	117.c
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	66.h	<i>Solida</i>	ibidem
<i>Scorpius</i>	171.b	<i>Scylla</i>	116.a	<i>Solidipodes</i>	84.h
<i>Scorpius</i>	104.b	<i>Scylla</i>	143.g	<i>Solidus</i>	183.d
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	ibidem	<i>Solidus in leguminibus</i>	ibidem.e
<i>Scorpius</i>	170.d	<i>Scylla</i>	114.e	<i>Solidipodes</i>	84.h
<i>Scorpius</i>	187.b	<i>Scylla</i>	115.a	<i>Solidipoda</i>	ibidem
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	101.b	<i>Solus</i>	79.e
<i>Scorpius</i>	183.e	<i>Scylla</i>	ibidem	<i>Sorex</i>	68.g
<i>Scorpius</i>	107.a	<i>Scylla</i>	94.e.g	<i>Sorex</i>	77.e
<i>Scorpius</i>	183.e	<i>Scylla</i>	ibidem	<i>Spargus</i>	170.b
<i>Scorpius</i>	187.b	<i>Scylla</i>	100.h	<i>Sparus</i>	176.f
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	188.d.e	<i>Sparulus</i>	ibidem
<i>Scorpius</i>	106.b	<i>Scylla</i>	94.g.97.f	<i>Sparulus</i>	113.f
<i>Scorpius</i>	114.a	<i>Scylla</i>	98.f	<i>Sparulus</i>	ibidem
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	ibidem.e	<i>Sparulus</i>	101.e
<i>Scorpius</i>	170.d	<i>Scylla</i>	101.g	<i>Sparulus</i>	115.a
<i>Scorpius</i>	188.d.e	<i>Scylla</i>	ibidem.h	<i>Sparulus</i>	ibidem
<i>Scorpius</i>	188.d.f	<i>Scylla</i>	ibidem	<i>Sparulus</i>	183.e
<i>Scorpius</i>	189.d	<i>Scylla</i>	101.e	<i>Sparulus</i>	187.f
<i>Scorpius</i>	166.b	<i>Scylla</i>	103.b	<i>Sparulus</i>	179.c
<i>Scorpius</i>	166.b.167.a	<i>Scylla</i>	185.e	<i>Sparulus</i>	ibidem
<i>Scorpius</i>	122.f	<i>Scylla</i>	ibidem	<i>Sparulus</i>	184.f
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	171.a	<i>Sparulus</i>	184.e
<i>Scorpius</i>	ibidem.g	<i>Scylla</i>	174.a.175.b	<i>Sparulus</i>	ibidem
<i>Scorpius</i>	163.g	<i>Scylla</i>	110.d	<i>Sparulus</i>	114.b
<i>Scorpius</i>	ibidem.b	<i>Scylla</i>	ibidem	<i>Sparulus</i>	ibidem
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	180.g	<i>Sparulus</i>	101.b
<i>Scorpius</i>	171.a	<i>Scylla</i>	176.d	<i>Sparulus</i>	148.a
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	170.c	<i>Sparulus</i>	148.d.h
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	177.d	<i>Sparulus</i>	116.b
<i>Scorpius</i>	ibidem	<i>Scylla</i>	117.g	<i>Sparulus</i>	ibidem

ANIMALIUM NOMENCLATURA

Spiornix	115.d	Sodus	149.a	Terrascola	117.h
Spiritus	116.b	Supera	191.e	Tetrestria animalia	11.g
Spira	117.e	Sus	82.g-84.f	Tetacea	107.e
spiras	ibidem.d	Susfira	81.b	Tetara	ibidem
Spirites	ibidem	Sus pifia	167.f.g	Tetado	91.d
Spondylus	114.b	Sus marinus	161.f	Tetudo marina	ibidem.e
Spondylic	101.h	siniper	83.h-84.g	Tetudo lunaria	91.h
Spongia	111.g	stusale	117.c	Tetudo lunensis	ibidem.e
Spongia Achilles	119.a	Sylus	ibidem.g	Tetudo terrestris	91.g
stusale	119.g	Synagris	191.g	Tetudines alba	91.f
Sponna pifia	111.d	Synodon	ibidem.f	Tetudines atra	ibidem
Sponna	111.g	Synodontis	119.e	Tetudines mactans	ibidem
Squalus	146.a-147.c	stusale	111.f	Tetudines igit	ibidem
Squama	144.e	Synodus	ibidem	Tetudines indic	91.f
Squammosa	ibidem.g	Symia	116.h	Tetudines cornigera	ibidem
Squama	ibidem	Synopodix	116.h	Tetanus	117.d
Squilla	103.b-106.g	T		Tetura	117.e
Squilla parva	106.a.f			Tethos	ibidem
stusale	111.e	Tabanus	119.e	stusale	ibidem
Saella	118.a	Tania pifia	190.g	stusale	ibidem
Stellans ardea	130.h	Tania uerms	196.a	Tethyon	ibidem
Stellans aquila	119.h	stusale	117.e	Tetragon	119.h
Stellans a creptor	111.a	Talpa	70.h	Tetragon	ibidem
Stellans pifia	146.h	stusale	111.f	Tetragonibus	117.e
Stellans	94.f	stusale	ibidem	Tetragonibus	ibidem
Stellans anafarina	94.a	stusale	ibidem	Tetragon	ibidem
Stimulantes	135.f	Tanandus	81.e	Tetrapelydes	119.f
stusale	111.a	Tanda	119.e	Tetraz	117.d
stusale	170.e	stusale	147.f	Tetraz altera	ibidem
Stenopodites	79.b	stusale	ibidem	Tetraz	ibidem
stusale	111.g	stusale	111.d	Tetraz	119.d
Sten	ibidem	Tetra	71.d	Tetragonia	ibidem
stusale	110.g	Taurus quadrupes	71.d	stusale	ibidem.d
stusale	111.f	71.h		stusale	ibidem.a
stusale	117.e-118.b	Taurus Aethiopicus	74.e	stusale	101.b-102.c
stusale	110.b	71.a		stusale	102.a-102.d
stusale	117.h	Taurus ladicus	71.e	Thais	170.d
stusale	116.h-116.e	Taurus ams	118.b	Thais	116.f
stusale	111.b	Taurus marinus	171.c	Thais	ibidem
stusale	116.e	Taurus flandicus	111.a-b	Thais	118.d
Stenothus Africanus	ibidem	stusale	170.d	Thais	118.d
Stenothus caucasicus	ibidem.b	stusale	71.d	Thais	117.h
Stenothus caucasicus	ibidem	Tellus	118.a	Thais	ibidem
Stenothus	ibidem.c	Tenchredo	118.e	Thais	ibidem
Stenothus	ibidem	stusale	ibidem	Thais	ibidem
Stenothopodes	10.e	Tetragus anis	118.	Thais	116.f
Stenothus	118.e	Tetragus pifia	118.f-170.d	Thais	116.f
Subaquila	118.e	Tetradactylus	114.c.d	Thais	116.g
Subus	113.c	stusale	ibidem	Thais	116.e
Subus	ibidem	stusale	111.b.c	Thais	ibidem
Subulones	79.e	Tetradactylus	ibidem	Thais	114.c-115.b
Subus	77.e	Tetradactylus	ibidem	Thais	114.f
Subulus	118.a	Tetradactylus similis	114.g	Thais	116.e

ET INDEX.

<i>Zeira</i>	162.c	<i>Tinon palus</i>	ibidem.b	<i>Verrucilla</i>	103.b
<i>Thaunus</i>	163.g.h.164.c	<i>Tinon monilifera manum</i>		<i>Verrucillina</i>	ibidem
<i>Alia</i>	163.a		173.c	<i>Verruba</i>	60.b
<i>Alia</i>	163.c	<i>Trochylus alis</i>	112.c	<i>Vernax</i>	77.g
<i>Thymalus</i>	170.a	<i>Trochus</i>	63.g	<i>Velga</i>	183.f
<i>Thymus</i>	ibidem	<i>Trocta</i>	196.c.197.d	<i>Velpa lera</i>	ibidem
<i>Thymus</i>	163.b.170.a	<i>Troglodytes</i>	117.d	<i>Velpa minor</i>	ibidem
<i>Thymus</i>	ibidem	<i>Quasima</i>	ibidem	<i>Velpa annua</i>	184.f
<i>Alia</i>	163.g	<i>Trogon</i>	112.c	<i>Vesperum dux</i>	112.g
<i>Tiger</i>	64.b	<i>Troxellus</i>	191.d	<i>Vesperum soci</i>	ibidem
<i>Tilio</i>	163.h	<i>Troscus</i>	113.c	<i>Vesperilio</i>	712.f
<i>Tilio</i>	183.c.g	<i>Quasima</i>	113.a	<i>Vesperulionex Arabica</i>	
<i>Tiler</i>	ibidem	<i>Quasima palus</i>	144.g	<i>ibidem</i>	
<i>Tinea</i>	163.f	<i>Tuxala</i>	191.d	<i>Vinago</i>	124.h
<i>Tinea</i>	164.c.c	<i>Tubera</i>	218.c	<i>Vipera</i>	59.d
<i>Tineo lanaria</i>	ibidem.f	<i>Turbinata</i>	210.b	<i>Vipereus</i>	196.f
<i>Tinea lignosa</i>	ibidem.c	<i>Turbo aca</i>	113.c.116.a	<i>Virco</i>	188.f
<i>Tinea alacorum</i>	181.c	<i>Turbo refluens</i>	117.g.119.c	<i>Virio</i>	ibidem
<i>Tinea agrestis</i>	193.b	<i>Turdus palus</i>	142.a.157.a	<i>Viriflora</i>	127.d
<i>Tinea acutus</i>	196.a	<i>Turdus aca</i>	117.h	<i>Vixia</i>	191.c
<i>Tinea masie</i>	196.a	<i>Turdus pilaris</i>	118.a	<i>Vixia</i>	712.713.b
<i>Tinunculus</i>	111.b	<i>Turdus iliacus</i>	ibidem	<i>Vixia</i>	ibidem
<i>Tiphie</i>	170.c	<i>Turpina</i>	170.d	<i>Vixia marina</i>	70.h.71.a
<i>Tilio</i>	172.c	<i>Turbo</i>	172.c	<i>Vixia</i>	67.h.68.c
<i>Alia</i>	114.d	<i>Turtur</i>	114.c.119.a	<i>Vixia</i>	23.h
<i>Alia</i>	168.a	<i>Turtur</i>	118.a	<i>Vixia</i>	112.f
<i>Tormus Thaumus</i>	167.b	<i>Tympanus</i>	114.g	<i>Vixia</i>	112.f
<i>Torpedo</i>	145.a	<i>Typhie</i>	170.c	<i>Vixia</i>	196.c
<i>Torquilla</i>	113.c.116.a	<i>Typhine</i>	102.g	<i>Vixia fluvialis</i>	ibidem.d
<i>Torio</i>	172.c	<i>Typhlopes</i>	ibidem	<i>Vixia marina</i>	ibidem.e
<i>Typhie</i>	62.b	<i>Tyrannus</i>	117.c	<i>Vixia</i>	77.f
<i>Typhlus</i>	166.f		V	<i>Vixia</i>	104.b
<i>Typhlus</i>	81.c	<i>Vacca</i>	712.713.d	<i>Vixia</i>	117.c
<i>Quasima quadripes</i>	78.c	<i>Vacca Alcinx</i>	ibidem.b	<i>Vixia</i>	107.f.108.c
<i>Quasima</i>	103.a.c.g	<i>Vaccapennata</i>	173.c.191.g	<i>Voca</i>	163.b
<i>Quasima</i>	ibidem	<i>Vaccina</i>	119.f	<i>Volucra</i>	184.b
<i>Tragus spongia</i>	198.d.162.b	<i>Vaccina acicula</i>	116.f	<i>Vopiscus</i>	48.d
<i>Tragus palus</i>	198.d.162.b	<i>Vaccina palus</i>	115.h	<i>Vopiscus</i>	114.b
<i>Tragopa</i>	114.c	<i>Vaccina quadripedes</i>	64.f	<i>Vixia</i>	119.d
<i>Tragopansides</i>	ibidem	<i>Vela</i>	118.d	<i>Vixia</i>	114.c
<i>Giger</i>	117.h	<i>Venaria alis</i>	118.d	<i>Vixia</i>	170.d
<i>Trochus</i>	161.f	<i>Venaria</i>	ibidem	<i>Vixia</i>	74.b
<i>Thuchus</i>	ibidem	<i>Venaria concha</i>	101.a.103.c	<i>Vixia</i>	119.h
<i>Trochades</i>	163.c	<i>Venaria</i>	119.f	<i>Vixia</i>	ibidem.g
<i>Trochades</i>	161.162.a	<i>Vermis</i>	119.a	<i>Vixia</i>	63.b
<i>Quasima</i>	77.h	<i>Vermis rubri</i>	119.a	<i>Vixia</i>	107.c
<i>Trochena</i>	114.b	<i>Vermisulicatus</i>	ibidem.h	<i>Vixia</i>	61.h
<i>Quasima</i>	191.h	<i>Vermisulicatus</i>	ibidem	<i>Vixia</i>	118.b
<i>Quasima</i>	191.h.193.c	<i>Vermisulicatus cocti</i>	193.a	<i>Vixia</i>	170.d
<i>Troglus</i>	161.g	<i>Vermisulicatus graminei</i>	ibidem	<i>Vixia</i>	112.h
<i>Quasima</i>	191.f	<i>Vermisulicatus</i>	ibidem.c	<i>Vixia</i>	71.g
<i>Troga</i>	119.c	<i>Vermisulicatus</i>	ibidem.d	<i>Vixia</i>	146.g
<i>Trochus</i>	110.g	<i>Vermisulicatus</i>	83.f.84.g	<i>Vixia</i>	ibidem
<i>Trochum</i>	163.d	<i>Vermisulicatus</i>	117.h		

ANIMALIVM NOMENCLATVRAE

Vulpes quadrupes	46.h	Lynx pardin	161.g		Z	
Vulpes	120.a.b	Lynx	ibidem	Zagoris		169.d
		Lynx	121.e.f	Zelus		150.g
X		Lynx	122.d	Zigmis		144.e
Xanthina	167.b	Lynx	120.e	Zoophyta		127.e
Xilophobos	123.f	Lynx	123.c	Zoophyta		127.e
Xiphos	167.g	Lynx	127.h	Zoris		123.h
Xiphos	ibidem	Lynx	121.a	Zygon		120.g
Xiphos	122.b	Lynx quadrupes	121.g.14.g	Zygon		122.b
		Lynx	121.h			
Y		Lynx	123.f			
		Lynx	127.f			
		Lynx	ibidem			
		Lynx	ibidem			

PARTIVM ANIMALIVM, NECNON

aliorum quorundam, ex quibus constituuntur co-
rum animalium differentiarum, Index.

	<i>Belonius</i> 3 f. d. h. c. 34. c	<i>Alcyon</i> 113. b 163. a. 166. d	<i>Agilis</i> 23. a
<i>Belonius</i> 13. b	<i>Alcyon</i> 166. a	<i>Alcyon</i> 166. a	<i>Alcyon</i> 32. d
<i>Belonius</i> 14. c	<i>Alcyon</i> 6. a	<i>Alcyon</i> 4. f	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 15. d	<i>Alcyon</i> 113. g. 46. f	<i>Alcyon</i> 4. f	<i>Alcyon</i> 7. a
<i>Belonius</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 79. f	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 78. a
<i>Belonius</i> 17. d	<i>Alcyon</i> 4. f	<i>Alcyon</i> 7. a	<i>Alcyon</i> 3. c. d. 9. b
<i>Belonius</i> 18. d	<i>Alcyon</i> 3. d. b	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 4. g
<i>Belonius</i> 19. d	<i>Alcyon</i> 47. a	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 20. d	<i>Alcyon</i> 27. c	<i>Alcyon</i> 14. b	<i>Alcyon</i> 20. f
<i>Belonius</i> 21. d	<i>Alcyon</i> 74. f	<i>Alcyon</i> 19. d	<i>Alcyon</i> 19. d
<i>Belonius</i> 22. d	<i>Alcyon</i> 7. b	<i>Alcyon</i> 1. b. 4. g	<i>Alcyon</i> 10. d
<i>Belonius</i> 23. d	<i>Alcyon</i> 97. b	<i>Alcyon</i> 10. d	<i>Alcyon</i> 11. a
<i>Belonius</i> 24. d	<i>Alcyon</i> 174. d	<i>Alcyon</i> 84. d	<i>Alcyon</i> 84. d
<i>Belonius</i> 25. d	<i>Alcyon</i> 4. b	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 26. d	<i>Alcyon</i> 4. b. 5. a	<i>Alcyon</i> 3. d	<i>Alcyon</i> 11. f
<i>Belonius</i> 27. d	<i>Alcyon</i> 5. a	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 28. d	<i>Alcyon</i> 6. b	<i>Alcyon</i> 10. f	<i>Alcyon</i> 10. f
<i>Belonius</i> 29. d	<i>Alcyon</i> 7. a	<i>Alcyon</i> 171. b	<i>Alcyon</i> 171. b
<i>Belonius</i> 30. d	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 8	<i>Alcyon</i> 6. f
<i>Belonius</i> 31. d	<i>Alcyon</i> 4. g	<i>Alcyon</i> 158. b	<i>Alcyon</i> 7. d
<i>Belonius</i> 32. d	<i>Alcyon</i> 11. g	<i>Alcyon</i> 20. f. 140. b	<i>Alcyon</i> 20. f
<i>Belonius</i> 33. d	<i>Alcyon</i> 10. a. 11. b	<i>Alcyon</i> 3. f	<i>Alcyon</i> 4. a
<i>Belonius</i> 34. d	<i>Alcyon</i> 142. c	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 35. d	<i>Alcyon</i> 31. a	<i>Alcyon</i> 20. d	<i>Alcyon</i> 14. a
<i>Belonius</i> 36. d	<i>Alcyon</i> 32. d	<i>Alcyon</i> 6. d	<i>Alcyon</i> 20. a
<i>Belonius</i> 37. d	<i>Alcyon</i> 11. g	<i>Alcyon</i> 6. f	<i>Alcyon</i> 6. f
<i>Belonius</i> 38. d	<i>Alcyon</i> 164. a	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 39. d	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 40. d	<i>Alcyon</i> 42. f. 44. b	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 41. d	<i>Alcyon</i> 30. b	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 42. d	<i>Alcyon</i> 13. a. b	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 43. d	<i>Alcyon</i> 36. g	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 44. d	<i>Alcyon</i> 16. a	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 45. d	<i>Alcyon</i> 33. f. 40. c	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 46. d	<i>Alcyon</i> 9. f	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 47. d	<i>Alcyon</i> 8. b	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 48. d	<i>Alcyon</i> 180. d	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 49. d	<i>Alcyon</i> 6. d. 11. g	<i>Alcyon</i> 16. d	<i>Alcyon</i> 16. d
<i>Belonius</i> 50. d	<i>Alcyon</i> 3. b	<i>Alcyon</i> 4. a	<i>Alcyon</i> 4. a

PARTIV M ANIMALIVM

<i>Βελίον</i>	<i>διδόν</i>	<i>καρβίον</i>	175.δ	<i>αίλιον</i>	4.β.7.δ
<i>Βελίον</i>	5.δ	<i>καρβίον μαυρίον</i>	11.β.36.φ	<i>αίλιον</i>	5.β
<i>Βελίον καφάδ</i>	<i>διδόν</i>	<i>καρβίον μαυρίον</i>	36.φ	<i>αίλιον</i>	4.φ
<i>Βελίον</i>	43.α.β.19.φ.20.α	<i>καρβίον (βίον) μαυρίον</i>	3.δ	<i>αίλιον</i>	4.α.7.δ
	ε	<i>καρβίον</i>	15.α.16.ε	<i>αίλιον μαυρίον</i>	4.α
<i>καρβίον</i>	30.α	<i>Ορνίθιον</i>	8.α	<i>αίλιον χαρτίον</i>	7.β
<i>καρβίον</i>	<i>διδόν.γ</i>	<i>Ορνίθιον</i>	<i>διδόν.β</i>	<i>αίλιον χαρτίον</i>	<i>διδόν.δ</i>
<i>Ορνίθιον</i>	8.α	<i>είδον.δ</i>	170.γ	<i>αίλιον</i>	6.β.11.γ
<i>Ορνίθιον</i>	11.α	<i>Ορνίθιον</i>	<i>διδόν</i>	<i>αίλιον αέριον</i>	12.γ
<i>αίλιον</i>	11.α	<i>αίλιον</i>	179.α	<i>αίλιον αέριον</i>	<i>διδόν</i>
<i>Calix</i>	3.φ.4.α.13.α.16.α	<i>αίλιον</i>	181.β	<i>αίλιον αέριον</i>	8.φ
<i>Calixaria</i>	4.α.13.α.16.α	<i>Ορνίθιον</i>	5.α.δ.14.α	<i>Ορνίθιον</i>	13.β.ε
<i>Calixaria</i>	47.α	<i>Ορνίθιον αέριον</i>	5.δ	<i>αίλιον αέριον</i>	37.δ
<i>Calix</i>	7.α.δ	<i>Ορνίθιον</i>	11.φ	<i>Calix</i>	5.β.α.δ
<i>καρβίον</i>	4.β	<i>αίλιον</i>	16.δ	<i>Calix</i>	<i>διδόν</i>
<i>καρβίον</i>	7.δ	<i>αίλιον</i>	54.ε.77.φ	<i>Ορνίθιον αέριον</i>	20.α
<i>Ορνίθιον</i>	4.α.13.α.16.α	<i>αίλιον</i>	80.ε	<i>Ορνίθιον</i>	5.β.δ.β.13.δ
<i>Ορνίθιον</i>	47.α	<i>Ορνίθιον</i>	16.α	<i>αίλιον</i>	6.β.7.β
<i>αίλιον</i>	4.φ	<i>Ορνίθιον αέριον</i>	4.β	<i>αίλιον αέριον</i>	11.δ
<i>Calix</i>	3.φ.4.α.12.α.43.α	<i>αίλιον αέριον</i>	31.β	<i>Ορνίθιον</i>	7.3.δ
<i>Calixaria</i>	16.β	<i>αίλιον</i>	4.β	<i>Ορνίθιον</i>	19.β.27.γ
<i>αίλιον</i>	11.α	<i>αίλιον</i>	16.α.13.α.20.γ.ε	<i>αίλιον</i>	36.α
<i>αίλιον αέριον</i>	10.ε	<i>Calix</i>	16.α.20.γ.ε	<i>Ορνίθιον</i>	4.α.1.δ
<i>Calix</i>	18.ε	<i>αίλιον</i>	3.α	<i>Ορνίθιον αέριον</i>	8.γ.α
<i>αίλιον</i>	6.φ.γ.7.α.15.α	<i>Ορνίθιον αέριον</i>	12.δ	<i>Ορνίθιον</i>	11.δ
<i>Calix</i>	19.φ.20.α.42.β	<i>αίλιον</i>	5.β	<i>αίλιον</i>	6.β
<i>Calix</i>	43.ε	<i>αίλιον</i>	4.α	<i>Ορνίθιον</i>	13.β
<i>Calix</i>	<i>διδόν</i>	<i>αίλιον</i>	87.α	<i>Ορνίθιον</i>	17.β.δ.18.α.δ
<i>Calix</i>	43.β.4.α.α	<i>αίλιον</i>	6.α	<i>αίλιον</i>	7.α
<i>Calix</i>	43.α	<i>Ορνίθιον</i>	5.φ.6.α	<i>αίλιον</i>	19.δ
<i>Calix</i>	44.α	<i>αίλιον</i>	11.α.20.φ	<i>Ορνίθιον</i>	19.α
<i>Calix</i>	43.α	<i>αίλιον αέριον</i>	20.φ	<i>αίλιον</i>	17.α.ε
<i>Calix</i>	43.α.4.α.ε	<i>αίλιον αέριον</i>	15.δ.δ	<i>αίλιον</i>	<i>διδόν</i>
<i>Calix</i>	70.β	<i>αίλιον</i>	4.β	<i>Ορνίθιον αέριον</i>	10.φ
<i>Calix</i>	<i>διδόν</i>	<i>αίλιον</i>	<i>διδόν</i>	<i>αίλιον</i>	14.β
<i>αίλιον</i>	<i>διδόν</i>	<i>αίλιον</i>	8.β.9.α	<i>αίλιον</i>	10.φ
<i>αίλιον</i>	6.α	<i>αίλιον αέριον</i>	18.α.α	<i>Calix</i>	10.β.13.α.18.ε
<i>αίλιον</i>	14.α	<i>αίλιον αέριον</i>	17.δ	<i>αίλιον</i>	14.φ
<i>αίλιον</i>	11.γ	<i>Calix</i>	35.4.φ	<i>αίλιον</i>	4.φ
<i>αίλιον</i>	6.ε	<i>αίλιον</i>	4.β.3.β	<i>Ορνίθιον</i>	9.δ
<i>αίλιον</i>	11.β	<i>αίλιον</i>	1.β	<i>Ορνίθιον</i>	14.δ
<i>αίλιον</i>	32.α	<i>Calix</i>	36.φ.39.β	<i>Ορνίθιον</i>	16.α.12.δ.12.δ
<i>αίλιον</i>	14.β	<i>αίλιον</i>	17.δ	<i>Ορνίθιον</i>	3.φ
<i>Calix</i>	17.9.δ	<i>αίλιον</i>	6.δ	<i>Ορνίθιον</i>	9.α
<i>Calix</i>	5.α	<i>αίλιον</i>	5.δ.6.α	<i>αίλιον</i>	6.β.14.β.17.β
<i>αίλιον</i>	10.β	<i>Calix</i>	16.δ	<i>αίλιον</i>	4.β
<i>αίλιον</i>	6.α	<i>αίλιον</i>	6.α	<i>αίλιον</i>	20.δ
<i>αίλιον</i>	17.3.α	<i>Calix</i>	6.α.α.α	<i>αίλιον</i>	4.β
<i>αίλιον</i>	4.α	<i>Ορνίθιον</i>	19.β.20.α.43.β	<i>Ορνίθιον</i>	16.β
<i>αίλιον</i>	16.β	<i>Ορνίθιον</i>	14.α	<i>αίλιον</i>	3.γ.4.α.14.ε
<i>αίλιον</i>	4.α	<i>Ορνίθιον</i>	11.α	<i>αίλιον</i>	1.β
<i>αίλιον</i>	16.α	<i>αίλιον</i>	<i>διδόν</i>	<i>αίλιον</i>	6.β.16.β
<i>Calix</i>	18.β	<i>αίλιον</i>	4.α	<i>αίλιον</i>	16.δ
<i>αίλιον</i>	16.α.16.φ	<i>Calix</i>	5.α	<i>αίλιον</i>	6.β

INDEX

[illegible]

INDEX

[illegible]

PARTIVM ANIMALIVM

[illegible]

INDEX.

aculei	6.d.11.g	Scapula	5.b.8.f.h.38.b	Spina scopulorum	14.a.f
aculeatus	7.4.f	Scapularium effoliatum	14.d	Spinalis medulla	19.d
aculeatus	6.b	scelus	7.d	Spinalis pectus	138.d
aculeatus	10.4.f	scelus	4.f	Spina	27.e
Promissus	96.f	Scindens	180.f	scutellum	11.a
aculeatus	16.b	Scindens	4.3.f	scutellum	indidem
Scapula	179.a.381.d	scutellum	indidem	scutellum	14.a
aculeatus	7.e	scutellum	21.e	Scutum	18.b
Acus	6.e	scutellum	17.d	scutellum	9.b
Palus	9.f.5.c	scutellum	14.b	scutellum	19.a
Palus	indidem	Scapula	5.b.14.d.16.a	scutellum	6.e
Palus	10.a.11.a	Scapula aperta	6.a	scutellum	4.b.11.g
scutellum	6.d	Scapula aperta	indidem	scutellum	11.g
scutellum	11.b	Scutum	19.g.6.e	scutellum	10.e.f.13.b
scutellum	31.b	Scutum	indidem	scutellum	18.b
scutellum	14.b	scutellum	21.e	scutellum	indidem
scutellum	41.f	Scutum	18.b.19.a	scutellum	6.b.14.f.g
scutellum	indidem	Scutum	18.a	scutellum	5.e
scutellum	10.e	scutellum	11.g	scutellum	6.b
scutellum	10.e	scutellum	indidem	scutellum	7.b
scutellum	2	Scutum	201.b	scutellum	indidem
Scutum	6.a.14.a.e	Scutum	indidem	scutellum	3.g
Scutum	4.b	Scutum	10.e	scutellum	1.e
Scutum scopulorum	14.e.f	Scutum	10.e	scutellum	11.b
Scutum scopulorum	9.e	Scutum	10.b.1.15.b	scutellum	3.e
Scutum	4.f	Scutum	4.b	scutellum	indidem
Scutum	4.e.16.e.32.f.101.e	Scutum	indidem	scutellum	4.9.e
Scutum	16.a	Scutum	19.f.10.a.42.b	scutellum	16.a
Scutum	indidem	Scutum	16.a	scutellum	indidem
Scutum	8.d	Scutum	18.b	scutellum	4.b
Scutum	10.g.11.a	Scutum	161.g.b.	scutellum	14.b
Scutum	4.b	Scutum	167.f	scutellum	12.f.10.e.f.41.e
Scutum	4.b.31.f	Scutum	4.b	Scutum	6.e.14.e.g
Scutum	173.g	Scutum	10.f	Scutum	15.4.f
Scutum	16.f.103.e	Scutum	27.e	Scutum	3.g
Scutum	1.g	Scutum	10.f	Scutum	7.e.d
Scutum	4.e.16.f.32.f.34.e	Scutum	11.a	Scutum	15.a.16.e
Scutum	32.e.103.e	Scutum	35.f.4.e.11.f	Scutum	18.a
Scutum	32.e	Scutum	10.d	Scutum	96.b
Scutum	2	Scutum	36.f	Scutum	31.b
Scutum	20.e.f.37.e	Scutum	14.d	Scutum	11.a
Scutum	165.f	Scutum	27.e	Scutum	10.f
Scutum	indidem	Scutum	4.d	Scutum	17.d
Scutum	indidem	Scutum	10.b	Scutum	10.a
Scutum	179.f	Scutum	4.b	Scutum	T
Scutum	12.d.f.16.b.17.a.b	Scutum	13.a	Scutum	7.d.16.f.16.e.11.f
Scutum	13.e.f	Scutum	13.b	Scutum	161.f
Scutum	161.b	Scutum	11.d.g	Scutum	indidem
Scutum	indidem	Scutum	16.d	Scutum	3.b.4.f
Scutum	18.e	Scutum	6.a.14.a.16.a	Scutum	7.b
Scutum	4.g	Scutum	indidem	Scutum	indidem
Scutum	4.d	Scutum	11.e	Scutum	4.f
Scutum	15.g.b	Scutum	13.d	Scutum	7.4.b







43

